

Ўзбекистон Республикасининг

Қизил

Китоби ①

КРАСНАЯ КНИГА Республики Узбекистан

The Red Data Book of the Republic of Uzbekistan

ЎСИМЛИКЛАР

Растения

Plants

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ФАНЛАР АКАДЕМИЯСИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ЭКОЛОГИЯ ВА АТРОФ-МУҲИТНИ
МУҲОФАЗА ҚИЛИШ ДАВЛАТ ҚЎМИТАСИ

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНING
ҚИЗИЛ КИТОБИ**

2 жилдли

1 ЖИЛД

КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

В 2-х томах

ТОМ I

THE RED DATA BOOK

OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

In 2 volumes

VOLUME I

ТОШКЕНТ - 2019

ББК 42(5Ў) Ў 32
УДК 502.172:582(575.1) Ў 32

**Биология фанлари доктори,
профессор
Фурқат Ҳасановнинг
умумий таҳрири остида**

Ў 32

Ўзбекистон Республикасининг
Қизил китоби, I жилд: Ўсимликлар;
Ф.Ў. Ҳасановнинг умумий таҳрири
остида. Т.: "Chinor ENK" экологик-
ноширлик компанияси. - 356 б. - Тит.
в. ўзбек, рус ва инглиз тилларида.


Ўзбекистон Республикасининг Қизил
китоби I жилдида ўсимликлар оламининг
камёб, йўқолиб кетиш хавфи остида тур-
ган турлари тўғрисидаги маълумотлар
жамланган бўлиб, унда ҳар бир турнинг
қисқача тавсифи, тарқалиши, ўсиш шарои-
ти, сони, кўпайиши, ареалининг ўзгариш
сабаблари, маданийлаштирилиши ва муҳо-
фаза чоралари кўрсатилган.

Китоб экология ва атроф-муҳитни
муҳофаза қилиш органлари ходимла-
ри, ботаниклар, ўсимлик дунёси билан
қизиқувчилар ҳамда кенг китобхонлар ом-
масига мўлжалланган.

ББК 42(5Ў) Ў 32
УДК 502.172:582(575.1) Ў 32

Тақризчилар:

Т.А. Мадумаров,
биология фанлари доктори, профессор
Л.Х. Ёзиев,
биология фанлари доктори, профессор



ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ:

Б.Т. Қўчқоров,

Ўзбекистон Республикаси Экология ва
атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат
қўмитаси раиси

Ф.Ў. Ҳасанов,

биология фанлари доктори, профессор

К.Ш. Тожибаев,

Ўзбекистон Фанлар академиясининг
академиги, биология фанлари доктори,
профессор

Ў.П. Пратов,

биология фанлари доктори, профессор

И.В. Белолипов,

биология фанлари доктори, профессор

Ҳ.Ф. Шомуродов,

биология фанлари доктори

Н.Ю. Бешко,

биология фанлари номзоди

С.Г. Мухторалиев,

"Chinor ENK" экологик-ноширлик компанияси
раҳбари

Под общей редакцией доктора
биологических наук, профессора
Фурката Хасанова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Б.Т. Кучкаров,

председатель Государственного комитета
Республики Узбекистан по Экологии и охране
окружающей среды

Ф.О. Хасанов,

доктор биологических наук, профессор

К.Ш. Тожибаев,

академик АН РУз, доктор биологических
наук, профессор

У.П. Пратов,

доктор биологических наук, профессор

И.В. Белолипов,

доктор биологических наук, профессор

Х.Ф. Шомуродов,

доктор биологических наук

Н.Ю. Бешко,

кандидат биологических наук

С.Г. Мухторалиев,

руководитель экологической издательской
компания "Chinor ENK"

КИРИШ

Атроф-муҳитни, ўсимликлар олами-ни муҳофаза қилиш инсоният учун жуда катта ҳаётий аҳамиятга эга. Инсоният табиатдан фойдаланар экан, унинг асрлар давомида шаклланган табиий манзарасини ўзгартирмоқда, унга салбий таъсир кўрсатмоқда. Саноат тармоқлари ва қишлоқ хўжалигининг ривожланиб бориши, табиий майдонларнинг кенг миқёсда ўзлаштирилиши экологик мувозанат бузилишига олиб келмоқда. Натижада ўсимликларнинг камайиб кетиш хавфи туғилмоқда. Бу эса ўсимликлар дунёси генофондининг қисқаришига сабаб бўлмоқда. Ҳар қандай турнинг йўқолиши бошқа нохуш оқибатларга олиб келиши аниқ. Таъкидлаш жоизки, ёввойи ўсимликлар қишлоқ хўжалигида экиладиган маданий навларни яратишда бирламчи асос сифатида муҳим аҳамиятга эга.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ҳозирда 4400 га яқин олий ёввойи ўсимлик ва 2000 дан зиёд замбуруғ турлари мавжуд. Улар орасида жиддий муҳофазага муҳтож кўплаб камёб эндемик ва реликт турлар ҳам бор. Бундай турларнинг сони 300 дан ортиқ бўлиб, улар Ўзбекистон флорасининг 10-12 фоизини ташкил этади.

Республика кўриқхоналарида муҳофаза қилинаётган ўсимликларнинг умумий ҳолати нисбатан яхши бўлишига қарамай, кўплаб ёввойи турларнинг табиий захиралари кескин камайиб кетмоқда. Дунёга донғи кетган лола ва саллагуллар, қимматбаҳо ўсимлик – етмак, доривор ўсимлик – бозулбанг кабилар кейинги йилларда кескин камайиб кетди. Бир қанча турлар йўқолиб кетиш ҳолатига келиб қолди.

Аҳолининг табиатга нотўғри муносабати ҳам ўсимликларнинг камайиб кетишига сабаб бўлмоқда. Айниқса, шаҳар ва қишлоқлар атрофида қизил лола, саллагул, ширач ва шунга ўхшаш нафис гулли ўсимликлар жуда камайиб кетган.

Табиатга, ўсимликлар дунёсига нисбатан беписанд муносабатда бўлишга чек қўйиш, табиат бойликларини муҳофаза қилиш ва кўпайтириш ҳаммамизнинг асосий бурчимиздир.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришгач, атроф-муҳитни, ҳайвонот ва ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилишга алоҳида эътибор қаратилди.

1992 йил 9 декабрда "Табиатни муҳофаза қилиш тўғрисида"ги, 2004 йил 3 декабрда "Муҳофаза этиладиган табиий ҳудудлар тўғрисида"ги қонунлар, 2016 йил 21 сентябрда "Ўсимлик дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида", 2018 йил 16 апрелда эса "Ўрмон ҳақида"ги қонунлар янги таҳрирда қабул қилинди.

Бу қонунлар барча ўсимлик турларини сақлаб қолиш, уларни асраб-авайлаш ва муҳофаза қилишда муҳим ҳужжат ҳисобланади.

Ўзбекистонда Қизил китоб илк бор 1979 йилда таъсис этилган. Мазкур Қизил китобга наботот оламининг камёб, йўқолиб кетиш хавфи остидаги турлари ҳақида маълумотлар киритилган. Бундан кўзланган мақсад, жамоатчилик ва давлат идоралари эътиборини табиат муҳофазаси масалаларига жалб этишдан ва турлар генофондини сақлаб қолишга кўмаклашишдан иборат эди.

Қизил китобнинг 1984 йилги нашрига Ўзбекистон флорасининг йўқолиб кетиш хавфи остида қолган 163 та тури киритилган. Бу турларнинг тақдири билан республика мутахассислари, олимлари муттасил шуғулланиб келмоқда. Ўтган йиллар мобайнида олиб борилган қузатишлар айрим ўсимлик турларининг сони ва майдони анча кенгайганлигини кўрсатмоқда. Масалан, анзур ва Суворов пиёзлари олдинги ҳолатига келмаган бўлса-да, маълум даражада кўпайди. Энг камёб ўсимликлардан саналган Минквиц тезиуми турларининг сони 7 тадан 17 тагача ортди. Қурама тизмасида ка-

мёб ўсимликлардан ҳисобланган Корвин ширачи ўсимлигининг мавжудлиги аниқланди. Айни вақтда айрим ўсимлик турларининг сони кескин қисқариб кетган. Омонқора ўсимлиги, Писком пиёзи, Маргарита мармараги кабилар шулар жумласидандир.

Кейинги йилларда олиб борилган изланишлар ўлкамиз флорасига мансуб яна 138 турдаги ўсимликни Қизил китобга киритиш лозимлигини кўрсатмоқда. 1998 йил маълумотларига кўра, Ўзбекистон Республикасининг Қизил китобига киритилган ўсимлик турларининг сони 301 тани ташкил этган бўлса, янги нашрдан 48 оилага мансуб 313 турдаги ўсимлик ўрин олди.

Қизил китобга киритилган ўсимлик турларига Табиатни муҳофаза қилиш халқаро уюшмаси томонидан ишлаб чиқилган таснифга биноан камёблик даражасига кўра 4 та мақом (статус) берилди.

0. Йўқолган ёки йўқолиб кетганлиги эҳтимолдан йироқ эмас. Бир неча йиллар давомида табиатда учратилмаган, лекин йиғиб олиш қийин бўлган айрим жойлардагина ёки маданий шароитда сақлаб қолиш эҳтимоли мавжуд бўлган турлар.

1. Йўқолиб кетиш арафасида турган. Йўқолиб кетиш хавфи остида қолган, сақлаб қолиниши учун махсус муҳофазани талаб этадиган турлар.

2. Камёб. Маълум кичик майдонлардагина ўзига хос шароитларда сақлаб қолинган, аммо тез йўқолиб кетиши мумкин бўлган ва жиддий назоратни талаб этувчи турлар.

3. Сон жиҳатдан камайиб бораётган. Сони ва тарқалган майдонлари маълум вақт ичида табиий сабабларга кўра ёки инсон омили таъсири остида камайиб кетаётган турлар. Айни вақтда, бундай ўсимликларни ҳар томонлама назоратга олиш талаб этилади.

Аслини олганда, Ўзбекистон Республикасининг Қизил китобига киритилган турларни тоифалаш Табиатни муҳофаза

қилиш халқаро уюшмасининг қизил рўйхати (IUCN Red List) томонидан ишлаб чиқилган таснифдан фарқ қилади. Буни қуйидагича тушуниб олиш мумкин:

0 (Йўқолган ёки йўқолган бўлиши мумкин) – IUCN Red List нинг тахминан EX (Extinct – Йўқолган) ва EW (Extinct in the wild – Ёввойи табиатда йўқолган) тоифаларига мувофиқ келади.

1 (Йўқолиш арафасида турган) IUCN Red List нинг тахминан CR (Critically Endangered – Бутунлай йўқолиб кетиш арафасида турган) и EN (Endangered – йўқолиб бораётган) тоифаларига тўғри келади.

2 (Камёб) – IUCN Red List нинг тахминан EN и VU (Vulnerable – Заиф) тоифаларига мувофиқ келади,

3 (Сон жиҳатдан камайиб бораётган) IUCN Red List нинг тахминан VU и NT (Near Threatened, Йўқолиб кетиш хавфи яқин) тоифаларига тўғри келади.

Ўсимликларнинг мақоми турғун эмас, балки ўзгарувчандир, яъни, вақт ўтиши билан муайян ўсимлик бутунлай йўқолиши ёки кўпайиб, муҳофаза қилиш даражасидан чиқиб кетиши мумкин.

Қизил китобда ҳар бир турнинг ўзбекча, русча, лотинча номлари ва уларнинг қайси оила ҳамда туркумга мансублиги кўрсатилган. Шунингдек, турларнинг қисқача тавсифи (ҳаётий шакли, бўйи, шох-шаббаси, барги, гули, меваси ва фенологияси), тарқалиши ва чизма харидада учрайдиган жойлари келтирилган. Табиий шароитда ўстириш усулларига ҳам тўхталиб ўтилган. Баъзи ўринларда муайян турни тажриба майдонларида ёки саноат асосида етиштириш имкониятлари баён этилган. Муҳофаза чоралари масаласига алоҳида эътибор қаратилган. Турларга тавсиф берилар экан, соҳага доир адабиётлар ва гербарий маълумотларидан, шунингдек, кўп йиллик кузатишлар натижаларидан ҳам фойдаланилди.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академиси Ботаника институти (аввалги Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди

институти) илмий ходимларининг кейинги йиллар ичида вилоятлар бўйича олиб борган илмий-тадқиқот ишларининг самараси ўлароқ, Қизил китобнинг аввалги (2009) нашридаги маълумотлар янгиланди, яъни, Қизил китобнинг янги нашрига айрим ўзгартиришлар киритилди. Жумладан, Ўзбекистонда кам учраши, тарқалиш ҳудудлари, яъни ареаллари, асосан бошқа мамлакатлар (Россия, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва бошқалар)га тўғри келганлиги сабабли, ботқоқ тошёрари, кечки ллойдия, Мартиус қиличўти, Олтой троллиуси, юмалоқбаргли парпи, Тожикистон етмаги ва бошқа бир қанча турлар Қизил китобдан чиқариб ташланди. Улуғбек скабиозаси, Ольга сорбарияси, Олой наталиелласи ҳам қизил китобдаги турлар рўйхатидан чиқарилди, сабаби, ҳозирги кундаги маълумотларга кўра, уларнинг ареаллари Ўзбекистон ҳудудига тегишли эмаслиги аниқланди.


Бундан ташқари, сўнгги йилларда олиб борилган тадқиқотлар Келлер астрагали, Олатоғ заъфарони, Ольга сохта клаусияси, Северцов муғултови, Липская чандири сингари турларнинг кенг тарқалганини, ортиқ уларнинг йўқолиб кетиш хавфи йўқлигини кўрсатди. Шунга асосланган ҳолда, мазкур турлар Қизил китобдан чиқарилди. Мақоми 0 га тенглаштирилган, яъни йўқолиб кетган деб

ҳисобланувчи турлар сони 19 та-

дан 10 тага қисқарди. Шунингдек, 15 та ноёб ва эндемик тур ҳам Қизил китобга киритилди, улар орасида сўнгги бир неча йилда аниқланган ва ҳали фанга номаълум бўлганлари ҳам бор. Қизил китобнинг аввалги нашри билан янги нашрини таққослайдиган бўлсак, эндиликда 157 та турнинг мақоми ўзгарди. Шунингдек, аввалги нашр чоп этилганидан бери номенклатурага киритилган кўп сонли ўзгаришлар туфайли, шу жумладан, ДНК-таҳлиллаш усулидан кенг фойдаланилиши муносабати билан узоқ вақт давомида махсус адабиётларда қўлланилиб келинган кўплаб таксонлар (турлар, туркумлар, оилалар)нинг илмий номлари ҳам ўзгарди. Бу флорамизга антропоген омиллар таъсири кучли эканлигидан далолат беради.

Қизил китобнинг мазкур янги нашри мутахассислар, давлат идоралари ҳамда жамоат ташкилотлари олдига қўриқхоналар ва буюртмахоналарни кенгайтириш, ёввойи ўсимликлар сотишни тақиқлаш, хомашё учун йиғиладиган ўсимликларни териш учун лицензиялар жорий этиш каби бир қанча долзарб масалаларни кўяди.

Ўсимликлар дунёсини муҳофаза қилиш бу жараёнда кенг жамоатчилик иштирок этган тақдирдагина ижобий самара беради. Барча яқдиллик билан ҳаракат қилсагина, наботот оламининг бебаҳо бойликларини сақлаб қолишга, уларни асраб-авайлаб, муносиб равишда келгуси авлодларга қолдиришга эриша оламиз.



ВВЕДЕНИЕ

Проблема охраны окружающей среды, растительного мира имеет огромное, жизненно важное значение для всего человечества. Пользуясь природными ресурсами, человек отрицательно влияет на формирующиеся веками природные ландшафты. Развитие промышленности и сельского хозяйства, широкое освоение природных территорий приводит к нарушениям экологического равновесия, в результате которого постепенно возрастает опасность оскудения видового состава флоры и утраты генофонда растений.

Исчезновение любого вида влечет за собой необратимые последствия, так как дикорастущие растения являются исходным материалом для создания ценных сортов многих сельскохозяйственных культур.

На территории Узбекистана насчитывается около 4400 видов дикорастущих высших растений и более 2000 видов грибов. Среди них более 300 редких, эндемичных и реликтовых видов (10–12 % флоры), для охраны которых необходимы эффективные меры. И хотя состояние флоры, охраняемой в заповедниках, относительно благополучно, природные запасы многих дикорастущих видов резко сократились. Так, вследствие усиленной промышленной заготовки уменьшились ареалы тюльпанов и пионов, мыльного корня, зайцегуба опьяняющего. Значительное число видов находится на грани исчезновения.

Большой ущерб дикорастущей флоре наносит бесконтрольный сбор редких лекарственных и пищевых растений (особенно луковичных, клубнелуковичных и корневищных, выкапываемых вместе с подземными органами), принимающий все более угрожающие масштабы.

Потребительское отношение к живой природе, в том числе к растительному миру – недопустимо. Сохранять и приумножать природные богатства страны обязанность всех граждан.

Обретение Республикой Узбекистан политической и экономической независимости дало принципиально новый импульс в деле охраны окружающей среды, растительного и животного мира. 9 декабря 1992 года был принят Закон "Об охране природы", 3 декабря 2004 года – Закон "Об охраняемых природных территориях", 21 сентября 2016 года – новая редакция Закона "Об охране и использовании растительного мира", 16 апреля 2018 года – новая редакция Закона "О лесе", которые являются документами государственной важности, способствующими сохранению растительного мира страны во всём его многообразии.

В 1979 году была учреждена "Красная Книга Узбекистана", где собраны основные сведения о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах флоры. Задача "Красной книги" – привлечь внимание общественности и государственных органов к проблемам охраны живой природы, помочь сохранить генофонд.

В издание "Красной книги" 1984 года были включены 163 находящихся под угрозой исчезно-

вания вида растений, судьба которых находилась и находится в центре внимания учёных и специалистов республики. В последние годы многое изменилось. Установлено, например, что площадь и численность некоторых видов растений увеличилась (лук стебельчатый, лук Суворова и др.). А количество экземпляров очень редкого вида теиума Минквица возросло с 7 до 17. Впервые на Кураминском хребте обнаружена популяция редчайшего вида – ширача Коровина. В то же время численность унгернии Виктора, лука Пскемского, шалфея Маргариты и др. резко сократилась.

На основании исследований последних лет сделан вывод о необходимости дополнения "краснокнижников" ещё 138 редкими таксонами. Таким образом, в изданную в 1998 году "Красную книгу" независимого Узбекистана был включен 301 вид растений. А в новое издание занесены 313 видов растений, принадлежащие 48 семьям.

В соответствии с классификацией Международного Союза охраны природы (МСОП) виды растений, включенных в "Красную книгу" Узбекистана, распределены по 4-м статусам.

0. Исчезнувшие или, вероятно, исчезнувшие. Виды, не встреченные на протяжении нескольких лет, но, возможно, уцелевшие в некоторых труднодоступных местах или в культуре.

1. Находящиеся на грани исчезновения. Виды с количеством, близким к критическому уровню, и близкие к исчезновению.

2. Редкие. Виды, не находящиеся под непосредственной угрозой исчезновения, но встречающиеся в таком небольшом количестве или в таких ограниченных по площади и специфических местах обитания, что могут быстро исчезнуть. Требуется тщательное наблюдение.

3. Сокращающиеся в численности. Виды, численность и ареал которых уменьшается в течение определенного времени по естественным причинам из-за вмешательства человека или в результате того и другого. Необходима регулярная оценка их состояния.

На самом деле, категории Красной книги Узбекистана отличаются от категорий IUCN Red List.

0 (Вероятно исчезнувшие) – примерно соответствует категориям EX (Extinct, Исчезнувшие) и EW (Extinct in the wild, Исчезнувшие в дикой природе) IUCN Red List,

1 (Находящиеся под угрозой исчезновения) – примерно соответствует категориям CR (Critically Endangered, Находящиеся на грани полного исчезновения) и EN (Endangered, Исчезающие) IUCN Red List,

2 (Редкие) – примерно соответствует категориям EN и VU (Vulnerable, Уязвимые) IUCN Red List,

3 (Сокращающиеся) – примерно соответствует категориям VU и NT (Near Threatened, Находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому) IUCN Red List.

По многим причинам статус вида изменяется как в одну, так и в другую сторону: растения могут и исчезнуть и выйти из категории охраняемых.

В настоящем издании принят алфавитный порядок расположения семейств, а также родов и видов внутри них. Названия многих таксонов (видов, родов, семейств), длительное время употреблявшиеся в специальной литературе, согласно последним исследованиям, заменены на новые. Каждый вид снабжен узбекским, русским и латинским названиями с указанием семейства. Даётся краткое описание вида (жизненная форма, высота, габитус, листья, цветок, плод, фенология), распространение. Перечисляются места обитания, на схематической карте точками нанесены их местонахождения. Отмечаются способы размножения в естественных условиях. В некоторых случаях говорится о возможности культивирования вида на опытных участках или в промышленном масштабе. Описываются принятые и необходимые меры охраны. В видовых очерках использованы гербарные и литературные материалы, опросные данные и результаты многолетних полевых исследований отдельных авторов.

В результате научно-исследовательских работ по областям республики, проведённых учёными института Ботаники (бывший ИГРЖМ) АН РУз из Красной книги были исключены камнеломка болотная, ллойдия поздняя, меч-трава Мартиуса, купальница алтайская, аконит круглолистный и аллохруза таджикистанская. Эти виды редко встречаются в Узбекистане, так как их ареалы в основном расположены в других странах (Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и др.). Были исключены Красной книги скабиоза Улугбека, рябинник Ольги и наталиелла алайская, так как по современным данным, ареал этих видов не заходит на территорию Узбекистана. Кроме того, исследования последних лет показали, что такие виды, как астрагал Келлера, шафран алатавский, ложноклаусия Ольги, моголтавия Северцова, липския замечательная, распространены достаточно широко и не находятся под угрозой исчезновения. На этом основании данные растения были исключены из Красной книги. Число считающихся исчезнувшими видов со статусом 0 уменьшилось с 19 до 10. Еще 15 редких и эндемичных видов были включены в Красную книгу, в том числе несколько новых для науки видов, которые были обнаружены в последние несколько лет. По сравнению с предыдущим изданием, у 157 видов изменился статус. Также были изменены научные названия многих таксонов (видов, родов, семейств), длительное время употреблявшиеся в специальной литературе, в связи с большим количеством номенклатурных изменений, произошедших с момента выхода предыдущего издания и связанных, в том числе, с широким использованием методов ДНК-анализа. В результате

исследований выявлено, что 10 видов растений встречаются также и на других хребтах и в своеобразных экологических условиях. Особо следует подчеркнуть наличие в новом издании 18 видов со статусом 0. Это документальное свидетельство мощного антропогенного прессинга, оказываемого на нашу флору.

Новое издание "Красной книги" попутно поднимает перед специалистами-ботаниками, представителями административных органов, а также общественными организациями вопросы охраны редких видов, создания заповедников и заказников, усиления контроля за заготовкой дикорастущих декоративных и сырьевых растений.

Только при участии всех граждан республики в деле охраны природы, её растительного мира, можно достичь желаемых результатов. Только таким образом можно сохранить живую природу для грядущих поколений.



АЙИҚТОВОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЛЮТИКОВЫЕ – RANUNCULACEAE

1. КНОРРИНГ ИСФАРАГИ

Живокость Кнорринга / *Delphinium knorringianum* B. Fedtsch.



Мақоми 2. Олой тизмасидаги кичик майдонда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–45 см га етадиган ўқ илдизли, кўп йиллик ўт. Барглари, асосан, поясининг пастки қисмида жойлашган. Баргбанди узун, пастки қисми бироз кенгайган, япроғи юмалоқ-буйраксимон, 5 та панжасимон бўлакка ажралган, бўлаклари тескари тухумсимон, улар ҳам, ўз навбатида, бироз қирқилган. Пояси камшоҳ, 5–7 гулли. Гулкосаси оч бинафша рангли, кенг эллипс-тухумсимон, пихлари ингичка, узунлиги 2,5 см, учи иккига ажралган. Июнь ойида гуллаб, июль ойида мева тугади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Шохимардон дарёси ҳавзаси, шунингдек, Қирғизистонда ҳам учрайди (Ўш вилояти).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади. Умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсимликнинг умумий сонини аниқлаш, табиатда ва ботаника боғларида биоэкологик хусусиятларини ўрганиш тавсия этилади.

Манбалар. [281, 389, 453, 461].

К.Т. Тойжанов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–45 см, со стержневым корнем. Листья на длинных, при основании расширенных черешках, сосредоточены в нижней части стебля, с округло-почковидной пластинкой, пальчато-рассечённой на 5 обратно-яйцевидных долей, которые, в свою очередь, неглубоко надрезаны. Стебель маловетвистый, с 5–7 цветами. Листочки околоцветника светло-фиолетовые, широко-эллиптически-яйцевидные, с тонким шпорцем длиной до 2,5 см, на конце обычно раздвоенные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ферганская область: бассейн реки Шохимардан, а также за пределами Узбекистана: Кыргызстан (Ошская область).

Места обитания. Склоны и скалы в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Рекомендуется уточнить общую численность растений, изучать в природе и в ботанических садах его биоэкологические свойства.

Источники. [281, 389, 453, 461].

К.Т. Тойжанов.

Rare endemic species of the Alay mountain range. It is spread at the Shakhimardan valley (Ferghana region). Inhabits slopes or rocks in the lower and middle belts of mountains. Solitary specimens or small groups can be found. Total number is unknown. Measures of protection: not protected.



2. ОҚ ПАРПИ

Аконит таласский / *Aconitum talassicum* Popov

Мақоми 3. Тянь-Шань ва Помир-Олой тизма-сидаги сон жихатдан қисқариб бораётган, ареали бўлинган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1,5 м га етадиган, кўп йиллик, тугунак илдизпояли ўт. Илдизпояси тугунакларнинг ёнма-ён қўшилишидан ҳосил бўлган. Поялари оддий, тик ўсувчи. Поянинг юқори қисмидаги барглари бандсиз, қолганлари бандли, япроғи асосигача йирик тишли бўлакларга ажралган. Ёрқин кўк рангли гуллари поянинг юқори қисмида йирик шокила ҳосил қилади. Июнь-июлда гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Фарғона, Жиззах, Қашқадарё вилоятлари: Писком, Чотқол, Қурама, Фарғона, Туркистон, Зарафшон, Ҳисор тизмаларида тарқалган. Тожикистонда, Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларидаги нам ерларда ва ёнбағирлардаги булоқларнинг атрофларида ўсади. Баъзан булоқ бўйларида кичик бутазорлар ҳосил қилади.

Сони. Бутун ареали бўйлаб бир-биридан анча узоқ жойлашган унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Халқ табобатида доривор ўсимлик сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Зомин ва Ҳисор қўриқхоналарида, Угом-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида ўстирилади.

Манбалар. [214, 215].

К.Т. Тойжанов.

Статус 3. Эндемик западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с сокращающейся численностью и разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее клубнекорневищное травянистое растение высотой до 1,5 м. Корневище представлено цепочкой сросшихся клубней. Стебель прямой, про-

стой. Листья черешковые (кроме самых верхних), почти до основания рассечённые на крупнозубчатые доли. Цветки – в верхушечной кисти, крупные, светло-синие. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской, Ферганской, Джизакской, Кашкадарьинской областях: Пскемский, Чаткальский, Кураминский, Ферганский, Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. Влажные места у родников, на склонах и в долинах среднего и верхнего поясов гор. Иногда у родников образует небольшие заросли.

Численность. По всему ареалу встречается в виде отдельных, иногда значительно удалённых друг от друга небольших популяций.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. В народной медицине употребляется как лекарственное средство.


Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского, Зааминского и Гиссарского заповедников, Угам-Чаткальского и Зааминского национальных парков.

Источники. [214, 215].

К.Т. Тойжанов.

Endemic species with reducing area at the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Pskem, Chatkal, Ferghana, Turkestan, Zeravshan, Hissar Ranges (Tashkent, Ferghana, Jizzakh, Kashkadarya regions). Inhabits wet places near springs, on the slopes and in valleys of the middle and upper belts of mountains. Sometimes, forms brushwoods near springs. Sometimes, separate small populations are met all over the area. Limiting factors: used in national medicine. Measures of protection: protected in the Chatkal, Zaamin and Hissar state nature reserves, the Ugam-Chatkal and Zaamin National Parks.



3. БОЙСУН ПЎФАНАГИ

Ветреница байсунская / *Anemone baissunensis* Juz.

Мақоми 3. Кўхитанг ва Ҳисор тизмаларида ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Чўзиқ тугунакли кўп йиллик ўт. Илдизолди барглари бандли, уч карра бўлинган, бўлаклари юмалоқ ёки ўткир тишли. Ён бўлаклари бандсиз ёки қисқа бандли, ўрта қисмидаги банди 1,5 см узунликка эга. Ўрама барглари 2-3 тани ташкил этади, юқори қисми уч карра бўлинган. Гулбанди 1-4 тагача туклар билан қопланган. Гулларининг диаметри 1-2, 3-4 см, сариқ рангли. Чангдони ва чангчи иплари сариқ, уруғчиси эса қора. Уруғи 0,3-0,35 см узунликда. Тумшукчасининг узунлиги 0,2 см, сертук. Март-апрель ойларида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида - Шалқонсой атрофида; Ҳисор тизмасида - Бойсун, Шўрчи, Денов атрофларида ўсади. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларидаги сариқ ва майда тупроқларда ҳамда тоғ этакларидаги ола тупроқларда ўсади.

Сони. Табиатда кам учрайди. Одатда, кичик-кичик тўпчалар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан, айрим ҳолларда вегетатив йўл билан ҳам кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари йиғиб, тугунаклари қазиб олинади. Чорва моллари томонидан пайҳон қилинади.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1965 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда сақланиб қолган тупларини назорат остига олиш лозим. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [98, 99, 129, 354].

К.Т. Тойжанов.

Статус 3. Редкий эндемик Гиссарского хребта и Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с продолговатыми клубнями. Прикорневые листья на черешках, трижды рассечённые на сегменты с закруглёнными или заострёнными зубцами. Боковые сегменты сидячие или на коротких черешках, средний на черешке длиной до 1,5 см. Листочки обёртки (2-3) в верхней части трижды рассечённые. Цветоносы (1-4) покрыты волосками. Цветки с диаметром 1-2, 3-4 см, жёлтые. Пыльники и тычиночные нити жёлтые, пестики чёрные. Семянки до 0,3-0,35 см, с загнутым носиком, длиной до 0,2 см, шерстисто-волосистые. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитангский хребет - окрестности Шалкансая; Гиссарский хребет - окрестности Байсуна, Шурчи, Денау. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Лёссовидные и мелкоземистые склоны, выходы нестроцветных пород в предгорьях.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко - вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и клубней, вытаптывание скотом.

Культивирование. С 1965 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за популяциями. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [98, 99, 129, 354].

К.Т. Тойжанов.

Rare endemic species of the Hissar and Kughitang mountain ranges. It is spread at the Kughitang ridge: the Shalkansay, the Hissar range: nearby Baysun, Shurchi, Denau (Surkhandarya region). Inhabits loess-like and gypseous slopes of the foothills and lower mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: flowers and tubers collection, trampling down by cattle. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



4. БУХОРО ПЎФАНАГИ

Ветреница бухарская / *Anemone bucharica* Regel

Мақоми 3. Ўзбекистонда кам учрайдиган, Жанубий Помир-Олойда ўсадиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Тугунаги юмалоқ ёки узунчоқ кўринишдаги кўп йиллик ўт. Илдизолди барглари бандли, оч яшил, юмалоқ-юраксимон, уч карра бўлинган, сийрак тукли. Япроғининг ён бўлаклари бандсиз, ўрта қисмидагилари эса қисқа бандли. Ҳама барглари 3 та, уч карра бўлинган. Гулпоялар 1-3 та. Гуллари йирик, диаметри 3-4 см, тик турувчи, очик, ликопчасимон. Гулқоса қизил, ички томони ялтироқ, ташқи томони ётиқ тукли. Уруғи қалин тукли. Апрель-июнь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида - Шалқонсой атрофи, Бойсунтоғ ва Боботоғ тизмаларида тарқалган (Тожикистонда ҳам учрайди).

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларидаги сарғиш тусли ва майда заррали тупроқларда ҳамда тоғ этакларидаги ола тупроқларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган, тўп-тўп ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва тугунақларининг маҳаллий аҳоли томонидан йиғиб олинishi ва чорва моллари боқилиши натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1962 йилдан буён ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда мавжуд популяциялари қатъий назорат остига олинishi лозим. Сурхон давлат кўрикхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [98, 99, 129, 354].

К.Т. Тойжанов.

Статус 3. Эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с клубнями от округлой до про-

долговатой формы. Прикорневые листья на черешках ярко-зелёные, округло-сердцевидные, трижды рассечённые, рассеянноволосяные. Боковые сегменты почти сидячие, средний - на коротком черешке. Листочки обёртки (3) трижды рассечённые. Цветоносы в количестве 1-3. Тычинки и пестики многочисленны. Цветки крупные, до 3-4 см в диаметре, прямостоячие, открытые, блюдцевидные. Листочки около цветника красные, внутри блестящие, снаружи прижато-волосяные. Семена густоволосяные. Цветёт и плодоносит в апреле-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг - окрестности Шалканская, хребты Байсунтау и Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Лёссовидные и мелкоземистые склоны, выходы пестроцветных пород в предгорьях.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко - вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и клубней местным населением, выпас скота.


Культивирование. С 1962 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [98, 99, 129, 354].

К.Т. Тойжанов.

Endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang, Baysuntau and Babatag ranges (Surkhandarya region). Inhabits loess-like and fine earth slopes, on gypseous rocks. Rarely, small groups can be found. Limiting factors: collection of flowers and tubers by population, cattle overpasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



5. ТУКСИЗ СУҒУРЎТ

Горицвет голочашечный / *Adonanthe leiosepala* (Butkov) Chrtěk et Slaviková



Мақоми 3.
Жануби-ғарбий
Тянь-Шанда
тарқалган ареали
бўлинган, камёб энде-
мик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи
15–20 см, попуксимон илдиз-
ли, кўп йиллик ўт. Илдизпоя
бўғзидан чиққан кўнғир барг-

лари қисқа, бир нечта поялар ўсиб чиқади. Новда-
лари сершоҳ, сербарг. Барглари патсимон бўлинган,
юпқа, майда. Гуллари йирик, якка-якка, тўқ сариқ
рангли. Меваси юпқа илмоқсимон учли, хиёл
қайрилган. Май ойида гуллаб, меваси июль–август
ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизма-
сида – Паркент, Заркент қишлоқлари атрофларида,
Сўқоқсой, Бошқизилсой ва Келинчаксойда; Курама
тизмасида – Қамчиқ довоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги
тошли, шағалли, майда жинс тупроқларда ва
қояларда ўсади.

Сони. Бу тур тарқалган ерлар 3,5–4 минг гек-
тарни ташкил қилади. Умумий сони 30–40 минг туп
атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

**Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаб-
лари.** Униб чиқиш қобилияти 1–2 фоизни ташкил
этади. Етилган уруғлари 2–3 йилдан сўнг униб
чиқади. Рақобатга чидамсиз. Кўриқхона шароитида
якка ҳолда ўсган катта ёшдаги туплари аниқланган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол давлат биосфера
кўриқхонаси ҳамда и Угам-Чотқол биосфера резер-
ватида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [84–87, 130, 247].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик юго-западного Тянь-
Шаня с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее кистекор-
невое травянистое растение высотой 15–20 см.
От шейки корневища отходит несколько стеблей,
покрытых бурыми, редуцированными листьями.
Стебли ветвящиеся, густооблиственные. Листья
перисто-рассечённые, тонкие. Цветки крупные,
одиночные, ярко-жёлтые. Плоды с тонким крючко-
вато-изогнутым носиком. Цветёт в мае, плодоносит
в июле–августе.

Распространение. Ташкентская область: Чат-
кальский хребет: в окрестностях посёлков Паркент,
Заркент, Сукок, а также в Башкызылсае, Келинчек-
сае; Кураминский хребет: перевал Камчик.

Места обитания. Щелнистые, каменистые и
мелкоземистые склоны, выходы скал субальпий-
ского пояса.

Численность. Известные участки ареала охва-
тывают 3,5–4 тыс. га. Общая численность: 30–40
тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.
Очень низкая всхожесть (1–2 %). Семена всходят
после 2–3-летнего периода покоя. Низкая конку-
рентоспособность. На заповедной территории вид
представлен одиночными, старовозрастными эк-
земплярами.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском госу-
дарственном биосферном заповеднике и Угам-Чат-
кальском биосферном резервате.

Источники. [84–87, 130, 247].

К.Ш. Тожибаев.

*Rare endemic species of the south-western Tien-Shan
with reducing area. It is spread at the Chatkal range:
the surroundings of Parkent, Zarkent, Sukok and also in
Bashkyzylsay, Kelincheksay; the Kurama range: the Kam-
chik pass (Tashkent region). Inhabits stony and fine earth
slopes, rocks of the alpine belt. Known area plots occupy
3.5–4 thousand ha. Total number: 30–40 thousand speci-
mens. Limiting factors: very low germination (1–2%).
Seeds spring up after 2–3 years of dormancy. Low com-
petition capacity. In the territory of state reserve the spe-
cies are represented by single, old specimens. Measures
of protection: protected in the Chatkal biosphere state
reserve and the Ugam-Chatkal biosphere reserve.*



АНОРДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ГРАНАТОВЫЕ – PUNICACEAE

6. ЁВВОЙИ АНОР

Гранат обыкновенный / *Punica granatum* L.

Мақоми 3. Ўзбекистонда табиий ҳолда жуда кам сақланиб қолган, ареали бўлинган реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2 м га етадиган бута. Барги чўзиқ, тескари тухумсимон, узунлиги 6–8 см, эни 7–15 мм, чармсимон, қисқа шохларда тўп-тўп, узун шохларда эса қарама-қарши ўрнашган. Гули калта новдаларда жойлашган. Косачаси қайишсимон мустаҳкам, тожбарги оч қизил рангда. Меваси юмалоқ, йирик. Май–августда гуллаб, сентябрь–октябрь ойларида мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тоғининг жануби-ғарбий қисмида Тўпаланг, Сангардак дарёлари хавзаларида тарқалган. Тожикистон, Туркменистон, Кавказорти, Туркия, Шимолий Эрон, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмида–денгиз сатҳидан 1000–1600 м баландликдаги салқин ва нам дараларда ўсади.

Сони. Купинча якка ҳолда, баъзан бошқа дарахт ва буталар билан биргаликда ўсади. Айрим жойларда соф анорзорларни ташкил этади. Тупларининг умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва илдиз бачкисидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Анорзорларнинг бузиб юборилиши ва мевалари пала-партиш йиғиб олинishi туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Анор одамлар томонидан 4000 йилдан буён етиштириб келинади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 274].

И.В. Белолипов.

Статус 3. Очень редкий, исчезающий в Узбекистане реликтовый вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник высотой до 2 м. Листья продолговато-обратнояйцевидные, кожистые, длиной 6–8 см, шириной 7–15 мм, на укороченных побегах сидят пучками, на удлинённых – супротивно. Цветки на укороченных побегах. Чашечка кожистая. Лепестки ярко-красные. Плод шаровидный, крупный. Цветёт в мае–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта – бассейны рек Тупаланг, Сангардак. За пределами Узбекистана – Таджикистан, Туркменистан, Закавказье, Турция, Северный Иран, Афганистан.

Места обитания. Увлажнённые и защищённые места в небольших ущельях и расщелинах гор на высоте 1000–1600 м.

Численность. Встречается редко, одиночными кустами или небольшими зарослями вместе с другими древесными и кустарниковыми породами, очень редко – небольшими чистыми зарослями. Точные учёты не проводились.



Размножение. Вегетативное (отпрысками) и семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территории и нерегулируемый сбор плодов местным населением.


Культивирование. Культура граната обыкновенного известна более 4000 лет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 274].

И.В. Белолипов.

Very rare endangered in Uzbekistan relict species with reducing area. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Tupalang and Sangardak valleys (Surkhandarya region). Inhabits wet and protected places in small gorges and clefts of mountains at the altitude of 1000–1600 m. Rarely, solitary specimens or small groups with other trees and shrubs, very seldom, small pure brushwoods. Total number was not calculated. Limiting factors: the economic development of the territory and irregular harvest by local population. Measures of protection: not protected. Some populations are protected in forestries.



БИГНОНИЯДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО БИГНОНИЕВЫЕ – BIGNONIACEAE

7. ОЛЬГА ИНКАРВИЛЛЕЯСИ

Инкарвиллея Ольги / *Incarvillea olgae* Regel



Мақоми 3. Помир-Олойдаги жуда камёб, йўқолиб кетиш арафасидаги реликт тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 1,5 м га етади. Пояси унча кўп эмас, тик ўсади. Барглари оддий, узунлиги 6–10 см, патсимон қирқилган. Гуллари ўсимликнинг учидаги рўваксимон тўпгулларда ўрнашган. Косачаси туксиз, узунлиги 3–4 см, кенг учбурчак тишчали. Гултожи воронкасимон, йирик, беш бўлмали, пушти-тўқ қизил рангли, баъзан оқ, узунлиги 4 см, ташқи томони туксиз, ички томони сийрак тукли. Чангчиларининг иллари туксиз, чангдони икки қанотчали, сийрак тукли. Уруғдони узун, туксиз устунчали. Меваси кўп уруғли, чўзиқроқ, пўсти қалин, узунлиги 5–10 см, эни 1 см келадиган сал қайрилган ёйсимон кўсакча. Уруғи 1 см гача узунликда, ярим пардасимон, оқ қанотчали. Июнь–август ойларида гуллаб, август–сентябрда мева тугади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Помир-Олой (Олой тизмаси)нинг Сўх ва Шоҳимардон дарёлари ҳавзасида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Адир ва тоғларда 1500–2500 м баландликдаги майда чағир тошли, тошли ёнбағирларда шағалли дарё ўзанларида ўсади.

Сони. Кичик гуруҳлар ҳосил қилиб ўсади. Популяцияларининг умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Антропоген омиллар таъсирида ва чорва моллари боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1961 йилдан буён муваффақиятли ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [25, 156–159, 210].

И.В. Белолипов.

Статус 3. Очень редкий, находящийся под угрозой исчезновения реликтовый вид Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 1,5 м. Стебли немногочисленные, прямостоячие. Листья простые 6–10 см длины, перисто рассеченные. Цветы в верхушечном, метельчатом соцветии. Чашечка голая, 3–4 мм длины с широко треугольными зубцами. Венчик воронковидный, крупный, пятилопастной, розово-пурпуровый, редко белый, до 4 см длины. Тычинки с голыми нитями и рассеянно опушенными двукрылыми пыльниками. Завязь с длинным голым столбиком. Плод многосемянная удлинённая кожистая, слегка согнутая коробочка 5–10 см длины и 1 см ширины. Семена до 1 см длины с полупрозрачными белыми крыльями. Цветет в июне–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ферганская область: Памиро-Алай (хребет Алайский – бассейны рек Сох и Шакхимардан). За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. На галечниковых поймах и конусах выноса, щебнистых мелкоземистых, каменистых склонах предгорий и гор, на высотах 1500–2500 м.

Численность. Встречается небольшими группами. Общая численность популяций не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности. Антропогенное воздействие и выпас скота.

Культивирование. Успешно выращивается с 1961 г. в Ботаническом саду АН РУз. В культуре устойчива.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [25, 156–159, 210].

И.В. Белолипов.

Very rare endangered relict endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Pamir-Alay (the Alay range: the Sokh and Shakhimardan valleys). Inhabits pebbles, gravelly and stony slopes in foothills and middle mountain zone (1500–2500 m.s.l.) Growing in micro-populations. Total number is unknown. Limiting factors: antropogenic factors and overgrazing. Measures of protection: not protected.



БУРЧОҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОТЫЛЬКОВЫЕ (БОБОВЫЕ) – FABACEAE (LEGUMINOSAE)

8. БИНАФША ГУЛЛИ АРҒУВОН

Багрянник Гриффита / *Cercis griffithii* Boiss.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олой тизмаларида ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–4 м келадиган, кенг шох-шаббали дарахт. Бир йиллик новдаларининг пўстлоғи қўнғир-қизил рангли. Барглари юмалоқ, буйраксимон, туб қисми кенг ўйилган, устки томони яшил, пастки томони кўкимтир рангда. Гуллари калта-калта шокилаларга тўпланган. Тожбарги қирмизи-бинафша рангли. Дуккагининг узунлиги 6–8 см, эни 1 см. Май ойида гуллаб, июнда мева беради. Манзарали дарахт.

Тарқалиши. Тошкент ва Сурхондарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань – Угом, Қурама тизмалари; Помир-Олой – Ҳисор тизмасида ва Боботоғда ўсади. Тожикистон ва Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмларидаги тошли, тошли-шағалли ва майда заррала тууроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди. Баъзан кичик аргувонзорлар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қурилиш материаллари ва ўгин учун кесиб олинishi туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [89, 156–159, 297].

Р.И. Қозоқбоев.

Статус 2. Редкий вид в западном Тянь-Шане и Памиро-Алае.

Краткое описание. Дерево высотой 3–4 м, сильно ветвистое, образует широкую крону. Годичные побеги с красно-бурой корой. Листья округлые, почковидные, при основании широко-выемчатые, верхняя поверхность листа зелёная, нижняя – синеваато-сизая. Цветки собраны в укороченные кисти. Венчик пурпурно-фиолетовый. Бобы длиной 6–8 см, шириной до 1 см. Цветёт в мае, плодоносит в июне. Декоративен.

Распространение. В Ташкентской и Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань – Угамский, Кураминский хребты; Памиро-Алай – Гиссарский хребет, Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые, каменисто-щебнистые южные склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными особями, реже образует небольшие рощицы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Заготавливается населением на топливо и древесину.


Культивирование. Культивируется.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [89, 156–159, 297].

Р.И. Казакбаев.

Rare endemic of the western Tien-Shan and southern Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Kurama ranges; the Pamir-Alay: the Hissar range, the Babatag (Tashkent and Surkhandarya regions). Inhabits fine earth, stony-southern slopes in the lower belt of mountains. Single specimens, rarely forms small groves. Limiting factors: using as firing and wood. Measures of protection: not protected.



9. АБОЛИН АСТРАГАЛИ

Астрагал Аболина / *Astragalus abolinii* Popov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда кичик майдонда тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт. Қисқа танасидан осилиб турувчи ингичка, кўплаб бурама поялар ўсиб чиққан. Барги мураккаб, 5–6 см узунликда, баргчалари 4–6 жуфт, чўзиқроқ юмалоқ шаклда, узунлиги 7–14 мм, эни 5–8 мм. Гуллари ёйиқ, момиқ гулпопугида 3–9 тадан жойлашган. Косачаси (гуллаган даврда) бироз каттаяди, кейинчалик тухумсимон-қабарик шаклга киради. Дуккаги 8–12 мм узунликда, оқиш, хурпайган, қалин тукли. Июнда гуллаб, июлда мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол, Угом, Писком ҳамда Қоржонтов тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1000–1200 м баландликдаги қуёш нури тик тушмайдиган қоятошларнинг ёриқларида ва дараларнинг салқин ёнбағирларида ўсади.

Сони. Чотқол тизмасида бир-биридан ажралган ҳолда кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади. Оқбулоқ атрофларида 10 та жойда борлиги аниқланган. Писком дарёси ҳавзасида 150–250 атрофидаги туплардан иборат 20 дан ортиқ популяциялари мавжуд.

Кўпайиши. Фақат уруғидан кўпаяди. Оқбулоқ атрофларида панароқ ёнбағирларда ёш ниҳоллари учрайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Янги униб чиққан майсалари ва ёш ниҳолларининг камлиги ўсимликнинг секинлик билан кўпайишидан далолат беради. У ўзига хос шароитда ўсишни талаб қилади ва турлараро рақобатга дош бера олмайди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [343, 345].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с укороченным стволиком, от которого отходят многочисленные извилистые свисающие тонкие стебли. Листья длиной 5–6 см, листочки 4–6-парные, округло-овальные, закруглённые, длиной 7–14 мм, шириной 5–8 мм. Цветки собраны в 3–9-цветковые рыхлые кисти. Чашечка при цветках

слегка вздутая, позже яйцевидно-вздувающаяся. Бобы длиной 8–12 мм, оттопыренно-бело шерстисто-мохнатые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский, Угамский, Пскемский хребты и Каржантау.

Места обитания. Трещины отвесных скал на высоте 1000–1200 м, преимущественно северные, тенистые склоны ущелий.

Численность. Встречается разрозненно, образует небольшие популяции на Чаткальском хребте. В районе Акбулака отмечен в 10 пунктах. В бассейне реки Пскем имеется более 20 популяций, с численностью по 150–250 растений.

Размножение. Только семенное. В районе Акбулака на защищённых склонах встречаются молодые всходы.

Причины изменения численности и ареала. Малочисленность ювенильных растений и всходов, свидетельствующая о слабой воспроизводительности; приуроченность к характерным местообитаниям и низкая конкурентоспособность.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном государственном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [343, 345].

Ғ.М. Шерматов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal, the Ugam, the Pskem, the Karzhantau ranges (Tashkent region). Inhabits cracks of sheer rocks at the altitude of 1000–1200 m above sea level, mainly, the northern shady slopes of gorges. Can be met separately. Forms small populations at the Chatkal Range. In Akbulak, is observed in 10 points. At the Ugham, in the basin of river Pskem, the Karzhantau, 150–250 plants can be observed. Limiting factors: scarcity of juvenile plants and seedlings, i. e., weak ability for reproduction; thrived in typical habitats and low competition capacity. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal national park.



10. БАРАНОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Баранова / *Astragalus baranovii* Popov

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 4–10 см келадиган деярли поясиз, ер бағирлаб ўсадиган кўп йиллик ўт. Асосий поясининг ер остида жойлашган ёғоч қисмидан бир йиллик, ингичка, 2 см узунликдаги ётиқ оқ туклар билан қопланган поялар ўсиб чиқади. Барги 2,5–6 см узунликда, баргчалари 4–6 жуфт, тухумсимон ёки юмалоқ-тухумсимон 4–6 мм узунликда, тўмтоқроқ, ҳар икки томони ётиқ оқ туклар билан қопланган. Гулпопуги қисқа, соябонсимон, ғовак ва момиқ, 1,5–2 см узунликдаги 4–5 та гули бор. Тожбарги оч пушти рангли. Дуккаги чўзиқ-наштарсимон, узунлиги 10–11 мм, эни 3 мм, бироз ҳурпайган оқ тукли, икки уяли. Июлда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида: Катта Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ минтақасининг юқори қисмида, оҳақтошли қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Фақат икки жойда ўсиши аниқланган.

Кўпайиши. Одатда, уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Дам олиш масканларининг қурилиши ва чанғи учиш учун трассалар барпо этилиши ўсимлик сонига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 343].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее высотой 4–10 см приземистое растение с подземным деревянистым длинноветвистым стволиком, почти бесстебельное или с тонкими, прижато-белопушистыми годичными стеблями длиной до 2 см. Листья длиной 2,5–6 см, листочки 4–6-парные, яйцевидные или округло-яйцевидные, длиной 4–6 мм, закругленно-тупые, с обеих сторон седовато-прижато-волосистые. Кисти – укороченные, зонтиковидные, рыхлые, 4–5-цветковые, длиной 1,5–2 см. Венчик бледно-розовый. Бобы ланцетно-продолговатые, длиной 10–11 мм, шириной 3 мм, полуоттопыренно-беломохнатые, двугнёздые. Цветёт в июле, плодоносит в августе.


Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет: Большой Чимган.

Места обитания. Расщелины известняковых скал в субальпийском поясе гор.

Численность. Отмечен только в двух пунктах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. В связи с созданием зон отдыха и лыжной трассы численность вида резко сократилась.





Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 343].

К.Ш. Тожибаев.

Endemic species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range: the Greater Chimgan (Tashker region). Inhabits clefts of calcareous rocks in the subalpine belt of mountains. In 2 localities can be observed. Limiting factors: reducing due to creation the resorts and ski-tracks. Measures of protection: r protected.



11. БИНАФШАРАНГ АСТРАГАЛ

Астрагал центральный / *Astragalus centralis* E. Sheld.

Мақоми 2. Қизилқумдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см орасидаги оқ туклар билан қопланган бутача. Пояси кумушранг, бироз тарвақайлаган, қалин, ипаксимон тукли. Баргининг узунлиги 2–5 см, баргчалари 3–5 жуфт, эллипссимон, ўткир учли, узунлиги 8–14 мм, ҳар икки томони қалин кумушранг-ипаксимон туклар билан қопланган. Тўпгули юмалоқ ёки тухумсимон, узунлиги 2–3,5 см, зич жойлашган, кўпгулли. Косачасининг узунлиги 8–10 мм, қалин ва майда, кенг ёйилган, юмшоқ тукли. Гултожи бинафша ранг. Дуккаги майда, бандсиз, юмалоқ-чўзиқроқ шаклда, қирралари ўткир, пўсти қалин, бир уяли. Май ойида гуллаб, май-июнь ойларида мева беради.

Тарқалиши. Бухоро ва Навоий вилоятлари: Қизилқумда (Кулжуктоғ, Оқтоғ, Оқтошли ва Оёқғужумди атрофларида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Қояларнинг ёриқларида, оҳақтошли ва тошли, тош-шағалли, баъзан майда тупроқли-шағалли қолдиқ тоғларнинг ёнбағирларида ўсади.

Сони. 1200 га яқин тупдан иборат бешта популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Қизилқум чўл станцияси коллекция майдонида кўпайтиришга қаратилган уринишлар натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Кулжуктоғни муҳофаза этиладиган худудлар қаторига киритиш тавсия этилган.

Манбалар. [266, 267, 3350, 351].

К.Ш. Тожибаев, Ш.У. Саробаева.

Статус 2. Редкий эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Кустарничек, опушенный белыми волосками, высотой 5–10 см. Стебли серебристые, густо-полуоттопыренно-шелковистые. Листья длиной 2–5 см, листочки 3–5 парные, эллиптические, острые, длиной 8–14 мм, с обеих сторон

густо-серебристо-шелковистые. Соцветия шаровидные или яйцевидные, длиной 2–3,5 см, плотные, многоцветковые. Чашечка длиной 8–10 мм, густо и довольно мягко-оттопыренно-короткомохнатая. Венчик фиолетовый. Бобы сидячие, мелкие, овальные, на спинке и брюшке килеватые, кожистые, одногнездные. Цветёт в мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкумы (горы Кулджуктау, Актау, Актасты, окрестности Аяк-гужумды).

Места обитания. Трещины скал, известняковые и каменные, каменно-щебнистые, изредка мелкоземисто-щебнистые склоны останцевых гор.

Численность. Отмечены около 1200 особей в пределах 5 популяций.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Попытки введения в культуру на территории Кызылкумской пустынной станции АН РУз не увенчались успехом.

Меры охраны. Кулджуктау рекомендован к утверждению в качестве охраняемой территории.

Источники. [266, 267, 350, 351].

К.Ш. Тожибаев, Ш.У. Саробаева

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktau mountains, the Aktau, the Aktasty, the Ayak-guzhumdy (Bukhara and Navoi regions). Inhabits cracks of rocks, calcareous and stony, gravelly, fine earth slopes of the relict low mountains. There are 5 populations with about 1200 plants can be found. Limiting factors: unknown. Measures of protection: the Kuldzhuktau recommended as a protected area.



12. БОРИС АСТРАГАЛИ

Астрагал Бориса / *Astragalus borissianus* Gontsch.

Мақоми 1. Олой тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см, деярли поясиз ёки жуда қисқа пояли, барг қолдиқлари билан ўралган кўп йиллик ўсимлик. Барги 10–23 см узунликда, баргчалари 10–13 жуфт, чўзиқ, эллипс шаклида ёки ўткир наштарсимон, узунлиги 7–15 мм, қаттиқ, япроқчаларининг ҳар икки томони ётиқ оқ тукли. Гул-попуклари қисилган, қисқа, 6–8 гулли. Дуккаги бандсиз, чўзиқ-тухумсимон, 14–15 мм узунликда, қаттиқ, хурпайган оқ туклар билан қопланган, икки уяли. Июнда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасининг Шоҳимардон дарёси ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Арчазорларда, тошли тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чора-тадбирлар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [2, 156–159].

Ф.Ў. Ҳасанов

Статус 1. Редкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное растение, высотой 30 см, с короткими, сильно укороченными стеблями, одетыми старыми черешками листьев. Листья длиной 10–23 см, листочки 10–13-парные, продолговато-эллиптические или ланцетные, острые, длиной 7–15 мм, жёсткие, с обеих сторон прижато-беловолосистые. Кисти – сжатые, короткие, 6–8-цветковые. Бобы сидячие, продолговато-яйцевидные, длиной 14–15 мм, жестко-оттопыренно-беломохнатые, двугнёздые. Цветёт в июне, плодоносит в августе.


Распространение. Ферганская область: Алайский хребет: бассейн реки Шахимардан.

Места обитания. Каменистые склоны среди арчовников.

Численность. Встречается одиночными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [2, 156–159].

Ф.О. Хасанов

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: the Shakhimardan river basin (Fergana region). Inhabits stony slopes, among the juniper stands. Single specimens can be found. Measures of protection: not protected.



13. БУТКОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Буткова / *Astragalus butkovii* Popov

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 4–6 см келадиган кўп йиллик ўт. Поялари оқ, қиррали жўякларга эга бўлиб, ётиқ, ғадир-будур, момиқ оқ туклар билан қопланган. Баргининг узунлиги 7–8 см, баргчалари 3 жуфт, тескари чўзиқ-тухумсимон ёки эллипс шаклида, узунлиги 7–15 мм, эни 4–7 мм, ҳар икки томони момиқ туклар билан қопланган. Гулпопуғи ғоваксимон, 5–8 гулли, узунлиги 4–5 см. Тожбарги сарғиш. Дуккаги қисқа бандли (0,75 мм), чўзиқ наштарсимон, узунлиги 9–19 мм, эни 2,5–3 мм. Май–июнда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмаси Қашқадарё ҳавзасида – Тошқўрғон қишлоғи атрофида учрайди.

белые. Листья длиной 7–8 см, листочки 3-парные, продолговато-обратнойцевидные или эллиптические, длиной 7–15 мм, шириной 4–7 мм, с обеих сторон, пушистые. Кисти рыхлые, длиной 4–5 см, 5–8-цветковые. Венчик желтоватый. Бобы на короткой (0,75 мм) ножке, продолговато-ланцетные, длиной 9–19 мм, шириной 2,5–3 мм. Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Кашкадарья, окрестности селения Ташкуртан.

Места обитания. Краснопесчаники в арчовнике.

Численность. Встречается очень редко, единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [156–159, 343].

Ф.О. Хасанов.



Ўсиш шароити. Арчазорлардаги кум-туғилларда ўсади.

Сони. Табиатда ниҳоятда кам тарқалган. Онда-сонда якка тупларини учратиш мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [156–159, 343].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли высотой 4–6 см, угловато-бороздчатые, прижато-шероховато-пушистые,

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: the Kashkadarya river basin, nearby the Tashkurgan village (Kashkadarya region). Inhabits sandstones among juniper stands. Very rare, isolated specimens can be found. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



14. БУХОРО АСТРАГАЛИ

Астрагал бухарский / *Astragalus bucharicus* Regel

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см, деярли поясиз ёки жуда қисқа пояли (2–3 см), кўп йиллик ўт. Барглари оддий ёки мураккаб, учта баргчадан ташкил топган, барг банди узун, ярим ётиқ туклар билан қопланган. Баргчалари кенг эллипс ёки кенг тухумсимон, баъзан юмалоқ. Гулпояси 15 см узунликда, попуклари момик ва ғовак. Гули яшил-сарғиш рангли. Дуккаги чўзиқ-юмалоқ шаклда. Апрельда гуллаб, меваси май ойида пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг ва Ҳисор тизмаларида (Хўжагургур-Ота, Чўлбайир, Ғозимойлик, Оқбоштоғ), Хондиза дарёси ҳавзасида ҳамда Боботоғнинг Чагам қишлоғи яқинида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола-була, лойқа ва гипсли тупроқларда, қизил кумтошларда ўсади.

Сони. Якка ҳолда, 3–4 тупи биргаликда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ. Лекин гипсли жинслардан ташкил топган ўзига хос тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги учун ареали кенгаймаслиги мумкин.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 342].

Ғ.М. Шерматов.



Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, почти бесстебельное или с коротким (2–3 см) стеблем, высотой до 20–25 см. Листья тройчатые или простые, на длинных черешках, полуприжато-опушенные. Листочки широко эллиптические, широкояйцевидные, реже округленные. Кисти рыхлые, цветоносы длиной 15 см. Цветки зеленовато-желтые. Бобы продолговато-овальные. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитангский и Гиссарский хребты (горы Ходжа-Гур-Гур-Ата, Чутьбайир, Газимайлик, Акбаштау), бассейн реки Хондиза; Бабатаг (близ кишлаков Чагам и Ходжакульсун). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Пестроцветные гипсоносные глины и красные песчаники.

Численность. Небольшие популяции, одиночно или изолированными группами по 3–4 растения.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к гипсоносным пестроцветным условиям препятствует расширению ареала.

Культивирование. Выращивалось в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 342].

Ғ.М. Шерматов.

Rare, endemic species of the Kughitang range.

It is spread at the Kughitang and Hissar ridges (the Khodja-Gur-Gur-Ata, the Chulbair, the Gazimaylik, the Akbashtau mts.), the Babatag ridge (near village Chagam) (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes of the middle belt of mountains, among the juniper sparse growth. Small populations form isolated single groups of 3–4 plants among the juniper stands. Limiting factors: stenotopic species with a restricted habitat. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



15. ВИЛЛИС АСТРАГАЛИ

Астрагал Виллиса / *Astragalus willisii* Popov

Мақоми 2. Кўхитангда кам тарқалган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи қисқа (4–10 см), пояси йўгон, сершоҳ, кўп йиллик ўт. Поясининг пастки қисмини ўтган йилдан қолган барг бандлари ўраб туради. Барги 18 см узунликда, баргчалари эллипсисимон ёки чўзиқ наштарсимон, 8–18 жуфт, 4–10 мм узунликда, ўткир учли, икки томони майин ипаксимон, қалин тукли. Гул поясининг узунлиги баргига тенг. Гуллари бинафша ранг. Дуккаги чўзиқ, узунлиги 8 мм, икки ёнидан сиқилган. Май ойида гуллаб, меваси июнда пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасидаги Қизил олма қишлоғининг шимолида ва Каттақурчуқ теварақларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги шағалли-тошли ёнбағирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Асосан, якка ҳолда, баъзан арчазорлар орасида кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган ерларда чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши туфайли ўсиш майдонлари қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [73,171].

Ф.Ў. Ҳасанов.



Статус 2. Редкий эндемик хребта Кугитанг.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с коротким (4–10 см), толстым, ветвистым стеблем, густо покрытым остатками черешков листьев прошлых лет. Листья длиной до 18 см. Листочки 8–18-парные, эллиптические или ланцетно-продолговатые, длиной 4–10 мм, остроконечные, с обеих сторон мягко-шелковисто-мохнатые. Цветочные по длине равны листьям. Цветки фиолетовые. Боб продолговатый, длиной 8 мм, с боков сжатый. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Кугитангский хребет – севернее кишлаков Кызыл-Алма и Катта-Курчук.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны среднего пояса гор, среди арчового редколесья.

Численность. Встречается единичными экземплярами, образует небольшие заросли среди арчовников.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [73,171].

Ф.О. Ҳасанов.



Rare, endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang: nearby the Kyzyl-Alma and Katta-Kurchuk villages (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes of the middle belt of mountains, among the sparse juniper stands. Small populations form isolated single groups among the juniper stands. Limiting factors: grazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.

16. ЁНФОҚСИМОН АСТРАГАЛ

Астрагал ореховый / *Astragalus nucleosus* Popov

Мақоми 1. Фарбий Тянь-Шанда кам тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–12 см узунликдаги, поясиз, кўп йиллик ўт. Барги 5–14 см узунликда. Баргчалари 11–15 жуфт, наштарсимон ёки эллипс-наштарсимон, учи ўткир, қалин туклар билан қопланган. Гулпоясининг узунлиги 5–8 см. Гули йирик, узунлиги 25–30 мм. Дуккаги бандсиз, 4 см узунликда, чўзиқ тухумсимон, қалин, майин, ярим ётиқ тукли. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама ва Чотқол тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1600 м гача баландликдаги шағал-тошли очик (яланг) тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Кўпинча якка-якка ҳолда, баъзан эса кичик майдонларда тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши



туфайли ўсимлик майдонлари қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чора-тадбирлар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 318].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой 10–12 см. Листья длиной 5–14 см. Листочки 11–15-парные, ланцетные или эллиптически-ланцетные, острые, войлочномохнатые. Цветоносы длиной 5–8 см. Цветки крупные, длиной 25–30 мм. Бобы сидячие, длиной до 4 см, яйцевидно-продолговатые, густо-мягко-полуприжато-мохнатые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Ташкентская область: хребты Кураминский и Чаткальский. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Открытые каменистые, каменисто-щебнистые склоны предгорий и среднего пояса гор до высоты 1600 м.

Численность. Встречается небольшими группами, чаще всего одиночно.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 318].

Ф.О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama, the Chatkal ranges (Tashkent region). Inhabits stony and gravelly slopes of foothills and middle belt of mountains up to 1600 m. Small groups, frequently, isolated specimens can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



17. ЗАРҲАЛ АСТРАГАЛ

Астрагал позолоченный / *Astragalus auratus* Conisch.

Мақоми 2. Олой ҳамда Туркистон тизмаларида ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15 см га етадиган деярли поясиз кўп йиллик ўт. Пастки барглари оддий, якка, юқоридагилари эса икки жуфтли, баргчалари тескари тухумсимон, ҳар икки томони ётиқ тукли. Гулпояси баргига деярли тенг, 6–8 гулли, гуллари оч қизил. Июлда гуллаб, уруғ беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасининг денгиз сатҳидан 1600–1800 м баландликдаги Шоҳимардон, Кўли Куббон, Ёрдон қишлоқлари атрофида, Увлардисойда ҳамда Сўх, Пешкаўт дарёларининг ҳавзаларида тарқалган. Тожикистонда ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли қуруқ қияликларда, ола тупроқли ёнбағирларда, тошлоқларда ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди, баъзан кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади. Асосан, Шоҳимардон, Сўх ҳамда Пешкаўт дарёлари ҳавзаларида кўпроқ сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши туйфайли ўсимлик майдонлари кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 343].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 2. Редкий эндемик Алайского и Туркестанского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное травянистое растение высотой до 15

см. Нижние листья простые, одиночные, верхние – двупарные, обратнойцевидные, с обеих сторон прижато-волосистые. Цветоносы почти равны листьям, 6–8-цветковые, цветки ярко-желтые. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет (окрестности Шахимардана, Кули-Куббона, Иордана, Увлардисай, бассейн реки Сох, долина реки Пешкаут на высоте 1600–1800 м). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Сухие каменистые склоны, пестроцветные толщи, галечники, реже осыпи.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 343].

Ғ.М. Шерматов.

Rare, endemic species of the Alay and Turkestan ranges. It is spread at the Alay range: nearby the Shakhimardan, the Kuli-Kubbon, the Jordan, the Uvlardisai, the Sokh, the Peshkaut valleys at the altitude of 1600–1800 m (Ferghana region). Inhabits dry stony slopes, pebbles, rarely screes. The quantity is unknown. Limiting factors: grazing. Measures of protection: not protected.



18. ИККИ РАНГЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал двухцветкововидный / *Astragalus dianthoides* Boriss.

Мақоми 2. Олой тизмасида тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–4 см келадиган, ётиқ қалин туклар билан қопланган, деярли поясиз, кўп йиллик ўт. Барги 1–2 см узунликда, барг банди ингичка, узунлиги 2–5 мм, баргчалари 4–5

ти с 2–3 цветками. Чашечка трубчатая, длиной 12–16 мм. Венчик жёлтый, иногда краснеющий. Бобы длиной 20–25 мм, шириной 3 мм, суженные к основанию и верхушке, с очень коротким носиком, поперечно-жилковитые, сжатые с боков, мелко-прижато-волосистые. Цветёт в апреле, плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – окрестности поселков Чимён, Шахмардан, Садкак, Кадамжай, Вуадиль, Акпиляль и Сох. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Щебнистые сероземы, конгломераты и сланцы, овраги в предгорьях.

Численность. Встречается редко единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [65, 156–159].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: nearby the villages Chimion, Shakhmardan, Sadkak, Kadamzhai, Akpilal, Vuadil, Sokh (Fergana region). Inhabits grey soils, conglomerates and shales, ravines in foothills. Rare, isolated specimens can be found. Measures of protection: not protected.



жуфт, чўзиқ, узунлиги 2–7 мм, эни 1 мм, иккала томони қалин тукли. Гулпопуғи 2–3 гулли. Косачаси найсимон, узунлиги 12–16 мм. Тожбарги сариқ, баъзан қизғиш рангда. Дуккагининг узунлиги 20–25 мм, эни 3 мм, учига ва тубига қараб торайган, тумшукчаси қисқа, кўндаланг томирли, майда ётиқ тукли, икки томонидан қисилган. Апрель ойида гуллаб, апрель-май ойларида уруғ беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасининг Чимён, Шоҳимардон, Садқоқ, Водил, Оқбиллол, Қадамжой ва Сўх қишлоқлари атрофларида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги жарликларда, шағалли бўз тупроқлар ва конгломерат тоғ жинсларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [65, 156–159].

Ш.К. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное растение высотой 3–4 см, густо-прижато-опушенное. Листья длиной 1–2 см с тонкими черешками длиной до 2–5 мм. Листочки 4–5-парные, продолговатые, длиной 2–7 мм, шириной около 1 мм, с обеих сторон густоволосистые. Кис-



19. КНОРРИНГ АСТРАГАЛИ

Астрагал Кнорринга / *Astragalus knorringianus* Boriss.

Мақоми 2. Шимоли-ғарбий Помир-Олойда ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–7 см узунликдаги кулранг-яшил, ётиқ тукли, деярли поясиз кўп йиллик ўт. Барги 2–5 см, банди эса 5–15 мм узунликда. Барчалари 7–9 жуфт, тасмасимон ёки узун тигсимон, узунлиги 5–11 мм, эни 0,5–1,5 мм, ўткир учли, пастки томони қалин ётиқ тукли. Гулпояси 2–5 см узунликда. Гуллари 2–3 та, оч сариқ, 32–37 мм узунликда. Косачаси 17–20 мм узунликда. Дуккаги 7 см гача узунликда, эни эса 4 мм, калта тумшукчали, ётиқ оқ ва қора туклар билан қопланган. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси апрель–май ойлари етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота, Молгузар ва Туркистон тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то тоғнинг ўрта қисмигача чўзилган емирилган туб тоғ жинсларида, шағалли-тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, якка-якка ҳолда, баъзан кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши туфайли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Зомин давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [65, 156–159].

Ф.Ў. Ҳасанов.



Статус 2. Редкий эндемик северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее почти бесстебельное травянистое растение высотой 5–7 см, серо-зелёное, прижато-опушенное. Листья длиной 2–5 см, черешки длиной 5–15 мм. Листочки 7–9-парные, линейные или линейно-ланцетные, длиной 5–11 мм, шириной 0,5–1,5 мм, острые, снизу густо-прижато-

волосистые. Цветоносы длиной 2–5 см. Цветки в количестве 2–3, светло-желтые. Флаг 32–37 мм дл., чашечка 17–20 мм дл. Бобы линейные, прижато бело и черно волосистые, длиной до 7 см, шириной 4 мм, с коротким носиком. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: Нуратинские горы, хребты Мальгузарский и Туркестанский.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, разрушенные коренные породы, от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, единичными экземплярами или небольшими группами по несколько растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского и Зааминского государственных заповедников.

Источники. [65, 156–159].

Ф.О. Хасанов.

Rare, endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau mountains, the Malguzar and Turkestan ranges (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony slopes, destroyed bedrocks in the foothills, lower and middle belt of mountains. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Zaamin state nature reserves.



20. КОМАРОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Комарова / *Astragalus komarovii* Lipsky

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқларида тарқалган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган пўстлоғи қўнғир рангли бута. Баргчалари 6–9 жуфт, чўзиқ ва чўзиқ-думалоқ шаклда, учи бироз ўткир, устки томони деярли туксиз, пастки томони сийрак тукли. Гулпопуғи тигиз, тухумсимон, узунлиги 5 см атрофида. Дуккаги бандсиз, чўзиқ ёки тасмасимон, узунлиги 12–18 мм, эни 4 мм, майда-майда, ўткир учли, қалин ва қора ярим ётиқ ҳамда узун ва сийрак оқ туклар билан қопланган. Июнь-июлда гуллаб, июль-августда мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Филон, Қўл ва Шут қишлоқлари теваракларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Майда жинс тупроқли ёнбағирларда тоғларнинг ўрта қисмидаги наъма-так ва арчазорларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўрикхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [109, 159].

А.С. Эсонкулов.

Статус 2. Редкий вид западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Кустарник высотой до 1 м с коричнево-бурой корой. Листочки 6–9-парные, овальные или продолговато-овальные и несущие остроконечия на верхушке, сверху почти голые, снизу рассеянно-волосистые. Кисти плотные, яйцевидные, длиной около 5 см. Бобы сидячие, продолговатые или линейные, длиной 12–18 мм, шириной 4 мм, острые, густополу-прижато-мелко-черново-волосистые и, кроме того, с редкими более длинными белыми волосками. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности кишлаков Гилан, Куль и Шут. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны, арчовники и розарии в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [109, 159].

А.С. Эсанкулов.



Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: nearby the villages, Ghilan, Kul and Shut (Kashkadarya region). Inhabits fine earth slopes, juniper stands and rosaries in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.

21. МАССАГЕТОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Массаетова / *Astragalus massagetovii* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойда учрайдиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–30 см оралиғида, диаметри 80 см гача етадиган тиканли, сершоҳ, зич ёстиқчалар ҳосил қилувчи бутача. Барги 4–9 см узунликда, қалин тукли, барг банди қисқа. Баргчалари 8–13 жуфт, эллипс шаклида ёки тескари тухумсимон, узунлиги 10–15 мм, ўткир учли, икки томони ипаксимон қалин туклар билан қопланган. Косачаси 9–11 мм узунликда, найсимон, оққора қалин туклари бор. Гултожи сариқ, туксиз. Дуккагининг узунлиги 17–27 мм, эни 7–11 мм, икки уяли, кўп уруғли. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун тоғи ва Ҳисор тоғ тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги тошли-шағалли ва гипсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган,

Манбалар. [71, 252].

О.Т. Тургинов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Сильноветвистый колючий кустарничек высотой 15–30 см, образующий довольно плотные подушки до 80 см в диаметре. Листья густо-волосистые, длиной 4–9 см, с короткими черешками. Листочки 8–13-парные, эллиптические, обратнойцевидные, длиной 10–15 мм, остроконечные на верхушке, с обеих сторон густо-шелковисто-волосистые. Чашечка трубчатая, длиной 9–11 мм, бело и черно-густоволосистая. Венчик жёлтый, голый. Бобы длиной 17–27 мм, шириной 7–11 мм, двугнёздый, многосеменной. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: горы Байсунтау (около перевала Бельяуты), Гиссарский хребет.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны и выходы гипсированных пород в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [71, 252].

О.Т. Тургинов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range and Baysun mountains (Surkhondarya region).

Inhabits stony slopes and gypseous rocks in the upper part of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.




22. МИХАИЛ АСТРАГАЛИ

Астрагал Михаила / *Astragalus michaelis* Boriss.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см бўлган ярим бута. Пояси йўғон, сершоҳ, тўқ кулранг. Гулпоясичи, рўваксимон. Барги 5,5–11 см узунликда, барг банди жуда қисқа, баргчалари 10–13 жуфт, узунчоқ тасмасимон ёки чўзик, узунлиги 5–8 мм, эни 1–1,5 мм, икки томони сийрак тукли. Гулпопуғи чўзикроқ-ғоваксимон, 5–8 гулдан иборат. Тожбарги оч пушти рангли, узунлиги 15–17 мм. Дуккаги 17–22 мм



Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Растение высотой 10–26 см. Бесстебельное или почти бесстебельное многолетнее травянистое растение. Листья длиной до 20 см, непарноперистые, с 14–18 парами листочков, беловолосистые, листочки длиной 1–2 см, шириной 0,4–1,2 см, линейные, продолговато- или широко-эллиптические, с клиновидным основанием, наверху округлые или заострённые, сверху голые, снизу оттопыренно-беловолосистые. Кисть длиной 4–10 см, продолговатая, рыхловатая, 5–9-цветковая. Чашечка длиной 1,3–1,7 см, узкотрубчатая, прижато-черно- и оттопыренно-беловолосистая. Бобы длиной 2,2–2,5 см, шириной 5–8 мм, продолговато-ланцетные, коротко- и длинно-белоопушенные, 10-семянные, почти двугнёздые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань (Угамский и Пскемский хребты).

Места обитания. Скалы, каменистые, щебнисто-мелкоземистые склоны, берега рек в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [26, 66].

К.Ш. Тожибаев.

узунликда, қорамтир, узун тумшукчали. Уруғининг узунлиги 4 мм, эни 1,8 мм, сарғиш-кўнғир рангли. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом ва Писком тизмаларида учрайди.

Ўсиш шароити. Қояларда, тошли-шағалли ва майда заррали тупроқлардан иборат ёнбағирларда ҳамда дарё қирғоқлари бўйлаб тоғнинг юқори қисмигача чўзилган жойларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.


Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [26, 66].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam and Pskem ranges (Tashkent region). Inhabits rocks, stony, fine earth slopes, river banks in the middle and upper mountain belt. The quantity is rare. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



23. НУРОТА АСТРАГАЛИ

Астрагал нуратинский / *Astragalus nuratensis* Popov

Мақоми 1. Нурота тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Серпояли кўп йиллик ўт. Пояси анча йўғон, узунлиги 8–15 см, сийрак, хурпайган тукли, улар кейинчалик тўкилиб кетади. Барги, асосан, поянинг юқори қисмида жойлашган. Баргчалари 4–6 жуфт, юқори қисми тўмтоқроқ, деярли тескари юраксимон, узунлиги 1–2 см. Гулпопуги сийрак, 5–10 гулли. Гултожи оч сариқ рангли. Дуккагининг узунлиги 10–20 мм, ўтқир учли (тумшуқчали), сийрак, узун, хурпайган тукли, икки уяли. Уруғи кулоксимон, сиқилган, узунлиги 5 мм, сирти силлик, тўқ жигарранг. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тоғларининг Оқтоғ тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда, қояларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [77, 136].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее, многостебельное травянистое растение. Стебли довольно толстые, длиной 8–15 см, скудно-оттопыренно-волосистые, позже почти голые. Листья расположены, главным образом, на верхушке стеблей, листочки 4–6-парные, на верхушке притупленные, почти обратносердцевидные, длиной 1–2 см. Кисти рыхлые, 5–10 цветковые. Венчик бледно-жёлтый. Бобы длиной 10–20 мм, с остроконечием (носи́ком), рыхло-оттопыренно-длинно-волосистые, двугнёздые. Семена уховидные, сжатые, длиной 5 мм, гладкие, черно-коричневые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: Нуратинские горы (хребет Актау).

Места обитания. Каменистые склоны и скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [77, 136].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau mountains: the Aktau range (Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony slopes and rocks in the lower and middle mountain belts. Single specimens and small isolated populations occur very rarely and sporadically. Measures of protection: not protected.



24. ПАТСИМОН АСТРАГАЛ

Астрагал перистый / *Astragalus plumatus* Boriss.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг ғарбий тармоқлари ва Жануби-ғарбий Қизилқумнинг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см гача етадиган, шохлари тарвақайлаган, тўғри ва йўғон, оқ тукли, узунлиги 4–8 см, қалин тиканлар билан қопланган бута. Баргчалари 5–6 жуфт, чўзиқроқ-тухумсимон, ёйилган майин тукли. Гуллари барг қўлтиғида 8–10 тадан жойлашган, эни 3 см келадиган юмалоқ шаклли зич тўпгул ҳосил қилади. Дуккагининг узунлиги 5 мм, тухумсимон, оқ момик тукли. Уруғи буйраксимон, сирти силлиқ. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси май-июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий, Бухоро вилоятлари: Қизилқумда – Конимех шаҳри атрофида; Помир-Олойда – Зирабулоқ-Зиевуддин тоғларида ва Нурота тоғларида (Қоратог тизмаси) тарқалган.

Ўсish шаронти. Тоғ ёнбағирларида, адирларда, юзага чиқиб қолган қумтошли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [26, 28, 29].

Н.Ю. Бешко.

Статус 3. Редкий эндемик западных отрогов Памиро-Алая и Юго-западного Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой до 60 см, ветви густо покрыты торчащими толстоватыми, прямыми бело-пушистыми колючками длиной 4–8 см. Листочки в количестве 5–6 пар, овальнойцевидные, оттопыренно-мягкоопушенные. Цветки в пазухах листьев до 8–10, скучены в округлые многоцветковые соцветия шириной около 3 см. Боб длиной около 5 мм, яйцевидный, беломохнатый. Семена почковидные, гладкие. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Навоийской, Бухарской областях: Кызылкум – окрестности города Канимех; Памиро-Алай – Зирабулак-Зиадинские горы; Нуратинские горы (хребет Каратау).

Места обитания. Склоны гор, предгорья, выходы песчаников.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [26, 28, 29].

Н.Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western branches of the Pamir-Alay and the south-western Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kokchatau hill nearby Kanimekh town; the Pamir-Alay: the Zirabulak-Ziaetdin mountains; the Nuratau range (Samarkand and Bukhara regions). Inhabits mountain slopes, foothills, sandstones. Isolated specimens or small groups can be found. Measures of protection: not protected.



25. ПАХМОҚТУКЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал ложноязвенниковый / *Astragalus pseudanthylloides* Gontsch.

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг ғарбида тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см, поясиз кўп йиллик ўт. Барглари 6–12 см узунликда, барг банди яхши тараққий этмаган. Баргчалари 10–16 жуфт, эллипссимон, баъзан тескари тухумсимон, ўткир учли, қаттиқ, устки томони томирли, кулранг, пастки томони оқ тукли ёки ипаксимон тукли, узунлиги 4–12 мм. Гулпоялари барглари-нинг узунлигига тенг ёки улардан бироз узунроқ, қисқа, оқиш момик тукли. Гулпопуги момик ва ғовак, узунлиги 10–17 см, 18–25 гулли. Гултожи оқ ёки нимпушти. Уруғдони қалин ётиқ оқ туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, июлда мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқларида (Бойсун, Кетмончопти ва Чўлбайир тоғларида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларида тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 1984 йилдан 2001 йилгача фақатгина 30 туп топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [71, 171].

О.Т. Тургинов.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение, высотой 15–25 см. Листья длиной 6–12 см, с почти невыраженными черешками. Листочки 10–16-парные, эллиптические, реже обратно-яйцевидные, коротко-остроконечные, жёсткие, сверху жилковатые, сероватые, снизу беловолосистые или шелковисто-волосистые, длиной 4–12 мм. Цветоносы по длине равны листьям или длиннее их, коротко-бело-мохнатые. Кисти рыхлые, длиной 10–17 см, 18–25-цветковые. Венчик белый, чуть розоватый. Завязь густо-прижато-беловолосистая. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта (горы Байсунтау, Кетмень-Чапты и Чутьбайр).

Места обитания. Каменисто-щебнистые и глинистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. С 1984 по 2001 года найдено всего 30 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [71, 171].

О.Т. Тургинов.

Rare endemic species of the western branches of the Hissar range. It is spread at the western branches of the Hissar range: the Baysuntau and Chulbair mountains (Surkhandarya region). Inhabits stony and clay slopes in the lower and middle mountain belts. From 1984, only 30 plants were found. Measures of protection: not protected.



26. ПИСКОМ АСТРАГАЛИ

Астрагал пскемский / *Astragalus pskemensis* Popov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ер ости пояси жуда қисқа бўлган ярим бута. Ўсимлик шохчалари бир йиллик, ингичка, қисқа, 5 см гача узунликда, ётиқ тукли. Баргининг узунлиги 5–8 см, ётиқ ва йўғон оқ тукли. Баргчалари 5–8 жуфт, чизиқли, баъзан чизиқлари тасмасимон шаклга киради, узунлиги 7–12 мм, учи тўмтоқ, ёки салгина ўйилган, икки томони ётиқ оқ туклар билан қопланган. Гулпопуғи зич жойлашган бир нечта бошчалардан иборат. 5–10 гулли, узунлиги 2–2,5 см. Гултожи оқиш. Дуккаги чўзиқ, бандсиз, ўткир учли, узунлиги 12–20 мм, эни 3–4 мм, ётиқ қора ва оқ туклар билан қопланган, икки уяли. Июль ойида гуллаб, меваси август, сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком дарёси ҳавзаси – Тепарсой ва Испайсойларнинг юқори қисмида учрайди.

Ўсиш шароити. Шағалли ва тошли тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Мухофаза чоралари. Махсус чоралар ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [67, 69, 106, 109].

К.Ш. Тожибаев.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [67, 69, 106, 109].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem valley, the heights of the Teparsay and Ispaisay (Tashkent region). Inhabits skeleton and stony slopes of mountains. The quantity is rare. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.


Краткое описание. Полукустарник с толстым сильно укороченным подземным стволиком. Годичные веточки тонкие, короткие, длиной до 5 см, прижато-пушистые. Листья длиной 5–8 см, прижато-белопушистые; листочки 5–8-парные, линейные, реже линейно-продолговатые, длиной 7–12 мм, тупые или слегка выемчатые, с обеих сторон прижато-беловолосистые. Кисти плотноголовчатые, 5–10-цветковые, длиной 2–2,5 см. Венчик беловатый. Бобы продолговатые, сидячие, острые, длиной 12–20 мм, шириной 3–4 мм, прижато-бело- и чернопушистые, двугнёздые. Цветёт в июле, плодоносит с августа до сентября.

Распространение. Ташкентская область: Бассейн реки Пскем, верховья Тепарская и Испайская.

Места обитания. Щербнистые и каменистые склоны гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.



27. ПУФАК АСТРАГАЛ

Астрагал тонкопузырчатый / *Astragalus leptophysus* Vved.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойда кичик майдонларда тарқалган реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик поясиз ўт. Ингичка новдалари фақат тупроқ остида ривожланади. Тоқ баргли бандида 15–35 жуфт япроғи бор, узунлиги 10–20 см, бандининг узунлиги 3–7 см, хурпайган оқ туклар билан қопланган. Баргчалари чўзиқ-тухумсимон, баъзан япроқчалари бир-бирига тегиб туради, узунлиги 10–17 мм, эни 6–9 мм. Гулпояси хурпайган оқ тукли. Косачаси узун найсимон, узунлиги 2,5 см, эни 3–4 мм. Гуллари йирик, узунлиги 3 см гача оқ, кейинроқ тўқ қизил тусга киради. Дуккаги юмалоқ-тухумсимон, узунлиги 4 см гача етади, эни 3 см. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Жиззах вилоятлари: Туркистон тизмаси ва Нурота тоғларида тарқалган. Тожикистонда (Фатмовут қишлоғи атрофларида) ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ҳар хил ўтлар, шувоклар ва арчазорлар орасида ҳамда тошли-шағалли ёнбағирларда ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Жуда кам. Якка-якка ҳолда, шунингдек 10–20 та ўсимликдан иборат кичик тўплар, ҳолида учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ўсимликларга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [55, 252, 289].

Н.Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий реликтовый эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое бесстебельное растение. Развиваются только тонкие побеги под землей. Листья непарноперистые в количестве 15–35 пар, длиной 10–20 см, черешки длиной 3–7 см, оттопыренно-беловолокнистые. Листочки продолговатояйцевидные, иногда налегающие краями друг на друга, длиной 10–17 мм, шириной 6–9 мм.



Цветоносы оттопыренно-беловолосистые. Чашечка длиннотрубчатая, длиной 2,5 см, шириной 3–4 мм. Цветки крупные, длиной до 3 см, белые, в конце цветения темно-красные. Бобы шаровидно-яйцевидные, длиной до 4 см, шириной 3 см. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Джизакской областях: Туркестанский хребет и Нуратинские горы. За пределами Узбекистана – Таджикистан (окрестности кишлака Фатмовут).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны и осыпи, среди разнотравно-полюнной растительности и арчовников.

Численность. Встречается редко, спорадически, единичными экземплярами или небольшими группами до 10–20 растений. Общая площадь распространения популяций около 5 тыс. га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота негативно влияет на численность растения.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [55, 252, 289].

Н.Ю. Бешко.

Rare relict endemic, species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Turkestan range and the Nuratau mountains (Samarkand and Jizzakh regions). Inhabits stony slopes and mounds, among wormwood and other herb species and junipers. Single specimens and small populations (up to 10-20 plants) occur sporadically. Distribution area is about 5000 hectares. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state nature reserve.



28. СОХТА ЧЎЛ АСТРАГАЛИ

Астрагал ложноэремофиза / *Astragalus pseudoeremophysa* Popov

Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–30 см оралиғидаги поясиз ёки пояси 7 см га етадиган кўп йиллик ўт. Барги 15–30 см узунликда. Баргчалари 8–14 жуфт, юмалоқ, узунлиги 13–20 мм, юмалоқ, тўмтоқ ёки сал ўйилган, устки томони туксиз, пастки томони қалин тукли, четлари киприксимон қалин тукли. Гулпояси баргидан анча қисқа, гулпопуги 6–10–15 гулдан иборат, узунлиги 7–10 см, қалин тукли. Косачасининг барглари наштарсимон тишчалар билан қопланган. Дуккаги тухумсимон чўзиқроқ шаклда, банди 3–7 мм узунликда, пастга қараб осилган, қалин тукли, деярли икки уяли. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Жанубий Помир-Олойда – Боботоғ тизмаси ва Тожикистоннинг жанубидаги пастқам тоғларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этаклари ва пастки қисмларидаги қумликларда, бўз ва соз тупроқларда, қизил қумли тошларда, гипсли жинсларда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Чагам қишлоғи атрофларида 50 тупи топилган.



Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.
Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус чоралар ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [31, 135].

А.С. Эсонқулов

Статус 2. Редкий вид Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение с короткими (не более 7 см) стеблями, высотой 15–30 см. Листья длиной 15–30 см. Листочки 8–14-парные, почти окру-

жённые, длиной 13–20 мм, округло-тупые или едва выемчатые, сверху голые, снизу густопушистые, по краю густо-пушисто-реснитчатые. Цветоносы намного короче листьев, рыхлые, 6–10–15-цветковые кисти длиной 7–10 см, густо-волосистые. Чашечка длиннотрубчатая, длиной 18–22 мм, густо-мохнатая, с ланцетными зубцами. Бобы овальные, на ножке длиной 3–7 мм, поникающие, бархатисто-пушистые, почти двугнёздные. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Южный Памиро-Алай, хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана – низкогорья южного Таджикистана.

Места обитания. Пески, лёссы, выходы красных песчаников, глины, гипсоносные обнажения в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко. Зарегистрировано 50 растений рядом с кишлаком Чагам.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [31, 135].

А.С. Эсанқулов.

Rare species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the southern Pamir-Alay, the Babatag range (Surkhandarya region). Inhabits sands, loess, red sandstones, clay, gypseous outcrops in foothills and lower belt of mountains. Very rarely, single specimens and small populations occur sporadically. 50 plants were found nearby the Chagam village. Limiting factors: unknown. Measures of protection: not protected.



29. СУР АСТРАГАЛ

Астрагал сплошь серебристый / *Astragalus holargyreus* Bunge

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Қизилқум қолдиқ тоғларида ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см келадиган поясиз кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, баргчалари 3–5 жуфт, ўткир учли, узунлиги 15 мм гача, икки томони ётиқ оқ тукли. Бир нечта тўпгулдан иборат. Тожбарги қизил. Дуккаги тухумсимон, майда. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Қизилқумдаги қолдиқ тоғ (Бўкантоғ)да ва Чингелди қудуғи атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Қолдиқ тоғларда 1000 га яқин туплари аниқланган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши натижасида камайган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Камайиб кетиш сабабларини чуқурроқ ўрганиш лозим.

Манбалар. [32, 159].

Г.А. Серекеева.

Статус 1. Редкий узкий эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 25 см. Листья сложные, листочки 3–5-парные, острые, длиной до 15 мм, с обеих сторон прижато-беловолосистые. Соцветия головчатые. Венчик красный. Боб яйцевидный, мелкий. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Навоийская область: Кызылкум – останцовые горы Букантау, окрестности колодца Чингельды.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. 1000 растений.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [32, 159].

Г.А. Серекеева.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Bukantau range and Chingeldi (Navoi region). Inhabits stony-gravelly slopes. 1000 plants can be found. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.



30. ТУК КОСАЧАЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал волосисточашечный / *Astragalus lasiocalyx* Gontsch.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 8–15 см га етадиган кўп йиллик ўт. Ер остида жойлашган қисми ёғочсимон қисқа поядан иборат. Бир йиллик поялари жуда қисқа, узунлиги 0,3–1 см, тигиз жойлашган ётиқ оқ туклар билан қопланган. Барглари узунлиги 4–7 см, ётиқ оқ тукли, баргчалари 1–2 жуфт, тухумсимон, ҳар икки томони сийрак ётиқ туклар билан қопланган. Гул-попуги нозик, момиқ, кўп гулли, узунлиги 3–6 см. Тожбарги қизғиш-сарик тусли. Дуккагининг банди 4 мм узунликда, кам уруғли, туксиз. Май ойида гуллаб, меваси июлда пишади.

Тарқалиши. Тошкент вилоятининг Писком, Угом, Майдонтол ва Чотқол тизмаларида тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги шагалли-майда тупроқли, тошли ёнбағирлар ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Номаълум.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудидаги популяциялари муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [75, 343].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 8–15 см, с укороченным подземным деревянистым стволиком. Годичные стебли длиной 0,3–1 см, густо-прижато-белопушистые. Листья длиной 4–7 см, прижато-беловолосистые, листочки 1–2-парные, яйцевидные, с обеих сторон рассеянно-прижато-волосистые. Кисти рыхловатые, длиной 3–6 см, многоцветковые. Венчик красновато-желтоватый. Бобы на ножке длиной около 4 мм, малосеменные, голые. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: хребты Пскемский, Угамский, Майдантальский и Чаткальский. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Щебнисто-мелкоземистые, каменистые склоны, осыпи и галечники в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [75, 343].

К.Ш. Тожибаев.



Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Maidantal and Chatkal ranges (Tashkent region). Inhabits fine earth, stony and pebble slopes and debris in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



31. ТҮПОЛОН АСТРАГАЛИ

Астрагал тупаланский / *Astragalus tupalangi* Gontsch.

Мақоми 1. Помир-Олойда ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35 см атрофида, поясиз, ер ости пояси йўғон, қисқа шоҳли кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 20–30 см, баргчалари 12–13 жуфт, тухумсимон, 20–27 мм узунликда, устки томони туксиз, фақат пастки томонидаги томирлари сийрак, дағал туклар билан қопланган, четлари дағал, киприксимон тукли. Гулпопуги момиқ ва ғовак, кўп гулли, узунлиги 6–7 см. Гулбандининг узунлиги 2–3 мм. Косачаси найсимон, узунлиги 20 мм, туксиз, фақатгина косача баргларининг четлари дағал киприксимон тукли. Гултожи оч сариқ рангли. Дуккаги деярли бандсиз,



чўзиқ-тухумсимон, узунлиги 11–12 мм, эни 7 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнь ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси: Тўпаланг дарёси хавзасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошлоқ ва юзага чиқиб қолган харсанг тошларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг

ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари.

Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [109, 133].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой около 35 см, с толстым коротким подземным стволиком. Листья длиной 20–30 см, листочки 12–13-парные, яйцевидные, длиной 20–27 мм, сверху голые, снизу с редкими жесткими волосками по жилкам, по краю редко жесткореснитчатые. Кисти рыхлые, длиной 6–7 см, многоцветковые. Цветоножки длиной 2–3 мм. Чашечка трубчатая, длиной 20 мм, голая, лишь на зубцах жесткореснитчатая. Венчик ярко-желтый. Бобы почти сидячие, продолговато-овальные, длиной 11–12 мм, шириной около 7 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, галечники и гранитные скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [109, 133].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range, the Tupalang river basin (Surkhandarya region). Inhabits granites, stony slopes and pebbles in the lower and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



32. ЮЛИНГАН АСТРАГАЛ

Астрагал оборванный / *Astragalus rhacodes* Bunge

Мақоми 2. Олой тизмасида ўсадиган камёб ўсимлик.

Кисқача тавсифи. Пастки қисми ёғочсимон ярим бутача. Баргининг узунлиги 7–12 см, барг бандининг узунлиги эса 15–17 см, оқтуклар билан қопланган. Гулпоясининг узунлиги баргига тенг, баъзан эса ундан сал узунроқ. Гулпопуги момик ва ғовак, 10–25 гулли. Косачаси мевалаган пайтида шишади. Гули сариқ. Дуккаги ярим думалоқ ёки чўзиқ ярим тухумсимон шаклда. Май–июнь ойида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасида (Шохимардон, Садқоқ, Қизилтоғ қишлоқлари атрофларида) тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200–1600 м баландликдаги тоғ ёнбағирларида кизил кумтошларда, майда жинсли ва шағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки бир нечта туп ўсимликдан ташкил топган кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Янги ерларнинг ўзлаштирилиши ва кўплаб чорва молларининг боқилиши унинг кўпайишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Табиатда камайиб кетиш сабабларини аниқлаш учун унинг биологиясини ва экологиясини ўрганиш лозим.

Манбалар. [156–159, 342].

Г.М. Шерматов.

Статус 2. Редкий вид Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарничек в нижней части древеснеющий. Листья длиной 7–12 см, черешки длиной 15–17 см, беловолосистые. Цветоносы равны листьям, иногда длиннее их. Кисти рыхлые, 10–25-цветковые. Чашечка при плодах вздувается. Цветки желтые. Бобы полуовальные или продолговато-полуовальные. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – окрестности кишлаков Шахимардан, Садкак и Кизилтаг. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Краснопесчаники, каменистые и мелкоземисто-щебнистые склоны на высоте 1200–1600 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий, выпас.

Культивирование. Выращивалось в условиях Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо изучение биоэкологических свойств в природе.

Источники. [156–159, 342].

Г.М. Шерматов.

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: nearby the villages Shakhimardan, Sadkak and Kiziltag (Ferghana region). Inhabits red sands, stony and fine earth slopes at the altitude of 1200-1600 m. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing and habitat destruction. Measures of protection: not protected.



33. ЮМАЛОҚ ТЎПГУЛЛИ АСТРАГАЛ

Астрагал почти шахимарданский / *Astragalus subschachimardanus* Popov

Мақоми 2. Кўхитанг тизмасидаги ўта камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15 см гача етадиган поясиз, йирик чим ҳосил қилувчи кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, 5–7 жуфт баргчали. Гулпояси баргидан бироз узун. Тўпгули шарсимон. Косачаси гуллаган пайтида найсимон бўлиб, меваси етилиши билан кенгайиб боради ва шар шаклига киради. Дуккаклари майда, оқ тукли. Июлда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасининг жанубидаги адирларда тарқалган (Туркменистонда ҳам учрайди).

Ўсиш шароити. Жанубий ёнбағирларда – харсангтошлар орасида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Аниқланган гулларининг сони атиги 1000 тага тўғри келади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу ҳақда маълумотлар йўқ, аммо шу атрофда яшайдиган аҳолининг чорва моллари ўсимлик ўсган майдонларни пайҳон қилиб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [32, 159].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [32, 159].

Ф.О. Хасанова.

Very rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits the southern slopes, conglomerate deposits. About 1000 plants were registered. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



Статус 2. Узколокальный редкий эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 15 см, образующее крупные дерновины. Листья сложные, листочки 5–7-парные. Цветоносы немного длиннее листьев. Соцветие шаровидное. Чашечка вначале трубчатая, при плодах шаровидно-пузырчатая. Бобы мелкие, беловолосистые. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.


Места обитания. Южные склоны, конгломератовые отложения.

Численность. Встречается очень редко. Зафиксированная численность не превышает 1000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.



34. ҚИЗИЛТОМИР АСТРАГАЛ

Астрагал красножилковый / *Astragalus rubrivenosus* Gontsch.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда жуда кичик майдонларда сақланиб қолган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–4 см келадиган, ер бағирлаб ўсувчи кўп йиллик, деярли поясиз ўт. Баргининг узунлиги 10–12 см, баргчалари, асосан, эллипс шаклида, ўткир учли, устки томони сийрак, пастки томони ётиқ тукли. Гулпояси 12–15 см узунликда, мустаҳкам, баргидан узун. Косачаси шишган, тўрсимон томирли. Дуккагининг узунлиги 13–14 мм, эни 0,5 см. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасидаги Оқсоқотасой, Бошқизилсой, Эртошсой ҳамда Серкалिसойларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1800–2000 м баландликдаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Аниқланган популяцияларидаги тупларнинг сони 3,5–4 мингтани ташкил этади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик популяциясининг катта қисми Чотқол давлат биосфера қўриқхонасида, Угам-Чотқол биосфера резерватида ва Угам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [32, 159, 293].

А.С. Эсанкулов.

Статус 2. Очень редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное приземистое травянистое растение высотой 3–4 см. Листья длиной 10–12 см. Листочки эллиптические, острые, сверху с рыхлыми, снизу с прижатыми волосками. Цветоносы крепкие, длиннее листьев (12–15 см). Чашечка вздутая, сетчато-неровная. Бобы длиной 13–14 мм, шириной 5 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет (Аксакатасай, Башкызылсай, Эрташсай и Серкелисай).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны на высоте 1800–2000 м.

Численность. Встречается очень редко. В известных популяциях общая численность достигает 3,5–4 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Большая часть популяций охраняется на территории Чаткальского государственного биосферного заповедника, Угам-Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [32, 159, 293].

А.С. Эсанкулов.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: the Aksak-Atasay, the Bashkzyzlsay, the Ertashsay and Serkelisay (Tashkent region). Inhabits stony slopes at the altitude of 1800–2000 m 3,5–4 thousand specimens within 6 populations can be found. Measures of protection: main populations are protected in the Chatkal state biosphere reserve, Ugam-Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



35. ҚИЗИЛ ТУПРОҚ АСТРАГАЛИ

Астрагал красноземный / *Astragalus terrae-rubrae* Butkov

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см келадиган, паяси тик мустақкам, 6–7 мм йўғонликдаги кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 20 см, баргчалари 2 жуфт, учбурчак-тухумсимон, узунлиги 6–8 см, эни 4–6 см, ҳар икки томонида томирлари бўртиб туради. Гули сариқ. Дуккаги тухумсимон ёки чўзиқ-тухумсимон, пуфаксимон шишган, узунлиги 8 мм, тўғри тумшукчали. Май ойида гуллаб, июнда мева беради.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида – Хўжагургур-Ота, Қизилсув, Оқсув дарёларининг ҳавзаларида ҳамда Кўхитанг тизмасида – Кампиртепа ва Тангидевол бўлимида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1400–1500 м баландликдаги ер юзасига чиқиб қолган туб жинсли тупроқларда ва турли хилдаги тупроқларда ҳамда тошли тик ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кўхитанг тизмасида 200 туپи аниқланган. Ҳисор тизмасидаги сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Сони ва уларнинг ўзгариши ҳақида аниқ маълумотлар йўқ. У фақат махсус тупроқ жинсларида ўсишга мослашганлиги учун тарқалиши чегараланган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1979 йилдан буён ўстириб келинади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Ҳисор давлат кўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 172, 310].

О.Т. Тургинов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с крепким стеблем высотой до 60 см. Стебель прямостоячий, толщиной 6–7 мм. Листья длиной до 20 см, листочки двухпарные, треугольнойцевидные, длиной 6–8 см, шириной 4–6 см, с выступающими сверху и снизу жилками. Цветки желтые. Бобы яйцевидные или яйцевидно-продолговатые, длиной 8 мм, вздутые, с прямым носиком. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет



– Ходжагургур-Ата, бассейны рек Аксу, Кызылсу, Катта-Уру-Дарья; хребет Кугитанг – Кампыртепа, Танги-Дувал. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Пестроцветные толщи и выходы коренных пород, крутые каменистые склоны на высоте 1400–1500 м.

Численность. Около 200 растений в Кугитанге. Численность на Гиссарском хребте неизвестна.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1979 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Гиссарском государственных заповедниках.

Источники. [159, 172, 310].

О.Т. Тургинов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Khoja-Gur-Gur-Ata, the Aksu, the Kyzylsu, the Katta-Uru-Darya river basins; the Kughitang mountains (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous and native rocks, steep stony slopes at the altitude of 1400-1500 m.s.l. 200 plants were counted at the Kughitang. At the Hissar range the magnitude of populations is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan and Hissar state reserves.



36. ҚИЗҒИШ АСТРАГАЛ

Астрагал красноватый / *Astragalus rubellus* Gontsch.

Мақоми 1. Фарғона водийсидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35 см гача етадиган оқ момиқ тукли, поясиз, кўп йиллик ўт. Барги 30–35 см узунликда, хурпайган қалин тукли, баргчалари 14–18 жуфт, юмалоқ-тухумсимон. Гулпояси 15 см узунликда, қисқа хурпайган қалин тукли. Гулпопуги 11–18 см, 8–15 та қизил гуллардан таркиб топган. Дуккаги шишган, тухумсимон, узунлиги 2 см, қайишсимон, сирти бўртиқ чокли. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Фарғона водийсининг Ёзёвон чўлида, Кўқон шаҳри атрофидаги бўз ерларда ва Қорақалпоқ қишлоғи теварагида ўсади.

Ўсиш шароити. Кум уюмлари орасида, шўрланган кумларда кўпроқ ўсади.

Сони. Жуда кам учрайдиган тур. У фақат ўзлаштирилмай қолган кум уюмлари орасидагина сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилган майдонлар ҳисобига ареалида ўзгаришлар юзага келиб, сони кескин камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [31, 135].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Чрезвычайно редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 35 см. Стебли беломохнатые. Листья длиной до 30–35 см, оттопыренно-мохнатые, листочки 14–18-парные, округлояйцевидные. Цветоносы длиной 15 см, коротко-оттопыренно-опушенные. Кисти длиной 11–18 см, состоят из 8–15 цветков. Цветки красные. Бобы длиной до 2 см, вздутые, яйцевидные, кожистые, с выступающими швами. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Ферганская долина: Ферганская область – близ города Коканда, в окрестностях кишлака Кара-Калпак и в песках Язъявана.

Места обитания. Межбарханские понижения. Предпочитает слабозасоленные пески.

Численность. Чрезвычайно редкий вид, сохранился только на ограниченной площади неосвоенных песчаных массивов.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение земель под сельхозкультуры.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [31, 135].

Ф.О. Хасанов.

Extremely rare, endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley, nearby Kokand, the village Kara-Kalpak and the Yazyavan sands (Ferghana region). Inhabits sandy hills and slightly saline sands. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of sandy area. Measures of protection: not protected.



37. ҚЎРҒОШИН АСТРАГАЛИ

Астрагал свинцовый / *Astragalus plumbeus* (Nevski) Gontsch.

Мақоми 2. Кўхитанг тизмасидаги эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–23 см оралиғидаги поясиз кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 5–8 см, баргчалари 4–5 жуфт, эллипсимон ёки чўзиқ эллипсимон, қаттиқ, ўткир учли, узунлиги 10–14 мм, ҳар икки томони қалин ётиқ туклар билан қопланган. Гулпояси баргидан 2 марта узун, қаттиқ, деярли тўрт қиррали, ётиқ тукли. Бошчаси 15–25 гулли, юмалоқ ёки тухумсимон, 3–4 см узунликда, зич жойлашган, гуллари деярли бандсиз. Гултожи сариқ. Тугунчаси бандсиз, ётиқ оқ тукли. Июнь–июлда гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги оҳак тошли ва майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 2001 йилда 2000 туп ўсимлик қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг тартибсиз боқилиши ўсимликларнинг кўпайишига салбий таъсир этмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [32, 159, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой 20–23 см. Листья длиной 5–8 см, листочки 4–5-парные, эллиптические или продолговато-эллиптические, жесткие, острые, длиной 10–14 мм, с обеих сторон густо-прижато-пушистые. Цветоносы вдвое длиннее листьев, крепкие, почти четырехгранные, прижато-пушистые. Головки шаровидные или яйцевидные, длиной 3–4 см, плотные, 15–25-цветковые, с почти сидячими цветками. Венчик желтый. Завязь сидячая, прижато-беловолосистая. Цветёт и плодоносит в июне–июле.



Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг.

Места обитания. Известняки и мелкоземистые склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. 2000 растений зарегистрировано в 2001 году.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Безсистемный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.

Источники. [32, 159, 310].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits lime-stones and slopes in the low and middle mountainous zone. 2000 plants were revealed in 2001. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



38. ОДИЛОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Адылова / *Astragalus adylovii* F. O. Khass., Ergashev et Kadyrov

Мақоми 1. Қизилқумнинг қолдиқ тоғларидаги реликт, камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 20–30 см. Пояси 5–10 см. Барглари 8–12 см узунликда, япроқчалари 4–6 жуфт, ингичка чўзиқроқ шаклда, учи ўткир, пастки томони оқиш, чалкаш тукли, устки томони деярли туксиз. Гулбанди 10–20 см узунликда, оқиш, қалин тукли. Гулпопуғи момиқ, икки тарафлама жойлашган 10–15 тача гулдан иборат. Косачаси найсимон, оқ ва қора тукли, узунлиги 10–12 см, тишчалари 2–3 мм узунликда. Байроқчаси сариқ, узунлиги 20–23 мм, қайиқчасидан узунроқ. Қанотчаси (эшқаги) байроқчасидан қисқа. Дуккаги осилиб туради, узунлиги 12–15 мм, оқиш қалин тукли, банди 2–3 мм узунликда.

Тарқалиши. Навоий ва Бухоро вилоятлари: Қулжуктоғнинг шарқий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Шимолий юмшоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. 20 туп ўсимликдан иборат 2 та популяцияси мавжуд.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [313].

Ф.О. Хасанов.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [313].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the eastern part of the Kuldzhuktau range (Navoi and Bukhara regions). Inhabits the northern grassy slopes. 2 populations with 20 plants were found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



Статус 1. Реликтовый эндемичный вид останцов Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее растение 20–30 см высоты. Стебель 5–10 см высоты. Листья 8–12 см длины, 4–6 парные, листочки узкоовальные острые, снизу оттопырено бело-волосистые, сверху почти голые. Цветоносы 10–20 см высоты, густо бело-волосистые. Кисти рыхлые, двусторонние, 10–15 цветковые. Чашечка трубчатая, бело и черно-волосистая, 10–12 мм длины, зубцы 2–3 мм длины. Флаг желтый, 20–23 мм длины, крылья короче флага и длиннее лодочки. Боб повислый, 12–15 мм длины, густо бело-волосистый на ножке 2–3 мм длины. Цветет в мае, плодоносит в июне. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Навоийской и Бухарской областях: горы Кульджуктау (восточная часть).

Места обитания. Северные мягкие склоны.

Численность. Известно 2 популяции (около 20 растений).

Размножение. Семенное.



39. АЛЕКСЕЙ АСТРАГАЛИ

Астрагал Алексея / *Astragalus alexeji* Gontsch.

Мақоми 0. Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Поясиз, кўп йиллик ўт, баландлиги 20 см. Баргларининг узунлиги 18–30 см, баргчалари 16–20 жуфт, юмалок, четлари ўйилган, пахмоқ тукли. Гулбанди 4–5 см узунликда, гулпопугининг узунлиги 4–5 см, 3–5 гулдан иборат. Косачаси найчасимон, узунлиги 12–13 мм, пахмоқ тукли. Байроқчаси сариқ, кейинроқ қизил тусга киради, узунлиги 25 мм, қанотчаси (эшқаги) 23 мм узунликда, қайиқчаси 21 мм узунликда. Дукчаги текис, сал пастга қараб эгилган, банди 4–5 мм узунликда, нишлари бор, узунлиги 17–20 мм, эни 5–6 мм, тумшукчаси 2–3 мм узунликда, пўсти қалин, пахмоқ тукли.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шербоддаги қатор тепаликларда (Тошқоқ дарасида) тарқалган.

Ўсиш шароити. Кулранг, бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Гербарий материаллари йўқ, ҳатто намунавий нусхаси ҳам йўқолган. Уни топиш учун олиб борилган тадқиқотлар натижа бермаган. Бу тур бутунлай йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган бўлиши мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмаган.

Манбалар. [32, 159, 310].

А.С. Эсанкулов.

Статус 0. Эндемик пестроцветных толщ Юго-западного Гиссара.

Краткое описание. Бесстебельный многолетник 20 см высоты. Листья 18–30 см длины, листочки 16–20-парные, округлые и мелко выемчатые, бархатисто-мохнатые. Цветоносы 4–5 см длины, кисти 4–5 см длины с расставленными 3–5 цветками. Чашечка трубчатая, 12–13 мм длины, бархатисто-мохнатая.

Флаг желтый, позже краснеющий, 25 мм длины, крылья 23 мм длины, лодочка 21 мм длины. Бобы горизонтально отклоненные, поникающие, на ножке 4–5 мм длины, ланцетные, 17–20 мм длины и 5–6 мм ширины, с носиком 2–3 мм длины, твердокожистые, бархатисто-мохнатые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: (эндемик Келиф-Шерабадской гряды – урочище Ташкак).

Места обитания. Серые глины.

Численность. Нет ни одного гербарного образца и даже типовой экзemplяр утерян. Многочисленные попытки найти вид не увенчались успехом. Вид по-видимому исчез.

Размножение. Видимо семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охранялось.

Источники. [32, 159, 310].

А.С. Эсанкулов.

Rare endemic species of the south-western spurs of the Hissar Range. It is spread at the Kelif-Sherabad low mountainous range (Surkhandarya region). Inhabits gray clays. There are no one specimen in herbaria (type specimen is also lost). Probably disappeared. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



40. БЕЛОЛИПОВ АСТРАГАЛИ

Астрагал Белоллипова / *Astragalus belolipovii* Kamelin ex F. O. Khass. et N. Sulejm.

Мақоми 1. Шимолий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Поясиз ўтсимон ўсимлик, бўйи 30–40 см. Барглари тикансиз, узунлиги 20–30 см. 15–20 жуфт оқ тукли баргчалари ён-атрофига ёйилиб тушган. Гулбанди гулидан узун. Гулпопуклари момиқ, 15–20 та гулдан иборат, узунлиги 10–15 см. Косачасининг пастки қисми кўк, дастлаб найсимон бўлиб, кейинроқ пуфак-симонга айланади, оқ тукли, узунлиги 12–15 мм, тишчаларининг узунлиги 2–4 мм. Байроқчаси яшилсимон-тўқ қизил рангли, узунлиги 25–30 мм,

Маданийлаштирилиши. И. В. Белоллипов томонидан ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Зомин давлат кўриқ-хонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [312].

Н.О. Сулаймонов.

Статус 1. Редкий эндемик Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Бесстебельное растение 30–40 см высоты. Листья неколючие 20–30 см длины, оттопырены, бело-волосистые, 15–20 парные. Цветоносы длиннее листьев. Кисти рыхлые 15–20 цветковые, 10–15 см длины. Чашечка внизу синеватая, вначале трубчатая позже вздувающаяся бело-волосистая 12–15 мм длины, зубцы 2–4 мм длины. Флаг зеленовато-пурпуровый, 25–30 мм длины с округлой пластинкой сверху выемчатый, крылья 25–30 мм длины чуть длиннее лодочки. Боб неизвестен. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Джизакская область: Туркестанский хребет (Зааминский государственный заповедник). Известно одно местонахождение вида в урочище Кульсай.

Места обитания. Средний пояс гор, в арчовнике.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Вид культивировался проф. И. В. Белоллиповым в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Зааминском государственном заповеднике.

Источники. [312].

Н.О. Сулейманов.

Rare endemic species of the northern Pamir-Alay. It is spread at the Turkestan range: the Zaamin state nature reserve, the valley Kulsay (Jizzakh region). Inhabits within juniper forests in the middle mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: unknown. Measures of protection: protected in the Zaamin state nature reserve.

учи думалоқ айлана шаклида ўйилган, қанотчаси 25–30 мм узунликда, қайиқчасидан сал узун. Дуккаги номаълум.

Тарқалиши. Фақат Туркистон тизмасидаги Қулсой дарасида ўсиши аниқланган (Жиззах вилояти, Зомин кўриқхонаси).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг марказий қисмидаги арчазорларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.



41. ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА АСТРАГАЛИ

Астрагал южноферганский / *Astragalus austroferganicus* Kamelin et R. M. Vinogr.

Мақоми 0. Фарғона водийсидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт, бўйи 10–20 см. Пояси ингичка, оқ тукли. Барги 1–2–3 жуфт баргчали, узунлиги 1–2–6 см, япроқчалари юмалоқ. Косачаси 12–18 см узунликда, оқ ва қора тукчалари тарқоқ. Байроқчаси сариқ, узунлиги 20 мм, қанотчаси 17–18 мм узунликда, қайиқчасининг узунлиги 18–20 мм. Дуккаги 20–50 мм узунликда, бандининг узунлиги 2–3 мм, тўғри, текис оқ тукли тумшукчасининг узунлиги 8–10 мм.

Тарқалиши. Фарғона водийси: Фарғона вилояти (Янгиарик)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Шўрхоқ тупроқларда ўсади.

Сони. 1928 йили бир мартагина А. Йоффе томонидан йиғилган. Бу тур йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик тарқалган жойларда хўжалик ишлари юритилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмаган.

Манбалар. [65, 159].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 0. Редчайший эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетник 10–20 см высоты. Стебли тонкие беловолосистые. Листья 1–2–3-парные, 1–2–6 см длины, листочки округлые. Чашечка 12–18 мм длины, бело- и чернорассеяно-волосистая. Флаг желтый 20 мм длины, крылья 17–18 мм длины, лодочка 18–20 мм длины. Бобы 20–50 мм длины, на ножке 2–3 мм длины, прямые с носиком 8–10 мм длины, беловолосистые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская долина: Ферганская область (Янгиарык).

Места обитания. Соленосные глины.

Численность. Собран один раз А. Йоффе в 1928 году. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственная деятельность.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охранялось.

Источники. [65, 159].

Ф.О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the foothills, nearby Ferghana city (Ferghana region). Inhabits salty clays. The plants were collected by A. Joffe in 1928. Probably disappeared. Limiting factors: habitat destruction. Measures of protection: not protected.



42. ҚИЗИЛ ХҲРОЗ АСТРАГАЛИ

Астрагал кызыл-хуразский / *Astragalus rubri-galli* Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойда тарқалган камёб реликт эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Қўп йиллик ўтсимон ўсимлик, бўйи 10–20 см. Барглари 5–7 жуфт узунлиги 5–7 см, туклари қаттиқроқ. Гулбанди қисқа, узунлиги 3–4 см. Косачаси найсимон, узунлиги 15–17 мм, оқ ва қора тукли. Байроқчаси 25 мм узунликда, учи ўйилган, қанотчаси 25 мм узунликда, қайиқчаси 22 мм узунликда. Дуккаги бандсиз, кенг чизиқлари бор, узунлиги 25–30 мм, ёйсимон букилган, оқ, қаттиқ тукли, икки уяли.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шеробод тепаликлариди тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил қумтошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 2001 йили 12 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши, турнинг реликтлиги ва ола тусли тупроқларнинг қисқариб кетаётганлиги натижасида қисқарган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [3, 310].

Н.Т. Очиллов.

Статус 1. Реликтовый эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение 10–20 см высоты. Листья 5–7-парные, 5–7 см длины, жестковато-пушистые. Цветоносы короткие, кисти 3–4 см длины. Чашечка трубчатая, 15–17 мм длины, бело- и черно-волосистая. Флаг 25 мм длины, на верхушке выемчатый, крылья 23 мм длины,



лодочка 22 мм длины. Бобы сидячие, широколинейные, 25–30 мм длины, дуговидно изогнутые, бело-жестковолосистые, двугнездные. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда.

Места обитания. Краснопесчанниковые склоны.

Численность. В 2001 году было зарегистрировано 12 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас, реликтовость вида и сокращение пестроцветов.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [3, 310].

Н.Т. Очилова.

Rare relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad low mountainous range (Surkhandarya region). Inhabits red gypsaceous slopes. In 2001, 12 plants were found. Limiting factors: pasturing, relict characters and decreasing of gypsaceous areas. Measures of protection: not protected.



43. ШУЪЛАЛИ ЗИРАКЎТ

Эспарцет таверниерелистный / *Onobrychis tavernierifolia* Stocks ex Boiss.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Қизилқумда жуда аз микдорда сақланиб қолган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 3–7 см келадиган, ер бағирлаб ўсувчи, деярли поясиз, туклар билан қопланган бир йиллик ўт. Барги, асосан, битта, йирик, тескари-тухумсимон ёки 1–2 жуфт ёнбаргчали, устки томони калта ётиқ, пастки томони хурпайган оқ тукли, банди 5 см узунликда. Гулпопуги момик, 3–7 гулли. Косачасининг узунлиги 3–3,5 мм. Дуккаги ғадир-будур каттакчали, узунлиги ва эни 1 см атрофида. Май ойида гуллайди, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумдаги қолдиқ тоғли жойларда (Қулжуктоғ этакларида жойлашган Чурук, Оёқгужумли қудуқлари атрофида) тарқалган. Эронда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлардаги шағалли-тошли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Бир-биридан узокда якка-якка ҳолда, баъзан эса 2–3 туп бўлиб ўсади. 2009 йили 94 туп ўсимлик қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди. Уруғи қаттиқ қобиқ ичида жойлашган. Шунинг учун ёгин кўп бўлган йиллари яхши униб чиқади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши натижасида ўсимликнинг сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1962–1964 йилларда ЎЗР ФА Қизилқум чўл станциясида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [138, 153].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Статус 1. Очень редкий и малочисленный вид в Юго-западном Кызылкуме.

Краткое описание. Однолетнее приземистое, высотой 3–7 см, почти бесстебельное, опушенное растение. Листья с верхней стороны покрыты короткими прижатыми, а снизу длинными торчащими белыми волосками, расположены на длинных (до 5 см) черешках, оканчивающихся крупной долькой-листочком обратнойцевидной формы. Цветоносы длиной 2–3,5 см. Кисти рыхловатые, 3–7

цветковые. Чашечка длиной 3–3,5 см. Бобы морщинисто-ячеистые, длиной и шириной около 1 см. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская область: останцовые низкогорья Кызылкума – Кульджуктау, близ колодцев Аяк-Гужумды и Чурук. За пределами Узбекистана – Иран.

Места обитания. Каменистые и каменисто-щебнистые склоны останцовых гор.

Численность. Сильно разбросаны единичными экземплярами, реже по 2–3. В 2009 году найдены 94 растений.

Размножение. Семенное. Семена покрыты твердой оболочкой, поэтому в годы с обильными осадками отмечается интенсивное прорастание.

Причины изменения численности и ареала. Нарушение среды обитания в результате чрезвычайного выпаса.

Культивирование. В 1962–1964 гг. были выращены в коллекционном питомнике на Кызылкумской пустынной станции АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [138, 153].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Very rare species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldzhuktau, near Ayak-Guzhumdy and Churuk (Bukhara region). Inhabits stony and gypseous slopes. There are three small populations can be found. Limiting factors: degradation of habitat as a result of overgrazing. Measures of protection: not protected.



44. БУРЧОҚСИМОН КАЛИСПЕПЛА

Калиспепла эгакантовая / *Calispepla aegacanthoides* Vved.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойда йўқолиб кетиш арафасида турган реликт эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см, йиллик поялари тикансимон, ётиқ оқиш туклар билан қопланган ёстиқсимон ярим бута. Барглари уч бўлакли, ёнбаргсиз, пастдагиси бандли, юқоридагилари деярли бандсиз. Гули сариқ. Дуккаги нишли-чизиқли, ўткир учли, қалин, ётиқ тукли. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун тоғидаги Мачайдарё ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги юзаси очилиб қолган ола тусли тупроқларда, нурраган тошли ёнбағирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Ўсимлик ўсган майдонлар учта жойда борлиги аниқланган. 2009 йилдаги изланишлар ўсимлик популяциясининг Дарбанд қишлоғидан 8–10 км юқоридаги тоғли худудларда сақланиб қолганлигини кўрсатди. Ўсимликнинг мазкур популяциясида туплар сони 500 та атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тўлиқ ўрганилмаган. Антропоген омиллар таъсирида тарқалиш майдонлари қисқариб бораётганлиги кузатилмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1982 йили табиатдан олиб келиб ўтказилган икки туп ўсимлик қуриб қолган. 2009 йилда Ботаника боғига ўсимликнинг туплари қайта экилган. Аммо бу уриниш ҳам натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [56, 169, 294].

И.В. Белолипов.

Статус 1. Редчайший эндемичный вид реликтового монотипного рода Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Подушковидный полукустарник высотой 20–40 см. Все растение седоватое от прижатых волосков. Годичные стебли с почти колючими ветвями. Листья без прилистников, тройчатые, нижние на черешках, верхние почти сидячие. Цветки желтые. Боб линейно-ланцетный, острый, густо-прижато-волосистый. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Бассейн реки Мачайдарья в Байсунских горах.

Места обитания. Каменистые эродированные склоны и обнажения пестроцветов, разреженные арчовники среднего пояса гор.

Численность. Отмечен в трех

пунктах. Исследования 2009 года выявили одну популяцию 8–10 км выше от кишлака Дарбанд, с численностью не более 500 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Изучено недостаточно. Под влиянием антропогенных факторов наблюдается сокращение площадей популяции.

Культивирование. Попытка интродукции 2-х взрослых растений в Ботаническом саду АН РУз в 1982 году оказалась неудачной. В 2009 году приступили к повторным попыткам вырастить растение в Ботаническом саду.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [56, 169, 294].

И.В. Белолипов.

Unique relict endemic species and monotypical genus of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Baysun mountains (Surkhandarya region). Inhabits stony eroded slopes and outcrops of gypsaceous rocks, sparse juniper stands in the middle belt of mountains. In 2009, 1 large population (about 500 plants) was revealed. Limiting factors: insufficiently known. Distribution area of population decreasing under the influence of anthropogenic factors. Measures of protection: not protected.



45. ҚОРАПОЯ МОЙҚОРАҒОН

Майкараган сетчатый / *Calophasa reticulata* Sumnev.

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олой тизмаларидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Унча баланд бўлмаган сершоҳ бута. Барглари кумушранг, ҳар икки томони ётиқ қалин туклар билан қопланган, баргчалари 4–5 жуфт, чўзиқроқ. Ёнбаргчаларининг асоси учбурчаксимон. Тўпгуллари бошчасимон, тиғиз. Дуккагининг узунлиги 35–40 мм. Июнда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Бойсун тоғларида тарқалган.


Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли ёнбағирларда ва арчазорлар орасида ўсади.

Сони. Табиатда онда-сонда учрайди.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ва ўсимликдан ўтин сифатида фойдаланилиши натижасида сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [273, 310].

О.Т. Тургинов.



Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Невысокий сильноветвистый кустарник. Листья серебристо-белые, с обеих сторон густо покрыты прижатыми волосками, с 4–5 парами продолговатых листочков. Прилистники при основании треугольные. Соцветие головчатое, скученное. Плод – боб длиной до 35–40 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет (Байсунские горы).

Места обитания. Щербнистые склоны в среднем поясе гор, среди арчовников.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас, заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [273, 310].

О.Т. Тургинов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Baysun mountains (Surkhandarya region). Inhabits slopes in the juniper zone. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing and cutting as fuel wood. Measures of protection: not protected.



46. ЙИРИК НҲАТ

Нут большой / *Cicer grande* (Popov) Korotkova

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 20–45 см. Пояси салгина буралган, безчали туклар билан қопланган кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 4–7 см, барг бандининг учи оддий ёки 3–5 та гажаги бор. Баргчалари 4–7 жуфт, чўзикроқ-эллипс шаклида, узунлиги 10–25 мм, эни 6–12 мм, ҳар икки томони калта, безчали туклар билан қопланган, гулпоясининг узунлиги 2,5–3,5 см, гулбанди 4–6 мм узунликда. Косачасининг узунлиги 10 мм, тугунчаси туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, июнь ойида мевалайди.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий ва Сурхондарё вилоятлари: Помир-Олойда, Нурота, Оқтов ва Қўхитанг тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмларидаги тошли ва майда заррали тупроқлардан иборат ёнбағирларда ўсади. Нурота кўриқхонаси ҳудудидаги учта тоғ дарасида тарқалганлиги аниқланди. Умумий сони бир нечта юз ўсимликдан иборат, популяцияси 5–6 гектарга яқин майдонда тарқалган.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди, баъзан унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг тартибсиз боқилиши натижасида ўсимлик сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Сурхон давлат кўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [151, 154, 181, 184].

Н.Ю. Бешко.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 20–45 см, стебли слегка извилистые, опушенные железистыми волосками. Листья длиной 4–7 см, черешки заканчиваются простым или 3–5-ветвистым усиком; листочки 4–7-парные, овально-эллиптические, длиной 10–25 мм, шириной 6–12 см, с обеих сторон коротко-железисто-опушенные. Цветоносы длиной 2,5–3,5 см, цветоножки – 4–6 мм, чашечки длиной 10 мм, завязь покрыта волосками. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Сурхандарьинской областях: Памиро-Алай, хребты Нуратау, Актау и Кугитанг.

Места обитания. Каменисто-мелкоземистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие группы. На территории Нуратинского заповедника отмечен в 3-х урочищах, общая численность составляет несколько сотен растений, занятая популяцией площадь около 5–6 га.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурханском заповедниках.

Источники. [151, 154, 181, 184].

Н.Ю. Бешко.



Rare endemic species of the western branches of Pamir-Alay. It is spread at the Pamir-Alay: the Nuratau, Aktau and Kughitang ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi and Surkhandarya regions). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. Single specimens and small populations can be found. On the territory of Nuratau nature reserve 3 populations are known (several hundred plants), distribution area is about 5-6 hectares. For Kughitang range, there is no data on populations size. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Surkhan state nature reserves.



47. ҚУДРОЙИ НҲАТ

Нут седой / *Cicer incanum* Korotkova

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи: Узунлиги 20–30 см келади-ган ярим бутача. Бўртма, тўлқинсимон поясининг ранги кўкимтир. Барглари жуфт-патсимон, узунлиги 2,5–4 см. Баргларининг банди ўзагига томон тикансимон туклар билан қопланган бўлади. Япроқчалари 4–6 жуфт, учли понасимон ёки тухумсимон, калта тукчалар билан қопланган. Гулпояси 10–15 мм узунликдаги туклар билан қопланган, 1,5–2,5 см узунликдаги 1–2 та гулдан иборат. Гулкосаси тукли, 8–10 мм узунликда. Байроқчасининг узунлиги 20 мм, ташқи томони тукли. Қанотчалари 14–15 мм, қайиқчаси 13–14 мм. Дуккаги тукли, 2,5 см узунликда. Июль ойида гуллаб, августда мева тугади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қизилдарё ҳавзаси (Тошқўрғон қишлоғи).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ўсади.

Сони. 1996 йилда 20 та ўсимлик қайд қилинган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тарқалиш доираси тор бўлган стенобионт эндемик тур.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [151, 154, 181, 184].

И.И. Мальцев.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание.

Полукустарничек с сизыми, извилистыми, железистыми стеблями 20–30 см высоты. Листья парноперистые 2,5–4 см длины, с осью, переходящей в колючку. Листочки 4–6-парные, клиновидные или яйцевидные, коротко

опушенные. Цветоносы 1–2 цветковые, 1,5–2,5 см длины, с остью 10–15 мм длины. Чашечка опушенная, 8–10 мм длины. Флаг снаружи опушенный, 20 мм длины, крылья 14–15 мм длины, лодочка 13–14 мм длины. Боб опушенный 2,5 см длины. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кызылдарья (кишлак Ташкуртан).

Места обитания. Скалы в среднем поясе гор.

Численность. В 1996 году было зарегистрировано 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Узлокальный эндемичный стенобионт.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [151, 154, 181, 184].

И.И. Мальцев.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Kyzyl-darya valley, nearby the village Tashkurgan (Kashkadarya region). Inhabits rocks in the middle mountainous zone. Seldom, single or small brushwoods with other woody and shrubby plants can be observed, very seldom, small pure brushwoods can be found. In 1996, only 20 plants were found. Limiting factors: endemic species. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



48. ВВЕДЕНСКИЙ ОКСИТРОПИСИ

Остролодочник Введенского / *Oxytropis vvedenskyi* Filin.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см, ёғочсимон, йўғон ўқ илдизли яримбута. Баргининг узунлиги 1,5–3 см, банди ярим ётиқ, оқ тукли. Баргчалари 5–6 жуфт, тиғсимон-чўзиқ, ҳар иккала томони сийрак, ётиқ оқ туклар билан қопланган, узунлиги 3–5 мм, эни 1–1,5 мм. Гулпопуғи 6–8 гулли, ғовак. Гултожи бинафша рангли. Дуккаги чўзиқ ёки думалоқ-чўзиқ, узунлиги 10–12 мм, эни 0,3–0,4 мм, банди 1,5 мм узунликда, майда, ётиқ қора ва оқ тукли. Июнь–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағрида, Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида майда заррали тупроқлар, тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой 5–10 см с толстым деревянистым стержнем. Листья длиной 1,5–3 см с полуприжато-беловоло-

систыми черешками. Листочки 5–6 (7)-парные, ланцетно-продолговатые, с обеих сторон негусто-прижато-беловолосистые, длиной 3–5 мм, шириной 1–1,5 мм. Кисти 6–8 цветковые, рыхлые. Венчик фиолетовый. Бобы продолговатые или продолговато-овальные, длиной 10–12 мм, шириной 0,3–0,4 мм, на ножке длиной 1,5 мм, мелко прижато бело- и черноволосистые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: южные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы.

Места обитания. Пологие мелкоземистые, скалистые и каменные склоны в среднем и верхнем поясах гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов.

Endemic species of the Hissar range It is spread at the southern spurs of the Hissar range (Baysun mountains, Surkhandarya region). Inhabits fine earth, rocky and stony slopes in the middle and upper mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



49. МАЙДА ГУЛЛИ ОКСИТРОПИС

Остролодочник мелкоцветный / *Oxytropis tyttantha* Gontsch.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см, поясиз кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 8–10 см; баргчалари 15–25 жуфт, тухумсимон чўзиқ, баъзан кенг ёйилган, ўткир учли, узунлиги 5–12 мм ли нишлар билан, баъзан тўмтоқ, дағал оқ туклар билан қопланган. Гулпопуғи калта, зич, тухумсимон ёки юмалоқ, узунлиги 1,5–2 см, эни 1–1,5 см, 10–15 гулли. Косачаси кўнғироқ ёки найсимон кўнғироқ, узунлиги 5 мм, дағал ярим ётиқ тукли. Дуккагининг банди 2 мм атрофида, чўзиқ, узунлиги 10–15 мм, тумшукчаси 2–3 мм узунликда, сал эгилган, бигизсимон. Август-сентябрь ойларида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида Қашқадарё, Тўпаланг, Сангардак дарёлари ҳавзаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва юқори қисмларидаги тошли ва майда тупроқли ёнбағирларда, юзаси очилиб қолган қизил тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное растение высотой 10–20 см. Листья длиной 8–10 см. Листочки 15–25-парные, яйцевидно-продолговатые или широколанцетные, длиной 5–12 мм, острые, реже туповатые, рыхлые или густо жёстко-шероховато-прижатобеловолосистые. Кисти укороченные, плотноватые, яйцевидные или почти округлые, длиной 1,5–2 см, шириной 1–1,5 см, 10–15-цветковые. Чашечка колокольчатая или трубчато-колокольчатая, длиной 5 мм, полуприжатожёстковолосистая. Бобы продолговатые, длиной 10–15 мм, плодоножка длиной около 2 мм, со слегка вниз изогнутым шиловидным носиком длиной 2–3 мм. Цветёт в августе–сентябре, плодоносит в сентябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейны рек Кашкадарья, Тупаланг, Сангардак.

Места обитания. Каменистые и мелкоземистые склоны, реже выходы красных глин в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов.

Endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range, the Kashkadarya, the Tupalang, the Sangardak river basins (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits stony and fine earth slopes, rarely, red clay in the middle and upper belts of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



50. МАЙДОНТОЛ ОКСИТРОПИСИ

Остролодочник майдантальский / *Oxytropis maidantalensis* B. Fedtsch.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, калта, ўқ ил-дизли, деярли поясиз, сийрак чим ҳосил қилувчи, оқ пахмоқ тукли ўсимлик. Баргининг узунлиги 2,5–7 см, 5–12 жуфт, баргчалари чўзиқроқ. Гулпоясининг узунлиги баргига тенг ёки ундан узунроқ. Гулпопуги бошчасимон, зич жойлашган қизил гуллардан иборат. Дуккаги пуфаксимон, чўзиқ ту-хумсимон, узунлиги 15 мм, қаттиқ, тумшукчали, қалин хурпайган тукли. Июль ойларида гуллаб, августда мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Майдонтол дарёсининг ҳавзасида. Ўзбекистондан ташқарида эса Қозоғистон ва Қирғизистонда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли тоғ ён-бағирларида ўсади.

Сони. Санокли даражада учрайди. Ўзбекис-тондаги умумий сони 3000 дан ортмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий та-биат боғи ҳудудидаги ўсиш жойлари муҳофазага олинган.

Манбалар. [10, 47, 76, 212, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик За-падного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, коротко-стержневое, многоглавое травянистое растение, почти бесстебельное, рыхлодерновинное, бело-мохнатое от опушения. Листья длиной 2,5–7 см, 8–12-парные, с овальными листочками. Цветоно-сы равны листьям или длиннее их, с густой голов-чатой кистью красных цветков. Бобы вздутые, удлинено-яйцевидные, длиной около 15 мм, с прямым твердым носиком, густо-оттопырен-но-шерстистые. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская об-ласть: бассейн реки Майдантал. За преде-лами Узбекистана: Казахстан, Кыргыз-тан.

Места обитания. Каменисто-щебни-стые склоны.

Численность. Встречается одиночно. Общая численность в Узбекистане не пре-вышает 3000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находят-ся на территории Угам-Чаткальского националь-ного парка.

Источники. [10, 47, 76, 212, 304, 305].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: the Maidantal river basin (Tashkent region). Inhabits stony and gravelly. Single specimens can be found. The number is about 3000 plants in Uzbekistan. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



51. НИМ ПУШТИ РАНГ ОКСИТРОПИС

Остролодочник ложнорозовый / *Oxytropis pseudorosea* Filim.

Мақоми 2. Нурота тоғларида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см, поясиз, ёғочсимон кўп йиллик ўт. Баргининг узунлиги 10–15 см, яшил, ётиқ ипаксимон тукли. Асосий банди ва баргчаларининг банди кумушсимон тукли. Гулпопуги момиқ, ғовак, чўзиқроқ, узунлиги 7–15 см, кўп гулли, гуллари сийрак жойлашган. Косачаси кўнғироксимон, узунлиги 12–14 мм, оқ тукли. Гултожи пушти-бинафша рангли. Дуккаги чўзиқ, узунлиги 10–15 мм, эни 4–5 мм, тумшукчасининг узунлиги 5–6 мм, қалин оқ туклар билан қопланган, деярли икки уяли. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмидаги шағалли-тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши натижасида ўсимликнинг сони камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Н.Ю. Бешко.

Статус 2. Эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Бесстебельное растение высотой 30–40 см с деревянистым стержневым корнем. Листья длиной 10–15 см, прижато-шелковисто-опушенные, зеленые; черешки, как и ось, шелковистоволосистые. Кисти рыхлые, длиной 7–15 см, многоцветковые, с расставленными цветками. Чашечка колокольчатая, длиной 12–14 мм, прижато-бело-опушенная; с шиловидными, равными трубке зубцами. Венчик розово-лиловый, в сухом виде фиолетовый. Бобы продолговатые, длиной 10–15 мм, шириной 4–5 мм, с носиком длиной 5–6 мм длины, густо-прижато-беловолосистые, почти двугнездые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Нуратау и Актау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, единично или небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Основную угрозу представляет чрезмерный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Н.Ю. Бешко.

Endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau and Aktau ranges (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony and gravelly of the lower and middle belts of mountains. Single specimens and small populations occur sporadically. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



52. ФЕДЧЕНКО ОКСИТРОПИСИ

Остролодочник Федченко / *Oxytropis fedtschenkoana* Vassilcz.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда кам тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, қисқа ўқ илдизли, поясиз, юмшоқ чимли, қалин туклар билан қопланган ўсимлик. Баргларининг узунлиги 2–3 см, баргчалари 3–8 жуфт, чўзиқроқ думалоқ шаклда. Гулпояси баргидан узун. Дуккаги пўстлоқли, юмалоқ пуфаксимон, узунлиги 15 мм. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол ва Курама тизмаларининг ғарбий қисмларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг қуруқ шағалли-тошли ёнбағирларида ва майда тошли ярим мустаҳкамлашган сурилмалардан, тоғларнинг юқори минтақасида ўсади.

Сони. Бу турнинг бир-биридан алоҳида жойлашган 6 та популяцияси маълум. Лекин уларнинг сони ва майдони унча катта эмас, яъни, 100 м² майдонга 1–2 тупи тўғри келади, умумий сони тахминан 4,5–5 минг атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Рақобатга чидамсиз. Мунтазам равишда чорва моллари боқиладиган ерларда ўсади. Ёввойи ҳайвонлар ҳам истеъмол қилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. ва Угом-Чотқол биосфера резерватида ўсади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, бесстебельное, мелкодерновинное, короткостержневое растение, седое от густого опушения. Листья длиной 2–3 см, 3–8-парные, с овальными листочками. Цветоносы длиннее листьев. Бобы кожистые, шаровидно вздутые, длиной до 15 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: западные оконечности Чаткальского и Кураминского хребтов.

Места обитания. Сухие крупнощепнистые склоны и мелкощепнистые полузакрепленные осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Отмечен в 6 удаленных друг от друга популяциях. Каждая из них невелика по площади и немногочисленна по составу. Растения неравномерно удалены друг от друга, единичны, в среднем по 1–2 особи на 100 м². Общая численность ориентировочно оценивается в 4,5–5 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая конкурентоспособность. Произрастает в зоне интенсивного летнего выпаса, поедается дикими и домашними животными.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Произрастает на территории и Угам-Чаткальского биосферного резервата.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the Western Tien-Shan. It is spread at the western outskirts of the Chatkal and Kurama ranges (Tashkent region). Inhabits dry dry gravelly slopes and semi-fixed scree in the upper mountain zone of mountains. 6 populations were revealed. Each of them occupies a small area and is not numerous. Plants irregularly distant one from other, single, an average 1-2 specimens per 100 m² can be observed. Total number is approximately evaluated at 4500–5000. Limiting factors: low competition capacity. It grows in the zone of intensive summer pasturing. It is eaten by wild and domestic animals. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and Ugam-Chatkal biosphere reserve.



53. ЮПҚА ПАРДАЛИ ОКСИТРОПИС

Остролодочник ложнотонкопузырчатый / *Oxytropis pseudoleptophysa* Boriss.

Мақоми 2. Кўҳитанг тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 4–10 см, қалин бурама туклар билан қопланган, поясиз, кўп йиллик ўт. Баргларининг узунлиги 2–10 см, чўзиқ, банди хурпайган оқ туклар билан қопланган. Баргчалари 5–8 жуфт, учли, ҳар икки томони пахмоқ тукли, узунлиги 5–7 мм, эни 3–5 мм. Гулпопуғи ғовакроқ, 8–12 гулли, косачасининг узунлиги 5–7 мм. Гултожи кўк ёки ҳаворанг. Дуккаги пуфаксимон шишган, тухумсимон-юмалоқ, юмшоқ, хурпайган оқ тукли, узунлиги 13–18 мм, эни 10–15 мм гача етади. Май-июнь ойларида гуллаб, июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитанг тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное растение, 4–10 см высоты, все густомахнатое от длинных отклоненных белых волосков. Листья продолговатые, 2–10 см длины, с оттопыренно-волосистыми черешками. Листочки в числе 5–8 пар, островатые, с обеих сторон густомахнатые, длиной 5–7 мм, шириной 3–5 мм.

Кисть рыхловатая, 8–12-цветковая.

Чашечки длиной 5–7 мм. Венчик

синий или голубоватый. Бобы

вздутые, яйцевидно-ша-

ровидные, мягко-оттопыренно-беловолосистые, длиной 13–18 мм, шириной около 10–15 мм. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [10, 47, 76, 304, 305].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



54. АНГРЕН ТАНГАЎТИ

Копеечник ангрениский / *Hedysarum angrenicum* Korotkova

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шаннинг Чотқол тизмасида учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган поясиз, қишда ер усти қисмлари куриб қоладиган кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, узунлиги 10–16 см, баргчалари 3–4 жуфт, чўзиқроқ айлана шаклида, ҳар икки томони тукли, устки томони сийрак, пастки томони қалин тукли. Тўпгули баргига тенг, баъзан ундан узунроқ, 16–18 см. Косачаси узун тукли. Дуккаги туксиз, бир-икки, баъзан уч бўғимли. Июнь ойида гуллаб, меваси июль–августда етилади.



Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол тизмаси (Оҳангарон дарёси ҳавзаси) ва Фарғона водийси (Оқсув ва Қорасув дарёлари ҳавзалари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли шимолий ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши туфайли ўсимликнинг уруғ бериши пасайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев.

длинные (10–16 см), сложные, 3–4-парные. Листочки овальные, сверху слабоопушенные, снизу густоволосистые. Цветоносы равны листьям, иногда чуть длиннее их (до 16–18 см). Чашечка длинноволосистая. Бобы без щетинок, одно-, двух-, реже трёхчленистые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский хребет – бассейн реки Ахангаран; Ферганская долина – бассейны рек Аксу и Карасу.

Места обитания. Каменистые северные склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нарушение среды обитания, снижение семенной продуктивности в результате чрезмерного выпаса.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: the Akhangaran; the Fergana valley: the Aksu and Karasu river basins (Tashkent and Namangan regions). Inhabits stony northern slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: destruction of habitats, reduction of seed productivity as a result of overgrazing. Measures of protection: not protected.



Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 20 см с отмирающими на зиму надземными частями. Листья

55. БУХОРО ТАНГАЎТИ

Копеечник бухарский / *Hedysarum bucharicum* B. Fedtsch.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасида учрайдиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–30 см орасидаги кўп йиллик ўт. Барглари мураккаб, баргчалари 5–8 жуфт, узунлиги 14–18 мм, эни 2–8 мм. Гулпояси баргидан узун. Байроқчаси қайиқчасидан калтароқ. Дуккаги 2–3 бўғимли, 5–8 та кўндаланг кесимли бўртмалари бор. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбида, Қизилмозор, Тошқўрғон қишлоқлари атрофларида ҳамда Яккабоғ дарёсининг юқори оқимида, Хўжагургур-Ота тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Гипсли, оҳак-тошли тупроқларда ҳамда сйрак арчзор, пистазорларда, шунингдек, ёвсан ва бошқа ўтлар орасида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан зиёд кўп боқилиши туфайли камайиб кетган. Қурғоқчилик йиллари уруғи яхши унмайди.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўрикхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий вид Юго-западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение со стеблями высотой 10–30 см. Листья сложные, 5–8-парные, листочки длиной 14–18 мм, шириной 2–8 мм. Цветоносы превышают листья. Флаг немного короче лодочки. Бобы 2–3-членные с 5–8 поперечными ребрами. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, окрестности кишлаков Кызыл-Мазар, Ташкурган, верховья Яккабаг-Дарьи, горы Ходжа-Гур-Гур-Ата.

Места обитания. Гипсы и известняки, среди арчового редколесья, в разреженных фисташниках и полынно-разнотравных сообществах.

Численность. Встречается единично, реже небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сильно страдает от выпаса мелкого рогатого скота. Плохо возобновляется в засушливые годы.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев.

Rare species of the south-western part of the Hissar range. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range, the surroundings of the villages Kyzyl-Mazar, Tashkurgan, Yakkabag-Darya, Khoja-Gur-Gur-Ata (Kashkadarya and Surkhandarya region). Inhabits gypseous slopes and lime-stones, within juniper forests, pistachios and sagebrush-grasslands. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



56. ДРОБОВ ТАНГАЎТИ

Копеечник Дробова / *Hedysarum drobovii* Korotkova

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанда учрайдиган кам-ёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см, ўқ илдизли кўп бошчали, кўп йиллик ўт. Пояси кўп, баъзан 2–3 та, тўпгули пояларининг учида жойлашган. Ўсимликнинг барча қисми ётиқ, кумушранг туклар билан қопланган. Барги мураккаб, узунлиги 7–10 см, баргчалари 2–3 жуфт. Гулбанди барг қўлтигидан чиққан, гуллари пуштиранг, эгилган, тўпгули ёйиқ. Дуккаги деярли бандсиз, узунлиги 6–8 мм, томирлари бўртиб чиққан. Июнда гуллаб, меваси июнь-июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом (Хумсон қишлоқ атрофи) ва Чотқол тизмалари (Бурчмулла ва Янгиқўрғон қишлоқлари атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ҳамда бўз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Санокли даражада учрайди, умумий сони 200 тупдан ошмайди. 2009 йили Бурчмулла қишлоғи атрофида 50 тупдан ошмайдиган кичик популяцияси қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорвоқ сув омбори қурилиши муносабати билан ўсимлик ареали кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [137, 150]

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–60 см с многоглавым стержневым корнем. Стебли многочисленные, реже 2–3, оканчивающиеся цветоносом. Всё растение опушено прижатыми серебристыми волосками. Листья длиной 7–10 см, сложные, с 2–3 парами боковых листочков. Цветоносы пазушные, цветки розовые,

понижающие, собраны в рыхлое соцветие. Боб почти сидячий, длиной 6–8 мм, с резко выступающими жилками. Цветёт в июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение.

Ташкентская область: Угамский хребет – окрестности кишлака Хумсан; Чаткальский хребет – окрестности Бурчмуллы и Янги-Кургана.

Места обитания. Каменисто-щебнистые и глинистые труднодоступные склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается единично, общая численность около 200 экземпляров. В 2009 году отмечена маленькая популяция с 50 особями в окрестности к. Бурчмуллы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Строительные работы и затопление Чарвакского водохранилища.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [137, 150]

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: near the village Khumsan; the Chatkal range: near the villages Burchmulla and Yangi-Kurgan (Tashkent region). Inhabits stony and clayish almost inaccessible slopes in the lower belt of mountains. Single specimens occur sporadically. Total number of plants does not exceed 200 specimens. In 2009, a population of 50 plants was found near the Burchmulla village. Limiting factors: building works and flood of the Charvak reservoir. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



57. ОМОНҚЎТОН ТАНГАЎТИ

Конецчник аманкутанский / *Hedysarum amankutanicum* B. Fedtsch.

Мақоми 0. Бу ўсимлик йўқолиб кетган бўлиши мумкин. Зарафшон тизмасидан атиги бир марта терилган.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–85 см га етадиган кўп йиллик ўт. Барги мураккаб, баргчалари 3–5 жуфт, чўзиқроқ думалоқ. Гулпояси ингичка, узунлиги 20–22 см. Гуллари 25–40 тагача, оч пушти рангли, бандсиз. Дуккаги қандай экани номаълум. Май ойида гуллайди.

Тарқалиши. Самарқанд вилояти: Зарафшон тоғининг Тахтақорача довоида учрайди.

нинг Комаров номидаги Ботаника институти гербарийсида сақланади (Санкт-Петербург). Сўнгги йилларда бу турни топиш учун уюштирилган экспедициялар самарасиз тугади.

Кўпайиши. Маълум эмас.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 0. Возможно, исчезнувший эндемик Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 70–85 см. Листья сложные, 3–5-парные, листочки овальные. Цветоносы тонкие, длиной до 20–22 см. Цветки бледно-розовые, сидячие, в числе 25–40. Бобы не известны. Цветёт в мае.

Распространение. Самаркандская область: Зеравшанский хребет – перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Перевал на высоте 1500 м.

Численность. Единственный экземпляр, по которому описан этот вид, найден в 1913 году на перевале Тахта-Карача и хранится в гербарии Ботанического института РАН в Санкт-Петербурге. Последующие поиски не дали результатов.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [137, 150].

К.Ш. Тожибаев.

Probably disappeared species of the Zeravshan range. It is spread at the Zeravshan range: the Takhta-Karacha pass (Samarkand region). Inhabits the passage (1500 m). The only specimen was found in 1913, on the Takhta-Karacha pass and is kept in the Herbarium of the Botanical Institute of RAS in Saint-Petersburg. Recent collecting missions had no success. Measures of protection: not protected.



Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1500 м бандликкача бўлган доводда ўсган.

Сони. Мазкур тур Тахтақорача довоидан 1913 йили биринчи бор йиғилган ягона нусхаси бўйича тавсиф этилган. Айни вақтда бу нусха Россия Фанлар академияси-



58. ТИЗМА ТАНГАЎТ

Копеечник великолепный / *Hedysarum magnificentum* Kudr.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см га борадиган кўп йиллик ўт. Пояси ғовак, оч яшил рангли. Баргларининг узунлиги 3–8 см, эни 5 см, чўзиқроқ думалоқ шаклдаги учта баргчадан ташкил топган, учигаги баргчаси йирикроқ. Гули хира бинафша ранг, баъзан эса оқиш тусда товланади. Гулпопугининг узунлиги 15 см, ғовак ва момиқ. Дуккаги 1–2 бўғимли. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор (Деҳқонобод, Оқравот, Лангар, Тошкўрғон атрофлари, Шўроб ва Дарбанд оралиғидаги Оқсуроттоғ, Оқсув, Мачай дарёлари водийсида, Қизилқишлоқ ва Қизилмачит қишлоғи орасида) ва Кўхитанг (Тўлгашсой ёқалари, Кампиртепа, Тангидевол довоида) тизмаларида тарқалган, Туркменистон (Кўхитанг-Хўжаифил) да ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Куйи ва ўрта тоғларнинг сийрак ўсимликлар билан қопланган тошли-шағалли, ола тусли ва гипсли ёнбағирларида ўсади.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди. Табиатда кузатилишича, намлик кўп бўлган йиллари яхши униб чиқади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқда ўсишга мослашган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Ҳисор давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [137, 150, 208, 310].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебли светло-зелёные, полые. Листья тройчатые, длиной от 3 до 8 см, шириной 5 см. Листочки овальные, конечные дольки крупные. Цветки грязно-фиолетовые,





реже белые. Кисти рыхлые, длиной 15 см. Бобы одно-двухчленистые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет – окрестности Дехканабада, Акрабата, Лянгара и Ташкургона, горы Аксурат между Шурабом и Дербентом, долины рек Аксу, Мачайдарья, между кишлаками Кызыл-кишлак и Кызыл-Мечеть; Кугитанг – по реке Тулгашсай, Кампиртепе, перевал Танги-Дувал. За пределами Узбекистана: Туркменистан – горы Кугитанг (Ходжа-Филь).

Места обитания. Каменно-щебнистые склоны, пестроцветные и гипсоносные обнажения низкогорий и среднегорий с разреженным растительным покровом.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное. Дружные всходы наблюдаются во влажные годы.

Причины изменения численности и ареала. Растения требовательны к субстрату.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Гиссарском государственных заповедниках.

Источники. [137, 150, 208, 310].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the south-western branches of Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the surroundings of Dekhkanabad, Akrobat, Langar and Tashkurgan, the Aksurat mountains between Shurab and Derbent the valleys of Aksu and Machaidarya rivers, between the villages Kyzylkishlak and Kyzyl-Mechet; the Kughitang: along the Tulgashsay river, the Tangi-Duval passage (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes, gypseous and gypsum-bearing outcrops of low and middle mountains with thinned vegetation. The quantity is unknown. Limiting factors: plants are sensitive to substrate. Measures of protection: protected in the Surkhan and Hissar state nature reserves.



59. ЛАНГАРСИМОН ЧЕЗНЕЯ

Чезнея якорцевидная / *Chesneya tribuloides* Nevski

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бақувват илдизли, ер бағирлаб ўсувчи пояларининг баландлиги 30 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Барглари 2–3 жуфт юмалоқ баргчалардан ташкил топган. Гулдор поялари баргларидан калта, алоҳида гулли. Гул-косачасининг узунлиги 5 мм, майда тишчали, кўнғироқсимон. Гултожи тўқ сариқ, кейинчалик қизғиш тусга киради, дуккаги 11–12 мм. Май–август ойларида гуллаб, июнь–сентябрь ойларида мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг ва Келиф-Шербод тизмаларида учрайди. Туркманистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил қумли тупроқларда ўсади.

Сони. Мамлакатимизда 140 тупи қайд қилинган.

длины. Цветет в мае–августе, плодоносит в июне–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг и Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. Зарегистрировано 140 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас и сокращение площади пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [159, 310].

Ф.О. Хасанов.



Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўп боқилиши ва ола тусли ер майдонларининг қисқариши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 310].

Ф.Ў. Хасанов.


Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетник с мощным корнем и стелющимися стеблями до 30 см выс. Листья 2–4 парные с округлыми листочками. Цветоносы короче листьев, одноцветковые. Чашечка 5 мм длины, колокольчатая с мелкими зубцами. Венчик оранжевый, позже краснеющий, 11–12 мм длины. Бобы яйцевидные, волосистые, 9–10 мм

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang and Kelif-Sherabad ridges (Surkhandarya region). Inhabits red sandstones. 140 plants were registered. Limiting factors: overgrazing and degradation of habitats. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



60. БОЧАНЦЕВ ЭВЕРСМАННИЯСИ

Эверсманния Бочанцева / *Eversmannia botschantzevii* Sarkisova

ке выемчатые, густо опушенные. Цветоносы 7–10 см дл. Венчик фиолетовый, 15–17 мм длины. Боб 3–5 см длины, голый. Цветет в мае–июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: хребт Элликбош (окрестности кишлака

Курганташ).

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 264].

Ф.О. Хасанов.

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Ellikbosh range: nearby the village Kurgantash (Kashkadarya region). Inhabits red sandstones. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing and degradation of habitats. Measures of protection: not protected.



Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Шохлари тукли, 60–70 см ли тиканак бута. Барглари 4–7 жуфт, баргчалари тухумсимон, учи кемтик, тукчалари зич жойлашган. Гулбандлари 7–10 см узунликда. Гултожи сиёҳранг, 15–17 мм. Дуккаги 3–5 см, туксиз. Май–июнь ойларида гуллаб, июлда мевалайди.

Тарқалиши. Қашқадарё вилоятидаги Элликбош тоғ тизмаси (Кўрғонтош қишлоғи атрофи)да учрайди.

Ўсиш шароити. Қизил қумли тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва ола тусли майдонларнинг қисқариши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза этилмайди.

Манбалар. [159, 264].

Ф.Ў. Хасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Колючий кустарник 60–70 см высоты с опушенными ветвями. Листья 4–7 парные, листочки яйцевидные, на верхуш-

61. ОСИЛУВЧАН (ЭГИЛУВЧАН) ҚУЛОНҚУЙРУҚ

Эремоспартон обвислый / *Eremosparton flaccidum* Litv.

Мақоми 2. Қизилқумда тарқалган камёб ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Шоҳлари ингичка туклар билан қопланган, баландлиги 5–6 м гача етадиган сершоҳ бута. Барглари яхши ривожланмаган,

фатида фойдаланилиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Чорва молларининг боқилишини тартибга солиш ва ўсимликдан ўтин сифатида фойдаланишни тақиқлаш лозим.

Манбалар. [1, 272]

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий вид Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой до 5–6 м, сильно ветвистое, с тонкими войлочно-опушенными обвислыми ветвями. Листья недоразвитые, в виде мелких, острых ланцетно-линейных чешуек. Цветы темнофиолетовые, расставленные. Бобы сжатые с боков, яйцевидные, полукруглые, со слегка серповидно изогнутым носиком, опушенные короткими отстоящими волосками. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкум – окрестности колодцев Келле, Янгиказган и Ак-тасды. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. На барханных песках.

Численность. Не установлено. Встречается редко на небольших участках.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Территория усиленно используется под пастбища. На распространение вида отрицательно влияет заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо регулировать выпас и запретить заготовку на топливо.

Источники. [1, 272].

Ф.О. Хасанов.

Rare species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: Kelle, Jangikazgan and Aktasdy (Bukhara and Navoi regions). Inhabits sand dunes. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.




майда, ўткир тиғсимон-чизиқчали тангачалар шаклида. Гуллари тўқ бинафшаранг, бир-биридан муайян ораликда жойлашган. Дуккаги икки томондан қисилган, тухумсимон, тумшукчаси қисман ўроқсимон қайрилган, калта тик тукчалар билан қопланган. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқум – Калла, Янгиказган ва Оқтошли қудуқлари атрофларида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қум барханларида ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг йил давомида муттасил боқилиши ва қулонқуйруқдан ўтин си-



БУҒДОЙДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МЯТЛИКОВЫЕ (ЗЛАКОВЫЕ) – POACEAE (GRAMINEA)

62. ОҚТОҒ ЧАЛОВИ

Ковыль актавский / *Stipa aktauensis* Roshev.

Мақоми 2. Марказий Қизилқумдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–30 см га етадиган, чим ҳосил қилувчи, кўп йиллик ўт. Барглари ингичка, юқоридагилари бироз кенгайиб, тўпгулларини ўраб олган. Тўпгулининг узунлиги 6–10 см, ингичка, кам бошоқли. Бошоғининг ўзаги деярли 13,5 см узунликда, бўғим-бўғим бўлиб қайрилган, бутун юзаси майда патсимон туклар билан қопланган, туклари 4–5 мм узунликда. Апрель–июнь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Марказий Қизилқумдаги пасткам қолдиқ тоғларда тарқалган (Қорақалпоғистон, Навоий ва Бухоро вилоятлари).

Ўсиш шароити. Қуруқ тоғ ёнбағирларида, қояларнинг ёриқларида учрайди.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши туфайли қисқарган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Табиатда ва маданий шароитда бу турнинг биологиясини ўрганиш лозим. Уни назорат остига олиш учун Оқтоғ ва Томдитоғда буюртмахоналар ташкил қилиш тавсия этилади.

Манбалар. [159, 219, 316].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Статус 2. Очень редкий узкий эндемик Центрального Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее плотнокустовое дерновинное травянистое растение, высотой до 25–30 см. Листья узкие, верхние расширенные, обхватывающие соцветие. Соцветие длиной 6–10 см, узкое, малоколосковое. Ось зерновки длиной около 13,5 см, коленчато согнутая, по всей длине перистая, волоски пера длиной 4–5 мм. Цветёт и плодоносит в апреле–июне.

Распространение. В Каракалпакстане, Навоийской и Бухарской областях: останцовые низкогорья Центрального Кызылкума.

Места обитания. Сухие щербнистые склоны, трещины скал.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо изучение биологии в

природе и культуре, организация комплексного заказника в Актау или Тамдытау.

Источники. [159, 219, 316].

Х.Ф. Шомуродов.

Very rare endemic species of the central Kyzylkum. It is spread at the central Kyzylkum (Karakalpakstan, Navoi and Bukhara regions). Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: it is necessary to study biology in nature and in culture, to establish the protected area in the Aktau or Tamdytau.



63. ҚОРАТОҒ ЧАЛОВИ

Ковыль каратавский / *Stipa karataviensis* Roshev.

Мақоми 2. Нурота тоғи ва Шимоли-ғарбий Тянь-Шаннинг ареали қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган зич пояли, чим ҳосил қилиб ўсувчи кўп йиллик ўт. Барглари ингичка, чизиқли, четлари ичкарисига букилган, дағал тукли, юқори қисми бироз кенгайган, тўпгули ингичка, кам бошоқчали бўлиб, гирдини ўраб туради. Бошоғининг узунлиги 8–9 см, бир марта бўғим-бўғим бўлиб букилган, пастки қисми



туксиз, бўғимидан юқориси патсимон тукли, туклари 5–7 мм узунликда. Июнь–июль ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тизмасининг ғарбий қисми, Қоратоғ ва Оқтоғ тизмаларида ўсади. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларидаги тошли, соз тупроқли ва оҳактошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган, кичик-кичик туплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Саноат корхоналари ва бошқа иншоотлар қурилиши ҳамда чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 219, 316].

Н.Ю. Бешко.

Статус 2. Эндемик Нуратинских гор и северо-западных отрогов Тянь-Шаня с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее, плотнокустовое, дерновинное травянистое растение, высотой до 20–30 см. Листья узколинейные, свернутые, щетиновидные, верхние расширенные, обхватывающие соцветие; последнее узкое, малоколосковое. Ость зерновки длиной 8–9 см, один раз коленчатосогнутая, в нижней части голая, выше колена перистоволосистая, волоски пера длиной 5–7 мм. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение. Навоийская область: Хребты Нуратау (западная часть), Каратау и Актау. За пределами Узбекистана: Казахстан (Чу-Илийские горы и Сырдарьинский Каратау).

Места обитания. Каменистые, глинистые и известняковые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разведка и добыча полезных ископаемых, перевыпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 219, 316].

Н.Ю. Бешко.

Endemic species of the Nuratau mountains and the north-western branches of the Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the Nuratau (the western part), the Karatau and Aktau ranges (Navoi region). Inhabits stony, clayish and lime-stony slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: crushed stone and rubble quarrying, mining operations, overgrazing. Measures of protection: not protected.



64. ГНЕЗДИЛЛО ЧАЛОВИ

Ковыль Гнездилло / *Stipa gnezdilloi* Pazij

Мақоми 1. Кўхитанг тизмасининг камёб, петрофит ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Поялари тукланган, кўп йиллик ўт, бўйи 50–60 см. Барглари туксиз. Тилчаси 1–2 мм, киприкчали. Гултўпи 11–17 см узунликда. Бошоқлари деярли бир хил, 3–4 см узун-

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тарқалиш доираси тор бўлган стенобионт ўсимлик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 219, 316].

Х.Ф. Шомуродов.

Статус 1. Редкий петрофильный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Многолетник с опушенными стеблями 50–60 см высоты. Листья голые. Язычок 1–2 мм длины, с ресничками. Метелка узкая 11–17 см длины. Колоски почти равные 3–4 см длины. Нижняя цветковая чешуя 11–13 мм длины, верхняя с 7 линейными волосками. Ость 12–13 см длины, двухколенчатая, волоски 0,2–0,3 мм длины. Цветет и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтный узколокальный эндемик.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [159, 219, 316].

Х.Ф. Шомуродов.

Endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits stony, rocky slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: endemic stenobiontic species. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.


ликда. Пастки гул қобиғи 11–13 мм. Бошоғи 12–13 см узунликда, икки бўғимли, туклари 0,2–0,3 мм. Май–июнь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмаси. Ўзбекистондан ташқари Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта камаридаги тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.



**ГИАЦИНТДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ГИАЦИНТОВЫЕ (ЛИЛЕЙНЫЕ) -
HYACINTHACEAE (LILIACEAE).**

65. ТУРКИСТОН ДИПКАДИЙСИ

Дипкади туркестанский / *Dipcadi turkestanicum* Vved.

Мақоми 0. Жанубий Ўзбекистонга хос жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–20 см га етадиган кўп йиллик пиёзди ўт. Пиёзи кулранг, юпқа қобикли. Илдизолди барглари (2–3 та) чизиқли, новсимон, серэт. Пояси камгулли. Гулбарглари этли, ўроқсимон эгилган, ташқи томони хира кўкимтир, оқ ҳошияли, ички томони оқиш рангли. Меваси кўсакчага ўхшайди. Уруғи ингичка. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Шеробод водийсидаги Ховдак қолдиқ тоғида учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкам қум уюмларида ва уларнинг оралиқларидаги текисликларда ўсади.

Сони. 1975 йили ўсимликдан икки нусха йиғилиб, гербарий қилинган. 1975 йилдан сўнг ўсимликнинг бирорта тупи ҳам топилмаган. Тур йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Аниқланмаган. Эҳтимол, уруғидан кўпайса керак.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ховдак тоғида, айниқса, баҳор мавсумида чорва моллари кўплаб боқилиши натижасида йўқолиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1938 йил САГУ (ҳозирги ЎзМУ) Ботаника боғида ўсимлик пиёзидан экиб ўстирилган. Кейинчалик эса у қуриб қолган, 1975 йили бу турнинг 2 дона пиёзи кавлаб олиниб, ЎзР ФА Ботаника боғида экилганида ҳам қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 223].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 0. Редчайший узкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–20 см. Луковица с серыми бумагообразными оболочками. Прикорневые листья (2–3) линейные, желобчатые, мясистые. Стебель с немногочисленными цветками. Листочки окололистника слегка мясистые, серповидно отогнутые, снаружи грязновато-зелёные, белоокаймленные, внутри беловатые. Плод – коробочка. Семена узкокрылые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: Шерабадская долина – останцовые горы Хаудақтау.

Места обитания. Закрепленные барханные пески, котловины выдувания.

Численность. В 1975 году собрано лишь 2 экземпляра. После 1975 года ни одного растения не найдено, несмотря на неоднократные поиски. Вид видимо исчез.

Размножение. Не установлено: вероятно сеянное.

Причины изменения численности и ареала. Район Хаудақтау интенсивно используется под весенний выпас.

Культивирование. В 1938 году был выращен в Ботаническом саду САГУ (НУУз) из луковиц, затем высох. Две луковицы, собранные в 1975 году, после высадки в Ботаническом саду АН РУз погибли.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 223].

Ф.О. Хасанов.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Sherabad valley; the Khaudaktau remnant mountains (Surkhandarya region). Inhabits fixed sand hills, kettles of blowing. In 1975, only 2 specimens were collected. After 1975, no plants were found, despite special search, none plant was found. Species probably disappeared. Limiting factors: the Khaudaktau region is intensively pastured during spring time. Measures of protection: not protected.



**ГУЛСАФСАРДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ИРИСОВЫЕ –
IRIDACEAE**

66. ИТАЛИЯ ГЛАДИОЛУСИ

Шпажник посевной / *Gladiolus italicus* Mill.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см гача етadиган кўп йиллик ўт. Барглари қиличсимон, узунлиги 18–20 см, ўткир учли, кам томирли. Тўпгули бошоқсимон, 6–8 гулли (баъзан 10 гача). Гулолди барглари наштарсимон, гуллари тик, гулкўрғони пушти рангли. Меваси юмалоқ-тухумсимон кўсак шаклида, узунлиги 1 см гача. Тугунак пиёзчаси тухумсимон, кўнғир рангли қобиқ билан ўралган. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилояти: Ҳисор, Бойсунтоғ ва Кўҳитанг тизмаларида тарқалган. Тожикистон, Туркманистон ва Афғонистонда, шунингдек, Ўрта Ер денгизи мамлакатларида ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Булоқлар атрофида, соз ва юмшоқ тупроқли ёнбағирларда ва тоғ дарёлари бўйларидаги яйловлар ҳамда бутазорларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари гулдасталар учун териb олиниши ва ёш ниҳолларининг оёқости қилиниши туфайли камайиб бормоқда.



Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Китоб давлат қўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [156–159, 335].

О.Т. Тургинов.

Статус 3. Редкий вид Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Листья мечевидные, длиной 18–20 см, остроконечные, с немногими жилками. Соцветие колосовидное, с 6–8, реже до 10 цветками. Прицветные листья ланцетные, цветки прямостоячие, околоцветник розовый. Плод – шаровидно-яйцевидная коробочка длиной до 1 см. Клубнелуковички яйцевидные, с коричневыми обертками. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, Байсунские горы, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Средиземноморье.

Места обитания. Лёссовые и мелкоземистые склоны, ближе к родникам, среди зарослей кустарников, в долинах горных рек.

Численность. Встречается спорадически единичными особями и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Собираются на букеты, всходы вытаптываются скотом в ювенильной стадии.


Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском и Китабском государственных заповедниках.

Источники. [156–159, 335].

О.Т. Тургинов.

Rare species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar, the Baysun, the Kughitang ranges (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits loess and soft slopes, near springs, among shrubwoods, in valleys of mountain rivers. Single specimens and groups sporadically can be found. Limiting factors: picking of flowers, seedlings are trampled down at juvenile stage. Measures of protection: protected in the Surkhan and Kitab state reserves.



67. ВИНКЛЕР ГУЛСАФСАРИ

Ирис Винклера / *Iris winkleri* Regel

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга хос жуда камёб, ареали бўлинган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см гача етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзининг қобиғи қора, қоғозсимон. Илдизолди барглари 4 та, чизикли, эни 1–2 мм, ўроқсимон эгилган. Гули якка, гулқўргони барглари уzunлиги 4 см атрофида, бинафша рангли. Апрель–май ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол ва Курама тизмалари – Ангрен дарёсининг юқори оқимида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги майсазорларда ўсади.

Сони. 15 та жойда ўсиши аниқланган. Умумий сони ҳақида маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг камёблиги сабаби, унинг муайян тупроқ ва иқлим шароитига мослашганлигида бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ареали ва сони аниқлаш лозим.

Манбалар. [159, 170].

И.Г. Левичев

Статус 2. Очень редкий вид Западного Тянь-Шаня с дизъюнктивным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 20 см. Кроющие чешуи луковицы чёрные, бумагообразные. Прикорневые листья в количестве 4, узколинейные, шириной 1–2 мм, серповидные. Цветок одиночный, листочки околоцветника длиной 4 см, фиолетовые. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский и Кураминский хребты – верховья реки Ангрен.

Места обитания. Альпийские лужайки.

Численность. Известно 15 местонахождений. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местообитаниям.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 170].

И.Ф. Левичев

Very rare species of the western Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the Chatkal and Kurama ranges: the upper part of the Akhangaran river basin (Tashkent and Namangan regions). Inhabits alpine slopes. Known from 15 locations. Total number is unknown. Limiting factors: stenobiont ecology. Measures of protection: not protected.



68. АНТИҚА ГУЛСАФСАР

Iris великолепный / *Iris magnifica* (Vved.) F.O. Khass. & Rakhimova

Мақоми 2. Зарафшон тизмасида ўсувчи жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–40 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Илдизи йўғон, урчуқсимон, пиёзи яхши ривожланган. Пояси йўғон, барглари бир-биридан муайян ораликда жойлашган, ўроқсимон, оч яшил рангли, ялтироқ, пастки қисмидаги баргларининг эни 3,5–5 см. Гуллари 3–7 та. Гулқўрғон найининг узунлиги 4,5–5 см, яшил-бинафша рангли, ички гулқўрғони баргчалари оч бинафша рангли, узунлиги 22–27 мм. Чангдонлари оқиш. Уруғи йирик, ғадир-будур, ялтироқ. Апрель–май ойлари гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасининг ғарбий қисми ва Омонкўтон довоида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги майда тупроқли ерларда ва қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Кичик-кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёзларининг йиғиб олиниши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда. Маданий шароитда гуллаб, уруғ бермоқда.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик ўсадиган айрим ҳудудлар Китоб давлат кўриқхонаси томонидан

муҳофазага олинган. Омонкўтон довои ҳудудида ўсимлик муҳофазасини ташкил қилиш ва популяция мониторингини юритиш лозим.

Манбалар. [53, 59, 283, 366].

Н.К. Раҳимова.

Статус 2. Редкий эндемик Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 25–40 см. Корни сильно утолщённые, веретеновидные, луковица хорошо развита. Стебель мощный с расставленными листьями и хорошо заметными междоузлиями. Листья светло-зелёные, блестящие, серповидные, нижние шириной 3,5–5 см. Цветки в количестве 3–7. Трубка околоцветника длиной 4,5–5 см, светло-сиреневые; внутренние листочки околоцветника бледно-сиреневые, длиной 22–27 мм, пыльники беловатые. Семена крупные, морщинистые, блестящие. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкарьинской областях: западная часть Зеравшанского хребта, перевал Аманкутан.

Места обитания. Мелкоземистые площадки и трещины скал в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов на букеты и выкапывание луковиц.

Культивирование. Успешно интродуцируется. В Ботаническом саду АН РУз цветёт и плодоносит.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Китабском государственном заповеднике. Необходима организация охраны растений и мониторинг популяций в районе перевала Аманкутан.

Источники. [53, 59, 283, 366].

Н.К. Раҳимова.

Rare endemic species of the Zeravshan range. It is spread at the western part of the Zeravshan ridge, Amankutan pass (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits clefts of rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: picking of flowers and digging out of bulbs. Measures of protection: some populations protected in the Kitab state nature reserve. The preservation and monitoring of populations at the Amankutan pass is required.



69. ОРХИДЕЯНАМО ГУЛСАФСАР

Ирис орхидный / *Iris orchioides* Carrière

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Илдизи урчқусимон шаклда бироз йўғонлашиб кетган кўп йиллик пиезли ўт. Пиези 1,5–2,5 см қалинликда. Пояси 15–25 см узунликда, бир-биридан муайян ораликда жойлашган барглари оч яшил тусда, ўроқсимон, чети оқ хошияли, бироз дағалроқ. Гуллари 3–5 та, оч сариқ тусда, гуллаш даври ниҳоясида бинафшаранг тус олади. Ташқи гулбаргчалари 3,5–4,5 см, оч-сариқ. Ички гулбаргчалари 1–1,5 см, япроқлари учли. Апрель ойида гуллаб мева беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама (Оҳангарон дарёси ҳавзаси), Чотқол (Одамтош, Сўқок, Чотқол биосфера қўриқхонаси, Чимён), Қоржонтов (Оқтош), Писком (Ойгайинг, Майдонтол ҳавзасида учрайди) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон (Сариоғоч, Жилға, Дарбоза, Сирдарё Қоратоғи) ва Тожикистонда (Мўғултоғ) тарқалган.

Ўсиш шароити. Адири ва тоғ минтақаларининг тошлин-шағалли ёнбағирликларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғи ва бошқа мамлакатларнинг ботаника боғларида ўстириб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [53, 59, 283, 366]

Н.К. Раҳимова.

Статус 3. Редкое, эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Клубнелуковица 1,5–2,5 см толщины. Стебель 15–25 см высоты. Листья светло-зеленые, серповидные, по краю окаймленные, более-менее шероховатые. Цветки в количестве (1) 3–5, бледно-желтые, по отцветании приобретают фиолетовый оттенок. Наружные листочки околоцветника 3,5–4,5 см длины. Внутренние листочки околоцветника 1–1,5 см длины, с острой пластинкой. Цветет и плодоносит в апреле.

Распространение. Ташкентская область: Куряминский (бассейн реки Ахангаран), Чаткальский (Адамташ, Сукок, Чаткальский биосферный заповедник, Чимган), Каржантау (Акташ), Пскемский (Ойгайинг, Майдантал) хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау), Казахстан (Сары-Агач, Джилга, Дарбаза, Сырдаринский Каратау).

Места обитания. Мелкоземные и каменистые

склоны в предгорьях, нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Не установлена

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз, а также в ботанических садах других стран.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [53, 59, 283, 366]

Н.К. Раҳимова.



Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama (the Akhangaran valley), the Chatkal (the Adamtash, the Sukok, the Chimgan, the Chatkal reserve), the Karzhantau (Aktash), the Pskem (Oygaing, Maydantal) ranges. Inhabits stony and fine slopes in the low and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



70. ИППОЛИТ ГУЛСАФСАРИ

Ирис Ипполита / *Iris hippolyti* (Vved.) Kamelin

Мақоми 1. Қизилкум қолдиқ тоғларининг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Тугунак пиёзи 1,5 см йўғонликда. Поясининг баландлиги 10 см. Барглари ўроқсимон, эни 1–1,5 см, силлик, четлари оқ ҳошияли, ўткир учли. Гуллари биттадан, оч бинафшаранг тусда. Ташқи гулбарглари 2 см узунликда, ичкилари 15 мм узунликда, ромб шаклида, учи қиррали. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси апрель–майда пишади.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Кўкчатоғ.

Ўсиш шароити. Сув ҳавзаларини иккига ажратувчи қоятошли жойларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва тугунак пиёзларидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатдан камёб, эндемик тур. Ўсиш жойларида чорва моллари жуда кўп боқилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза этилмайди.

Манбалар. [53, 59, 283, 366].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Статус 1. Редчайший узколокальный эндемик низкогорий Кызылкума.

Краткое описание. Клубнелуковица 1,5 см ширины. Стебель 10 см высоты. Листья серповидные, 1–1,5 см ширины, гладкие, по краю бело окаймленные, острые. Цветки бледно-фиолетовые, по одному. Внешние листочки околоцветника около 2 см длины, внутренние 15 мм длины, ромбовидные, островатые. Цветет в марте–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Навоийская область: Кокчатау.

Места обитания. Скалы в приводораздельной части.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий эндемичный вид. Угрозу представляет чрезмерный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [53, 59, 283, 366]

Х.Ф. Шомуродов.

Extremely rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Navoi region: the Kokchatau relic mountain. Inhabits clefts of rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: Rare endemic species. The habitat is used for pastures. Measures of protection: not protected.



71. СВЕТЛАНА ГУЛСАФСАРИ

Ирис Светланы / *Iris svetlanae* (Vved.) F.O. Khass.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кулранг қопламали тугунак пиёзининг эни 2–2,5 см. Поясининг баландлиги 10–15 см. Барглари ўроқсимон, эни 3–4 см, силлиқ, четлари (атрофи) оқ хошияли, учи ўткир. Гуллари 1–2 та, сариқ тусли. Ташқи гулкўрғон бўлаклари 12–16 см узунликда, ромб шаклида, учи ўткирроқ. Апрель ойида гуллаб, май ойида мева тугади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Зарафшон ва Ҳисор тизмасининг ғарбий қисми – Қашқадарё ҳавзаси (Қизилча, Кўрғонтош, Торқопчиғай ва Ишкент қишлоқлари, Тахтақорача довони атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизил қумтошли тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

островатые. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: западные отроги Зеравшанского и Гиссарского хребтов – бассейн реки Кашкадарья (окрестности кишлаков Тойча, Кызылча, Курганташ, Таркапчиғай и Ишкент, перевал Тахтакарача).

Места обитания. Краснопесчаники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение естественных местообитаний и выпас скота.

Культивирование. Успешно культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [53, 59, 159, 283, 366].

Н.К. Рахимова.



Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг қисқариши ва чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФАнинг Тошкентдаги ботаника боғида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.


Манбалар. [53, 59, 159, 283, 366].

Н.К. Рахимова.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Клубнелуковица 2–2,5 см ширины с серыми чешуями. Стебель 10–15 см высоты. Листья серповидные, 3–4 см ширины, гладкие, по краю белоокаймленные, острые. Цветки желтые 1–2. Внешние листочки околоцветника 4–5 см длины, внутренние 12–16 мм длины, ромбовидные,

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Kashkadarya region: the western branches of the Zeravshan and Hissar ranges, nearby the pass Takhta-Karacha, the villages Ishkent, Tarkapchigay, Kurgantash, Toycha and Kyzylcha. Inhabits red red sandstones. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



72. ВИКТОР ГУЛСАФСАРИ

Iris victoris F.O. Khass. et al.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойга хос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Дағал ва кулранг пўстлоқли тугунак пиёзининг эни 2–2,5 см. Поясининг баландлиги 10–15 см. Барглари ўроқсимон, эни 3–4 см, силлиқ, гирди (атрофи) оқ хошияли, учи ўткир. Гуллари 1–2 та, сариқ тусли. Ташқи гулкўрғон япроқлари 4–5 см, ички гулкўрғон япроқлари эса 12–16 мм узунликда, илгаксимон. Февраль–март ойларида гуллаб, меваси апрелда пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўҳитангда (Келиф-Шеробод тизмаси, Оқтош қишлоғи) тарқалган.

Ўсиш шароити. Бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг қисқариши ва чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [366].

Н.К. Раҳимова.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Клубнелуковица 2–2,5 см ширины с серыми чешуями. Стебель 10–15 см высоты. Листья серповидные, 3–4 см ширины, гладкие, по краю белоокаймленные, острые. Цветки

желтые 1–2. Внешние листочки околоцветника 4–5 см длины, внутренние 12–16 мм длины, булавовидные. Цветет в феврале–марте, плодоносит в апреле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда (пос. Акташ).



Места обитания. Серые глины.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала.

Сокращение естественных местообитаний и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [3, 366].

Н.К. Раҳимова.

Extremely rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Surkhandarya region: the Kelif-Sherabad range (near Aktash). Inhabits grey clays. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.

ЗИРАДОШЛАР (СОЯБОНГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ) – APIACEAE (UMBELLIFERAE)

73. МАЙДА МЕВАЛИ ДОРЕМА

Дорема мелкоплодная / *Dorema microcarpum* Korovin

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шань ва Шимолий Помир-Олойда ўсувчи ўта камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1-2 м гача етадиган кўп йиллик ўт. Барглари кулранг тусда бўлиб, қиррали бутун ҳамда ярмигача кесилган кичик бўлакчаларга тўрт қарра патсимон шаклда бўлинган. Баргининг ҳар икки томони қалта-қалта тукчалар билан қопланган. Соябончалари қисқа шохчаларда биттадан ёки иккитадан бўлиб, кетма-кет ўрнашган. Соябончаларидаги гуллари 10 тадан. Меваси майда-майда, узунлиги 6–7 мм. Май ойида гуллаб, июнда мева беради.



Тарқалиши. Наманган ва Фарғона вилоятлари: Фарбий Тянь-Шанда – Чотқол тизмасида (Кўқонбий ва Тергачи қишлоқлари оралиғи); Олой тизмаси (Шоҳимардон)да тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги соз тупроқли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик майдонларда якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг камайишига ерларнинг қишлоқ хўжалиги мақсадлари учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1961 йилдан бошлаб муваффақиятли равишда ўстириб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [140, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 1–2 м. Листья сероватые, четырёхжды перисто-рассечённые на ланцетовидные цельные и до половины надрезанные дольки, с обеих сторон с коротким опушением. Зонтики расположены на коротких веточках по 1 или по 2 друг над другом. Цветков в зонтичках по 10. Плоды мелкие, длиной 6–7 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Наманганской и Ферганской областях: Западный Тянь-Шань – Чаткальский хребет – по дороге от селений Куканбия и Тергачи (Наманганский вилоят) и Алайский хребет (Шахимардан). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Глинисто-щебнистые склоны в предгорьях.

Численность. Встречается единичными экземплярами на небольших площадях.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение мест естественного произрастания под сельхозугодья, выпас скота.


Культивирование. С 1961г. успешно выращивался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [140, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare endemic species of the Naryn river basin in the western Tien-Shan and northern Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal ridge – along the road from the villages of Kukanbiya and Tergachi (Namangan region) and the Alay ridge (Shakhimardan). Inhabits clay and gravelly slopes in foothills. Single specimens in small areas can be observed. Limiting factors: Destruction of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



74. ДЕНОВ ЖУФТУРУҒИ

Шарозонтичник денауский / *Sphaerosciadium denaense* (Schischk.) Pimenov et Kljuykov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги йўқолиш арафасида турган камёб эндемик реликт ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган поликарп ўсимлик. Пояси тўғри, туксиз, юмалоқ, тўлиқ. Илдизбўғзи ҳамда поя барглари узун ва йўғон бандли, узунлиги 20–30 см, эни 10–20 см, асосида пояни ўраб турувчи 3 см гача кенгайган қулоқсимон қинга эга. Барглар уч марта патсимон қирқилган, туксиз, уларнинг 1-сегментлари узун, 2-си қисқа бандчали, охиргиси ўтроқ. Барг сегментларининг узунлиги 3–7 см, эни 2–4 см, тенгсиз, четлари юмалоқ тишчали, илдизбўғзи ва поянинг қуйи қисмида уларнинг шакли кенг тухумсимон, поянинг ўрта қисмида ланцетсимон. Юқориги барглар ингичка ланцетсимон қингача редукциялашган: марказий соябон остида 2 та йирик, узунлиги 7–9 см, эни 0,6–1 см ва 1 та майда, узунлиги 2–3 см, эни 0,4–0,6 см; ён соябонлар остида 2 та қин бўлиб, узунлиги 4–6 см, эни 0,3–0,4 см. Ўсимликнинг марказий соябончаси катгароқ, 10–15 та худди шундай кичик соябончаларни жамлаган, ён тарафдаги соябонлар 3–11 та. Уруғлаган вақтида нурларининг узунлиги 9–15 см га етади, деярли туксиз. Ўрама барги ва ўрама баргчалари йўқ. Меваси икки бўлакки, юмалоқ. Апрель–майда гуллаб, меваси май–июнь ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасидаги Сангардак дарёси водийси (Нилу қишлоғидан Хондиза дарёсининг қуйи оқимигача) ва Тўпаланг дарёсининг ўрта оқимида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ўсади.

Сони. 2014 йилда Сангардакда 180 тупи топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ўсадиган ерларда кўплаб чорва моллари боқилади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Бу турнинг биологик хусусиятларини ўрганиб чиқиш лозим.

Манбалар. [142, 159].

Д.Т. Хамраева.



Статус 1. Редчайший реликтовый эндемичный вид и род Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Поликарпик высотой около 1 м. Стебель прямой, голый, округлый, полный. Прикорневые и стеблевые листья на длинных и толстых черешках, 20–30 см длины и 10–20 см ширины, при основании расширенных в стеблеобъемлющие мясистые, кожистые влагалища ушковидной формы до 3 см ширины. Листья трижды перисто-рассеченные, голые, их первичные сегменты на длинных, вторичные – на коротких ножках, а конечные сидячие. Сегменты листа 3–7 см длины и 2–4 см ширины, неровные, с округлыми зубцами, форма сегментов прикорневых и нижних стеблевых широкояйцевидная, в средней части ланцетовидная. Верхние листья редуцированы до влагалищ узколанцетной формы: под центральным зонтиком 2 крупных 7–9 см длины, 0,6–1 см ширины, и 1 мелкое - 2–3 см длины, 0,4–0,6 см ширины; под боковыми зонтиками 2 влагалища 4–6 см длины и 0,3–0,4 см ширины. Центральный зонтик более крупный из 10–15 зонтичков, боковые зонтики из 3–11 зонтичков. При плодах с широко раскинутыми, длинными (9–15 см), почти голыми лучами. Обертки и оберточки отсутствуют. Плод двойчатый, шаровидный. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – долина реки Сангардак, от кишлака Нилу до низовьев Хандизы и реки Тупаланг в среднем течении.

Места обитания. Скалы в среднем поясе гор.

Численность. В 2014 году зарегистрировано 180 растений в Сангардаке.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [142, 159].

Д.Т. Хамраева.



Rarest relict endemic species and genus of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar ridge: the Tupalang and Sangardak valleys, from the village Nilyu to Khandiza (Surkhandarya region). Inhabits rocks in the middle mountainous zone. In 2014, 180 plants were registered in the Sangardak valley. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.

75. ПОПОВ ЖҶЯКМЕВАСИ

Бороздоплодник Попова / *Aulacospermum popovii* (Korov.) Kljuykov, Pimenov et V.N.Tikhom.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шандаги ареали бўлинган, камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см, ўқ илдизли кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизининг йўғонлиги 1 см га етади. Илдиз бўғизи эски куриган баргларининг бандлари билан қопланган. Ёпирма барглари патсимон, бўлинган, барг банди ингичка қанотчали, тўқ яшил рангли. Пояси бақувват, жўякли, асосидан бошлаб шохланган. Соябони кўп, 10–18 та шуълали камончаси бор, эни 5–7 см. Тожбарглари сарғиш. Меваси чўзиқ, ён томонидан қисилган. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Ғарбий Тянь-Шанда – Угом, Писком ҳамда Чотқол (ғарбий қисми) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан баландлиги 1600–2000 м бўлган тоғларнинг шимолий ва шимоли-шарқий ёнбағирларидаги оҳактошли қояларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади. 7 та популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик фақатгина бир марта гуллаб, мева бериши (монокарп) ва уруғининг яхши унмаслиги ҳамда алоҳида шароит (оҳактошлар)га мослашганлиги туфайли сони жуда кам.

Маданийлаштирилиши. Қисқа вақт давомида ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [140, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой травянистый монокарпик высотой 40–100 см. Корень толщиной до 1,8 см, корневая шейка одета остатками черешков отмерших листьев. Прикорневые листья перисторассечённые, с узкокрылатыми черешками, темно-зелёные. Стебель крепкий, бороздчатый, от самого основания ветвящийся; верхние ветви мутовчатые. Зонтики многочисленные, с 10–18 лучами, 5–7 см в поперечнике. Лепестки

желтоватые. Плод продолговатый, слегка сжатый с боков. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань – Угамский, Пскемский хребты и западная оконечность Чаткальского хребта). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Трещины и уступы отвесных известняковых скал северной и северо-восточной экспозиции в среднем поясе гор (1600–2000 м).

Численность. Встречается единичными экземплярами на небольших площадях. Известно 7 популяций.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Редкое монокарпическое растение с узким экологическим диапазоном.

Культивирование. Непродолжительное время культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка. Необходимо изучение биологических особенностей.

Источники. [140, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare endemic species of the western Tien-Shan with the reducing area. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Pskem and Chatkal ranges (Tashkent region). Inhabits clefts and ledges of plumb lime-stony rocks of the northern and north-eastern expositions in the middle belt of mountains (1800–2000 m above sea level). Only 7 populations are known. Limiting factors: rare monocarp plant with strict ecology. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



76. ТЯНЬ-ШАНЬ КАМЕЛИНИЯСИ

Камелиния тьяншанская / *Kamelinia tianschanica* F.O. Khass. et I.I. Malzev

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ҳудудига мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см, кўп туғунакли, кўп йиллик поликарп ўсимлик. Илдиз бўғизидоги барглари узун бандли, япроғи уч карра бўлинган, бўлаклари чўзиқроқ-думалоқ, нишлари бор. Поядаги барглари бандли, юқоридагилари қисқариб новга айланган. Соябонидаги 5 та ўрама баргчали камонлари 5–10 та, узунлиги 10 см. Косачаси пардасимон тишли. Гултожи оқ. Меваси юмалоқроқ, узунлиги 4 мм, эни 5 мм. Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Ғарбий Тянь-Шанда – Охангарон дарёси ҳавзасида иккита ўсиш жойи маълум: Дукентсой ва Қорабоғсой.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан баландлиги 1200–1600 м бўлган жойлардагикўчиб тушган тошлар уюми орасида ўсади.

Сони. Дукентсойдаги популяцияси ўрганилган. 80 га майдонда 600 дан ортиқ ҳар хил ёшдаги туплари маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Махсус шароитга мослашган, атрофмуҳитнинг ўзгарувчан шароитларига чидамсиз (стенобионт) ва реликт тур.

Маданийлаштирилиши. 2009 йили ЎЗР ФА Ботаника боғига экилган.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [159, 311].

И.И. Мальцев.

Статус 2. Редкий реликтовый эндемичный вид и род Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое растение с пальчато ветвящимися клубневидными вздутыми корнями. Стебли 30–50 см высоты. Прикорневые листья на удлинённых черешках, пластинки их трижды рассечённые на ланцетно-овальные доли. Стеблевые листья нижние на черешках, верхние редуцированные до влагалищ. Лучей зонтика 5–10 до 10 см длины, с обверточками из 5 листочков. Зубцы чашечки пленчатые. Лепестки белые. Плоды черные, округлые, 4 мм длины, 5 мм ширины. Цветет в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Западный Тянь-Шань – в долине реки Ахангаран известны популяции из Дукентсая и Карабау.

Места обитания. Каменистые осыпи в диапазоне высот 1200–1600 м.

Численность. Изучена популяция в Дукентсае. На площади около 80 га произрастает более 600 особей различного возраста.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтный и реликтовый вид.


Культивирование. Высажен в Ботанический сад АН РУз в 2009 г.

Меры охраны. Находится на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [159, 311].

И.И. Мальцев.

Rare, relic, endemic species and genus of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal range (the surroundings of Yangiabad, the Karabau and Dukantsai rivers). Inhabits stony slopes at 1200–1600 m. Population in the Dukantsay was studied. On the area of 80 hectares, more than 600 plants were registered. Limiting factors: relict and stenobiont taxon. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



77. СУМБУЛ КОВРАК

Ферула мускатная / *Ferula sumbul* (Kauffm.) Hook. f.

Мақоми 3. Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 150 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари 2–5 та, ингичка, юқори қисми сершоҳ. Барглари қаттиқ бўлиб, илдиз бўғизида ўрнашган. Япроғи уч қарра патсимон бўлинган, узунлиги 2–3 см, кенлиги 1–1,5 см, учидаги бўлаклари тухумсимон нишли. Узунлиги 2–3 см, кенлиги 1–1,5 см. Гуллари сариқ рангда. Косача барглари тишчали. Меваси майда, узунлиги 7 мм, эни 4 мм. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Нурота, Туркистон, Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда, бутазорларда ўсади.

Сони. Ниҳоятда камёб, тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан муттасил ва нооқилона тарзда атир-упа саноати учун ҳамда доривор хом ашё сифатида йиғиб олинishi ва уруғининг турли ҳашаротлар томонидан зарарланиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Ўзбекистон Миллий университетининг Ботаника боғида бундан бир неча йиллар олдин ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Нурота, Зомин, Китоб, Ҳисор давлат қўриқхоналарида, Зомин миллий табиат боғида муҳофаза этилади.

Манбалар. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 3. Редкий эндемик Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 150 см. Стебли в количестве 2–5, тонкие, в верхней части ветвящиеся. Листья жёсткие, в прикорневой розетке. Пластинка трижды перисто-рассечённая, конечные дольки яйцевидные, ланцетные или продолговатые, 2–3 см длиной, 1–1,5 см шириной, зубчатые. Цветки жёлтые. Зубцы чашечки заметные. Плоды мелкие, длиной 7 мм и шириной 4 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Хребты Нуратау, Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор, среди зарослей кустарников.

Численность. Крайне редок, встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивная и нерациональная заготовка местным населением в качестве лекарственного и парфюмерного сырья. Семена сильно повреждаются насекомыми-вредителями.


Культивирование. Ранее успешно культивировался в Ботаническом саду Национального Университета Узбекистана.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском, Зааминском, Китабском, Нуратинском государственных заповедниках и Зааминском национальном парке.

Источники. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau, the Turkestan, the Zeravshan, the Hissar ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi, Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains, among shrubs. The quantity is unknown. Limiting factors: stocking by local population as medicinal plant, mentioned by Avicenna. Most of seeds are damaged by insects. Measures of protection: protected in the Hissar, the Zaamin, the Nuratau, the Kitab state reserves and the Zaamin national park.



78. ТУГАНАКЛИ КОВРАК

Ферула клубненосная / *Ferula tuberifera* Korovin

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жануби-ғарбида ўсадиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизи қисқа, бир нечта бутоқларга бўлинган, ён томилари тугунакли. Поясининг бўйи 50–60 см, оч яшил рангда, бўғим оралиқлари пуфаксимон шишган, ўрта қисмидан шохланган. Поянинг пастки қисмидаги шохлари кетма-кет, юқоридагилари эса ҳалқа шаклида ўрнашган. Илдиз бўғизидаги барглари ромб шаклида, банди қисқа, уч карра патсимон бўлинган, тишчали, 1,5–2 см узунликда. Соябони ҳар хил: ўрта-сидагилари деярли бандсиз, 7–13 шуълала, диаметри 8 см атрофида, ён томондагилари 2–3 тадан бирлашган. Соябончалари 10–15 гулли. Тожбарги сариқ рангли, чўзиқ-думалоқ шаклда. Мевалари чўзиқроқ-думалоқ, оқиш-сарик рангли. Май ойида гуллаб, июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида (Кўхитанг, Чўлбайир) тарқалган.

Ўсиш шароити. Бойсунтоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ва тошли-шағалли ерларда, арчазорларда тарқалган.

Сони. Кўпинча якка-якка ҳолда, баъзан тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғи етилмаган пайтда ўсимликни чорва молларининг барча турлари яхши истеъмол қилади. Шунингдек, ем-хашак сифатида ўриб олинади.

Маданийлаштирилиши. Экиб ўстирилмайди.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [141, 159, 237].

О.Т. Тургинов.

Статус 3. Редкий вид Юго-западного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое растение. Корень короткий, разветвленный, с клубнями на боковых корнях. Стебель бледно-зелёный, высотой 50–60 см, в узлах вздутый, от середины ветвящийся. Нижние ветви очередные, верхние-мутовчатые. Прикорневые листья в очертании ромбические, трижды перисторассеченные; конечные дольки обратной-цевидные, 1,5–2 см длиной, зубчатые. Зонтики разные: центральные почти сидячие, 7–13-лучевые, около 8 см в диаметре, боковые собраны по 2–3. Зонтики 10–15-цветковые. Лепестки жёлтые, продолговато-овальные. Плоды овальные, бледно-жёлтые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги

Гиссарского хребта – Кугитанг, Чульбаир. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и щебнисто-галечниковые субстраты в среднем поясе гор, в арчовниках.

Численность. Часто встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас (в стадии незрелых плодов хорошо поедается всеми видами животных) и сенокосы.

Культивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [141, 159, 237].

О.Т. Тургинов.

Rare and endemic species of the south-western Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Kughitang, the Chulbair (Surkhandarya region). Inhabits stony and pebble substrates in the middle belt of mountains, in juniper stands. The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



79. ҚИЗИЛҚУМ КОВРАГИ

Ферула кызылкумская / *Ferula kyzylkumica* Kogovin

Мақоми 3. Қизилқумдаги қолдиқ тоғларда ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган поликарп ўт. Пояси ўрта қисмидан рўваксимон шохланади, кейинчалик қизил тусга киради. Шохлари кетма-кет жойлашган. Илдиз бўғизидаги барглари қисқа ва йўғон бандли, кенг новли. Япроғи кенг ромбсимои, учтадан бўлакка ажралган, бўлаклари, ўз навбатида, уч карра пат шаклида бўлинган, учидаги паллчалари тухумсимои, 5–10 мм узунликда. Поядаги барглари япроқлари жуда қисқа. Соябонлари ўрама баргчаларсиз, 7–10 гулли. Косача барглари тишсиз, тожбарглари сариқ рангда. Меваси чўзиқ-думалоқ шаклда. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тоғларда (Томдитоғ, Белтоғ, Сангрунтоғ, Бўкантоғ, Қулжуктоғлар) ва ола тусли тупроқларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирларда, ола тусли тупроқларда ва юзага чиқиб қолган туб жинсларда тарқалган.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши сабабли сони камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Қизилқум чўл станциясининг тажриба майдонида синаб кўрилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 3. Редкий эндемик останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Поликарпическое растение высотой 50 см. Стебель в средней части ветвящийся в неширокую метёлку, позднее краснеющий. Ветки очередные.

Листья прикорневые, на коротких и толстых черешках, расширенных во влагалище.

Пластинка листа в очертании широкоромбическая, тройчаторассечённая, конечные доли яйцевидные, 5–10 мм длиной, перистонадрезанные.

Стеблевые листья с сильно уменьшенной пластинкой. Зонтики без обёрточек

7–10-цветковые. Чашечка без зубцов, лепестки желтые. Плоды продолговато-овальные. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: останцовые горы и пестроцветы Кызылкумов – Тамдытау, Бельтау, Сангрунтау, Букантау, Кульжуктау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, пестроцветы и выходы коренных пород.

Численность. Встречается единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Испытывается в коллекционном питомнике Кызылкумской станции АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare and endemic species of remnant mountains of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Tamdytau, the Beltau, the Sengruntau, the Bukantau, the Kuldjuktai (Bukhara and Navoi regions). Inhabits stony and pebble slopes, outcrops of variegated beds. Single specimens can be found. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: not protected.



80. ПРАТОВ КОВРАГИ

Ферула Пратова / *Ferula pratovii* F.O. Khass. et I.I. Malzev

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик поликарп ўсимлик, бўйи 30–60 см. Пояси туксиз. Баргларининг аксарият қисми илдиз бўғизидида жойлашган, уч карра бўлинган, оқ тукли, ён томонидаги паллалари тухумсимон – чўзиқ, 3–5 бўлакли. Соябони 4–8 шуълали, узунлиги 2–3 см. Соябонининг шуъласи 8–10 та. Ўрама баргли ва ўрама баргчасиз. Косачасининг тишлари тўмтоқроқ. Гултожи оқиш, овалсимон. Стилоподи ясси. Тугунча ва меваси туксиз. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида тарқалган (Вуари қишлоғи атрофида).

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2400 м баландликдаги гипсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 60 туп ўсимликдан иборат 2 та популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг бузилиши ва кўплаб мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 308].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое растение 30–60 см длиной. Стебли голые. Листья все трижды перисто-рассеченные, с вздутым черешком, грубо волосистые, латеральные доли овальные, 3–5 отдельные. Зонтик с 4–8 лучами, 2–3 см длины, зонтики 8–10 лучевые. Прицветников и прицветничков нет. Чашечка тупозубчатая. Лепестки белые, овальные. Стилоподии сплюснутые. Завязь и плоды голые. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта (окрестности кишлака Вуары).

Места обитания. Гипсированные склоны на высоте 2400 м.

Численность. Известны 2 популяции (60 растений).

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 308].

Ф.О. Хасанов.

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western part of the Hissar range: nearby the village Vuary (Kashkadarya region). Inhabits gypsaceous slopes (2400 m.s.l.). 2 populations are known (60 plants). Measures of protection: not protected.



81. ФЕДЧЕНКО КОВРАГИ

Ферула федченковская / *Ferula fedtschenkoana* Koso-Pol.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Мутлақ туксиз кўп йиллик поликарп ўт ўсимлик. Пояси якка ёки бир нечта бутуқчадан иборат ингичка, бинафшаранг, юқори қисми кўпинча қалқонсимон шохланган. Шохлари кетма-кет, юқоридагилари супротив. Баргланинг ранги оч кўк, юмшоқ, туксиз, беш қарра бўлинган (кесилган), учидаги паллалари торайиб кетган, 10–20 мм узунликда. Соябони 4–8 шуълали. Соябончасининг шуъласи 8–10 та. Косачаси калта, тишчали. Гултожи сариқ, овалсимон, 1,4 мм узунликда. Меваси узунчоқ-овалсимон, туксиз, 6 мм узунликда, эни 3,5 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё ва Жиззах вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Қизилдарёнинг юқори қисми), Туркистон ва Молғузар тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги арчазор худуднинг шимолий ёнбағирликларидаги майда тупроқли-шағалли жойларда ўсади.

Сони. Саноқли даражада учрайди, 10 x 10 м² майдонга 2–3 та ўсимлик тўғри келади.

Кўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Зомин давлат қўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое совершенно голое травянистое растение. Корень веретеновидный. Стебель одиночный или их несколько, тонкий, нередко фиолетовый, в верхней части щитковидно ветвящийся; ветви очередные, верхние супротивные. Листья сизо-ватые, мягкие, голые, 5-перисто рассеченные;

конечные доли узкие, 10–20 мм длиной. Зонтики конечные 4–8 лучевые. Зонтики 8–10-цветковые. Чашечка коротко зубчатая. Лепестки желтые, овальные, 1,4 мм длины. Плоды продолговато овальные, сжатые со спинки, голые, 6 мм длиной, 3,5 мм шириной. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский (верховья Кызылдарьи), Туркестанский и Мальгузарский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые северные склоны в арчовом поясе.

Численность. Встречается одиночно, по 2–3 растений на 10 x 10 м².

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Не культивировался.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Зааминском заповедниках.

Источники. [141, 159, 237].
М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Jizzakh, Kashkadarya and Surkhandarya regions: the Hissar (the Kyzyl-darya river basin), the Turkestan and Malguzar ranges. Inhabits the rubbly northern slopes in juniper belt. Single or by 2-3 plants at 10m x 10m plots can be observed. Measures of protection: protected in the Hissar and Zaamin state reserves.



82. КОРЖИНСКИЙ КОВРАГИ

Ферула Коржинского / *Ferula korshinskyi* Korovin

Мақоми 2. Шимолий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, пояси туксиз поликарп ўсимлик. Илдизида шарсимон йўғонлашган жойлари бор. Пояси, одатда, бир нечта ингичка новдадан иборат, новдаларининг ранги кўкимтир, узунлиги 2 м гача етади, япроқларсиз, юқорига қараб икки ёки уч тармоққа ажралиб кетган. Барглари уч-тўрт карра учга бўлинган. Учидаги бўлаклари наштарсимон-чўзиқ ёки узунчоқ, узунлиги 1,5–6 см, кенглиги 6–15 мм, четлари бир текис, бус-бутун. Учидаги соябончалари 5–11 шуълали бўлиб, диаметри 6–8 см. Косачаси калта тишчалардан иборат. Баргчалари майда, чўзиқроқ, сариқ тусда. Мевалари кўкимтир, пастки тарафи кичрайиб кетган, чўзиқроқ шаклда, узунлиги 6–7 мм. Июль ойида гуллаб, августда мева беради.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмаси (Шоҳимардон). Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида тошлоқларда, гипсли туб жинсларда ва бошқа тоғ жинсларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларидаги ерларнинг тинимсиз ўзлаштирилиши ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [141, 159, 237].



М.Г. Пименов,
Е. Ключиков.

зубцами. Лепестки желтые, мелкие, овальные. Плоды сизые, сжатые со спинки, овальные, 6–7 мм длины. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет (долина реки Шохимардан). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. Лессовые, мелкоземисто-каменистые склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение предгорных ландшафтов, чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов,
Е. Ключиков.

Статус 2. Редкое растение Северного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое совершенно голое травянистое растение с вертикальным реповидно вздутым корнем. Стеблей обычно несколько; они сизые, тонкие, до 2 м высоты, безлистные, вверху дважды или трижды ветвящиеся. Листья трижды-четырежды тройчаторассеченные; конечные доли ланцетно-овальные или продолговатые, 1,5–6 см длины, 6–15 мм ширины, цельнокрайние. Зонтики конечные 5–11 лучевые, 6–8 см в диаметре. Чашечка с короткими

Rare species of the northern Pamir-Alay. It is spread at the Ferghana region: the Alay range, Shashimardan. Inhabits loess, clayey-stony slopes in lower mountain belt. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of habitats, economic activity in foothills, overgrazing. Measures of protection: not protected.



33. ЎРИНБОСАР КОВРАК

Ферула замещающая / *Ferula vicaria* Korovin

Мақоми 1. Фарғона водийсининг жанубий адирларида ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлик. Илдизида шарсимон йўғонлашган жойлари бор. Пояси, бир нечта бўлиб, кўкимтир рангда, ингичка, 2 м гача баландликда, қалқонсимон шохланган. Барглари калта, мустақкам тукли, 3–4 карра патсимон қирқилган, учидаги бўлаклари ингичка-узунчоқ, 0,5–2 см узунликда; поя барглари найсимон, ёпирма баргларгача редуцияланган. Соябони 2–5 шуълали; соябончалари 7–8 гулли. Косачаси тишчасиз. Гултожибарглари деяри ясси, кенг овалсимон, оч яшил-кўнғир. Меваси тескари тухумсимон, 4,5–6 мм узунликда. Июнь-июль ойларида гуллаб, мева ҳосил қилади.

Тарқалиши. Туркистон ва Олой тизмалари этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, тошлоқларда, гипсли туб жинсларда ва бошқа тоғ жинсларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларидаги ерларнинг тинимсиз ўзлаштирилиши ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов,
Е. Ключков.

Статус 2. Редкий эндемик южных предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое травянистое растение. Корни с шаровидными утолщениями. Стебель одиночный, тонкий, 20–60 см высоты, вверху щитковидноветвящийся. Листья слегка шероховатые от коротких жестких волосков, 3–4 перисто рассеченные; конечные доли узколинейные, 0,5–2 см длины; стеблевые

листья редуцированы до трубчатых влагалищ. Зонтики с 2–5 лучами; зонтики 7–8-цветковые. Чашечка без зубцов. Лепестки почти плоские, широко овальные, оливково-бурые. Плоды обратно-яйцевидные, сжатые со спинки, 4,5–6 мм длины. Цветет и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Предгорья Туркестанского и Алайского хребтов.

Места обитания. Щебнистые и пестроцветные склоны, по сухим руслам и по галечникам.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение предгорных ландшафтов, чрезмерный выпас скота.


Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [141, 159, 237].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare endemic species of the southern foothills of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana region: the foothills of the Turkestan and Alay ranges. Inhabits rubbly and gypseous slopes, dry stream beds, pebbles, at 900-1500 m s l. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing under antropogenic pressure. Measures of protection: not protected.



84. ЕЛЕНА КОВРАГИ

Ферула Елены / *Ferula helenae* Rakhm. et Melibaev

Мақоми 2. Нурота олди қолдиқ тоғларида (Балиқлитоғ, Эгарбелистоғ) ўсадиган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизи цилиндрсимон, илдиз бўғзи қуриган барглarning кўп сонли толалари билан қопланган. Поясининг баландлиги 60–70 см, мустақкам, ингичка, юқоридан шохланувчи, бўғинидан бир нечта шох ҳосил қилади. Барглари оқиш-кўкимтир қалин дағал туклар билан қопланган: тўпбарглари калта, мустақкам, қалин бандли, япроқлари кенг ромбсимон, мураккаб патсимон. Поядаги барглarning япроқлари жуда қисқа. Соябони икки хил. Меваси кучли ҳидга эга. Май ойида гуллаб, июнда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота олди қолдиқ тоғлари (Балиқлитоғ, Эгарбелистоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли ёнбағирларда тарқалган.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ўсади. Бир нечта жойларда ўсиши аниқланган.

Кўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ўсиб турган жойларининг бузилиши ва кўплаб мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди. Манбалар. [141, 159, 237].

А.Р. Батошев.

Статус 2. Редкий эндемик останцовых гор при Нуратау.

Краткое описание. Многолетний монокарпик. Корень цилиндрический, корневая шейка покрыта многочисленными волокнами отмерших листьев. Стебель 60–70 см высоты. Крепкий, тонкий, вверху ветвящийся, по несколько ветвей в узле. Листья сероватые от густо покрывающих жестких волосков: прикорневые – на коротких, крепких и толстых черешках, пластинка их широко-ромбовидная, тройчатая, многократно перисто-рассеченная на овальные перисто-надрезные, по краям курчавые, дольки 2–3 мм длины. Стеблевые листья с сильно уменьшенной пластинкой, верхние же сведены до яйцевидных, вздутых, стеблеобъемлющих влагалищ. Зонтики двоякные. Плоды с сильным скипидарным запахом. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Джизакская область: Принуратинские останцовые горы (Балыкклитау, Эгарбелистаг).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Встречается единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.


Источники. [141, 159, 237].

А.Р. Батошев.

Rare and endemic species of the Prinuratau. It is spread at the remnant mountains near the Nuratau range the Balykklitau and Egarbelistag (Jizzakh region). Inhabits stony-rubbly mountain belt. Single specimens can be found. Limiting factors: destruction of habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



85. ТОЖИК КОВРАГИ

Ферула таджиков / *Ferula tadshikorum* Pimenov

Мақоми 3. Помир-Олой тизмасидаги сон жиҳатдан қисқариб бораётган, ареали бўлинган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўсимлик бўлиб, бўйи 1,5–1,8 м, саримсоққа хос кучли ҳидга эга. Илдизи йўғон, вертикал илдиз-пояли. Оддий каудексли. Пояси якка, барглари юмшоқ, нозик, тезда сўлиб қолади, юқори қисми деярли туксиз. Тўпгули – кенг, шингилли. Соябонлари кўп, барчаси мева тугади. Соябончалари 10–15 гулли, ўрама баргчасиз. Гулбандлари қисқа, 0,5–0,8 см. Косачабарглари ташчалари майда, уч қиррали. Гултожибарглари сариқ, 2–2,5 см узунликда, чўзинчоқ-эллипсимон. Меваси 1,9–2,7 см узунликда, эни эса 0,9–1,2 см, тескари тухумсимон, чўзинчоқ-тухумсимон, овалсимон ёки эллипсимон, орқа томондан сиқилган, ясси, туксиз. Апрель-май ойларида гуллаб, июнь-июль ойларида мевалайди.

Тарқалиши. Жанубий Тожикистон, Ўрта Осиё (Жануби-Ғарбий Помир-Олой), Жанубий Ўзбекистон эндемиги (Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки кичик-кичик популяцияларни ташкил қилган ҳолда ўсади. Умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Сўнгги 20 йил мобайнида табиатдан фойдаланувчилар томонидан ўсимлик ширасининг режасиз ва назоратсиз йиғиб олиниши натижасида табиий захиралари ва популяцияларининг ўсиш майдонлари кескин қисқариши кузатилмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника институти мутахассислари томонидан хўжалик шартномалари асосида Боботоғ ўрмон хўжалиги ҳудудларида сунъий плантациялари ташкил этилган.

Муҳофаза чоралари. Табиатда мавжуд популяциялари қатъий назоратга олиниши керак. Мазкур популяциялардан ўсимлик сунъий план-

тацияларини ташкил қилишда фойдаланиш лозим.

Манбалар [1, 2].


А.В. Маҳмудов

Статус 3. Эндемик Памиро-Алая с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое растение, 1,5–1,8 м высотой, с сильно выраженным чесночным запахом. Корень толстый с вертикальным корневищем. Каудекс простой. Стебли одиночные. Листья мягкие, быстроувядающие, сверху почти голые, снизу серовато опушенные. Соцветие – широкая метелка. Зонтички 10–15-цветковые, без оберточек. Цветоножки короткие, 0,5–0,8 см. Лепестки желтые, 2–2,5 мм длины, продолговато-эллиптические, тупые, с загнутой внутрь верхушкой. Подстолбия чашевидные. Плоды 1,9–2,7 см длины, 0,9–1,2 см ширины, обратнойцевидные, продолговато-яйцевидные, овальные или эллиптические, со спинки сжатые, плоские, голые. Цветет в апреле-мае; плодоносит в июне-июле.

Распространение. Южный Таджикистан, Южный Узбекистан (Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области).

Место обитания. Склоны в нижнем и среднем поясах гор.



Численность. В естественных условиях встречаются одиночно или в виде небольших популяций. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Вследствие усиленной и бесконтрольной эксплуатации растений ради камеди (смолы) в течение последних 20 лет, наблюдается сильное сокращение естественных ресурсов и площади популяций.

Культивирование. Институтом Ботаники АН РУз на основе хозяйственных договоров созданы искусственные плантации в территории Бабатагского лесхоза.

Меры охраны. Необходимы регулярный и жесткий контроль за естественными популяциями, создание искусственных плантаций путем подсева семян в природные популяции.

Источники. [1, 2].

А.В. Махмудов

Endemic of Southern Uzbekistan. It grows in the Kashkadarya and Surkhandarya regions on slopes or rocks in the lower and middle mountain belts. Populations drastically decreased as a result of overharvesting. Protection measures: not protected.



86. ФЕДЧЕНКО ПИЛДИРОҚМЕВАСИ

Омежник федченковский / *Oenanthe fedtschenkoana* Koso-Pol.

Мақоми 0. Фарғона водийсига хос ниҳоятда камёб (балки йўқолган), эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган (эҳтимол монокарп) кўп йиллик ўт. Пояси битта, юмалок, чуқурроқ чизикли, кам шохли. Барглари қисқа бандли, асоси кенг – новсимон, икки карра патсимон қирқилган, бўлаклари чўзиқ-қалами. Соябони 8–14 нурли, соябончалари кўп гулли, ўрама баргчалари 5–10 та, наштарсимон. Мевалари тухумсимон, узунлиги 2 мм. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь ойида етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Қўқон шаҳри атрофларида учраган. Ушбу ўсимлик Москва шаҳрида (MW) сақланмоқда деб келинган гербарий типиде асосида тавсирланган. Бироқ MW (Губанов, 2002) ва МНА да бундай ўсимлик йўқ. Қўқон шаҳри атрофларида олиб борилган бир неча изланишлар натижа бермаган. Ўрта Осиёга мансуб гербарийларда ҳам ўсимликнинг қайта терилган нусхалари йўқ. Эҳтимол, мелиорация ва сугориш тизимларининг бир неча бор ўзгариши оқибатида ўсимликнинг ўсиш жойлари ўзлаштирилган бўлиши мумкин. Ўсимлик бир мартагина терилган, холос. Шунда ҳам Қирғизистоннинг Қўқон шаҳрига яқин жойларидан терилган бўлиши ёки ўсимликка оид маълумотларда чалкашликка йўл қўйилган бўлиши эҳтимолдан йироқ эмас.

Ўсиш шароити. Ботқоқланган ерларда ва эҳтимол, ариқ бўйларида ҳам ўсган.

Сони. Қўқон шаҳри атрофидан бир марта йиғилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ҳақида маълумотлар етарли эмас.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсимликнинг табиатда борлигини исботлаш зарур.

Манбалар. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 0. Чрезвычайно редкий (возможно, исчезнувший) эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее, травянистое (возможно, монокарпическое) растение высотой до 50 см. Стебель одиночный, округлый, сильнобороздчато-гранистый, слабоветвистый. Листья на коротких черешках, при основании расширенных во влагалище, дважды перисторассечённые на продолговато-линейные доли. Зонтики 8–14-лучевые, зонтики многоцветковые, обёртки из 5–10 ланцетовидных листочков. Плоды яйцевидные, длиной около 2 мм. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: в окрестностях г. Коканд. Все указания основаны на единственном местонахождении в окрестностей г. Коканда, причем тип будто бы находится в Москве (MW). Однако в гербариях MW (см. Губанов, 2002) и МНА такого растения нет. Неоднократные поиски в болотах в окр. Коканда никаких результатов не дали. Нет повторных сборов и ни в одном из среднеазиатских гербариев. Вполне возможно, что местонахождение исчезло в процессе многократного изменения поливной сети и мелиорации. Не исключено также, что единственный сбор этого м.б. заносного растения был сделан на территории Кыргызстана близ Коканда или даже произошла путаница этикеток.

Места обитания. Заболоченные низины, возможно, по берегам арыков.

Численность. Известен по единственному сбору из окрестностей города Коканда.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведения о виде крайне недостаточны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Extremely rare and probably disappeared endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the surroundings of Kokand (Ferghana region). All information was based on the only locality nearby Kokand town; and, the type of the mentioned specimen is stored in Moscow (MW). However, in MW (Gubanov, 2002) and MNA these species were not found. There is none specimen in all herbaria of Central Asia. Several collecting missions in surroundings of Kokand were unsuccessful. Probably, this locality disappeared during enlarged melioration

system in the 20 century. Probably, the plant was collected in Kyrgyzstan or determination label was changed. Inhabits swampy valleys, along channels. The species known by single collection nearby Kokand. Limiting factors: information about it is incomplete. Measures of protection: not protected.



87. ЧИЗИҚПОЯЛИ ПИЛДИРОҚМЕВА

Омежник разноплодный / *Oenanthe heterococca* Korovin

Мақоми О. Қашқадарё воҳасига мансуб, йўқолиш арафасида турган (балки йўқолган), эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси ғовак, асосидан шохланган, юмалоқ, усти чизиқли. Поянинг пастидаги барглари бандли, юқоридагилари бандсиз, ингичка новли, уч карра патсимон қирқилган. Бўлаклари қалами, ўткир учли, узунлиги 7–8 мм. Соябони узун бандли, 10 та шуълалари. Соябончалари кўп гулли. Ўрама баргчалари 7–9 та, ҳар хил узунликда, наштарсимон. Меваси пилдироқсимон, узунлиги 3 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Самарқанд вилоятлари: Шахрисабз шаҳри атрофидаги тоғ олди тексликлариди ҳамда Зарафшон тизмасида Тераскойда тарқалган. Биз Тошкентдаги гербарий намуналарини бошқа *Oenanthe* турлари билан солиштирдик ва у *O. silaifolia* M. Bieb. турига яқинлиги, аниқроғи, ундан барглари билан ҳам, илдизи билан ҳам фарқланмайди, деган хулосага келдик. Е.П. Коровиннинг "heterococca" эпитети меваларни

ўрганишда орқали ўз тасдиғини топмайди. Улар эса *O. silaifolia* меваларига ўхшаш. *O. silaifolia* ўхшаш экологияга эга, Эрон, Кавказдан то Европа ва Шимолий Африкагача кенг тарқалган. Шахрисабзга ўсимликнинг уруғи гуруч билан бирга аралашиб келиб қолган бўлиши мумкин.

Ўсиш шароити. Суғориладиган далалар орасида, сув ҳавзаларининг атрофларида ўсади.

Сони. 2016 йилда мазкур турнинг популяцияси (50 туп атрофида) Зарафшон тизмасида Тераскойнинг юқори қисмида, ботқоқлашган тоғ ўтлоқларида топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган бўлса керак, деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур ҳақида маълумотлар жуда кам.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [147, 348].



М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус О. Чрезвычайно редкий (возможно, исчезнувший) эндемик бассейна реки Кашкадарья.

Краткое описание. Травянистое многолетнее растение высотой до 50 см. Стебель полый, от основания ветвистый, округлый, бороздчатый. Листья у основания черешковые, выше – сидячие, на узком влагалище, трижды перисторассечённые на линейные острые доли длиной до 7–8 мм. Зонтики на длинных цветоносах, 10 лечевые. Зонтики многоцветковые. Обёртки из 7–9 ланцетовидных листочков разной длины. Плоды кубаревидные, длиной 3 мм. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская и Самаркандская области: подгорная равнина близ города Шахрисабз, Зеравшанский хребет (Тераскай). Мы сравнили гербарий (TASH) с другими видами *Oenanthe* и пришли к выводу, что он очень близок к *O. silaifolia* M. Bieb., а точнее практически неотличим ни по листьям, ни по корням с продолговатыми вздутыми. Видовой эпитет Коровина "heterococca" не находит

подтверждения при изучении плодов: мерикарпии у них одинаковые, как и у *O. silaifolia*.

O. silaifolia имеет сходную экологию и широко распространение от Ирана и Кавказа до Европы и Северной Африки. В Шахрисабз он мог быть занесен, например, с семенами риса. Не исключено, что сюда же может быть отнесен и *O. fedtschenkoana*, материал по которому не найден до сих пор, так как Козо-Полянский никакой гетеромери-

карпии не описывает.

Места обитания. Заболоченные участки среди полевых полей, по берегам водоёмов, сазы.

Численность. В 2016 году популяция вида (около 50 растений) была найдена на Зеравшанском хребте в верховьях Тераскай, на сазе.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведения о виде крайне недостаточны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [147, 348].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Extremely rare and probably disappeared endemic species of epy Kashkadarya valley. It is spread at the submontane plain near Shakhrisabz and on the Zeravshan range (Kashkadarya and Samar-kand regions). We compared herbarium material from TASH with other Oenanthe species and it was clear that it is very closed with O. silaifolia M. Bieb., there was no any difference in leaves and inflated roots. Korovin's epithet "heterococca" have no base, because mericarps of O. silaifolia are equal. This species have the same ecology and grows naturally from Iran and the Caucasus up to Europe and the northern Africa. Probably, it was introduced here together with rice crops or so. Probably, O. fedtschenkoana, could be the same species as well, because Kozo-Poljanskiy did not mentioned heterocarpic character. Inhabits swampy plots among fields requiring irrigation, on reservoir banks. A population of about 50 plants has been found in 2016 on the Zeravshan range. Measures of protection: not protected.

88. ШАШИРСИМОН ПУФАКЎҒИМ

Комаровия неровносемянная / *Komarovia anisoperma* Korovin

Мақоми 1. Зарафшон тизмасининг тармоқларида тарқалган камёб, реликт ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2–3 м гача етадиган, йўғонлашган илдизтуғунакли, кўп йиллик ўт. Пояси ингичка, бўғимлари бироз пуфаксимон шишган, юқори қисмидан шохланган. Ёпирма баргларининг узунлиги 70 см га етади, кўп марта патсимон бўлақларга ажралган. Япроғининг учдаги бўлақлари наштарсимон, узунлиги 4–5 см, эни 10 мм гача. Соябонлари 2–7 шуълали, соябончалари юмалоқ, ўрама барг ва баргчалари йўқ. Тожбарглари сариқ, узунлиги 10 мм. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасининг ғарбий тармоқларида ва унинг давоми Қоратепа тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1300–1700 м баландликдаги дараларда, шағалли тик ёнбағирларда, сурилмаларда, қояларнинг ёриқларида ўсади.



Сони. Фақат бешта жойда борлиги маълум. Тўплари (10–100 тупдан бўлиб) бир-биридан ажралган ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг сернам жойларга қатъий мослашганлиги ва аҳоли зич жойлашган ҳамда қишлоқ хўжалиги учун фойдаланиладиган ерларда ўсганлиги ўсимлик сонининг камайишига олиб келган.

Маданийлаштирилиши. Москва давлат университетининг Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Турнинг айрим популяциялари Китоб давлат кўриқхонасида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [142, 156–159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 1. Редкий реликтовый вид и род Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 2–3 м, с утолщенным ветвистым стеблекорнем. Стебель тонкий, в узлах слегка вздутый, метельчато ветвистый в верхней части. Листья в основном прикорневые, до 70 см длины и ширины, многократно перисторассечённые, с ланцетными конечными долями длиной 4–5 см и ширины до 10 мм. Зонтики 2–7-лучевые, зонтики шаровидные, без обёрток и обёрточек. Лепестки жёлтые, длиной до 10 мм. Плоды продолговато-яйцевидные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Кашкардинской областях: западная оконечность Зеравшанского хребта и его продолжение – хребет Каратепе.

Места обитания. Узкие ущелья и крутые щебнистые склоны, осыпи и трещины скал на высоте 1300–1700 м.

Численность. Отмечен в 5 пунктах. Встречается в виде сильно разрозненных немногочисленных популяций с разным числом особей (от 10 до 100).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовая природа вида и антропогенный фактор.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду МГУ.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Китабском заповеднике.

Источники. [142, 156–159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare, relict species and genus of the Zeravshan range. It is spread at the northern and southern slopes of the Zeravshan range (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits narrow defiles and steep slopes, mounds and cracks of rocks at the height of 1300–1700 m. 5 populations (from 10 to 100 specimens) can be found. Limiting factors: relict nature of the species and antropogenic factor. Measures of protection: some populations grow in the Kitab nature reserve.



89. ҲИСОР САРПОЯСИ

Головоног гиссарский / *Cephalopodium hissaricum* Pimenov

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см га етадиган кўп йиллик, монокарп ўт. Поясининг туби 2–3 см гача баргбандининг қолдиқлари билан қопланган, юқори қисми шохланган. Ёпирма барглари кўкимтир, патсимон бўлинган, япроқ учдаги бўлаклари қалами-наштарсимон, узунлиги 0,5–1,5 см, эни 0,1–0,2 см. Соябони 12–20 тача шуълали, диаметри 5–7 см, ўрама барглари йўқ. Соябончалари юмалоқ. Тожбарглари раанги аниқ эмас. Меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағирлари (Тўпаланг дарёси ҳавзаси)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги дарахт ва бутазорлар орасида, қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Бир марта йиғилган ҳолос.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди деган тахмин бор.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 1. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетний травянистый монокарпик высотой 30–50 см. Стебли при основании покрыты жесткими остатками черешков, тонкие, ветвящиеся в верхней части. Прикорневые листья сизоватые, 3–4-перисторасчещённые, с линейно-ланцетными конечными долями длиной 0,5–1,5 см, шириной 0,1–0,2 см. Зонтики 12–20-лучевые, 3–4 см в диаметре, без обёрток, зонтики шаровидные. Лепестки не известны. Плоды (незрелые) голые, широколанцетные. Плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: южный макросклон Гиссарского хребта – бассейн реки Тупаланг.

Места обитания. Трещины скал древесно-кустарникового пояса.

Численность. Не установлена, известен по единственному сбору.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the southern slope of the Hissar range: the Tupalang (Surkhandarya region). Inhabits cracks of rocks in woody-shrubby belt. There is the only locality. Measures of protection: not protected.



90. РЕГЕЛ ҚИРҚБОШИ

Зеравшания Регеля / *Zeravschania regeliana* Korovin

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етadиган ўқ илдизли, кўп йиллик ўт. Илдиз бўғизи шохланган, эски барг қолдиқлари билан қопланган. Поялари кўп, деярли баргсиз, ўртасидан шохланган. Ёпирма барглари қалин, узун бандли, уч қарра патсимон қирқилган, бўлаклари майда овалсимон. Поядаги барглари жуда майда, узунлиги 3–4 мм, поянинг юқори қисмидагилари эса майдалашиб, новга айланган. Соябонининг эни 4–8 см. Тожбарглари тесқари тухумсимон, оқ. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон ва Ҳисор тизмаларининг ғарбий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг тошли ёнбағирлари (арчазорлар)да ўсади.

Сони. Учта ерда мавжудлиги аниқланган. Умумий сони ҳақида аниқ маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Китоб давлат кўриқхоналарида муҳофаза этилади.

Манбалар. [159, 349].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 1 м. Корень стержневой. Стеблекорни разветвленные, покрыты остатками черешков отмерших листьев. Стеблей несколько, они полые, округлые, от середины ветвящиеся. Прикорневые листья на длинных черешках, трижды перисторассеченные, конечные доли мелкие, овальные, лопастные, 3–4 мм длины, стеблевые листья сильно уменьшенные, верхние редуцированные до влагалищ. Зонтики 4–8 см в поперечнике, с обертками и оберточками. Лепестки белые, обратнойцевидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: западная часть Зеравшанского и Гиссарского хребтов. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны гор в поясе арчовников.

Численность. Известны 3 местонахождения, сведений об общей численности нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не известны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Китобском заповедниках.

Источники. [159, 349].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare and endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western parts of the Zeravshan and Hissar ranges (Kashkadarya and Surkhandarya region). Inhabits stony slopes of mountains in the juniper belt. 3 populations are known. Total number is unknown. Measures of protection: protected in the Kitob and Hissar state reserves.



91. САРИҚ ҚИРҚГУЛ

Фергания многоцветковая / *Fergania polyantha* (Korovin) Pimenov

Мақоми 1. Фарғона водийсининг тоғолди худудларига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган кўп йиллик, монокарп ўсимлик. Поялари якка, майда чизиқли. Ёпирма барглари (гуллаган пайтида) ясси ва кенг бандли. Япроғи учбурчак шаклида, уч карра қирқилган, бўлаклари ўз навбатида патсимон қирқилган. Соябони ён шохларда ва поянинг учида жойлашган, 7–10 шуълали кўп гулли (гуллар 36 тагача), юмалоқ. Гуллари сарик, қосачасиз. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой ва Туркистон тизмаларининг Фарғона водийсига юзланган томонида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмида ва тоғ этакларида, соз тупроқли туб жинслар (сланец, конгломерат)дан ташкил топган ёнбағирларда, нураётган қоялар ва ўрнашиб қолган сурилмаларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 231].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков.

Статус 1. Редкий эндемик предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетние монокарпическое травянистое растение высотой до 40 см со стержневым корнем. Стебли одиночные, тонкобороздчатые. Листья прикорневые, с расширенными черешками. Пластинка листа в очертании треугольная, тройчаторассечённая; конечные доли продолговато-эллиптические, лопастные, 3 см длиной, 1,5 см шириной. Зонтики 7–10-лучевые, зонтики шаровидные. Лепески жёлтые, чашечка без зубцов. Плоды сжатые со спинки. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: предгорья Алайского и Туркестанского хребтов, обращённые к Ферганской долине. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Сланцевые и глинисто-сланцевые конгломераты на склонах, разрушающиеся скалы и неподвижные щебнистые осыпи в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Одиночно или небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 231].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков.

Rare species of the Ferghana valley. It is spread at the piedmont zone of the Alay and Turkestan ranges in the Ferghana valley (Ferghana region). Inhabits schistous and clayish-schistous conglomerates on slopes, destroying rocks and fixed mounds in piedmont zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



92. ПИЛДИРОҚ ҚҶШШОХ

Жабрица кубарчатая / *Seseli turbinatum* Korovin

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойнинг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси жўякли, туксиз, шохланган. Барглари уч карра патсимон қирқилган, бандли. Бўлаклари наштарсимон, учли, узунлиги 10–12 мм. Поянинг юқори қисмидаги барглари қалами-наштарсимон новли. Соябонлари 4–5 нурли, соябончалари тигиз, 20 та гулли, ўрама баргчалари 9–11 та, наштарсимон. Тожбарглари чўзиқ-овалсимон, юқори қисми ичига букилган. Меваси чўзиқ-овалсимон, тукли, узунлиги 5 мм га етади. Июль ойида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизмаси (Қўйтош тоғи, Устухон сой)да тарқалган. Тошкент вилояти, Қурама тизмаси. Ўзбекистондан ташқари Қозоғистонда учрайди.

Ўсиш шароити: Тошли ёнбағирлар ва қояларнинг ўрқачларида, бодомзор ва арчазорлар орасида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [148, 230].



Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение высотой до 1 м. Стебель бороздчатый, голый, ветвящийся. Листья на черешках, трижды перисторассечённые на ланцетные, острые доли длиной 10–12 мм, верхние стеблевые листья редуцированы до линейно-ланцетных влагалищ. Зонтики 4–5-лучевые, без оберток, зонтики плотные, 20-цветковые, обёртки состоят из 9–11 ланцетных, почти свободных листочков. Лепестки желтые, продолговато-овальные. Плоды продолговато-овальные, опушенные, длиной до 5 мм. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Джизакская область: Нуратинский хребет (горы Койташ, урочище Устахан; хребет Нуратау, урочище Гурдара); Ташкентская область: Кураминский хребет. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые склоны и скалистые гребни.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.


Источники. [148, 230].

Н.Ю. Бешко.

Н.Ю. Бешко.



Rare endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau range: the Koytash mts., the Ustakhan valley; the Nuratau mts., the Gurdara valley (Jizzakh region), the Kurama range. Inhabits stony slopes and rocky ridges. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



93. ОВЧИННИКОВ ПАУЛИЯСИ

Паулия Овчинникова / *Paulita ovczinnikovii* (Korovin) Sojak

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 50–100 см бўлган кўп йиллик монокарп ўсимлик. Илдизи тугунаксимон, бармоқсимон тармоқланган. Поялари якка-якка ҳолатда, ичи ғовак, ўртасидан бошлаб юқорироқда шохланади. Илдизолди барглари тез қуриydi; япроқлари кенг учбурчаксимон, икки, уч карра патсимон қирқилган; асос қисмидаги бўлақларининг бандчалари бор; учки бўлақлари кенг, ромбсимон, йирик тишчали. Гултожибарги оқ, косачасининг тишчалари йўқ. Меваси 2,5 мм узунликкача, тухумсимон, бир-бирига тенг бўлган қовурғалари туфайли сал ғадирбудур. Май ойида гуллаб, июнь-июлда мевалаydi.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, ғарбда Мачайдарёгача, Боботоғ. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли, соз тупроқли ёнбағирликларда ўсади (д. с. б. 900–2000 м).

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан зиёд кўп боқилиши, ўсиш жойларининг деградацияга учраши, маҳаллий аҳоли томонидан зиравор сифатида териб олинishi.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [141, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 1. Эндемичное растение Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетний монокарпик 50–100 см высоты. Корень клубневидный, пальчаторазветвленный. Стебли одиночные, полые, от середины ветвящиеся. Прикорневые листья рано увядающие; пластинка в очертании широкотреугольная, дважды-трижды перисторассеченная; базальные первичные сегменты на черешочках; конечные доли широкие, ромбические, крупнозубчатые. Зонтики 20–27 лучевые с оберткой и оберточками из цельных листочков. Лепестки белые; зубцы чашечки отсутствуют. Плоды до 2,5 мм длины, яйцевидные, слегка шероховатые с



короткими равными килевидными ребрами. Цветет в мае, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, на западе до Мачайдарьи, хребет Бабатаг.

Места обитания. Мелкощепнистые, мелкоземистые склоны (900–2000 м н. у. м.).

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота, деградация местобитаний, заготовка населением в качестве пряности.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [141, 159].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Endemic species of the Pamir-Alay.

It is spread at the Surkhondarya region: the Hissar range (the Sangardak and Tupalang river basins), the Babatag range. Inhabits clay and rubbly slopes, among shrubs, at 900–2000 m.s.l. Can be found in small groups with limited areas. Limiting factors: Intensive pasturing, habitat degradation using by local population as spice. Measures of protection: not protected.



94. ҒАРОЙИБ КУЗАКИ

Осенница неожиданная / *Autumnalia inopinata* Pimenov

Мақоми 1. Нурота тизмасидаги Қоратоғнинг ўта камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 1 м гача етадиган кўп йиллик поликарп ўсимлик. Поялари якка-якка, тигиз. Барглари икки карра уч булакли, учидаги булакларининг банди қисқа, тухумсимон, четлари бутун, учи ўткирлашган. Соябонлари кўп, майда шарсимон, 4–5 шўллалли; ўрама барглари тухумсимон, пастга қайрилган. Гултожибарги оч сарик; косачасининг тишчалари йўқ. Меваси туксиз, тухумсимон ёки сал юмалоқлашган. Август–сентябрда гуллаб, сентябрь–октябрда меналайди.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тизмаси Қоратоғдаги Қорақарға довони атрофида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 2009 йилда битта популяцияси аниқланган (50 та туп). 2012–2014 йилларда яна иккита популяцияси топилган (ўсимликларнинг умумий сони 150 га яқин). Тахминан 20 км² майдонда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда камёб эндемик ўсимлик. Ўсиш жойларида чорва моллари жуда кўп боқилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159].

Н.Ю. Бешко, К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редчайший эндемик горы Каратау Нуратинского хребта.

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой поликарпик до 1 м высоты. Стебли одиночные плотные с метельчато разветвленным соцветием. Листья дважды тройчатые; конечные доли на черешочках, яйцевидные цельнокрайние, на конце заостренные. Зонтики многочисленные мелкие шаровидные, 4–5 лучевые; листочки обертки яйцевидные, пленчатые, вниз отогнутые; оберточка отсутствует. Лепестки светложелтые; зубцы чашечки отсутствуют. Плоды голые, яйцевидные или почти округлые сильно сжатые со спинкой мерикарпиев; спинные ребра мерикарпиев почти незаметные, краевые крыловидные. Цветет в августе–сентябре, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Навоийская область: Нуратинские горы, хребет Каратау, окрестности перевала Каракарга.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, выходы сланцев, среди колючеминдальников на высоте 600–800 м н. у. м.

Численность. В 2009 году была обнаружена одна популяция с численностью не более 50 особей. В 2012–2014 гг. выявлено 2 популяции с общей численностью около 150 растений. Общая площадь распространения около 20 км².

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий узко эндемичный вид. Места обитания используются под выпас большого количества скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159].

Н.Ю. Бешко, К.Ш. Тожибаев.

*Very rare, endemic species of the Nuratau mountains, belonging to endemic Central Asiatic genus. It is spread at the Navoi region: the Nuratau mts., the Karatau range (near the Kara-karga passage). Endemic of Uzbekistan. Inhabits stony rubbly slopes, among the shrubs of *Amygdalus spinosissima*, at 600-800 m. s. l. In 2009 only one population (about 50 plants) was found. In 2012-2014, about 150 plants were counted in two localities. Distribution area is about 20 sq. km. Limiting factors: endemic stenotopic species. The habitat is used for pastures. Measures of protection: not protected.*



95. ЧАКАМИГМЕВАСИМОН АСТОМАТОПСИС

Астаматопсис подмаренникоплодный / *Astomatopsis galiocarpa* Korovin

Мақоми 2. Дарвоз тизмаси ва Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағирларининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Умуман туксиз, кўп йиллик поликарп ўсимлик, эфемероид. Тугунаги шарсимон. Пояси якка-якка, ингичка, 10–25 см баландликда. Илдизолди баргларининг япроқлари 2 карра уч бўлакли қирқилган; учки бўлаклари 1–2 см узунликда, эни 0,5 см, тухумсимон, уч бўлакли; поя барглари учидаги бўлақлар ингичка. Соябонлари ўрама барглари ва баргчаларсиз, 2–7 та ингичка, бир-бирига тенг 20 мм узунликдаги шуълалардан иборат. Косачаси тишчасиз. Гултожи оқ, 0,9 мм узунликда. Меваси икки бўлакли, кўшалоқ қўнғир, силлиқ, 1,5–1,9 мм узунликда, эни 3–4 мм. Июнь-июлда гуллаб, июль–августда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, Тўпаланг дарёсининг ҳавзаси. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон.

Ўсиш шароити. Майда шағалли тўкилмалар, қоялар остидаги майин тупроқлар тўпланган ёнбағирликлар, қор секин эрийдиган жойларда, дарё ёқаларида денгиз сатҳидан 2200–2300 м. баландликда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғи ва тугунагидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [142, 233].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков.

Статус 2. Эндемик южного макросклона Гиссарского и Дарвазского хребтов.

Краткое описание. Совершенно голое многолетнее поликарпическое растение, эфемероид. Клубень шаровидный. Стебель тонкий, одиночный, 10–25 см высоты. Пластинки прикорневых листьев дважды тройчаторассеченные; конечные доли 1–2 см длиной, 0,5 см шириной, яйцевидные, трехлопастные; стеблевые листья с линейными конечными долями. Зонтики без оберток и оберточек, с 2–7 тонкими, примерно равными лучами, 20 мм длины. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, 0,9 мм длины. Плоды двойчатые, бурые, гладкие, 1,5–1,9 мм длины, 3–4 мм ширины. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область:

Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкощепнистые осыпи, скопления мелкозема под скалами, местах позднего таяния снега, вдоль ручьев, д.с.б. 2200–3000 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенами и клубнями.


Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Нет сведений.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [142, 233].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков.



Rare endemic species of the southern slope of the Hisar and Darvaz ranges. It is spread at the Surkhandarya region: the Hissar range, the Tupalang. Inhabits scree, formed by small detrit stones, snow melting places under rocks, alongside streams. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



96. АНГРЕН ЗИРАСИ

Буннум ангрениский / *Bunium angreni* Korovin

Мақоми 1. Оҳангарон дарёси ҳавзасининг кам-ёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, туксиз, поликарп эфемероид ўсимлик. Тугунаги шарсимон. Пояси якка-якка, 15 см гача. Барглари ингичка-ланцетсимон бўлақларга уч карра патсимон қирқилган, бўлақлари 10 мм узунликкача. Соябони ўрама баргларсиз, 2–5 шуълали, шуълалар узунлиги 15–20 мм. Соябончаси ўрама баргчаларсиз. Косачасининг тишчалари йўқ. Гултожи оқ, бир хилда эмас, ташқаридагилари ичкиларидан йирикроқ. Мева-



си эллипссимон, мева бандидан бир неча марта калтароқ. Май–июнда гуллаб, июнь–июлда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол ва Курама тизмалари (Оҳангарон дарёси ҳавзаси)да.

Ўсиш шароити. 1200–2300 м баландликдаги шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва тоғли худудларнинг ўзлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонаси ва Угом-Чотқол биосфера резерватида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [114, 145].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 1. Редкий эндемик бассейна реки Ахангаран.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое голое растение, эфемероид. Клубень шаровидный. Стебли одиночные, до 15 см высоты. Листья тройчато-перисто рассеченные на линейно-ланцетные, до 10 мм длины участки. Зонтики без обверток, 2–5-лучевые, лучи 15–20 мм длины. Зонтики без обверточек. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, неодинаковые, наружные крупнее внутренних. Плоды эллиптические, во много раз короче плодоножек, 2,2 мм длины. Цветет в мае-июне, плодоносит июне-июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский и Кураминский хребты (в пределах бассейна реки Ахангаран).

Места обитания. Щебнистые склоны в диапазоне высот 1200–2300 м.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, освоение горных территорий.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского биосферного резервата.

Источники. [114, 145].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare endemic species of Akhangaran river basin It is spread at the Tashkent region: the Chatkal and Kurama ranges, of the Akhangaran river basin. Inhabits screes on the slopes, 1200–1300 m s l. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing, economic activity in the mountainous area. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and Ugam-Chatkal state biosphere reserves.



97. НОВБАРГЛИ ЗИРА

Буннум влагалищный / *Bunium vaginatum* Korovin

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шаннинг реликт, кам-ёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, умуман туксиз, поликарп ўт ўсимлик. Тугунаги шарсимон, диаметри 2 см гача. Пояси якка-якка, 25 см гача. Барглари 2 карра патсимон қирқилган, қалин, тухумсимон-ланцет шаклида кенгайган, ялтироқ новбарглари учидаги бўлақлари ингичка, 10 мм узунликда ва эни 1 мм. Соябони ўрама барглрсиз, 5–10 шуълали, шуълалар узунлиги 3–10 мм. Соябончаси 15–20 гулли. Косачасининг тишчалари йўқ. Гултожи оқ, тескари юраксимон, кемтикли, 1,5 мм узунликда. Меваси узунчоқ-овалсимон, 3 мм узунликда. Май–июнда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтоғдан бир марта И.И. Мальцев терган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон (Талас Олатоғи, Сирдарё Қоратоғи).

Ўсиш шароити. Сувайирғичларнинг яқинидаги тошли-шағалли ёнбағирликлар.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [114, 145].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков.

Статус 1. Редкий реликтовый эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Совершенно голое поликарпическое травянистое растение, эфемероид. Клубень шаровидный, до 2 см в диаметре. Стебель одиночный, до 25 см высоты. Листья дважды перисто-рассеченные, с кожистыми, яйцевидно-ланцетными расширенными, блестящими влагалищами; конечные доли линейные, до 10 мм длины и 1 мм ширины. Зонтики без обертки, с 5–10 лучами, 3–10 см длины, зонтики 15–20 цветковые. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, обратно-сердцевидные, выемчатые, 1,5 мм длины. Плоды продолговато-овальные, сжатые со спинки, 3 мм длины. Цветет и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань – Каржантау (один раз было собрано И.И. Мальцевым). За пределами Узбекистана: Казахстан (Таласский Алатау, Сырдарьинский Каратау).

Места обитания. Каменисто-щелочистые приводораздельные склоны гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Места произрастания находят-

ся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [114, 145].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков.

Rare endemic relict species of the western Tian-Shan. It is spread at the Tashkent region: the western Tian-Shan, the Karzhantau range (collected once by I.I.Maltzev). Inhabits stony and rubbly mountain slopes near water-sheds. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal National park.



98. ГАЙСИМОН ДИМОРФОСЦИАДИЙ

Диморфосциадий гайевидный / *Dimorphosciadium gayoides* (Regel & Schmalh.) Pimenov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойнинг камёб ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлик. Илдизи – ўқ илдиз. Пояси ривожланмаган, кўп сонли шохлари илдиз бўғзи олдидан чиқади, 10 см узунликкача. Баргларининг ҳаммаси илдизолди баргларидан иборат; япроқлари патсимон еки 2 карра патсимон қирқилган; учигаги бўлақлари овалсимон, тахминан 2 мм узунликда. Соябонлари икки хил: марказийлари каттароқ, эгилувчан, ёнбошлари майдароқ. Ҳама барг ва баргчалари бутун япроқчалардан ташкил топган. Қосачаси тишчаларсиз. Гултожи оқ, тухумсимон, 15 мм узунликда. Меваси тухумсимон, туксиз, 4 мм. Июль-августда гуллаб, август-сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком ва Чотқол тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Тожикистон, Ғарбий Хитой.

Ўсиш шароити. Баланд тоғларнинг очик, шағалли ёнбағирликларида ўсади (2900–3700 м).

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бениҳоя кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Угам-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [235].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 2. Редкое растение Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее монокарпическое травянистое растение. Корень стержневой. Стебель не развит, с многочисленными, выходящими из розетки приподнимающимися ветвями, до 10 см длины. Листья все прикорневые; пластинки перистые или дважды перисторассеченные; конечные доли овальные, около 2 мм длиной. Зонтики двойные: центральные более крупные, сидячие, боковые более мелкие, на верхушках ветвей. Обертки и оберточки из цельных листочков. Чашечка без зубцов. Лепестки белые, яйцевидные, 1,5 мм длины. Плоды яйцевидные, голые, 4 мм длины. Цветет в июле-августе, плодоносит августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Пскемский и Чаткальский хребты, за пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан, западный Китай.

Места обитания. На открытых щебнистых склонах высокогорий (2900–3700 м).

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [235].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare species of the western Tian-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Tashkent region: the Pskem and Chatkal ranges. Inhabits open rubbly slopes in the alpine belt (2900–3700 m.s.l.). The quantity is unknown. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: protected in the Chatkal Biosphere state reserve and Ugam-Chatkal national park.



99. КОРОВИН ЛОМАТОКАРПАСИ

Окаймленноплодник Коровина / *Lomatocarya korovinii* Pimenov

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик поликарп ўт ўсимлик. Кўп сонли поялари баргсиз, 5–15 (20) см узунликда, туксиз. Баргларининг ҳаммаси илдизолди баргларидан иборат, кўп сонли, бандли, туксиз, узунлиги 5–10 см, эни 1–2 см, япроқлари 2 қарра патсимон қирқилган; учидаги бўлаклари овалсимон ёки тухумсимон, 3–4 мм узунликда, тишчалари бор. Соябонлари 3–10 шуълалли, ўрама барг ва баргчалари 5–6 та ланцетсимон япроқлардан ташкил топган. Соябончаси 10 гулли. Косачаси тишчалари тухумсимон. Гултожи оқ, тухумсимон, 15 мм узунликда. Меваси тухумсимон, узунлиги 4 мм, эни 3–4 мм. Июнь–июлда гуллаб, июль–августда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Писком, Угом, Чотқол, Курама тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Қозоғистон.

Ўсиш шароити. Баланд тоғларнинг шағалли ёнбағирликларида ўсади (3000–3600 м).

Сони. Кичик тўплар ҳолида ўсади. Бошқизилсой юқори қисми (Кўрғонтош ва Қизилнур чўққиларининг атрофлари) ўсимлик доминантлигидаги кичик жамоалар қайд қилинган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бениҳоя кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Угом-Чотқол биосфера резерватид ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаз қилинади.

Манбалар. [236].

М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее поликарпическое травянистое растение с многоглавым каудексом. Стебли безлистные, многочисленные, 5–15 (20) см длины, голые. Листья все прикорневые, многочисленные, на коротких черешках, голые, 5–10 см длины и 1–2 см ширины, дважды перисторассеченные; конечные доли овальные или яйцевидные, 3–4 мм длиной, зубчатые. Зонтики 3–10-лучевые с обертками и оберточками из 5–6 ланцетных или линейных листочков. Зонтички 10-цветковые. Зубцы чашечки яйцевидные. Лепестки белые. Плоды яйцевидные, 4–5 мм длины и 3–4 мм шир. Цветет в июне–июле, плодоносит в июле–августе

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский, Кураминский, Угамский и Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. На щебнистых склонах верх-

него пояса гор (3000–3600 м).

Численность. Встречается группами. В верховьях Башкызылсая (окрестности Курганташа и Кызылнуры) отмечены сообщества с доминированием вида.

Размножение. Семенное. Причины изменения численности и ареала. Летний выпас скота.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника, Угам-Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [236].



М.Г. Пименов, Е. Ключков.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent and Namangan regions: the Chatkal, the Kurama, the Ugam and the Pskem ranges. Inhabits rubble slopes in alpine zone, at the altitude 3000–3600 m.s.l.. It grows in groups. In the Bashkyzylsai river basin (the Kurgantash, the Kyzylnura mts.) large populations were revealed. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal and Ugam-Chatkal biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park.



100. ИНГИЧКА БАРГЛИ ПОНАПАНЖА

Клинолопастный тонкорассеченный / *Sphaenolobium tenuisectum* (Korovin) Pimenov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб ва эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик монокарп ўт ўсимлик, баландлиги 40–100 см. Илдизпояси шохланган. Барглари узун барг бандларида жойлашган илдизолди баргларида иборат; япроқлари кенг ромбсимон, икки ва уч қарра қиркилган бўлаклари узун бандчаларда жойлашган, учидаги бўлаклари узунчоқ, узунлиги 10 мм, кенглиги 1,5 мм. Соябонлари 5–10 шуълали, ўрама барг ва баргчалари бутун япроқчалардан ташкил топган. Косачаси тишчалари калта. Гултожи оч сариқ, тухумсимон, 15 мм узунликда. Меваси 6,5 мм узунликкача, тухумсимон-ланцет шаклида, туксиз. Июлда гуллаб, август-сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтов, Писком ва Угом тизмалари. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон.

Ўсиш шароити. Шағалли ёнбағирликлар ва қояларнинг ёриқларида ўсади (д. с. б. 1500–2400 м).

Сони. Якка-якка ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-

Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [234].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков.

Статус 2. Редкое и эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетний стержнекорневой поликарпик 40–100 см высоты. Стеблекорень разветвленный. Стебли округлые, плотные. Листья преимущественно прикорневые на длинных черешках; пластинка в очертании широкоромбическая, дважды-трижды тройчаторассеченная; сегменты на длинных черешочках; конечные доли линейные, до 10 мм длины и 1,5 мм ширины. Зонтики 5–10 лучевые с обертками и оберточками из цельных коротких листочков. Лепестки светло-желтые; зубцы чашечки короткие. Плоды до 6,5 мм длиной, яйцевидно-ланцетные, голые. Цветет в июле; плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Каржантау, Пскемский и Угамский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. На щебнистых осыпях и в трещинах скал (1500–2000 м).

Численность. Встречается одиночно.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не известно.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [234].

М.Г. Пименов, Е. Ключиков.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent region: the Karzhantau, the Ugam and Pskem ranges. Inhabits rubble slopes and rock crevices at the altitude 1500–2000 m.s.l. Solitary specimens. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



ИСИРИҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОГИЛЬНИКОВЫЕ (ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ) – PEGANACEAE (ZYGOPHYLLACEAE)

101. ҚЎНҒИР ҚУМУЗУМ

Мягкоплодник критмолистный / *Malacocarpus crithmifolius* (Retz.) C.A. Mey.



Мақоми 2. Ўзбекистонда ягона турга эга туркумнинг реликт тури.

Қисқача тавсифи. Чирмашиб ўсадиган, қишда барглари тўкадиган бута. Барглари этли, учли-наштарсимон, қирқилган, узунлиги 7 см, эни 6 см. Гули икки жинсли, қўш гулкўрғони сариқ. Меваси 3 уяли, қўп уруғли, ясси-юмалоқ, диаметри 1–1,5 см, этли, сершира, қўнғир-қизғиш рангли. Уруғи майда, узунлиги 3 мм. Июнь–сентябрь ойларида гуллаб, меваси июль–октябрда пишади.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Устюртда тарқалган. Қозоғистон, Туркменистон ва Эронда ҳам ўсади.

Ўсиш шароити. Тошлоқларда, шўр тупроқларда, чучук ва маъданли булоқлар атрофида ўсади.

Сони. 2014 йили ўсимликнинг 6 та ценотик популяцияси (5 та жанубий, 1 та шарқий чинқда) топилган. Улардаги тупларнинг умумий сони 200 та атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан ва илдиз бачкилари орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзбекистон ҳудудига ўсимлик ўз ареалининг шимоли-шарқий чегараси орқали кириб келган. Аҳоли уни меваси учун йиғади.

Маданийлаштирилиши. Ашхобод ва Шевченко шаҳарларидаги ботаника боғларида кўп йиллардан бери муваффақиятли ўстириб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [196].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Статус 2. Редкий реликтовый вид монотипного рода.

Краткое описание. Лиланопоподобный листопадный кустарник. Листья мясистые, ланцетно-линейные, рассеченные, длиной 7 см и шириной 6 см. Цветки обоеполые, с двойным околоцветником, лепестки лимонно-жёлтые. Плод – трёхгнездная, многосеменная ягода округло-приплюснутой формы, 1–1,5 см в диаметре. Мякоть плода сочная, оранжево-красного цвета. Семена мелкие, длиной 3 мм. Цветёт в июне–сентябре, плодоносит в июле–октябре.

Распространение. Каракалпакстан: Плато Устюрт. За пределами Узбекистана: Казахстан, Туркменистан и Иран.

Места обитания. Галечники, засоленные почвы близ пресных и минерализованных родников.

Численность. В 2014 г. отмечено 6 ценотических популяций вида (5 на южном чинке и 1 в восточном чинке Устюрта), общей численностью около 200 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное (отводками).

Причины изменения численности и ареала. В Узбекистане находится на северо-восточной окраине ареала. Интенсивный сбор местным населением.

Культивирование. Успешно выращивается в ботанических садах Ашгабада, Шевченко.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [196].

Х.Ф. Шомуродов.

Rare, relict and genus species. It is spread at the Ustyurt Plateau (Karakalpakstan). Inhabits pebbles, saline soils near fresh and mineral springs. Limiting factors: Uzbekistan is the north-eastern limit of the distribution area. Intensive collection by local people. Measures of protection: not protected.



ИТУЗУМДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПАСЛЕНОВЫЕ – SOLANACEAE

102. ОЛОЙ ХИЁЛИ

Пузырница алайская / *Physochlaina alaica* Korotkova ex Kovalevsk.

Мақоми 1. Олой ва Туркистон тоғларига мансуб жуда камбаб эндемик ўсимлик.

Қискача тавсифи. Бўйи 50 см га егадиган, кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тик, ёйиқ сийрак, оддий ва безчали туклар билан қопланган. Барглари узун бандли, кенг тухумсимон, япроғининг узунлиги 5–10 см, эни 4–8 см, устки томони деярли туксиз, пастки томони томирлари бўйлаб сийрак туклар билан қопланган. Гуллари қиска (0,5 см), мевасининг етилишига қараб узайиб борадиган, безчасимон тукли бандларда ўрнашган. Тўпгули ёйиқ, юқори қисми каллакчасимон. Косачаси безчасимон тукли, узунлиги 0,5 см. Гултожи кўнғироқсимон, узунлиги 10–15 мм, хира пушти рангли. Меваси кўсакча, узунлиги 10–12 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасида, Шоҳимардон ва Сўх дарёларининг хавзаларида учрайди. Қирғизистон, Тожикистон (Туркистон тизмаси: Ворух, Хўжабақирган қишлоқлари атрофлари)да ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1800–2000 м бандликда қояларнинг соялари, бутазорларнинг тағлари, арчазорлар ва очик ерларда ўсади.

Сони. Жуда сийрак тарқалган. Турли ешдаги ўсимликларнинг умумий сони 8000 тупдан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан доривор ўсимлик сифатида кўплаб ишлатилиши сабабли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Табиий шароитда экиб ўстирилганда ижобий натижа бермаган. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1973 йилдан буён ўстириб келинади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [122, 159].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редчайший эндемик Алайского и Туркестанского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли многочисленные, прямостоячие, рыхловолосистые, с примесью железистых волосков. Листья широкояйцевидные, с верхней стороны почти голые, с нижней по главной жилке рыхловолосистые, на длинных черешках, пластинка листа длиной 5–10 см, шириной 4–8 см. Цветки на коротких (0,5 см) и удлинняющихся при плодах железистых цвето-

ножках, собраны в рыхлое соцветие, на верхушке головчатое. Чашечка железистоволосистая длиной 0,5 см. Венчик колокольчатый, длиной 10–15 мм, грязно-кремовый. Коробочка длиной 10–12 мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – бассейны рек Шахимардан и Сох. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Таджикистан (Туркестанский хребет – окрестности кишлаков Ворух, Ходжабақирган).

Места обитания. В тени скал, под кустарниками, в арчовниках и на открытых полянах в среднем поясе гор, в пределах 1800–200 м над уровнем моря.

Численность. Встречается редко, единичными особями. Общая численность разновозрастных растений не превышает 8000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нерациональное использование вида местным населением в качестве лекарственного сырья.


Культивирование. Предпринята неудачная попытка культивирования в природных местах обитания. В Ботаническом саду АН РУз выращивалась с 1973 года.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [122, 159].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic of the Alay and Turkestan ranges. It is spread at the Alay range: the Shakhimardan and Sokh valleys (Fergana region). Inhabits rock shades, under shrubs, on the open glades among the juniper stands in the middle belt of mountains, at an elevation of 1800–2000 m.s.l. Single specimens can be found rarely. Total number of plants of different age not exceeds 8000 specimens. Limiting factors: irrational use of these species by local population as medicinal raw material. Measures of protection: not protected.



КАРАМДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КАПУСТНЫЕ (КРЕСТОЦВЕТНЫЕ) – BRASSICACEAE (CRUCIFERAE)

103. ҲИСОР ИСКАНДАРАСИ

Искандера гиссарская / *Iskandera hissarica* N. Busch

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см га етадиган, поясининг пастки қисми ёғочланган, кўп йиллик ўт. Ёпирма барглари тескари наштарсимон, қисқа бандли, узунлиги 1–8 см, эни 3–15 мм, юлдузсимон тукли. Гулпояси, одатда, баргсиз бўлади. Косачабарглари чўзиқроқ, бинафша рангли, узунлиги 8 мм, эни 6,5 мм. Қўзоғи юқорига қараган, 3–5 см узунликда, кенг наштарсимон ёки чизикли-узунчоқ, юлдузсимон ва безсимон туклар билан қопланган. Май ойида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тоғи (Қорақўл, Хондиза ва Тўпаланг дарёлари-нинг юқори ирмоқлари)да тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмида, қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Кам учрайди, кичик-кичик тўплар ҳосил қилади. Тўпаланг дарёси ҳавзасида 3000 тупи қайд қилинган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [46, 263].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой до 30 см с древеснеющими в нижней части побегами. Листья розеточные, обратноланцетные, короткочерешковые, длиной 1–8 см, шириной 3–15 мм, звездчатоопушенные, многолучевые. Цветоносные стебли, как правило, безлистные. Чашелистики продолговатые, фиолетовые, длиной около 8 мм, шириной 6,5 мм. Стручки вверх торчащие, длиной 3–5 см, широколанцетно или линейно-продолговатые, опушены звездчатыми и железистыми волосками. Цветёт в мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – Каракуль, верховья Хандизы и притоков реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Трещины скал в субальпийском поясе гор.

Численность. Встречается небольшими куртинками. 3000 растений в Тупаланге.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [46, 263].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: Karakul, Khandiza and Tupalang (Surkhandarya region). Inhabits cracks of rocks in the subalpine zone. The quantity is 3000 plants in the Tupalang area. Measures of protection: not protected.



104. ТОШБУЗАР ПАРРИЯСИ

Паррия камселомка / *Parrya saxifraga* Botsch. et Vved.

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шанда ареали бўлинган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10 см га етадиган, даярли поясиз кўп йиллик ўт. Қисқа пояси курук барг қолдиқлари билан қопланган. Илди-зи кўпбошчали. Ёпирма барглари



чўзиқ тухумсимон, қаттиқ, четлари тишли. Гулпоя-лари баргсиз, оддий, узунлиги 3–7 см. Гуллари би-нафша рангли. Меваси кўзоқ, юқорига қараб қайрилган. Уруғи ясси, юмалоқ, эни 2,5–5 мм, ўрта қисмидан учига ва асосига қараб ингичка лаша боради. Июнь

ойнда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган вилоятлари: Чотқол ва Қурама тизмасидаги Бетоғалик, Кенгсоз ва Қўйтош дараларида, Жирдон, Орашон доволарида ўсади.

Ўсиш шароити. Тоғларда 2600–2900 м баландликдаги шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ёки кичик туплар ҳосил қилиб учрайди. Бу тур тоғларнинг чиқиш қийин бўлган жойларида сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғининг униб чиқиш даражаси паст бўлганлиги туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза қилиш тадбирлари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [36, 159].

К.Ш. Тожибаев.



Статус 2. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, почти бесстебельное травянистое растение высотой до 10 см. Укороченные стебли покрыты сухими остат-

ками отмерших листьев. Корень многоглавый. Листья в прикорневой розетке, жёсткие, зубчатые, продолговато-яйцевидные. Цветочные стебли безлистные, простые, высотой 3–7 см. Цветки фиолетовые. Плод – стручок, косо-вверх-направленный. Семена плоские, округлые, шириной 2,5–5 мм, к основанию и верхушке суженные. Цветёт в июне, плодоносит в августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Кураминский и Чаткальский хребты – урочище Бетагалик, Кенгсаз и Койташ, перевалы Джирдан, Арашан.

Места обитания. Щебнистые склоны субальпийского пояса гор, в пределах 2600–2900 м.

Численность. Одиночно или небольшими группами. Сохранился в труднодоступных местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Слабое семенное возобновление.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [36, 159].

К.Ш. Тожибаев.

Rare and endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: Betagalik, Kengsaz and Koitash, the Djirdan and Arashan passes (Tashkent and Namangan regions). Inhabits slopes of the subalpine belt of mountains at a height of 2600-2900 m s l. Single specimens or small groups can be found. They are extant in almost inaccessible regions. Limiting factor: bad seed reproduction. Measures of protection: not protected.



105. ҚУРАМА ПАРРИЯСИ

Паррия кураминская / *Parrya kuramensis* Botsch.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанда учрайдиган кам-ёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган по-ясиз, каудекси кўп бошчали, кўп йиллик ўсимлик. Барглари илдиз бўғзида тўп бўлиб ўрнашган, оддий, кенг бандли, безчасимон қалин туклар билан қопланган, ўткир учли, япроқчалари йирик тишли. Гулпояси тик, узунлиги 15–18 см, баргсиз, безчасимон тукли. Гуллари бинафша рангли. Қўзоғи узунчоқ, ясси, тик, туксиз, бўғим оралиқлари бироз ингичкалашган. Уруғи эллипссимон, бир қатор ўрнашган. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Курама тизмасидаги Қамчик довоида тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2200–2300 м баландликда, сийрак арчазорлар орасида, шағалли тик ёнбағирларда ўсади. Очиқ, шимоли-шарқий ёнбағирлар уларнинг ўсиши учун қулай жой ҳисобланади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки 3–5 тупдан иборат ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қамчик довои атрофида моллар боқиладиган ерларда ўсганлиги туфайли оёқости бўлиб, камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Табиатда ва маданий шароитда ўстириб, турнинг биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [36, 159].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее бесстебельное травянистое растение высотой до 25 см с много-

главым каудексом. Листья розеточные, простые, с густо железистым опушением, широкочерешковые, ланцетные, острые, по краю крупнопильчатые. Цветочные стебли высотой 15–18 см, прямостоячие, безлистные, с железистыми волосками. Цветки фиолетовые. Стручки голые, линейные, плоские, вверх направленные, с перетяжками между семенами. Семена эллиптические, однорядные. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Кураминский хребет – перевал Камчик.

Места обитания. Крутые щебнистые склоны на высоте 2200–2300 м над уровнем моря среди разреженных арчовников; предпочитает открытые северо-восточные экспозиции.

Численность. Малочислен, встречается единично или небольшими (3–5 растений) группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Произрастает вблизи перевала на трассе скотопргона, вытаптывается и поедается скотом.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [36, 159].

К.Ш. Тожибаев.

Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama range: the Kamchik pass (Tashkent and Namangan regions). Inhabits steep slopes at an altitude of 2200–2300 m, among sparse juniper stands; prefers the open north-eastern exposures. Not numerous, solitary specimens or small (3–5 plants) groups can be found. Limiting factors: grows near the passage on the route of cattle road, trampled down and eaten by cattle. Measures of protection: not protected.



106. ЗАРАФШОН СОХТА КЛАУСИЯСИ

Лежноклаусия зеравшанская / *Pseudoclausia zerawschanica* (Regel et Schmalh.) Botsch.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жануби-ғарбий минтақасига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–70 см га етадиган оддий, узун ҳамда безчасимон туклар билан қопланган бир ёки икки йиллик ўт. Якка пояли, тубидан шохланган. Барглари тўмтоқ, чўзик, патсимон бўлакчи. Гуллари оч бинафша рангли. Қўзоғи туксиз ёки тукли, етилганда тасбехсимон. Апрель–май ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари: Нурота, Оқтоғ тизмаларида, Зирабулоқ тоғларида ҳамда Зарафшон дарёси водийсидаги паст тоғларда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларида шағалли ва майда тупроқли жойларда, шувоқ, бута ва ярим буталар орасида ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ёки 2–10 тадан тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ва уруғининг яхши униб чикмаслиги сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [37, 159, 228].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик юго-западной части Узбекистана.

Краткое описание. Одно-двухлетнее травянистое растение высотой до 60–70 см, опушенное простыми длинными волосками с примесью железистых. Стебель от основания разветвляется, одиночный. Листья тупые, продолговатые, перистолопастные. Цветки светло-фиолетовые. Стручки голые и опушенные, слабочетковидные. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребты Нуратау, Актау, Зирабулакские горы, низкогорья в долине реки Зеравшан.

Места обитания. Щербнистые и мелкоземистые субстраты в нижнем и среднем поясах гор, среди полынных, кустарников и полукустарников.

Численность. Встречается единично и спорадически небольшими (от 2 до 10 экземпляров) группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас и низкая семенная продуктивность.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [37, 159, 228].

К.Ш. Тожибаев.



Rare endemic species of the south-western Uzbekistan. It is spread at the Nuratau, the Aktau ranges, the Zirabulak mountains, the low mountains in the Zeravshan river valley (Jizzakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits stony and fine earth substrates in the lower and middle belts of mountains, among sage brushes, shrubs and semishrubs. Single specimens and sporadically small (from 2 to 10 specimens) groups can be found. Limiting factors: overgrazing and low seed productivity. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



107. ЧИМЁН СОХТА КЛАУСИЯСИ

Ложноклаусия чимганская / *Pseudoclausia tschimganica* (Popov ex Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см, баъзан 100 см гача етадиган узун, оддий ва қисқа безчасимон туқлар билан қопланган икки йиллик ўсимлик. Пояси асосидан шохланган. Ёпирма барглари қўп, тескари наштарсимон, бандли. Гуллари қўнғир тусда, томирлари бинафша ранг, узунлиги 9–11 мм. Қўзоғи ясси, тасбеҳсимон қўринишда, пояга ёпишган, узун тумшукчали. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фақатгина Чотқол тизмасида тарқалган. Шунингдек, Қирғизистонда ҳам ўсади (Сандалош тизмаси).

Ўсиш шароити. Қояларда, тошли ва шағалли ёнбағирларда, дарё бўйларидаги тошлоқларда, эриётган қор уюмлари атрофида ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган. Якка-якка ҳолда ўсади.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Аниқ маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Камайиб бориш сабаблари аниқлиниши лозим. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғининг ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [37, 159, 228].

К.Ш. Тожibaев.

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Двухлетнее растение высотой 30–50, реже до 100 см, с длинными простыми и короткими железистыми волосками. Стебель от основания ветвистый. Листья прикорневые, многочисленные, черешковые. Лепестки коричневые, с фиолетовыми жилками, длиной 9–11 мм. Стручки уплощенные, слабочетковидные, прижаты

к стеблю, с длинным носиком. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: отмечен только на Чаткальском хребте. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Сандалашский хребет).

Места обитания. Скалы, каменистые склоны и осыпи, песчано-галечниковые берега ручьев, вблизи тающего снега.

Численность. Немногочислен. Встречается спорадически единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся

на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [37, 159, 228].

К.Ш. Тожibaев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range (Tashkent region). Inhabits rocks, stony slopes and mounds, sandy-pebble banks of streams, near melting snow. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



108. ЮРАКСИМОН ТОРОЛ

Клоповник почтисердцевидный / *Lepidium subcordatum* Botsch. et Vved.

Мақоми 2. Қизилқум ва Устюртда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган, поялари кўп бошчали, кўп йиллик ўт. Илдиз бўғизи тўкилиб кетган эски барг бандларининг пардали қолдиқлари билан ўралган. Поялари 2–3 та ва ундан ҳам кўпроқ, туксиз, шохланган. Барглари қалин тукли, поянинг асосида ўрнашганлари кўп, тескари тухумсимон, тўмтоқ, йирик тишли еки патсимон бўлинган, бандига қараб ингичкалашиб боради. Гуллаган пайтида шингили тиғиз, мевалаш даврига бориб сийраклашади. Косача барглари юмалоқ, тўмтоқ, ташқи томони тукли. Тож-барглари оқ рангли. Меваси тухумсимон кўзоқ шаклида. Уруғи майда, қўнғир рангли. Апрель–май ойларига гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон, Навоий ва Бухоро вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тоғлар (Қулжуктоғ, Букантоғ ва Султанувайс)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлардаги ола жинсли, шағалли ва қумли тупроқларда тарқалган.

Сони. Маълум эмас. Якка-якка ва 3–5 тупдан иборат тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик уруғлаган вақтда чорва молларининг кўплаб боқилиши унга айниқса жиддий шикаст етказди.

Маданийлаштирилиши. Чўл яйловлари унумдорлигини ошириш мақсадида кўп йиллик, сершира ем-хашак ўсимликлари етиштиришни кўпайтириш ЎЗР ФА Қизилқумдаги тажриба станциясида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [64, 159].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Статус 2. Редкий эндемик останцов Кызылкума и Устюрта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение длиной до 40 см. Стебли формируются от многоглавой головки. Шейка корня покрыта пленчатыми остатками черешков отмерших листьев. Стебли от 2–3 до многочисленных, голые, разветвленные. Листья опушены густыми волосками, розеточные, многочисленные, обратнойцевидной формы, тупые, крупнозубчатые или перисто-раздельные, постепенно суженные в черешок. Кисти при цветках очень плотные, при плодах рыхлые. Чашелистики почти округлые, тупые, по спинке пушистые. Лепестки белые. Стручки яйце-

видные, семена коричневые, мелкие. Цветёт в конце апреля–мая, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Каракалпакстане, Навоийской и Бухарской областях: останцевые возвышенности Кызылкумов – Кульджуктау, Букантау и Султанвайс.

Места обитания. На щебнистых и каменистых склонах, на выходах пестроцветных пород, на опесчаненных почвах по останцовым горкам.

Численность. Не установлена. Встречается одиночно и группами по 3–5 особей.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сильно страдает от перевыпаса в период созревания семян.


Культивирование. Имеются опытные посевы на Кызылкумской пустынной станции АН РУз. Испытывается как сочный многолетний корм с целью фитомелиорации пустынных пастбищ.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [64, 159].

Х.Ф. Шомуродов.

Rare endemic species of the Kyzylkum and Ustyurt. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktau, the Bukantau and Sultan-Uizdag relict mountains (Karakalpakstan, Navoi and Bukhara regions). Inhabits gravelly and stony slopes, outcrops of gypseous rocks, sandy soils on the hills. The quantity is unknown. Single specimens and groups of 3–5 specimens can be found. Limiting factors: suffers from overgrazing when seed maturing. Measures of protection: not protected.



109. ОЛЬГА ЛЕПИДИУМИ

Клоповник Ольги / *Lepidium olgae* (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.

Мақоми 2. Нурота тизмасининг камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт ўсимлик, илдизпояси тик, йўғонлашган. Пояси 30–70 см баландликда, туксиз, анча йўғон, юқори қисми шохланган. Барглари туксиз, кулранг, этли. Илдиз бўғзидаги барглари йирик, кенг тухумсимон ёки деярли юмалоқ, пастки қисми торайган, кенг қанотчали бандга эга. Поядаги барглари тухумсимон, бандсиз, секин - аста кичрайиб боради. Гуллари кўп гулли ўсимликнинг тепа қисмидаги шингилларда мураккаб рўвак ҳосил қилиб ўрнашган. Гултожи оқ, узунлиги 8–9 мм. Косачабаргларида 2 баравар узун. Қўзоқчаси очилмайдиган, тескари тухумсимон, узунлиги 16–20 мм, эни 8–10 мм, сал қабарикли, пишганлари осилиб туради, узун ва қайрилган мева-бандада ўрнашган. Апрель ва майнинг бошларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тоғ тизмасининг марказий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-чағиртошли, тошли-майда чағиртошли тоғларнинг ўрта қисмидаги шимолий ва ғарбий ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам, тарқоқ ҳолда бир неча тупдан то ўнлаб ўсимликкача таркиб бўлган кичик-кичик популяциялар учрайди. Умумий сони 1000 тупга яқин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликларнинг кичик майдонларда ўсиши, шароитга унча мослашмаганлиги, маҳаллий аҳоли томонидан илдизпояларининг кавлаб олиниб, доривор маҳсулот сифатида ишлатилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [64, 159, 289].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик хребта Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с утолщенным вертикальным корневищем. Стебли высотой 30–70 см, голые, довольно толстые, в верхней половине разветвленные. Листья голые, сизоватые, мясистые. Цветки в многоцветковых верхушечных кистях, собранных в сложное метельчатое соцветие. Лепестки белые, 8–9 мм длиной, в два раза длиннее чашелистиков. Стручочки нераскрывающиеся, обратнойцевидные, 16–20 мм длиной и 8–10 мм шириной, слегка вздутые, зрелые повислые, на длинных отогнутых плодоножках. Цветёт в апреле – начале мая, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Жиззакская область: центральная часть хребта Нуратау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко, спорадически, небольшими популяциями от нескольких экземпляров до нескольких десятков. Общая численность составляет не более 1000 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность вида к ограниченным местообитаниям и заготовка корневищ местными жителями в качестве народного лекарственного средства.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [64, 159, 289].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the central part of the Nuratau range (Jizzakh region). Inhabits stony slopes in the lower mountainous zone. About 1 thousands of specimens were revealed. Limiting factors: stenobiont rare species, roots collected by local population for medicinal purposes. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



110. ГОРДЯГИН ҚАТРОНИ

Катран Гордягина / *Crambe gordjagini Sprygin et Popov*

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–70 см га етadиган, кўп пояли, поясининг асоси хурпайган, дағал тукли, кўп йиллик ўт. Поясининг остки қисмидаги барглари узун бандли, турли даражада ўйилган, тухумсимон ёки лирасимон, кичик бўлақларга ажралган. Тўпгуллари рўваксимон, узун шохчали. Гуллари тўқ сариқ рангли. Қўзоқчасининг юқори бўғими эллипссимон, силлиқ. Апрель ойида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ғузур, Тўдадашт, Гулчадашт атрофидаги тепаликларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Эфемер, эфемероидлар орасида, шағалли ва гипсли қизил тупроқларда ўсади.

Сони. Ғузур атрофидаги тепаликларда бу турнинг мингга яқин туплари сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларининг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш учун қилинган ҳаракат натижасиз тугади.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [131, 336].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50–70 см. Стебли многочисленные, с торчащими жесткими волосками у основания. Нижние листья длинно-черешковые, неправильно-выемчатые, яйцевидные или лировидные, с маленькими долями. Соцветие метельчатое, с длинными ветвями. Цветки ярко-желтые. Стручок эллипсоидальный, гладкий. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: низкие холмы в окрестностях Гузара, Туда-Дашта, Гульча-Дашта.

Места обитания. Щербнистые холмы и выходы гипсоносных красных глин, среди эфемеров и эфемероидов.

Численность. Около 1 тысячи особей в окрестностях Гузара.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение зоны предгорий, интенсивный выпас.


Культивирование. Попытка выращивать в Ботаническом саду АН РУз оказалась неудачной.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [131, 336].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the low hills nearby Guzar, Tuda-Dasht, Gulcha-Dasht (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits hills and outcrops of gypsum-bearing red loams among ephemerooid plants. About 1000 of specimens can be found in the surroundings of Guzar. Limiting factors: economic reclamation of foothills, intensive grazing. Measures of protection: not protected.



Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик туксиз ўт. Пояси оддий, узунлиги 10–40 см. Барглари этли, бутун, бандли, чўзиқ-ланцетсимон, ўткир қиррали. Косачабарглари чўзиқ-чизиқли, бинафшаранг, юқори четлари оқиш пардали, узунлиги 7–10 мм. Гулбарглари қирмизи-бинафша рангда бўлиб, косачабарглардан 2–2,5 марта узун, узун бандли. Мевабандининг узунлиги 5 мм. Қўзоқчалари чўзиқ, ясси, ўроқсимон эгилган, узунлиги 4–8 см, эни 2 мм, калта тумшукчаси томон ингичкалашган. Март–апрель ойида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятида.

Ўсиш шароити. Кул ранг, бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Оқтош атрофидаги тепаликларда бу турнинг 200 га яқин тупи сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тоғ этакларининг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [38].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее голое, зеленое растение. Стебель простой, 10–40 см длины. Листья мясистые, цельные, черешковые, продолговато-ланцетные, острые. Чашелистики линейно-продолговатые, фиолетово-окрашенные, вверху по краю бело-перепончатые, 7–10 мм длины. Лепестки пурпурно-фиолетовые, в 2–2,5 раза длиннее чашелистиков, длинноноготковые, на верхушке округлые. Плодоножки 5 мм длины. Стручки линейные, четковидные, сплюснутые, серповидно отогнутые, 4–8 см длины, 2 мм ширины, суженные в короткий носик. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях.

Места обитания. Серые глины.

Численность. 200 особей в окрестностях кишлака Акташ.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение зоны предгорий, интенсивный выпас.

Культивирование. Нет информации.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [38].

К.Ш. Тожибаев.



Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the low hills nearby Aktash (Surkhandarya region). Inhabits grey clays. 200 specimens nearby Aktash can be found. Limiting factors: destroying of habitats and intensive overgrazing. Measures of protection: not protected.



112. АННА КИРПИЎТИ

Акантолимон Анны / *Acantholimon annae* Lincz.

Мақоми 2. Ҳисор тоғидаги камёб эндемик тур.
Қисқача тавсифи. Яримшар шаклидаги тиғиз, ёстиксимон, диаметри 10–12 см га етадиган ярим бута. Барги яшил, деярли ясси-наштарсимон, узунлиги 2–5 мм, эни 0,5–1,5 мм. Гулпояси оддий, узунлиги 4–5 см, баргидан узунроқ, туксиз. Бошоғи бир гулли. Косачаси қирмизи, тожбарги пушти рангли. Июль–август ойларида гуллаб, сентябрь–октябрда меваси етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, Тўпаланг дарёси ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли, қоя тошли, тик ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам сонли популяцияси табиатда жуда оз учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда усимликнинг ҳолати ва сони махсус ўрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [11, 177, 178].

И.В. Белолипов.

Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Полукустарник, образующий плотные полушаровидные подушки до 10–12 см в диаметре. Листья зеленовато-сизые, плоские, ланцетные, длиной 2–5 мм, шириной 0,5–1,5 мм. Цветоносы значительно превышают листья, высотой 4–5 см, простые, голые. Колоски

одноцветковые. Чашечка пурпурная, лепестки розовые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, бассейн реки Тупаланг.

Места обитания. Крутые каменистые и скалистые склоны среднего пояса гор.



Численность. Немногочисленные популяции встречаются крайне редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Состояние популяций и их численность не исследовались.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [11, 177, 178].

И.В. Белолипов.

Rare species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range, the Tupalang valley (Surkhandarya region). Inhabits steep stony and rocky slopes in the middle belt of mountains. Not numerous, population is extremely rare. Limiting factors: population state and their number was not investigated. Measures of protection: not protected.



113. ЕКАТЕРИНА КИРПИЎТИ

Акантолимон Екатерины / *Acantholimon ekatherinae* (B. Fedtsch.) Czerniak.

Мақоми 2. Чотқол тизмасига хос камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ерга ёпишиб ўсадиган, диаметри 15–40 см орасидаги ёстиқсимон, шохчалари бироз кўтарилиб ўсувчи ярим бута. Барги ясси, наштарсимон ёки учли наштарсимон, узунлиги 2 см, эни 4 мм. Гулпояси 5–20 см, баргидан узун. Гуллари, 3–8 тадан сийрак жойлашиб, бошоқча ҳосил қилади. Косачаси пушти ёки қирмизи. Тожбарглари пушти рангли. Июль–сентябрь ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасининг Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Инсон омили таъсирида ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли пайхон бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1962 йилдан бери муваффақиятли ўстирилмоқда. Экилганидан уч йил ўтиб, гуллайди, уруғ беради. Уруғидан униб чиқиши кузатилмаган. Нам шароитда яхши ўсади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угам-Чотқол миллий табиат боғининг ҳудудида жойлашган.

Манбалар. [11, 177, 178].

И.В. Белוליпов.

Статус 2. Редкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Подушковидный полукустарник с распростертыми и слегка поднимающимися ветвями 15–40 см в диаметре. Листья плоские, ланцетные или линейно-ланцетные, длиной до 2 см и шириной 4 мм. Цветonoсы превышают листья, высотой 5–20 см. Цветки в редких 3–8-колосковых колосьях. Чашечка розовая или пурпурная. Лепестки розовые. Цветёт в июле–сентябре, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет – Большой Чимган.

Места обитания. Горные склоны субальпийского и альпийского поясов.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Антропогенное воздействие: вытаптывается человеком и скотом.

Культивирование. С 1962 года успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз. Цветёт и плодоносит на 3-м году жизни. Самосева не отмечено. Положительно реагирует на подпитывающий умеренный полив.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [11, 177, 178].

И.В. Белוליпов.

Rare endemic species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range: the Great Chimgan mt. (Tashkent region). Inhabits mountain slopes of the subalpine and alpine belts. The quantity is unknown. Limiting factors: anthropogenic press. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



114. МАРГАРИТА КИРПИЎТИ

Акантолимон Маргариты / *Acantholimon margaritae* Korovin et Lincz.

Мақоми 2. Курама тизмасига мансуб камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Диаметри 25–50 см ора-сидаги бута. Ер усти қисми ярим шарсимон ғовак ёстиқча ҳосил қилади. Барглари яшил, деярли текис, узун бигизсимон, узунлиги 2–4 см, эни 1–2 мм. Гулпоясининг узунлиги 10–15 см. Бошоқчаси якка-якка жойлашган гуллардан ташкил топган. Косачаси қирмизи, тожбарги пуштиранг. Июль–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама тизмасида Оҳангарон дарёсининг чап томонида тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги арчазорларда, қояларда, тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Бутун ареали бўйлаб саноқли даражада ўсади ва жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда жуда кам тарқалган. Тупларининг ҳолати ва сони махсус ўрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1963 йилдан бошлаб ўстириб келинмоқда. Экилгандан сўнг иккинчи йили гуллаб, уруғ берган, боғ шароитида уруғидан кўпайиши кузатилмаган. Саккиз-тўққиз йилдан сўнг табиий қурий бошлаган ва 15-йилга келиб барчаси қуриб кетган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [11, 177, 178].

И.В. Белолипов.

Статус 2. Редкий эндемик Кураминского хребта.

Краткое описание. Кустарник, имеющий форму рыхлой полушаровидной подушки 25–50 см в диаметре. Листья зелёные, линейно-шиловидные, длиной 2–4 см, шириной 1–2 мм. Цветоносы длиной 10–15 см. Колоски в одноцветковых колосьях. Чашечка пурпурная, лепестки розовые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. Ташкентская область: Кураминский хребет – левобережье реки Ахангаран.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор, скалы, среди арчовников.

Численность. В пределах ареала растёт единичными экземплярами и встречается крайне редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Встречаются малочисленные особи в нескольких популяциях. Их состояние и численность не исследовались.


Культивирование. С 1963 года успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз. Цветёт и плодоносит на 2-м году жизни. Самосева не наблюдалось. Естественное отмирание отмечено на 8–9 году выращивания, массовое – на 15-м.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [11, 177, 178].

И.В. Белолипов.

Rare endemic species of the Kurama range. It is spread at the Kurama range: the left bank of the Akhangaran river (Tashkent region). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains, rocks, among juniper stands. Solitary specimens can be found within the distribution area. Limiting factors: not numerous specimens in several populations. Their state and number were not investigated. Measures of protection: not protected.



115. НУРОТА КИРПИЎТИ

Акантолимон нуратинский / *Acantholimon nuratavicum* Zakirov

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Диаметри 20 см келадиган, яримшар шаклидаги поялари жуда тиғиз ёстиқча ҳосил қилувчи ярим бута. Барглари кўкимтир-яшил, уч қиррали, чўзиқ наштарсимон ёки деярли бигизсимон, узунлиги 0,5–1 см, эни эса 0,5–1 мм, қисқа ва қалин туклар билан қопланган. Гулпояси баргидан узунроқ, баландлиги 10–15 см. Гуллари бошоқсимон тўпгул ҳосил қилади. Косачабарги қалин тукли, пушти рангли, тожбарги ҳам пушти рангли. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли ва шағалли қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Кичик популяциялар (20–30 тадан 100–200 тупгача) ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатан камёб эндемик тур. Чорва боқиладиган ерларда ўсганлиги туфайли оёқости бўлиб, камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқ-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [11, 177, 178, 208].

Н.Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукустарник, образующий плотные, довольно высокие полушаровидные подушки до 20 см в диаметре. Листья зеленовато-сизые, плоско-трёхгранные, узколинейно-ланцетные или почти шиловидные, длиной 0,5–1 см, шириной 0,5–1 мм, густо и очень короткоопушенные. Цветоносы значительно превы-

шают листья, высотой 10–15 см. Цветки в колосовидных соцветиях. Чашечка густоопушенная, розовая, лепестки розовые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Жиззакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Каменистые и щебнистые сухие склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически. Образует локальные популяции численностью от 20–30 до 100 и более растений. Общая площадь распространения около 10 тыс. га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий, узкоэндемичный вид. Страдает от чрезмерного выпаса скота из-за вытаптывания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [11, 177, 178, 208].

Н.Ю. Бешко.

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony dry slopes in the middle belts of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: endemic stenotopic species. Trampling down because of the overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



116. ДЕЯРЛИ СУЛИСИМОН КИРПИЎТ

Акантолимон почтновсовый / *Acantholimon subavenaceum* Lincz.

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Диаметри 30–40 см гача етадиган, яримшар шаклидаги тиканли ёстиксимон ярим бута. Барглари яшил, ясси уч қиррали, энсиз қалами – бигизсимон, узунлиги 1,5–2,5 см, эни эса 1 мм га яқин, жуда қисқа тукли. Гулпояси баргидан узун, бўйи 10–15 см, туксиз, оддий ёки камшоҳ. Гуллари сийрак бошоқсимон тўпгул ҳосил қилади. Бошоқчалар 1 гулли. Гулён-баргчали туксиз. Косачаси сийрак тукли, пушти рангли, қирмизи томирли, гултожи ҳам пушти рангли. Июлда гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасининг марказий қисмида тарқалган (Сентобсой, Устуксой).

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли, қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кичик майдонда (тахминан 20–25 км²) тарқалган. Якка ҳолда, баъзан кичик тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг умумий сони ва тўпларининг ҳолати махсус ўрганилмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Нурота қўриқхонасидаги химоя майдонида ўсади.

Манбалар. [11, 177, 178].

Н.Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Колочий подушковидный полукустарник. Подушки довольно плотные, высокие, полушаровидные подушки до 30–40 см в диаметре. Листья ярко-зеленые, плоско-треугольные, узколинейно-шиловидные, длиной 1,5–2,5 см, шириной около 1 мм, очень коротко опушенные. Цветоносы голые, простые или в верхней половине коротко ветвистые, значительно превышают листья, высотой 10–15 см. Цветки в редких колосовидных соцветиях. Колоски 1-цветковые. Прицветники голые. Чашечка 10–11 мм длины, воронковидная, розовая, с темно-пурпурными жилками. Лепестки розовые. Цветёт в июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: центральная часть хребта Нуратау (Сентабсай, Устуксай).

Места обитания. Каменистые сухие склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, немногочисленными популяциями. Площадь распространения примерно 20–25 км².

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий стенотопный вид. Угрозу представляет чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Произрастает в буферной зоне Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [11, 177, 178].

Н.Ю. Бешко.



Rare endemic species of the Nuratau ridge. It is spread at the central part of the Nuratau ridge: Sentaabsay, Ustuksay (Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony dry slopes in the middle mountain belt. Single specimens or small populations occur sporadically. Distribution area is about 20–25 км². Limiting factors: overpasturing. Endemic stenotopic species. Measures of protection: grows in buffer zone of the Nuratau state reserve.



117. ТУХУМОЁҚ ИЛДИЗБОШ, ЦЕФАЛОРИЗУМ

Корнеглав яйценогий / *Cephalorhizum oopodum* Popov et Korovin

Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, 40–60 см баландликдаги йўғон илдизли, тухумсимон каудексга ўтувчи ўсимлик. Барча барглари илдиз бўғзида жойлашган, бандли, серэт, ромбсимон, узунлиги 5–15 см, эни 1,5–2,5 см. Гулбанди 2–4 та, тўғри, шохланган, тўпгули бир томонлама жойлашган 5–15 гулли. Косачаси қалин тукли, узунлиги 7–8,5 мм, найчаси ўтсимон, қобирғали, юпқа, қўқимтир, кейинроқ оқарувчи қайтариқли. Гултожи қизил-бинафша рангли.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шерабод тепаликларида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола жинсли паст тоғлардаги бўз тупроқларда ўсади.

Сони. 2009 йили 13 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларнинг қисқариши ва молларнинг боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [179, 180, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетник 40–60 см высоты с толстым корнем, переходящим в яйцевидный каудекс. Листья все прикорневые, черешковые, мясистые, сизые, ромбические, 5–15 см длины, 1,5–2,5 см ширины. Цветоносы 2–4, прямые, ветвистые с односторонними 5–15-цветковыми соцветиями. Чашечка густо опушенная, 7–8,5 мм длины, трубка ее травянистая, ребристая, с перепончатым синеющим, позже белеющим отгибом. Лепестки красновато-фиолетовые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана – Туркменистан.

Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 13 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [179, 180, 310].

Ф.О. Хасанов.



Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (Surkhandarya region). Inhabits grey clays in variegated low mountains. 13 plants were registered in 2009. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



КЕЛИНСУПУРГИДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТИМЕЛЕЕВЫЕ – ТНУМЕЛАЕАСЕАЕ

118. АЛЬБЕРТ ҚИСРОНИ

Викстремия Альберта (рестелла Альберта) / *Wikstroemia alberti* (Regel) Domke
(= *Restella albertii* (Regel) Pobed.)

Мақоми 3. Помир-Олой ва Ғарбий Тянь-Шань тоғларида учрайдиган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1,5 м га етадиган бута. Эскирган шохлари қўнғир, кулранг, ёш новдалари ётиқ тукли. Барглари наштарсимон, 1,5–3 см узунликда, эни эса 0,5–1,5 см, асоси понасимон, учи тўмтоқ, ҳар икки томони тукли, пастдагилари бандсиэ. Гуллари 5–13 тадан соябонсимон бошча тўпгул ҳосил қилади. Гулбанди 1,5 см яшил, ётиқ тукли. Тожбарглари сариқ. Ёнғоқ мевали, қуриган гулқўрғон бўлаклари билан ўралган. Июнь–июль ойда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган ва Сурхондарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань (Чотқол, Писком, Қурама тизмалари) ва Помир-Олойда (Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағри, Бойсун тоғлари)да тарқалган. Тожикистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Арчазорлар орасида, сернам ва юмшоқ тупроқларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, кичик тўплар ҳосил қилади.

шириной 0,5–1,5 см, клиновидные при основании, тупые на вершине, с обеих сторон волосистые, короткочерешковые, нижние сидячие. Цветки по 5–13 в головчато-зонтиковидных соцветиях. Цветоносы длиной до 1,5 см, зелёные, прижатоспущенные. Венчик жёлтый. Плод-орешек, заключен в остающийся засохший околоцветник. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань (Пскемский, Чаткальский, Кураминский хребты); Памиро-Алай (южный склон Гиссарского хребта, Байсунские горы). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мягкие увлажненные субстраты, в арчовниках.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [205, 239].

Р.И. Казакбаев.

Rare species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the western Tien-Shan: the Pskem, the Chatkal, the Kurama ranges; the Pamir-Alay: the southern slopes of Hissar range, the Baysun mountains (Tashkent, Namangan, Surkhandarya regions). Inhabits soft wet substrates, in the juniper stands. The quantity is unknown. Measures of

protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Чотқол давлат биосфера қўриқхонаси ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [205, 239].

Р.И. Қозоқбоев.

Статус 3. Редкий вид Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Кустарник высотой до 1,5 м. Старые побеги буро-серые, молодые прижатоопушенные. Листья ланцетные, длиной 1,5–3 см и



119. РОЗАНОВ КОВУЛИ

Каперцы Розанова / *Capparis rosanowiana* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган серпоя ва сертикан кўп йиллик ўт. Пояси ер бағирлаб ўсади. Барглари чўзиқ, наштарсимон. Гуллари барг қўлтиғида биттадан ўрнашган, тўғри, сариқ рангли, кўп чангчили. Меваси кўсақдай, наштарсимон, узунлиги 30 см га етади, кўнғир рангли, кўндаланг томирли. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: фақат Боботоғда ўсади. Асосан, Жанубий Тожикистонда тарқалган. Мавжуд гербарийларга қараганда, бу тур илгари Оқтоғ ва Хўжақозиёнда ҳам ўсган.

Ўсиш шароити. Очилиб қолган ола жинсларда, баъзан оҳақтошларда ва нураган қум тошларда ўсади.

Сони. Табиатда онда-сонда якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг камайишига у ўсадиган ерларнинг ҳар хил мақсадлар учун ўзлаштирилиши сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида экиб ўстириш учун қилинган ҳаракат натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [159, 262].

Т.Т. Раҳимова.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с многочисленными простертыми, колючими побегами длиной до 1 м. Листья продолговато-ланцетные. Цветки в пазухах листьев одиночные, правильные, жёлтые, многотычиночные. Плод – коробочка, ланцетной формы, длиной до 30 см, бурый, с продольными жилками. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: встречается только в горах Бабатаг. Основная часть ареала находится в Южном Таджикистане. Сборы свидетельствуют о том, что этот вид раньше произрастал также на Актау и Ходжа-Казиианне.

Места обитания. Обнажения пестроцветных толщ, изредка известняки и разрушенные песчанники.

Численность. Встречается спорадически единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозкультуры.

Культивирование. Попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУз оказались неудачными.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 262].

Т.Т. Раҳимова.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Babatag range (Surkhandarya region). Inhabits the outcrops of variegated beds and gypsaceous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: reclamation of area under crops. Measures of protection: not protected.



120. ГОРДЯГИН КЛЕОМАСИ

Клеоме Гордягина / *Cleome gordjagini* Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойнинг ўта камёб, реликт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Поялари 50–120 см баландликдаги, сарғиш момиқ тукли бир йиллик ўт ўсимлик. Барглари тухумсимон, момиқ тукли, узунлиги 4–5 мм, эни 3–3,5 мм. Косачабарглари ланцетсимон, 3 таси бир хил, 4-си йирикроқ, 7 мм гача. Чангчилари 6 та. Қўсаги 25–50 мм узунликда, эни 1,5–2 мм, ўткир бурунчали, безли туклари бор. Августда гуллаб, сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё: Келиф-Шеробод тепаликлари. Ўзбекистондан ташқарида: Туркменистон (Копетдоғ).

Ўсиш шароити. Гипсли ёнбағирликлар.

Сони. 2009 йилда 20 тупи топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўп боқилиши, турнинг реликтлиги ва ола жинсли майдонларнинг қисқариб бориши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [262, 310].

Т.Т. Раҳимова.

Тычинок 6. Коробочка 25–50 мм длины, 1,5–2 мм ширины, железистые, с острым носиком. Цветет в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана: Туркменистан (Копетдаг).

Места обитания. Гипсированные склоны.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас, реликтовость вида и сокращение пестроцветов.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [262, 310].

Т.Т. Рахимова.

Rarest relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (Surkhandarya region). Inhabits the gypseous slopes. 20 plants were found in 2009. Limiting factors: relict species, decreasing of the gypseous habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



Статус 1. Редчайший реликтовый вид Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетник с желтоватыми, войлочно-опушенными стеблями, 50–120 см высоты. Листья яйцевидные, войлочно-опушенные, 4–5 см длины. Чашелистики ланцетные, 3 одинаковые, 4-й крупнее до 7 мм длины. Лепестки желтые, 6–8 мм длины, 3–3,5 мм ширины.



121. ЛЮДМИЛА БОЙЧЕЧАГИ

Гусиный лук Людмилы / *Gagea ludmilae* Levichev

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги кичик майдонларда тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик пиёзли ўсимлик. Пиёзининг диаметри 6–8 мм, ёш пиёзчаларидан 4–6 та, узунлиги 1–5 см келадиган, учида биттадан пиёзчалар ўрнашган поячалар ўсиб чиқади. Илдизолди барги новсимон, учи ўткирлашган. Поядаги барглари тўпгулининг пастки қисмида ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулкўрғонининг узунлиги 10–15 мм. Уруғи ясси. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: фақат бир жой (Паркент шаҳрининг жануби-шарқий қисми)да ўсиши маълум.

Ўсиш шароити. Соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик майдонда тарқалган, ёш ниҳоллар ҳисобига кўпдек туюлади. Гуллаб турган туплари ниҳоятда сийрак.

Кўпайиши. Асосан, вегетатив равишда кўпаяди, уруғидан кўпайиши кам кузатилади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари.

Бу тур ўсиб турган ерлар (адир)да узлуксиз равишда деҳқончилик қилиниши ва чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда. У, асосан, вегетатив усул билан кўпайиши ҳисобига сақланиб қолмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Унинг тарқалишини ва экма шароитда биологик хусусиятларини ўрганиш зарур.

Манбалар. [160].

И.Г. Левичев.

Статус 1. Редкий, узкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение. Луковица 6–8 мм в диаметре, у ювенильных особей от луковицы отходят 4–6 стволов длиной 1–5 см с одиночными вегетативными луковичками на конце. Прикорневой лист желобчато-угловатый, постепеннозаостренный. Стеблевые листья собраны в мутовку у основания соцветия. Листочки околоцветника длиной 10–15 мм. Семена плоские. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ташкентская область: отмечен в 1 точке к юго-востоку от города Паркент.

Места обитания. Глинистые травянистые склоны.

Численность. Встречается на небольшом участке, где довольно обилён за счёт множества ювенильных особей; генеративные растения очень редки.

Размножение. В основном – вегетативное, в меньшей степени – семенное. Причины изменения численности и ареала. Произрастает в интенсивно эксплуатируемой адырной зоне (богарное земледелие и выпас). Сильно стравливается скотом. Только высокая эффективность вегетативного размножения спасает вид от уничтожения.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимы уточнение распространения и изучение биологических особенностей в культуре.

Источники. [160].

И.Г. Левичев.

Rare, endemic species of the Chatkal range. It is spread at the 1 point to the south-east from Parkent (Tashkent region). Inhabits clayish grassy slopes. Grows on a small area. Limiting factors: grows in the intensively used foothill zone rainfed crops and pastures. Damage caused by pasturing cattle. Measures of protection: not protected.



122. ХОЛМОН ИСИРҒАГУЛИ

Рябчик Эдуарда / *Fritillaria eduardii* Regel

Мақоми 1. Ўзбекистонда камайиб бораётган ва ареали ажралган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пояси баргли, 40–80, баъзан 150 см га етадиган пиёзли, кўп йиллик ўт. Барглари ялтирок, яшил, пастки барглари кенг чўзиқ, баъзан пояда ҳалқа ҳосил қилиб жойлашади. Поянинг энг юқори қисмидагилари наштарсимон, ҳалқа шаклида ўрнашган. Гуллари кўнғироқсимон, пастга қараб осилиб туради, қизғиш, қирмизи-кўнғир рангли, 2–8 тадан бўлиб, соябонсимон тўпгул ҳосил қилади. Меваси юқорига қараб тик турувчи, қисқа бандли, эни 4–5 см, энсиз қанотчали қутичага ўхшайди. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади. Ажойиб, хушманзара ўсимлик.



Тарқалиши. Сурхондарё, Фарғона вилоятлари: Боботог, Ҳисор, Олой (Сўх дарёсининг ҳавзаси) тизмаларида тарқалган. Тожикистонда, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2100 м баландликда дарахт ва бугалар орасида, баъзан сернам тошли ҳамда оҳақтошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Ўзбекистонда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ғоят чиройли, гуллаган пайтида маҳаллий

халқ томонидан териб олинади, пиёзлари эса қазиб олиниб, истеъмол қилинади. Шу сабабли, кескин камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилган. Кўплаб ботаника боғларида, жумладан, ЎЗР ФА Ботаника боғида 1955 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. У кенг тарқалган жойларда буюртмаҳоналар ташкил этиш зарур. Манзарали боғдорчилик хўжаликларида кўплаб экиб ўстирилиши лозим.

Манбалар. [187].

А.Х. Шарипов.

Статус 1. Редкий в Узбекистане вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение с облиственным стеблем высотой обычно 40–80 см, реже 150 см. Листья зелёные, блестящие; самые нижние иногда почти мутовчатые, широко-продолговатые; самые верхние – мутовчатые, ланцетные. Цветки колокольчатые, кирпично-или пурпурно-коричневые, поникшие, собраны по 2–8 в зонтичковидное соцветие. Плод – вверх торчащая коробочка на короткой ножке, шириной 4–5 см, с узкими крыльями. Цветёт в апреле, плодоносит в мае. Весьма декоративен.

Распространение. В Сурхандарьинской и Ферганской областях: Хребты Бабатаг, Гиссарский, Алайский; долина реки Сох. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Среди кустарников под деревьями. Реже на каменистых, сырых россыпях известняка в среднем поясе гор, до 2100 м.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор растений на букеты и заготовка населением луковиц для употребления в пищу.

Культивирование. Введён в культуру. Интродуцирован многими ботаническими садами. С 1955 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходима организация заказников в местах массового распространения, массовое размножение в хозяйствах декоративного садоводства.

Источники. [187].

А.Х. Шарипов.

Rare endemic species of Uzbekistan with the disjunctive area. It is spread at the Babatag, the Hissar, the Alay ranges; the Sokh river valley (Surkhandarya and Fergana regions). Grows under shrubs and trees, woodlands rarely on the wet chalkstone fields in the middle belt of mountains, up to 2100 m.s.l.. The quantity is unknown. Limiting factors: picking of flowers and collecting of bulbs used in food. Measures of protection: it is necessary to create state reserves in places of mass distribution, mass reproduction in ornamental gardening.



123. ВВЕДЕНСКИЙ ЛОЛАСК

Тюльпан Введенского / Tulipa vvedenskyi Botschantz.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шанда ўсувчи кам-ёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–35 см га етадиган кўп йиллик, пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2–3 см, тўқ-кўнғир рангли, қобиги қоғозсимон. Барглари 3–4 та, эгри-бугри. Гуллари биттадан, қизил рангли. Гулининг туби сариқ, чангчи иплари сариқ ёки кўнғир, чангдонлари сариқ ёки қорамтир-бинафша рангли. Апрель-май ойларида гуллаб, июнь-июлда меваси етилади.

Тарқалиши. Курама ва Чотқол тизмаларида, асосан, Оҳангарон дарёси водийсида ўсади (Тошкент, Наманган вилоятлари).

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1600–2000 м баландликда туб жинсларда, шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кичик гуруҳлар ҳосил қилган ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва пиёзлари кўплаб йиғиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Чотқол давлат биосфера кўриқхонаси ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Табиатда ўсиб турган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 288, 291, 338].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 20–35 см. Луковица яйцевидная, 2–3 см в диаметре, с темно-коричневыми бумагообразными чешуями. Листья в числе 3–4, зеленоватые, волнистые. Цветок одиночный, красный. Центр цветка желтый; тычиночные нити желтые или коричневые, пыльники желтые или черно-фиолетовые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Кураминский и Чаткальский хребты, главным образом, бассейн реки Ахангаран (В Ташкентской и Наманганской областях).

Места обитания. Выходы коренных пород и мало-мощные щебнистые почвы в среднем поясе гор, на высоте 1600–2000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается спорадически, в виде небольших популяций.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.



Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Некоторые популяции охраняются на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка. Необходим контроль за численностью.

Источники. [50, 60, 288, 291, 338].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama and Chatkal ranges, mainly in the Akhangaran river basin (Tashkent and Namangan regions). Inhabits outcrops of bed rocks and weak soils in the middle belt of mountains, at a height of 1600–2000 m. Single specimens and small populations occur sporadically. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



Мақоми 3. Гарбий Помир-Олойга хос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, қора-кўнғир чарсимон қобигининг ички томони ётиқ туплар билан қопланган. Барглари 3–4 та, йўл-йўл бинафша доғли. Гули якка, йирик, диаметри 10 см гача бўлиб, қизил рангдан тўқ пушти ранггача. Ўзига хос қадахсимон шаклда. Гулининг туби қора, сариқ гардишли, баъзан гардишсиз. Чангчи иплари қора, чангдонлари бинафша рангли, баъзан сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Нурота тоғлари, Писталитоғ, Молгузар, Зарафшон, Кўхитанг, Ҳисор тизмаларида тарқалган (Жиззах, Навоий, Самарқанд, Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари). Тожикистон ва Туркменистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғолди текисликлари ва адирлардаги тошли ва соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кам, якка ҳолда ва кичик туплар ҳолида учрайди. Нурота тизмасининг тоғолди текисликларида бир гектар майдонда туплар сони бир нечадан 100–200 донагача етади. Шунингдек, Нурота тизмасидаги Устуксойнинг юқори қисмида (1600 м) ҳам ўсиш жойи маълум.



Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ва ўсимлик гулининг териб олиниши сабабли камаймоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Сурхон давлат қўриқхоналарида муҳофаза қилинади. Табиатда ўсиб турган жойлари қатъий назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 339, 357].

А.Х. Шарипов.

Статус 3. Редкий вид Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 20–30 см. Луковица яйцевидная с кожистыми, чёрно-бурыми, с внутренней поверхности прижатоволо-

систыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4, сизые, с полосатыми антоциановыми пятнами. Цветок одиночный, от ярко-красного до тёмно-малинового, очень крупный, до 10 см в диаметре, оригинальной бокаловидной формы. Центр цветка чёрный с жёлтым окаймлением, иногда без него. Тычиночные нити чёрные, пыльники фиолетовые, изредка жёлтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Нуратинские горы; хребты Писталитау, Мальгузар, Зеравшанский хребет; Кугитанг, Гиссарский (Джизакская, Самаркандская, Навоийская, Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Подгорные равнины, каменистые и глинистые склоны предгорий и нижнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями. На подгорной равнине Нуратау, обилие от нескольких экземпляров на гектар до 100–200 на га. Известно также одно местообитание в среднегорье Нуратау, в верховьях Устук-сая, на высоте 1600 м.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов, выпас.

Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурханском заповедниках. Необходим строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 339, 357].

А.Х. Шарипов.

Rare species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau mountains; the Pisticalitau, the Malguzar, the Zeravshan, the Hissar, the Kughitang ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi, Kashkadarya, Surkhandarya regions). Inhabits stony and clayish slopes of the submontane zone and lower belt of mountains. Single specimens and small

populations can be found. Limiting factors: picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau

and Surkhan state nature reserves. Monitoring of populations is necessary.



125. ФАРҒОНА ЛОЛАСИ, ЖАВҒАЗА ЛОЛА

Тюльпан ферганский / *Tulipa ferganica* Vved.

Мақоми 2. Фарғона водийсининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, қобиғи қорамтир-кўнғир, қаттиқ-чармсимон, ички томонининг юқори қисми ва асоси ётиқ тукли. Барглари тукли, юқори қисмидагилари эгри-бугри. Гули якка, сариқ, ташқи томони кўкимтир-пушти рангли, гул туби сап-сарик. Чангчи иплари қизғиш-сарик, чангдони қизғиш рангли. Апрель–май ойлариди гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Чотқол, Фарғона, Олой тизмаларининг пастки қисмида тарқалган (Фарғона, Наманган ва Андижон вилоятлари). Қирғизистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Адир ва тоғлардаги тошли ва майда зарра тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва пиёзлари йиғиб олинishi ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормокда. Илгари Фарғона шаҳри атрофларида ўсганлиги маълум.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди. Табиатда ўсиб турган тупларини қатъий назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 292, 340].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–50 см. Луковица яйцевидная, с черно-коричневыми, крепкими, кожистыми,

с внутренней стороны у вершины и при основании прижатоволосистыми покровными чешуями. Листья сизые, пушистые, верхние – курчавые. Цветки в числе 1–3, жёлтые, снаружи сизовато-розоватые, центр ярко-жёлтый. Тычиночные нити оранжево-жёлтые, пыльники оранжевые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Чаткальский, Ферганский и Алайский хребты (Наманганская, Андижанская и Ферганская области).

Места обитания. Каменистые и мелкоземистые склоны, от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и луковиц, выпас. Ранее растение произрастало в окрестностях г. Фергана.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1957 года.

Меры охраны. Не охраняется. Необходимо строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291, 292, 340].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Chatkal, Ferghana and Alay ranges (Namangan, Andijan and Fergana regions). Inhabits stony and fine earth slopes, from foothills to the middle belt of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: not protected. Monitoring of populations is necessary.



126. ЛЕМАН ЛОЛАСИ, ЖОВҚОСИН ЛОЛА
Тюльпан Леманна / *Tulipa lehmanniana* Mercklin ex Bunge

Мақоми 3. Ўзбекистондаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5–4 см. Қобиғи чармсимон, қорақўнғир, ер юзасигача давом этади. Барглари 3–4 та, эгри-бугри. Гули якка, сариқ, тўқ сариқ ёки қизил, туби қора, жигарранг доғли. Чангчи иплари, чангдонлари сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Бухоро, Навоий вилоятлари: Нурота тоғларининг тоғолди текисликлари; Қизилқумда: Конимех чўлида, Қулжуктоғ, Букантоғ, Оқтоғ, Томди ва Дарвоза қолдиқ тоғларида, Жануби-шарқий Қизилқумда тарқалган. Қозоғистон, Туркманистон, Тожикистон, Афғонистон, Покистон ҳамда Эронда учрайди.

Ўсиш шароити. Қумли чўлларда, қолдиқ тоғларда, қумли, тош-шағалли ёнбағирларда, ола жинслари ер юзасига чиқиб қолган жойларда ўсади.

Сони. 2014 йилда Қизилқум худудида қайд этилган 8 та ценотик популяциясида 4000 туп атрофида борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиезидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари териб олиниши ва чорва молларининг боқилиши сабабли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди. Ўсиб турган жойлари назорат қилинмоғи лозим.

Манбалар. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий вид в Узбекистане.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–25 см. Луковица яйцевидная, 1,5–4 см в диаметре, с крепкими, кожистыми, черно-бурыми, до поверхности земли продолженными покровными чешуями. Листья в количестве 3–4, курчавые. Цветок одиночный, желтый, оранжевый или красный, с черно-коричневым пятном в центре. Тычиночные нити и пыльники желтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.



Распространение. В Джизакской, Бухарской, Навоийской областях: подгорная равнина Нуратинских гор; Кызылкумы: Канимехчуль, горы Дарбаза, Тамдытау, Актау, Кульджуктау, Букантау, Юго-восточный Кызылкум. За пределами Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Иран.

Места обитания. Опесчаненные каменисто-щебнистые склоны и выходы пестроцветных пород в останцовых низкогорьях, песчаные и супесчаные равнины.

Численность. В 2014 г. в пределах 8 ценооточеских популяций отмечено около 4000 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас.


Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется. Необходим контроль за состоянием популяций.


Источники. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев.

Nuratau mountains, the Kyzylkum: the Kanimekhchul, the Darbaza, the Tamdytau, the Aktau, the Bukantau, the Kuldjuktau relict mountains (Jizzakh, Navoi and Bukhara regions). Inhabits sandy stony slopes and gypseous rocks in remnant hills, sand and sandy-loam deserts. Single specimens and small populations can be found. Reasons of decreasing: mass picking of flowers and pasturing. Measures of protection. Do not protected. Monitoring of populations is required.



Very rare species of Uzbekistan with the reducing area. It is spread at the piedmont plains of the



127. КОРОЛЬКОВ ЛОЛАСИ

Тюльпан Королькова / *Tulipa korolkowii* Regel

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги ареали ажралган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2,5 см, қобиғи ички томонининг юқори қисми сертук. Барглари 3 та, эгри-бугри. Гули якка, қизил, туби қора. Чангчи ипларининг пастки қисми қора, юқори қисми эса қизил. Баъзан чангчи иплари қора ёки қизил. Чангдони сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Жиззах, Самарқанд, Навоий, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Курама тизмасида (Абжассой, Кендирдовон), Нурота тоғлари, Писталитоғ, Кўхитанг, Бойсун, Боботоғда, Туркистон, Молгузар, Зарафшон, Ҳисор тизмаларида тарқалган. Қозоғистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қум-шағалли ҳамда тошли енбағирларда ва ола жинсли ерларда ўсади.

Сони. Табиатда тўп-тўп бўлиб ва якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёздан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари узиб ва пиёзлари қазиб олинishi ҳамда чорва молларининг боқилиши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Нурота, Зомин, Китоб, Ҳисор, Сурхон давлат қўриқхоналарида ва Зомин миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [50, 60, 291, 341, 357].

А.Х. Шарипов.



Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с разрозненным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–20 см. Луковица яйцевидная, до 2,5 см в диаметре, с внутренней стороны у верхушки с волосисто-шерстистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3, очень курчавые. Цветок одиночный, красный, центр цветка черный. Тычиночные нити внизу черные, вверху ярко-красные, иногда все тычиночные нити целиком черные или красные. Пыльники желтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Ташкентской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Кураминский хребет (Абжассай, Кендырдаван), Нуратинские горы, хребты Писталитау, Байсунтау, Бабатаг, Кугитанг, Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский. За пределами Узбекистана: Казахстан и Таджикистан.

Места обитания. Щербнистые, каменистые склоны и выходы пестроцветов.

Численность. Встречается немногочисленными популяциями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.


Культивирование. С 1956 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском, Зааминском, Китабском, Гиссарском и Сурханском заповедниках, Зааминском национальном парке.

Источники. [50, 60, 291, 341, 357].

А.Х. Шарипов.

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan and Pamir-Alay with the disjunctive area. It is spread at the south-western Tien-Shan: Kurama range, the Pamir-Alay: the Nuratau, the Baysuntau and Babatag mountains, the Pisticalitau, the Malguzar, the Turkestan, the Zeravshan, the Kughitang and Hissar ranges (Tashkent, Jizzakh, Samarkand, Navoi, Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits stony slopes and outcrops of gypseous rocks. Not numerous populations, single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Zaamin, the Nuratau, the Kitab, the Hissar and Surkhan state reserves and the Zaamin national park. It is necessary to control number and to extend area of this cultivation.



128. ҚАРДОШ ЛОЛА, НУРОТА ЛОЛАСИ

Тюльпан родственный / *Tulipa affinis* Botschantz.

Мақоми 3. Фарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–25 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи чўзиқ-тухумсимон, диаметри 2–4 см. Қобиғи қоғозсимон, узун, тўқ кўнғир рангли. Барглари 3 тагача, кўкимтир, сал эгри-бугри. Гули якка, қизил, туби қора, оч сарик хошияли. Чангчиларининг ипи қора, чангдонлар билан бириккан жойи оқ. Чангдонлари қора бинафша ранг. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Туркистон ва Молғузар тизмалари, Нурота тоғларида тарқалган. Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Майда зарра тупроқли, шағалли ва тошли ёнбағирларда, дараларда ва қояларнинг ёриқларида, бутазор ва арчазорлар орасида, тоғларнинг пастки ва ўрта қисмида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва тўп-тўп бўлиб тарқалган. Баъзан бир неча юзлаб ўсимликдан иборат популяциялар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари кўплаб терилиши ва чорва моллари боқилиши ареалининг қисқариб кетишига олиб келган.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Зомин ва Нурота кўриқхоналарида ҳамда Зомин миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–25 см. Луковица продолговато-яйцевидная, 2–4 см в диаметре, с бумагообразными темно-коричневыми длинными чешуйками. Листья (3) сизые, слабоволнистые. Цветок одиночный, красный, центр цветка чёрный с ярко-жёлтым окаймлением. Тычиночные нити чёрные, в местах соединения с пыльниками белые. Пыльники черно-лиловые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Туркестанский, Мальгузар; Нуратинские горы. За пределами Узбекистана: Кыргызстан и Таджикистан.

Места обитания. Произрастает на каменистых, щебнистых и мелкоземистых склонах нижнего и среднего пояса гор, в ущельях, на скальных карнизах, среди кустарников и арчовников.

Численность. Встречается единично или небольшими группами, иногда образует популяции по несколько сотен растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выпас.

Культивирование. С 1957 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на Заминском и Нуратинском заповедниках, Зааминском национальном парке.

Источники. [50, 60, 291, 357].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Turkestan and Malguzar ranges; the Nuratau mountains (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits fine earth, gravelly and stony slopes, rock ledges, among shrubs and the juniper stands, in the lower and middle mountain belts. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Zaamin nature reserves, the Zaamin national park. It is necessary to control the state of populations and pasturing.



129. ФОСТЕР ЛОЛАСИ

Тюльпан Фостера / *Tulipa fosteriana* Irving

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–50 см га етадиган кўп йиллик, пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2–6 см, қобиғи қорамтир-кўнғир, чармсимон, ички томони қалин, тўғри, қаттиқ, тилларанг туклар билан қопланган. Барглари 3–5 та, бироз эгри-бугри, кўкимтир ёки яшил рангли. Гуллари ялтироқ, қизил, якка, йирик, диаметри 10–12 см, туби қора, сариқ хошияли ёки сариқ. Чангчи иплари тўқ қизил ёки сариқ. Чангдони қорамтир-бинафша рангли. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасидаги Омонкўтон ўрмон хўжалигида, Тахтақорача доvonида, Ургут, Оталиқ қишлоқлари атрофларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги майин тупроқли ёнбағирларда ва қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёзларининг кўп миқдорда йиғиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1957 йилдан буён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Китоб давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатда ўсиб турган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Статус 2. Очень узкий редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–50 см. Луковица яйцевидная, 2–6 см в диаметре. Покровные чешуи черно-бурые, кожистые, внутри покрыты густыми, прямыми, жесткими, золотистыми волосками. Листья (3–5) слабокурчавые, сизые или блестящие, зелёные. Цветок блестящий, красный, одиночный, очень крупный, 10–12 см в диаметре, центр цветка чёрный с жёлтым окаймлением или сплошь жёлтый. Тычиночные нити тёмнокрасные или жёлтые. Пыльники черно-фиолетовые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет – Аманкутанское лесничество, перевалы Тахта-Карача, Ургут, Агалык. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны и карнизы скал в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.


Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.

Культивирование. С 1957 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Китабского заповедника. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.



Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zerafshan range: the forestry of Amankutan, the Takhta-Karacha pass, surroundings of the villages Urgut, Agalyk (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth slopes and rocks in the middle belt of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab nature reserve. Monitoring of populations is necessary.



130. ОҚ ЛОЛА

Тюльпан орнитивидный / *Tulipa orithyoides* Vved.

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойдаги йўқолиш арафасида турган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 7–12 см га етадиган кўп йиллик, пиёзли ўсимлик. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5 см, қобиғи қоғозсимон, кўнғир кулранг, ички томони тўрсимон момиқ тукли. Барглари 2 та, яқин жойлашган, эгри-бугри. Гуллари якка, оқ, туби сариқ. Чангчи иплари сариқ, остки қисми узун киприксимон тукли. Чангдони хира бинафша рангли. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмаси (Чўлбайир тоғи, Тўпаланг ва Оби-Заранг дарёлари ҳавзаси)да тарқалган (Сурхондарё вилояти).

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2500–3000 м баландликда тош-шағалли ембағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари узиб олинishi ҳамда чорва моллари боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1975 йилдан буён экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Табиатда сақланиб қолган тупларини назорат остига олиш лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Западного Памиро-Алая, находящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 7–12 см. Луковица яйцевидная, до 1,5 см в диаметре, с бумагообразными буро-серыми, с внутренней стороны паутинисто-мохнатыми оболочками. Листья в количестве 2, сближенные, курчавые. Цветок одиночный, белый, центр желтый. Тычиночные нити желтые, внизу длиннореснитчатые. Пыльники грязно-фиолетовые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Гиссарский хребет: горы Чутьбаир, бассейн рек Тупаланг и Оби-Заранг (Сурхандарьинская область).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем и верхнем поясах гор, на высоте 2500–3000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас.

Культивирование. С 1975 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.




Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay, it is on the verge of disappearance. It is spread at the Hissar range: the Chulbair mountains, the Tupalang and Obi-Zarang river basins (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in the middle and upper belts of mountains, at a height of 2500–3000 m. The quantity is unknown. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: not protected.



131. САРҒИШ ЛОЛА

Тюльпан волосистотычиночный / *Tulipa dasystemon* (Regel) Regel

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги ареали ажралган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5 см гача. Қобиғи қоғозсимон, қора-кўнғир тусли ёки кўнғир, ички томонининг юқори қисми ётиқ тукли. Барги 2–3 та. Гули якка, оч сариқ, баъзан оқ, туби сариқ. Чангчи ипи ва чангдони сариқ. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Писком, Угом, Чимён, Чотқол, Курама, Олой, Туркистон, Молғузар, Ҳисор тизмаларида тарқалган (Тошкент, Фарғона, Жиззах, Сурхондарё вилоятлари). Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2500–3000 м баландликдаги тошли ва шағалли тоғ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик тўплар ҳосил қилиб ёки якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғининг ёмон униши ва чорва молларининг боқилиши ареалининг қисқариб кетишига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1959 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол ва Зомин кўриқхоналарида, Угом-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида муҳофаза қилинади. Бу ўсимлик ўсадиган жойда мол боқилишини режалаштириш ва уни назорат остига олиш керак.

Манбалар. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий вид Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–25 см. Луковица яйцевидная, до 1,5 см в диаметре, с чёрно-бурыми или бурыми-бумагообразными, с немногими прижатыми волосистыми у самой верхушки оболочками. Листья в числе 2–3. Цветок бледно-жёлтый, редко белый, с жёлтым центром. Тычиночные нити жёлтые, пыльники жёл-

тые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Пскемский, Угамский, Чимганский, Чаткальский, Кураминский, Алайский, Туркестанский, Мальгузарский, Гиссарский хребты (Ташкентская, Ферганская, Джизакская, Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в верхнем поясе гор, на высоте 2500–3000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала.

Выпас, отсутствие семенного возобновления.

Культивирование. С 1959 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского и Зааминского заповедников, Угам-Чаткальского и Зааминского национальных парков. Необходимы регулирование выпаса и контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев.



Rare species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay with the reducing area. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Chimgan, the Chatkal, the Kurama, the Malguzar, the Hissar ranges (Tashkent, Jizzakh, Samarkand and Surkhandarya regions). Inhabits stony and gravelly slopes in the upper belt of mountains (2500–3000 m.s.l.). Single specimens or small groups can be found. Limiting factors: pasturing, seed reproduction is absent. Measures of protection: protected in the Chatkal and Zaamin nature reserves, Ugam-Chatkal and Zaamin national parks. Control of pasturing and state of populations are necessary.



132. ТУКЛИ ЛОЛА, СУРХОН ЛОЛАСИ

Тюльпан шерстистый / *Tulipa lanata* Regel

Мақоми 3. Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 4 см гача, қобиғи юпқа-чармсимон, кўнғир рангли, ички томони қалин, узун туклар билан қопланган. Барглари 4 тагача, четлари эгри-бугри. Гули якка, диаметри 5–6 см, гулқўргони қизил, асоси кўнғир ёки қора, оқ-сарик ҳошияли. Чангчи иплари қисқа, туби қора, учбурчак шаклда, чангдонлари қизғиш-қора, туб қисми оқ. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмаси, Кўхитанг, Бойсунтоғ ва Боботоғда тарқалган (Сурхондарё вилояти). Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги соз туپроқли ва тошли ёнбағирлар ҳамда очик ола жинсли туپроқларда тарқалган.

Сони. Якка-якка ва кичик гуруҳлар ҳолида ўсади.

Кўпайиши. Уругидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гул ва пиёзларининг кўп миқдорда йиғиб олиниши ҳамда чорва молларининг боқилиши туфайли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1954 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимликнинг сони ва популяцияси ҳолатини назорат остига олиш ҳамда чорва моллари боқилишини тартибга солиш лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Статус 3. Редкий эндемик Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–40 см. Луковица яйцевидная, до 4 см в диаметре, с нежными, тонкокожистыми покровными чешуями коричневого цвета, внутри обильно покрытыми длинными волосками. Листья в количестве 4, курчавые. Цветок одиночный, 5–6 см в диаметре, лепесточки околоцветника красные, при основании бордовые или черные с бледно-желтым окаймлением. Тычиночные нити короткие, при основании в виде чёрных треугольников, под пыльниками белые. Пыльники бордово-черные. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне.

Распространение. Гиссарский хребет, Кугитанг, Байсунские горы, Бабатаг (Сурхандарьинская область). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые, реже каменистые склоны и выходы пестроцветных толщ в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и немногочисленными группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.


Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1954 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Необходим контроль за численностью и состоянием популяций, регулирование выпаса.

Источники. [40, 50, 60, 291].
А.Х. Шарипов.


Rare endemic species of the Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range; the Baysun mountains; the Kughitang, the Babatag ranges (Surkhondarya region). Inhabits clayish, rarely stony slopes, outcrops of gypseous layers in the lower belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve. It is necessary to control number and state of populations and pasturing.



Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шандаги камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–50 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, чўзиқ ёки шолғомсимон, диаметри 1,5–6 см оралиғида. Қобиғи тўқ кўнғир ёки тилларанг кўнғир, нафис, қоғозсимон юпка. Барглари 3–5 та. Гули якка, оқ, сариқ, оч сариқ, оч қизил. Гулининг туби сариқ. Чангчи иплари ва чангдонлари сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Угом, Писком, Қоржонтов, Чотқол, Қурама тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон.



Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то юқори (яйловнинг пастки) қисмигача бўлган тошли ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки кичик туплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг кўп миқдорда териб олиниши ҳамда ўсиб турган ерларининг ўзлаштирилиши туйфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1951 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Угом-Чотқол биосфера резерватиди ва Угом-Чотқол миллий боғида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тупларининг ҳолатини назорат қилиш, гулларини теришни тақиқлаш, улар орасидан манзарали шакллари ажратиб олиш ва экиб ўстириш зарур.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Статус 3. Эндемик Западного Тянь-Шаня с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–50 см. Луковица яйцевидная, удлинённая или репчатая, 1,5–4 см в диаметре. Покровные чешуи черно-бурые или золотисто-коричневые, нежные, бумагообразные. Листья в количестве 3–5. Цветок одиночный, листочки околоцветника белые, желтые, кремоватые, огненно-красные; центр цветка желтый. Тычиночные нити и пыльники желтые. Цветёт в марте–апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Хребты Угамский, Пскемский, Каржантау, Чаткальский, Кураминский: бассейны рек Угам, Пскем, Чаткал, Чирчик, Ахангаран, Чадаксай (Ташкентская, Наманганская области). За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан.

Места обитания. Каменистые местообитания от предгорий до субальпийского пояса.

Численность. Встречается небольшими популяциями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и хозяйственное освоение территории.

Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике, Угам-Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимы контроль за состоянием популяций, запрещение сбора цветков, выявление декоративных форм и размножение их в культуре.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Endemic species of the western Tien-Shan with highly reducing area. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Angren, the Chatkal river basins (the Tashkent region). Inhabits stony habitats from the submontane zone to subalpine belt. Small populations and single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and economic use of territory. Measures of protection: protected in the Chatkal and Ugam-Chatkal state biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to control the state of populations, to forbid picking of flowers, to search for ornamental forms and their reproduction in cultivation.



134. ТУБЕРГЕН ЛОЛАСИ

Тюльпан Тубергена / *Tulipa tubergeniana* T.M. Hoog

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–30 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 3–5 см, қобиғи жигарранг ёки кўнғир, ички томони тўрсимон-чалкаш, момиқ тукли. Барглари 3 та, гулидан узун. Гуллари якка, йирик, диаметри 6–7 см, қизил, туби қора, оч сариқ, гардишсимон доғли. Чангчи иплари қора, чангдонлари бинафша рангли. Апрельда гуллаб, меваси июнь–июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида (Бойсун тоғларида, Сина қишлоғи атрофи ва Тупаланг дарёси ҳавзасида), Кўхитанг ва Боботоғ тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Адирларда ва тоғларнинг пастки қисмидаги ола жинсли ва соз тупроқли ёнбағирларда, кўпинча, пистазорларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари кўплаб узиб олинishi ва чорва моллари боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1955 йилдан бери экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатдан янги ўсиб турган ерларини қидириб топиш лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Ҳ. Шарипов.



Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–30 см. Луковица яйцевидная, 3–5 см в диаметре. Покровные чешуи с бурыми или коричневыми, с внутренней поверхности паутинисто-лохматыми оболочками. Листья (3) превышают цветок. Цветок одиночный, крупный, 6–7 см в диаметре. Листочки околоцветника красные, при основании с чёрным, бледно-желто-окаймленным пятном. Тычиночные нити черные, пыльники фиолетовые. Цветёт в апреле, плодоносит в июне–июле.



Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет, Байсунские горы, окрестности кишлака Сина, бассейн реки Тупаланг; Кугитанг, Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые склоны в предгорьях и пестроцветных низкогорьях, часто среди фисташников.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас.


Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1955 г.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Сурханского государственного заповедника. Необходим поиск новых местонахождений.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay It is spread at the Hissar range: the Baysun mountains, the surroundings of village Sina, the Tupalang river basin; the Kughitang and Babatag ranges (Surkhondarya region). Inhabits clayish slopes in gypseous low hills, often among the pistachio-woodlands. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: some populations protected in the Surkhan state nature reserve. It is necessary to search new locations.




135. УЛУҒВОР ЛОЛА

Тюльпан великий / *Tulipa ingens* T.M. Hoog

Мақоми 3. Ғарбий Помир-Олойда кам тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 12–25 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзининг диаметри 2,5–4 см, чўзиқ-тухумсимон, устки қисми қора кўнғир ёки кўнғир юпқа чармсимон қобиқ билан ўралган. Барглари 3–4 та, тарвақайлаган, ўткир учли, наштарсимон, четлари эгри-бугри, кўкимтир рангли. Гули қизил, юлдузсимон, туби қора рангли. Чангчиси ва чангчи иплари қора, тим кўнғир ёки тўқ қизил рангли. Апрель–май ойида гуллаб, мевасиюнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон, Кўҳитанг ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Тоғларнинг денгиз сатҳидан 1600–2000 м баландликдаги соз тупроқли ёнбағирларида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва тўплар бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши, гуллари узилиб, ва пиёзлари қазиб олинishi сабабли сони камайган.

Маданийлаштирилиши. 1951 йилдан бошлаб ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор, Китоб ва Сурхон қўриқхоналарида муҳофаза қилинади. Ўсиб турган тўплари назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Ҳ. Шарипов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 12–25 см. Луковица продолговато-яйцевидная, 2,5–4 см в диаметре, с черно-бурыми или бурыми тонкокожистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4, расставленные, ланцетные, иногда по краю слабо-крупноволнистые, сизые. Цветок красный, в форме звезды, центр черный. Тычиночные нити черные, пыльники черные, коричневаточерные или темно-бордовые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Зеравшанский и Гиссарский хребты, Кугитанг (Самаркандская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Глинистые склоны в среднем поясе гор, на высоте 1600–2000 м над уровнем моря.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и луковиц, выпас.


Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Гиссарского, Китабского и Сурханского заповедников. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zeravshan, the Hissar and Kughitang ranges (Samarkand, Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits clayish slopes in the middle belt of mountains, at a height of 1600–2000 m.s.l. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in the Hissar, the Kitab and Surkhan state reserves. Control of the state of populations is necessary.



136. ШУБҲАЛИ ЛОЛА, ЧИПОР ЛОЛА

Тюльпан сомнительный / *Tulipa dubia* Vved.

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 7–25 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи чўзиқ-тухумсимон, қобиғи тўқ жигарранг, ичи ётиқ тукли. Барглари учта, кўкимтир, четлари эгри-бугри. Гуллари ёпирма барглар орасида жойлашган. Гулбанди сертук, кўкимтир ғуборли. Гуллари якка, сариқ, ташқи томони кўкимтир-пушти йўл-йўл, гул туби тўқ сариқ. Чангчи иплари тўқ сариқ, чангдонлари сариқ. Май-июнь ойида гуллаб, меваси июль-августда стилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Угом, Писком, Қоржонтов, Чотқол, Курама тизмаларида тарқалган. Қирғизистон ва Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва юқори қисмидаги майин зарра тупроқли, шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уругидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва пиёзлари йиғиб олинishi сабабли қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1951 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Угом-Чотқол биосфера резерватида ва Угом-Чотқол миллий боғида муҳофаза қилинади. Биологик хусусиятларини ўрганиш ва маданийлаштирилиши лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 7–25 см. Луковица удлинённойцевидная, с тёмно-коричневыми оболочками, внутри прижатоволосистая. Листья (3) сизые, по краю волнистые. Цветки сидячие в розетке листьев. Цветоножка очень пушистая, с сизым налётом. Цветок одиночный, жёлтый, снаружи с сизо-розовыми полосками, центр оранжевый. Тычиночные нити оранжевые. Пыльники желтые. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: хребты Каржантау, Угамский, Пскемский, Чаткальский и Кураминский. За пределами Узбекистана: Казахстан и Кыргызстан.

Места обитания. Мелкоземистые и щепнисто-мелкоземистые склоны среднего и верхнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов и луковиц.

Культивирование. С 1951 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.



Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике, Угам-Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимы изучение биологических особенностей и введение в культуру.

Источники. [50, 60, 291].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam, the Pskem, the Chatkal and Kurama ranges (Tashkent and Namangan regions). Inhabits fine earth and -fine earth slopes in the subalpine and alpine belts of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: picking of flowers and bulbs. Measures of protection: protected in the Chatkal and Ugam-Chatkal state biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to study biological characteristic features and the introduction into cultivation.



137. ЧЎЛБАЙИР ЛОЛАСИ, ПУШТАГЛИ ЛОЛА

Тюльпан килеватый / *Tulipa carinata* Vved.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–50 см орасидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5–4 см, қобиғи чармсимон қора қўнғир рангли, ички томони қалин тукли. Барглари 3–4 та. Гули якка, қизил ёки пушти ранг. Гулининг туби сариқ ёки хирароқ сариқ. Чангчи иплари қора, чангдони



Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқ-хонасида муҳофаза қилинади. Ўсиб турган жойлари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 15–50 см. Луковица яйцевидная, 1,5–4 см в диаметре, с черно-коричневыми, кожистыми, с внутренней стороны волосисто-шерстистыми покровными чешуями. Листья в количестве 3–4. Цветок одиночный, красный, центр цветка черный или грязновато-желтый. Тычиночные нити черные, пыльники черные с бордовым оттенком, изредка желтые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Кугитанг, Байсунские горы, горы Чульбайр, Гиссарский хребет: бассейн рек Сангардак и Тупаланг (Сурхандарьинская область). За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и каменисто-мелкоземистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов.

Культивирование. С 1966 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [40, 50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang, the Baysuntau and Chulbair mountains, the Hissar range: the Tupalang, the Sangardak river basins (Surkhandarya region). Inhabits stony and stony-fine earth slopes in the middle mountainous zone. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve. Monitoring of populations is necessary.



қора ёки қизғиш, баъзан сариқ. Май–июнда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг, Бойсун ва Чўлбайир тоғлари, Ҳисор тизмасида (Тўпаланг, Сангардак дарёлари ҳавзаси) тарқалган. Тожикистон ва Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли ва майда тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кўллаб гуллари териб олиниши сабабли ареали қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1966 йилдан буён экиб ўстирилади.

138. ЎЗБЕКИСТОН ДОЛАСИ

Тюльпан узбекистанский / *Tulipa uzbekistanica* Botschantz. et Sharipov

Мақоми 1. Йўқолиб кетиш арафасидаги Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 2,5 см, қобиғи чўзиқроқ, қаттиқ, туксиз, фақат ичи сийрак ётиқ туклар билан қопланган. Барглари 3 та, яшил кўкимтир ғуборли, чети бироз эгри-бугри. Гули қизил, туби тўқ кўнғир доғли, сариқ гардишли. Чангчи иплари ва чангдонлари оч сариқ, баъзан тўқ қизил. Мартда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Курукдаҳана тоғининг Толли довоида тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсли паст тоғлардаги кулранг шўрхок бўз тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган. Курукдаҳана тоғининг Толли довоида 40–45 га майдонда 1000 га яқин туши аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг кўп миқдорда терилиши ва чорва молларининг бокилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1967 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Унинг ўсиб турган янги жойларини қидириб топиш лозим.

Манбалар. [41].

Ф.И. Каримов.

Статус 1. Редкий эндемик Юго-Западного Памиро-Алая, находящийся на грани исчезновения.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–20 см. Луковица яйцевидная, до 2,5 см в диаметре, оболочки луковицы немного продолговатые, жёсткие, голые, изнутри покрытые редкими короткими, прижатыми волосками. Листья (3) зелёные с сизым налётом, по краю крупноволни-

стые. Цветок красный, в центре тёмно-коричневое пятно с жёлтым окаймлением. Тычиночные нити и пыльники светло-жёлтые, реже бордовые. Цветёт в марте, плодоносит в мае.

Распространение. Горы Курукдагана, перевал Таллы (Кашкадарьинская область).

Места обитания. Серые солёные глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Встречается единичными экземплярами, на перевале Таллы на площади 40–45 га отмечено около 300 экземпляров.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выпас.

Культивирование. С 1967 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим поиск новых местонахождений.

Источники. [41].

Ф.И. Каримов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kurukdagana mountains; the Tally pass (Kashkadarya region). Inhabits grey saliferous clay of gypseous low hills. Single specimens can be found. Limiting factors: mass picking of flowers, pasturing. Measures of protection: it is necessary to search new locations.



139. ҚИЗИЛ ЛОЛА (ГРЕЙГ ЛОЛАСИ)

Тюльпан Грейга / *Tulipa greigi* Regel

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шандаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–45 см оралигидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон ёки юмалоқ, қобиғи баъзан қалин чармсимон баъзан юпқа қоғозсимон. Барглари 3–4 тагача эгри-бугри, устки қисмида бинафша ранг доғлари бор. Гуллари якка, тўқ сариқ, баъзан тўқ қизил, сариқ, қизғиш доғли. Гулининг туби сариқ тухумсимон қора доғли. Чангчи иплари қора ёки сариқ, чангдонлари сариқ, бинафшаранг, кулранг. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шаннинг барча тизмаларида тарқалган. Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги шағалли ва соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан 5–10 тупдан иборат тўплар ҳосил қилиб тарқалган. Тошкент вилояти ҳудудида 100 000 тупга яқин ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ёки қисман вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гули ва пиёзларининг кўп миқдорда йиғиб олинishi ҳамда чорва моллари боқилиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Кўпгина ботаника боғларида муваффақиятли ўстирилади. Шу жумладан, ЎЗР ФА Ботаника боғида 1956 йилдан буён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера кўриқхонасида, Угом-Чотқол биосфера резерватида ва Угом-Чотқол миллий боғида муҳофаза қилинади. Унинг ўсиб турган туплари назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 10–45 см. Луковица яйцевидная или округлая с грубыми кожистыми или нежными бумагообразными чешуями. Листья в числе 3–4, курчавые, с антоциановыми пятнами. Цветок одиночный, оранжево-красный; встречаются формы с темно-красными, оранжевыми, желтыми, кремовыми цветками, центр цветка желтый с яйцевидными черными пятнами. Тычиночные нити или черные, или желтые, пыльники желтые, фиолетовые, сероватые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в июне–июле.



Распространение. Все горные хребты Западного Тянь-Шаня (Ташкентская и Наманганская области). За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Глинистые и щебнистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами, очень редко – небольшими (5–10 особей) группами. В Ташкентской области встречается около 100 000 экземпляров.

Размножение. Семенное, реже вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выкапывание луковиц, выпас.


Культивирование. Успешно выращивается во многих ботанических садах, в том числе с 1956 года в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника, Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чаткальского национального парка. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [50, 60, 291].

А.Х. Шарипов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at all ranges of the western Tien-Shan (Tashkent and Namangan regions). Inhabits clayish and gravelly slopes in the lower belt of mountains. Single specimens, very rarely small (5–10 specimens) groups can be found. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: protected in Chatkal and Ugam-Chatkal state biosphere reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to control the state of populations.



140. ШАРИПОВ ЛОЛАСИ, ГУЛБАРРА

Тюльпан Шарипова / *Tulipa scharipovii* Tojibaev

Мақоми 2. Фарғона водийсининг шимолий адирларида тарқалган эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–20 см га етадиган, пиёзи кўп йиллик ўт ўсимлик. Пиёзи тухумсимон, қобиғи қаттиқ, жигарранг тусли, ички томонидаги туклари зич жойлашган, қобиқнинг туби ва юқорисида жамланган. Юқоридаги туклари қобикдан ташқарига чиқиб туради. Барглари 3 та, ланцетсимон, бир-бирига жуда яқин жойлашган, 7–10 см. Гули сариқ, тубида сариқ ранг қуюқлашади. Гул баргчаларининг учи кесилган ёки чуқурчали. Чанг иплари ва чангдонлари сариқ. Март–апрель ойларида гуллаб, меваси майда пишади.

Тарқалиши. Наманган вилояти: Чотқол ва Курама тизмаларининг тоғ олди текисликлари ва адирларида тарқалган (Турақўрғондан Резаксой қишлоғигача).

Ўсиш шароити. Қуйи адирлардаги бироз шўрлашган майин тупроқларда, юқори адирлардаги тошли-шағалли ёнбағирликларда ўсади.

Сони. Якка-якка ва кичик тўплар ҳосил қилган ҳолда учрайди. Популяцияларда 100 × 100 м майдонда 50–80 та тупи учрайди.

Кўпайиши. Уругидан ва пиёздан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гули ва пиёзларининг кўп миқдорда йиғиб олинishi ҳамда чорва молларининг боқилиши.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 2009 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Унинг ўсиб турган туплари назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [291, 292, 369]

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Эндемичное растение северных предгорий Ферганской долины.

Краткое описание. Луковица яйцевидная, черно-коричневая, коричневая, крепкая, кожистая. Оболочки луковицы не продолженные, 3–3,5 см длины и 2–2,5 см ширины. Изнутри на основании и сверху волосисто-шерстистые. Густое опушение оболочки выступает наружу. Стебель (10) – 15–20 см высоты, вместе с цветоножкой голые. Листьев 3, ланцетные, сильно сближенные, образуют ложные мутовки, у живых растений змеевидно лежат на земле. По краю курчавые, голые, 7–10 см длины. Цветок одиночный, в бутоне поникающий, желтый, на основании без пятна. Листочки околоцветника на верхушке выемчатые, глубина выемки достигает 1 мм. Тычинки 9–10 мм длины, 2–2,5 раза короче околоцветника. Нити тычинок голые, темно-желтые. Пыльники желтые, вдоль всей длины одновременно открывающиеся. Цветёт марте–апреле, плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Наманганская область: подгорные равнины и предгорья Чаткальского и Кураминского хребтов (от Турақурғана до Резаксай).

Места обитания. В подгорных равнинах слегка засоленные лессовые почвы, в высоких адырах каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Встречается единичными экземплярами, и небольшими группами. В популяциях на 100 × 100 м встречается по 50–80 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов, выкапывание луковиц, выпас.

Культивирование. С 2009 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяций.

Источники. [291, 292, 369].

К.Ш. Тожибаев.



Endemic species of the northern foothills of Ferghana valley. It is spread at the foothills and piedmont zone of the Chatkal and Kurama ranges: from Turakurgan to Rezaksay. Inhabits foothills with loess and saline soils and stony slopes. Single specimens and small groups can be found. Population consists of 50–80 plants on 100 square meter. Limiting factors: mass picking of flowers and bulbs, pasturing. Measures of protection: it is necessary to control the state of populations.



Мақоми 2. Фарғона водийсининг шимолий адирларида тарқалган камёб ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзи тухумсимон, диаметри 1,5 – 3,0 см, қобиғи энсиз, чармсимон, тўқ жигарранг тусли, бирмунча узун, баъзан ҳатто тупроқ юзасига чиқиб қолиши мумкин. Ички томонидаги туклари зич жойлашган ва асосан қобиғининг пастки қисми ҳамда юқорисида жамланган. Барги 3 та, улар бир-бирига жуда яқин ўрнашган, 5–7 см узунликда, наштарсимон қиррали, четлари буралган, тўлқинсимон. Яккагулли, гули сариқ, тўқ сариқ ёки қизил (*var. korolkowioides*), гул туби жигарранг ёки тўқ сариқ ранг. Гул баргчаларининг учи ўткир ёки бироз кемтиклашган. Чангчи иплари 1,0 – 1,3 см, сариқ, баъзан пастки қисми қора, юқориси алвон ранг (*var. korolkowioides*), четлари бир-бирига параллель, ўрта қисми бироз кенгайган. Чангдонлари сариқ. Тугунчаси бутилкасимон, ранги оч-сариқ. Март

ойининг охири – апрель ойининг бошларида гуллаб, уруғи апрель охири – май ойларида етилади.

Тарқалиши. Наманган вилояти (Чуст ва Поп туманлари): Қурама тизмасида тарқалган.

Ўсиши. Адирларнинг қуйи ва ўрта қисмидаги тошли-шағалли ёнбағирликларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг бетартиб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Тошкент ботаника боғида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чорва молларини тизимли равишда ўтлатиш ҳамда ўсиш майдонларида доимий кузатув тадқиқотларини амалга ошириш лозим.

К.Ш. Тожибаев.





Статус 2. Редкий вид адыров северной части Ферганской долины.

Краткое описание. Луковица яйцевидная 1,5 – 3,0 см в диаметре; покровные чешуи тонкокожистые, темновато-коричневые, продолженные, иногда выступающие на поверхность почвы, внутри у основания и на верху густо покрыты прижатыми волосками. Стебли 8 – 12 см высоты, гладкие. Листья в количестве 3, почти мутовчатые, 5 – 7 см длины, ланцетные, скрученные с волнистыми краями. Цветок одиночный, с желтыми, оранжевыми или красными (*var. korolkowioides*), иногда небольшими коричневатыми пятнами или темно-желтым цветом у основания, острым или с небольшим острием на верхушке. Тычинки 1,0 – 1,3 см, желтые, внизу – черные, вверху – пурпурные (*var. korolkowioides*), от основания почти параллельными краями, несколько расширенные в средней части. Пыльники желтые. Завязи бутылкообразные, бледно-желтые.

Цветет в конце марта и начале апреля, плодоносит в конце апреля и мае.

Распространение. Наманганская область (Чустские и Папские районы): Кураминский хребет.

Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы низких и средних адыров.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Размножается семенами.

Причины изменения численности и ареала. Безсистемный выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ташкентском ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимо обеспечить системный выпас скота и постоянный контроль за состоянием популяций.

К.Ш. Тожибаев.

Endemic species of the northern foothills of the Fergana valley. It is spread at the Namangan region (the Chust and Pap regions); the Kurama range. Inhabits stony slopes of low and middle foothills. Single specimens can be found. Limiting factors: overgrazing. Measures of protection: it is necessary to manage grazing and permanent control of the populations.



НАВРЎГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПЕРВОЦВЕТНЫЕ – PRIMULACEAE

142. ҲИСОР ДИОНИСИЯСИ

Дионисия гиссарская / *Dionysia hissarica* Lipsky

Мақоми 2. Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги кичик майдонларда сақланиб қолган кам-ёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Қояларнинг ёриқларида осилиб ўсадиган ёстиқсимон, намчил ярим бутача. Илдиз бўғизидан ўсиб чиққан бир тутам пояларидаги барглар кетма-кет жойлашган. Эски ёпирма барглари сақланиб қолади. Барглари юмшоқ, юпқа, тишчали, безчали туклар билан қопланган, ўзига хос ҳидга эга. Гуллари сариқ, 2–3 та, гулолди баргчалари билан ўралган, пастга эгилиб турувчи гулпояларда ўрнашган. Июнь–июль ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жанубий ёнбағирлари (Сангардак дарёсининг ўрта оқими)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги сернам жойларда, шаршаралар яқинидаги кумтош қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. 2013 йилда 1250 тупи аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғ маҳсулдорлигининг пастлиги ва табиий ўсиш шароитининг чекланганлиги (стенобионт тур).

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида кўчат қилиб ўтқазилган ва уруғи орқали кўпайтиришга қаратилган уринишлар натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [88, 269, 368].

О.Т. Тургинов.

Статус 2. Редкий узлокальный эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Подушковидный мезофильный полукустарник. Образует компактные подушки, свисающие из расщелин скал. От корневой шейки отходит пучок хрупких стеблей с очередными листьями. Старые розетки сохраняются. Листья мягкие, тонкие, зубчатые, с железистым опушением и нежным ароматом. Цветки на поникающих цветоносах, жёлтые, собраны по 2–3 и окружены прицветниками. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: южные склоны Гиссарского хребта – среднее течение реки Сангардак.

Места обитания. Влажные ниши и под карнизами, расщелины отвесных скал вблизи водопадов в среднем поясе гор.

Численность. В 2013 году зарегистрировано 1250 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Стенобионтность и низкая семенная продуктивность вида.


Культивирование. Посадка взрослых экземпляров и высев семян в Ботаническом саду АН РУЗ окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [88, 269, 368].

О.Т. Тургинов.

Rare and endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Sangardak valley (Surkhandarya region). Inhabits the wet niches, clefts of sheer rocks near waterfalls in the middle belt of mountains. In 2013 about 1250 plants were revealed. Limiting factors: narrow ecological position and low seed production. Measures of protection: not protected.



ПИСТАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО СУМАХОВЫЕ – ANACARDIACEAE

143 ОШЛОВЧИ ТОТИМ (СИРКА ДАРАХТИ)

Сумах дубильный / *Rhus coriaria* L.

Мақоми 1. Ҳисор тизмаси ва Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб тур.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 3–4 м, баъзан 6–10 м га етадиган паст бўйли дарахт. Нокулай шароитда ўсганда бута шаклида ҳам учрайди. Бир йиллик новдалари кулранг-қўнғир, кўп йиллик поялари эса жигарранг. Барглари мураккаб, тоқ патсимон, 7–9 жуфт, узунлиги 30 см га етади. Барг банди қанотчали. Гуллари яшил-оқиш, поянинг учида чўзиқ урчуксимон тўпгул ҳосил қилади. Меваси йирик, тигиз, юмалоқ, тўқ қизил рангли, нордон. Уруғи (данаги) овал шаклида, қаттиқ.

Тарқалиши. Сурхондарё, Тошкент вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Тупаланг ва Хондиза дарёларининг ҳавзалари) ва Ғарбий Тянь-Шанда, Чотқол тизмаси (Қоронқулсой)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200–1400 м баландлиқда қуруқ шағалли ва тошли ёнбағирларда ўсади. Очиқ жойларда ўсувчи ёруғсевар ўсимлик.

Сони. Кам учрайди, онда-сонда кичик туллар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан ва бачкисидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалнинг ўзгариш сабаблари. Ўтин сифатида ишлатилади ва ёш ниҳоллари чорва моллари томонидан оёқости қилинади.

Маданийлаштирилиши. Андижон ва Тошкент вилоятларида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 139].

Р.И. Қозоқбоев.

Статус 1. Редкий вид Гиссарского хребта и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Невысокое (3–4, реже 6–10 м) листопадное растение. В неблагоприятных условиях проявляет себя как кустарник. Однолетние побеги серо-коричневые, многолетние – коричневые. Листья

сложные, непарноперистые, 7–9-парные, длиной до 30 см, с крылатым черешком. Цветки зеленовато-белые, образуют на верхушках побегов вытянутое, веретеновидное соцветие. Плоды шаровидные, тёмно-бордовые, кислые, собраны в плотные крупные соплодия. Семена (косточка) овальные, твёрдые.

Распространение. В Сурхандарьинской и Ташкентской областях: Гиссарский хребет: бассейн рек Тупаланг и Хандиза; Западный Тянь-Шань (вероятно занесен и интродуцирован) – Чаткальский хребет – урочище Каранкуль.

Места обитания. Сухие каменистые горные склоны с мелкоземистыми маломощными почвами в нижнем поясе гор. Светолюбивое растение обитает на открытых местах на высоте 1200–1400 м.

Численность. Образует небольшие, часто разреженные рощицы.

Размножение. Семенное и вегетативное. Легко размножается корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Вырубается на топливо, страдает от вытаптывания скотом, особенно молодые всходы и ювенильные растения.


Культивирование. Культивируется в Андижанской и Ташкентской областях.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 139].

Р.И. Казакбаев.

Rare species of the Hissar range and the western Tien-Shan. It is spread at the Hissar range: the Tupalang and Khandiza river basins; the western Tien-Shan (probably introduced); the Chatkal range: Karankul (Surkhondarya and Tashkent regions). Inhabits dry stony slopes of mountains in the mountainous zone. Photophilous plant inhabits open places at 1200–1400 m.s.l. The quantity is unknown. Limiting factors: felled as firing, suffers from trampling down by cattle, especially young seedlings and juvenile plants. Measures of protection: not protected.



**РАЪНОГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО РОЗОЦВЕТНЫЕ –
ROSACEAE**

144. ЎРТА ОСИЁ НОКИ

Груша среднеазиатская / *Pyrus asia-medicae* (Popov) Maleev

Мақоми 0. Ғарбий Тянь-Шанга хос йўқолиб кетган тур.

Қисқача тавсифи. Шох-шаббали йирик дарахт. Барглари йирик, кенг тухумсимон ёки деярли юмалоқ, четлари йирик аррасимон, баргининг пастки томони яшил, устки томони эса тўқ яшил, барг банди япроғидан қисқароқ. Гуллари майда. Меваси йирик, юмалоқ, кўкиш ёки сарғиш рангли, кечпишар, серсув, ширин. Май ойида гуллаб, меваси октябрда пишади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фақатгина Писком дарёси бўйидаги Испай ва Муллали қишлоқларида ўсганлиги маълум.

Ўсиш шароити. Боғларда ўсган.

Сони. Фақатгина бир марта М. Г. Попов томонидан йиғилган. Кейинги изланишлар натижасиз тугаган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Қариган туплари ўтин сифатида ишлатиб юборилган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида жойлашган. Махсус муҳофаза чоралари кўрилмаган.

Манбалар. [159, 164, 189, 256].

Ў.П. Пратов.

Статус 0. Исчезнувший вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Крупное дерево с раскидистой кроной. Листья крупные, широкояйцевидные или почти округлые, по краю крупнопильчатые, сверху тёмно-зелёные, снизу более светлые, черешки короче пластинок. Цветки мелкие. Плоды крупные, зеленоватые или желтоватые, чаще округлые, позднеспелые, сочные, сладкие. Цветёт в мае, плодоносит в октябре.

Распространение. Ташкентская область: известна только одна точка – долина реки Пскем в окрестностях кишлаков Испай и Муллали.

Места обитания. Сады.

Численность. Один раз собрана М. Г. Поповым в указанном пункте. Дальнейшие поиски оказались безрезультатными.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Возможно, старые деревья были использованы на топливо.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания расположены в пределах Угам-Чаткальского национального парка. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 164, 189, 256].

У.П. Пратов.

Disappeared endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem valley in the surroundings of the village Ispai and Mullali (Tashkent region). Inhabits gardens. Once it was collected by M.G. Popov in the mentioned place. Recent collecting missions had no success. Limiting factors: probably old trees were used as wood. Measures of protection: not protected.



РЎЯНДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE

145. СИЛЛИҚ РЎЯН

Марена гладкая / *Rubia laevissima* Tscherneva

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган ярим бута. Пояси силлиқ, юмалоқ, баъзан тўрт қиррали, оч кулранг. Барглари қисқа бандли, туксиз, пояда 6 тадан ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гули яшил-сарик, барг қўлтиғида ярим соябон шаклида ўрнашган. Меваси қора, ялтироқ, узунлиги 0,5 мм. Май-июнь ойида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол дарёси ҳавзасида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди (Бешорол кўриқхонаси).



Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1000–1100 м баландликдаги йирик тошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Жуда кам сақланиб қолган. Ҳозирча 12 жойда ўсиши аниқланган, умумий сони 800 га яқин тупни ташкил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Эҳтимол, тошларнинг сурилиши ва кўчкилар туфайли камайиб кетган бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилганда ижобий натижага эришилмаган.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий табиат боғида сақланади. Табиий ҳолда тарқалган тупларини сақлаш ва экиб ўстириш ишларини йўлга қўйиш керак.

Манбалар. [159, 323].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 1 м, с гладкими, округлыми, реже слегка четырёхгранными стеблями светло-серого цвета. Листья в мутовках по 6, на коротких черешках, голые. Цветки зеленовато-жёлтые, в пазушных простых полувонтиках. Плоды чёрные, блестящие, длиной 0,5 мм. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Бассейн реки Чаткал. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (заповедник Бешарал).

Места обитания. Крупнообломочные каменные осыпи нижнего пояса гор, на высоте 1000–1100 м.

Численность. Очень редок. Достоверно известно 12 местонахождений с общей численностью не более 800 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Возможно, влияют камнепады, оползни и лавины.


Культивирование. Предприняты неоднократные и неудачные попытки интродукции в условиях Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка. Необходимо сохранение местобитаний, поиск путей введения в культуру.

Источники. [159, 323].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the south-western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal river basin (Tashkent region). Inhabits stony mounds with large segments in the lower belt of mountains at a height of 1000–1100 m. There are 12 population with about 800 specimens recorded. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to reserve locations, to work out methods of introduction into cultivation.



146. БОЧАНЦЕВ ПЛОКАМАСИ

Плокама Бочанцева / *Plocama botschantzevii* (Lincz.) M. Backlund et Thulin

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Яримбутача, қалин, оқиш, бўғимли, шохлари туксиз. Барглари ясси, наштарсимон, туксиз, юпқа пардасимон ёнбаргчалари нов ҳосил қилади. Гуллари йирик гулёнбаргчали, косачаси бокалсимон, сал ғадир-будур, узунлиги 4 мм, 3–4 та киприксимон тишчали. Гултожи оқишкулранг, узунлиги 7–9 мм, 5 бўлакли, дағал тукли. Меваси цилиндрсимон, узунлиги 5–6 мм, қалин, дағал тукли. Кўшалоқ мевалари бир-бирига маҳкам ўрнашган.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шеробод тепаликлари (Оқтош қишлоғи атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Олажинсли паст тоғлардаги соз тупроқларда ўсади.

Сони. 70 тупи борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Олажинсли майдонларнинг қисқариши ва молларнинг кўплаб боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [356, 367]

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редчайший эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник с многочисленными беловатыми, членистыми, голыми ветвями. Листья плоские, ланцетные, голые с пленчатыми прилистниками, образующими влагалища. Цветы с крупными прицветниками. Чашечка бокаловидная, слегка шероховатая, 4 мм длины, с 3–4 реснитчатыми зубцами. Венчик беловато серый, 7–9 мм длины, 5-лопастной, щетинистый. Плод цилиндрический, 5–6 мм длины, сильно щетинистый, полуплодики плотно соединены друг с другом. Цветет в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (кишлак Акташ).

Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Зарегистрировано 70 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [356, 367].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. Endemic of the Kelif-Sherabad range, nearby the village Aktash (the Surkhandarya region). Inhabits grey salty soils. 70 plants were found. Limiting factors: decreasing of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.



147. АЛ-ШАҲБОЗ ПЛОКАМАСИ

Плокама Аль-Шехбаза / *Plocama alshehbazii* F.O. Khass., D. Khamr., U. Khuzh. et Achilova.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–45 см ли ярим бута. Илдизи қўнғир рангли. Пояси силлиқ, тўқ яшил. Барглари силлиқ, узунлиги 2–4 см, эни 1–1,5 мм, новдада қарама-қарши жойлашган, ёнбаргчасиз. Тўпгули монохазилли, гули гулбандсиз. Гулёнбарги яшил, силлиқ, узунлиги 5–6 мм, эни 0,5 мм. Косачаси қорамтир, узунлиги 2,5–3 мм, 5 та бирига тенг бўлмаган тишчали. Гулқўрғонининг узунлиги 25–30 мм, у дастлаб сарғиш, кейинчалик пушти рангли, туксиз 5 қисми. Чангчиси 5 та, тумшукчаси билан бирга бўртиб чиққан. Тугунчаси силлиқ. Мерикарпийси силлиқ, жигарранг, узунлиги 4–5 мм, эни 1,5 мм. Июлда гуллаб, сентябрда мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шеробод тепаликлари (Бойсун атрофида тарқалган).

Ўсиш шароити. Олажинсли қолдиқ тоғлардаги саз тупроқларда ўсади.

Сони. 100 туп ўсимлик борлиги аниқланган.

Қўпайиши. Уругидан қўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Олажинсли майдонларнинг қисқариши ва молларнинг қўшлаб боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [356, 367].

У. Хўжаназаров.



Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [356, 367].

У. Хужаназаров.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник 20–45 см высоты. Корни черно-коричневые. Стебли гладкие, темно-зеленоватые. Листья гладкие 2–4 см длины, 1–1,5 мм ширины, супротивные, без прилистников. Соцветие монохазильное, цветки без цветоножек. Прицветники зеленоватые, гладкие, 5–6 мм длины, 0,5 мм ширины, без желтого острия. Чашечка черноватая, 2,5–3 мм длины, с 5 неравными зубчиками. Околоцветник 25–30 мм длины, сначала желтоватый, позже розовый, голый, 5-раздельный. Тычинок 5, выставленных вместе с рыльцем. Завязь гладкая. Мерикарпии гладкие, коричневые, 4–5 мм длины, 1,5 мм ширины. Цветет в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик Келиф-Шерабадской гряды (возле г. Байсун).


Места обитания. Серые глины пестроцветных низкогорий.

Численность. Зарегистрировано 100 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. Endemic of the Kelif-Sherabad range, nearby town Baysun (Surkhandarya region). Inhabits grey salty soils. 100 plants were found. Limiting factors: decreasing of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.



**САВРИНЖОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО БЕЗВРЕМЕННОКОВЫЕ
(МЕЛАНТОВЫЕ) – COLCHICACEAE (MELANTHIACEAE)**

148. КЕССЕЛРИНГ САВРИНЖОНИ

Безвременник Кесселринга / *Colchicum kesselringii* Regel

Мақоми 3. Марказий Осиёда камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик тугунак пиёзли ўт. Тугунак пиёзи чўзиқ тухумсимон, диаметри 1–3,5 см, қобиғи дағал, қора кўнғир рангли. Барглари 3–6 та, чизикли. Гуллари 1–4 та, оқ рангли. Тожбаргчаларининг ташқи томони тўқ бинафшаранг чизикли, наштарсимон, тўмтоқ. Чангчилари қайтақисидан 2 марта қисқа, чангдони ингичка. Февраль ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Навоий, Самарқанд, Қашқадарё, Жиззах, Сурхондарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань (Курама, Чотқол тизмалари)да, Помир-Олой (Туркистон, Зарафшон, Ҳисор, Нурота, Кўхитанг тизмалари ва Чўлбайир тоғлари)да тарқалган. Қозоғистон, Тожикистон, Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то тоғнинг юқори қисмигача бўлган жойларда майда жинс тупроқли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ва тўп-тўп бўлиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллариининг кўп миқдорда йиғиб олинishi ва чорва молларининг кўплаб боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1967 йилдан буён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Зомин, Сурхон, Нурота, Китоб, Ҳисор кўриқхоналарида, Зомин ва Уғам-Чотқол миллий боғларида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 221].

У.Х. Қодиров.

Статус 3. Эндемик Центральной Азии с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Многолетнее клубнелуковичное растение. Клубнелуковица яйцевидно-продолговатая, сплюснутая, 1–3,5 см в диаметре, с чёрно-бурыми кожистыми оболочками. Листьев 3–6, линейные. Цветки в количестве 1–4, белые. Листочки околоцветника снаружи по спинке с темно-фиолето-

выми полосками, линейно-ланцетные, тупые. Тычинки в 2 раза короче отгиба, с линейными пыльниками. Цветёт в феврале, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Ташкентской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской, Джизакской, Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань – Кураминский, Чаткальский хребты; Памиро-Алай – горы Чутьбаир. Туркестанский, Зеравшанский, Гиссарский хребты, Нуратау, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан.

Места обитания. Мелкоземистые и щебнисто-мелкоземистые склоны от подгорных равнин до верхнего пояса гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор цветов и выпас.

Культивирование. С 1967 года культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском, Зааминском, Сурханском, Нуратинском, Китабском, Гиссарском заповедниках, Зааминском и Угам-Чаткальском национальных парках.

Источники. [159, 221].

У.Х. Кадыров.



Endemic of Central Asia with the reducing populations. It is spread at the western Tien-Shan: the Kurama, the Chatkal ranges; the Pamir-Alay: the Chulbair Mountains; the Turkestan, the Zeravshan, the Hissar, the Nuratau, the Kughitang ranges (Tashkent, Samarkand, Navoi, Kashkadarya, Jizzakh, Surkhandarya regions). Inhabits fine earth slopes from piedmonts to the upper belt of mountains. Single specimens and small populations can be found. Limiting factors: picking of flowers, pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal, the Zaamin, the Surkhan, the Nuratau, the Kitab, the Hissar state reserves, the Zaamin and Ugam-Chatkal national parks.



СОЛАБДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ОРХИДНЫЕ –
ORCHIDACEAE

149. ТУРКИСТОН ЭУЛОФИЯСИ

Эулофия туркестанская / *Eulophia turkestanica* (Litv.) Schlecht.

Мақоми 3. Марказий Осиёнинг жанубий қисмидаги ареали ажралган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–50 см орасидаги туксиз, сариқ-бинафша рангли, кўп йиллик ўт. Илдизпояси бўғимли. Пояси 1–2 та. Барглари унча ривожланмаган, ўткир учли, пардасимон, юқори қисми учбурчак шаклидаги новни эслатади, узунлиги 2–3 см. Кечроқ тарақкий этадиган поялардаги барглари энсиз, узунчоқ, қаттиқ. Гуллари оч сариқ, пастга қараб эгилган. Кўсаги эллипссимон, узунлиги 2–2,5 см, эни 10–12 мм. Апрель ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий, Самарқанд, Сурхондарё вилоятлари: Зарафшон дарёси водийсида, Муян, Кармана, Конимех қишлоқлари атрофида, Сурхондарё хавзасида, Жаркўрғон ва Сурхон қишлоқлари ўрталарида, Денов шаҳри атрофида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тўқайларда, чийзорларда ҳамда ботқоқлашган ерларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган, унча катта бўлмаган тўплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [337].

О.Қ. Ҳожиматов.

Статус 3. Редкий эндемик южной части Центральной Азии с разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, желтовато-фиолетовое, голое, высотой 35–50 см. Корневище узловатое. Стебли в количестве 1–2, с редуцированными листьями в виде заостренных, перепончатых на верхушке, треугольных влагалищ длиной 2–3 см. Листоносные побеги развиваются позднее, с узкими, линейными, жесткими листьями. Цветки ярко-желтые, поникающие. Коробочка эллиптическая длиной 2–2,5 см, шириной 10–12 мм. Цветёт в апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Сурхандарьинской областях: Долина реки Зеравшан, у селений Муян, Кармине, Канимех, между кишлаками Сурхан и Джаркурган, окрестности города Денау.

Места обитания. Заболоченные участки, тугай и заросли чия.

Численность. Встречается редко, небольшими популяциями.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [337].

О.К. Ҳожиматов.

Rare endemic species of the southern part of Central Asia with reducing area. It is spread at the Zeravshan river valley, nearby the villages Muyan, Karmine, Kanimekh, Surkhan and Djarkurgan, nearby Denau (Bukhara, Navoi, Samarkand, Surkhandarya regions). Inhabits wetlands. It grows rarely in a small populations. Measures of protection: not protected.



**САЛЛАГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ПИОНОВЫЕ (ЛЮТИКОВЫЕ) -
РАЕОНАСЕАЕ (RANUNCULАСЕАЕ)**

150. ЁВВОЙИ САЛЛАГУЛ
Пион степной / *Paeonia hybrida* Pall.

Мақоми 3. Ўзбекистондаги сони қисқариб бораётган камёб, манзарали тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–75 см оралиғидаги кўп йиллик ўт. Илдизи урчуқсимон йўғонлашган. Барглари бандли, икки қарра уч бўлакли, бўлаклари қалами-наштарсимон. Гуллари йирик, диаметри 6–10 см. Меваси тарвақайлаган, қалин тукли. Уруғи ялтироқ, қора рангли. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Чотқол, Курама, Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида тарқалган. Қирғизистон, Қозоғистон, Ғарбий Сибирда ва Шинжон музофоти шимолидаги Жунғория худудида ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1500–2000 м баландликдаги чириндили, майда жинсли тупроқларда ва дарактларнинг тагида ўсади.

Сони. Табиатда 200–250 популяцияси борлиги аниқланган бўлиб, улардан айримлари йўқолиб кетган. Улар фақат кўриқланадиган ва чиқиб бўлмайдиган жойларда сақланиб қолган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гулларининг узиб олиниши ва тупларининг илдизи билан қазиб олиниб, ҳовлиларга экилиши ҳамда чорва молларининг кўплаб боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Кўпгина ботаника боғларида муваффақиятли равишда экиб келинмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Китоб ва Зомин кўриқхоналарида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида кўриқланади.

Манбалар. [226].

О.Қ. Ҳожиматов.

Статус 3. Редкий в Узбекистане декоративный вид с сокращающейся численностью.

Краткое описание. Травянистый многолетник высотой 25–75 см. Корни с веретенообразными утолщениями. Листья на черешках, дважды тройчаторассечённые на ланцетно-линейные доли. Цветки 6–10 см в диаметре, пурпурно-розовые. Плоды отклоненные, густоопушенные; семена блестящие, чёрные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской, Самаркандской, Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях: Чаткальский, Кураминский, Гиссарский, Зеравшанский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан, Западная Сибирь, Джунгария (Северная часть Синьцзян-Уйгурской автономии).

Места обитания. Мелкоземистые гумусированные почвы, реже под пологом деревьев на высоте 1500–2500 м.

Численность. Отмечен в 200–250 популяциях, некоторые из них уже не существуют. Очень редко на охраняемых территориях и в труднодоступных местах образует заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветков на букеты и пересадка растений на приусадебные участки, бессистемный выпас.


Культивирование. Успешно культивируется многими ботаническими садами.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском, Китабском и Зааминском государственных заповедниках, Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [226].

О.К. Хожиматов.

Rare in Uzbekistan ornamental species with the reducing quantity. It is spread at the Chatkal, the Kurama, the Hissar, the Zeravshan ranges (Tashkent, Samarkand, Surkhandarya, Kashkadarya regions). Inhabits fine earth humus soils, rarely under trees at a height of 1500–2500 m. There are 200–250 populations, some of them do not exist by this time. Very rare on the protected territories and in almost inaccessible places it forms tickets. Limiting factors: picking flowers and replantation of plants into personal plots, unsystematic pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal, the Kitab and Zaamin state reserves and the Ugam-Chatkal national park.



САНТАЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО САНТАЛОВЫЕ – SANTALACEAE

151. МИНКВИЦ ТЕЗИУМИ

Ленец Минквица / *Thesium minkwitzianum* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга хос йўқолиб кетиш арафасида турган ғоят камёб реликт ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизи кўп бошчали, ундан тик поялар ўсиб чиқади. Барглари кенг наштарсимон, чармсимон. Гуллари якка-якка, сариқ, деярли бандсиз. Гулкўрғони узун найсимон, учи 5 бўлакли. Уруғи (енчаси) эллипс шаклида, томирлари шохлиниб каттачалар ҳосил қилади. Май-июнь ойларида гуллаб, мена беради.

Тарқалиши. Ғарбий Тянь-Шанда тўртта ўсиш жойи маълум – Бошқизилсой (Ўзбекистон), Боролдойтоғ, Талас Олатоғи (Қозоғистон) ва Бешорол атрофлари (Қирғизистон).

кожистыми листьями. Цветки одиночные, желтоватые, почти сидячие, околоцветник в виде длинной трубки, наверху неглубоко рассечён на 5 лопастей. Орешек эллиптический, ячеистый от густой сети ветвящихся жилок. Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: две близко расположенных популяций имеются в западных отрогах Чаткальского хребта в бассейне реки Башкызылсай. За пределами Узбекистана: Казахстан (Боролдайтәу, Таласский Алатау), Кыргызстан (Бешарал).

Места обитания. Мелкоземистые почвы в среднегорье (1400 м).

Численность. Более 50 разновозрастных особей в Башкызылсае.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий реликтовый вид. Застройка и интенсивное хозяйственное использование территории.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Угам-Чаткальском биосферном резервате.

Источники. [160, 302].

О.К. Хожиматов.



Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1400 м баландликда майда жинс тупроқларда ўсади.

Сони. Ҳар хил ёшдаги 50 дан ортиқ тупи маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариши сабаблари. Табиатда камёб, реликт тур. Ўсимлик ўсиб турган жойларда қурилиш ишларининг олиб борилиши ва ерларнинг хўжалик мақсадида ўзлаштирилиши бу турнинг қирилиб кетишига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол биосфера резерватида муҳофаза қилинади.


Манбалар. [160, 302].

О.Қ. Хожиматов.

Статус 1. Редчайший, находящийся на грани исчезновения реликтовый вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Травянистый многолетник высотой до 50 см, с многоглавым корнем, многочисленными прямыми стеблями, широко ланцетными

ern part of the Chatkal range in the Boshkzyzylsay basin (Tashkent region). Inhabits fine earth soils in the middle belt of mountains (1400 m.s.l.). More than 50 plants were found. Limiting factors: relict species, distribution area and numbers decreasing under anthropogenic pressure. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal biosphere reserve.



**СЕМИЗАҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТОЛСТЯНКОВЫЕ –
CRASSULACEAE**

152. ҚЎНҒИРОҚГУЛЛИ СОХТАСЕМИЗАҚ

Ложноочиток колокольчикоцветный / *Pseudosedum campanuliflorum* Boriss.

Мақоми 2. Туркистон ва Қурама тоғ тизмаларининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см, тик илдизли, поялари сербарг кўп йиллик ўсимлик. Барглари қалами, узунлиги 1–1,5 см, эни 1–1,5 мм. Гултўдаси соябонли тўпгул. Гулёнбарглари чўзиқ – тухумсимон. Гуллари қисқа бандли, узунлиги 8–9 мм. Гултожи қўнғироқсимон, пуштиранг. Апрель–май ойларида гуллаб, май ойида уруғ ҳосил қилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Туркистон тизмаси, Жиззах шаҳри атрофлари (Молгузар тизмасининг "Темур дарвоза" дараси) ва Қурама тизмалари (Қашқасой)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон (Қурама тизмаси ва Мўғилтоғ).

Ўсиш шароити. Тошли ёнбағирлар, тоғнинг пастки қисмидаги қоялар.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Чорва молларининг мунтазам боқилиши, йўл қурилиши оқибатида камайиб кетган бўлиши мумкин.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [254, 289].

О.Қ. Ҳожиматов.

Статус 2. Редкий эндемик Туркестанского и Кураминского хребтов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10–15 см, с мощным вертикальным корнем, густо облиственными многочисленными стеблями. Листья линейные, 1–1,5 см длины, 1–1,5 мм ширины. Соцветие зонтиковидно-щитковидное. Прицветники продолговато-яйцевидные. Цветы 8–9 мм длины, на коротких цветоножках. Венчик колокольчатый, розовый. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае.

Распространение.

Джизакская область: Мальгузарский хребет (ущелье Темирлановы ворота), Ташкентская область: Кураминский хребет (Кашкасай). За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, скалы в нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.

Культивирование. Не культивировался.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [254, 289].

О.К. Ҳожиматов.

Rare endemic species of the Turkestan and Kurama ranges. It is spread at the Malguzar range: the Timur's gate gorge (Jizzakh region) and the Kurama range (Tashkent region). Inhabits stony slopes and rocks. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



СИГИРҚУЙРУҚДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО НОРИЧНИКОВЫЕ – SCROPHULARIACEAE

153. БУХОРО СПИРОСТЕГИЯСИ

Спиростегия бухарская / *Spirostegia bucharica* (B. Fedtsch.) Ivanina

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–60 см оралиғидаги паҳмоқ туклар билан қопланган икки йиллик ўт. Поялари 1–4 та, оддий, баъзан шохланган. Барглари тухумсимон-чўзик, кетма-кет жойлашган, четлари ай-рисимон тишли. Гуллари якка-якка, поянинг юқори қисмидаги баргларининг қўлтиғида жойлашган. Косачаси найсимон-кўнғироқсимон, узунлиги 12–15 мм, учбурчак наштарсимон тишли. Гултожи сап-сарнқ, воронқасимон, узунлиги 25–45 мм. Кўсак меваси чўзик тухумсимон, узунлиги 15 мм. Уруғи майда. Июль–август ойларида гуллаб, меваси сентябрь–октябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадаре, Сурхондаре вилоятлари: Ғузор, Деҳқонобод, Қизилча, Оқрабод, Шўроб, Оқтош, Қораил, Чарқауқ ва Озод қишлоқлари атрофида тарқалган. Туркменистонда (Кўхитанг) ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Гипсли оҳақтошларда, оҳақгилларда, гипсли қояларда, баъзан майда жинсли туңроқларда ўсади.

Сони. Тулларининг умумий сони 15 мингдан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилганлиги ва чорва молларининг узлуксиз боқилиши ўсимликнинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстириш устида олиб борилган кўп йиллик тажрибалар натижасиз тугади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [101, 156–159, 310].

Ф.У. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой 20–60 см, густо мохнато опушенное, клейкое от железистых выделений. Стебли в количестве 1–4, простые, реже ветвистые. Листья очередные, яйцевидно-продолговатые, по краю вильчато-зубчатые. Цветки одиночные в пазухах листьев верхней половины стебля. Чашечка колокольчато-трубчатая, длиной 12–15 мм, с тре-

угольно ланцетными цельными зубцами. Венчик ярко-жёлтый, воронковидный, длиной 25–45 мм. Коробочка удлинённо-яйцевидная длиной 15 мм. Семена мелкие. Цветёт в июле–августе, плодоносит в сентябре–октябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: окрестности Гузара, Дехканабада, Кызылчи, Акрабада, Шураба, Караила, Чарқауқ, Ақташ, Азада. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Загипсованные известняки, скалы чистого гипса, реже мелкоземистые, сильно загипсованные субстраты.

Численность. Общая численность не превышает 15 тысяч экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Уменьшение площадей пестроцветов и выпас.

Культивирование. Многочисленные попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУЗ оказались неудачными.


Меры охраны. Охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.

Источники. [101, 156–159, 310].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: nearby Guzar, Dekhanabad, Kyzylcha, Akrabad, Shurab, Karail, Charkauk, Oktash, Azad (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous slopes. Total number does not exceed 15 thousand specimens.

Limiting factors: decreasing of gypseous area and pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



154. ЙИРИК ШЕРОЛЧИН

Мытник большой / *Pedicularis grandis* Popov ex Vved.

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Попук илдизли ўсимлик. Пояси якка-якка, тик, наматсимон тукли, баландлиги 50–80 см. Барглари навбат билан ўрнашган, чўзиқ, патсимон қирқилган. Тўпгули 20–40 см узунликда. Косачаси наматсимон тукли, узунлиги 30–33 мм, найчаси билан бўртиб туради. Қалпоқчаси ўроқсимон эгилган, узун тумшукчали. Лабчаси тишли, 3 бўлакчи. Иккита чангчисининг ипи қалин тукли, бошқа иккитасиники туксиз.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Филон қишлоғи атрофида тарқалган) Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги дарёларнинг қирғоқларида жойлашган ўрмонларда ўсади.

Сони. 25 йил мобайнида бу турни топиш устида олиб борилган ишлар натижасиз тугади. У бу-

тунлай йўқолиб кетган бўлса керак.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайган бўлса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 176].

О.К. Ҳожиматов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Корень мочковатый. Стебель одиночный, прямой, мохнато пушистый, 50–80 см высоты. Листья очередные, удлиненно продолговатые, перисто рассеченные. Соцветие 20–40 см длины. Чашечка серо мохнатая 12–14 мм длины. Венчик желтоватый 30–33 мм длины, с выступающей трубкой. Шлем серповидно согнутый с длинным носиком. Губа зазубренная, трехлопастная. Нити 2 тычинок мохнатые, 2 других голые. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет, окрестности кишлака Гилян. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Пойменные леса в среднем поясе гор.

Численность. Многочисленные попытки в течении 25 лет найти этот вид в классическом местонахождении не увенчались успехом. Вид, видимо, полностью исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 176]

О.К. Ҳожиматов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western parts of the Hissar mountains, nearby the village Ghilan (Kashkadarya region). Inhabits river forests. Several collecting missions during last 25 years to find these species were unsuccessful. Probably, species disappeared. Measures of protection: not protected.



СУТЛАМАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МОЛОЧАЙНЫЕ – EUPHORBACEAE

155. ВВЕДЕНСКИЙ АНДРАХНАСИ

Андрохна Введенского / *Andrachne vvedenskyi* Pazij

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий худудларига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган ярим бута. Ёш поялари ғадир-будур. Ёғочланган кулранг ва кўнғир шохлари кўплаб сақланиб қолади. Барги қалин этли, кенг эллипсимон, юмалоқ, баъзан тесқари-тухумсимон, тўмтоқ ёки учли. Гуллари айрим жинсли, барг кўлтиқларида 1–2 тадан жойлашган. Чангчи гули ингичка, уруғчи гули йўғон гул бандда жойлашган. Кўсакчаси деярли юмалоқ, 3 бўлакли. Мева бандининг узунлиги 8–10 мм. Июль ойида гуллаб, меваси пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Сурхон-Шеробод водийсида (Шакарли Остона) тарқалган.

Ўсиш шароити. Очиқ ола жинсларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ўсади. Бир жойдан 2 марта йиғилган.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмади.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 40 см. Молодые стебли очень шероховатые. В изобилии сохраняются одревесневшие старые серые и буроватые ветви. Листья мясистые, широко-эллиптические, округлые или реже обратно-яйцевидные, тупые или заострённые. Цветки разнополые, в пазухах листьев по 1–2. Мужские цветки на тонких цветоножках, женские – на толстых. Коробочка почти шаровидная, трёхлопастная. Плодоножка длиной 8–10 мм. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Сурхан-Шерабадская долина – Шакарлык-Астана.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.



Численность. Встречается единично. Собран два раза.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Surkhan-Sherabad valley: Shakarlyk-Astana (the Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Single specimens were collected two times. Measures of protection: not protected.



156. АЙРИШОХ СУТЛАМА
Молочай густоватый / *Euphorbia densiuscula* Popov

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–10 см орасидаги бир йиллик ўт. Пояси қисқа, қалин баргли, шоҳланган, хурпайган қисқа тукли. Барглари этли, тескари тухумсимон, асосига қараб ингичкалашиб боради ва барг бандига айланади. Тўпгули қалқонсимон, кўп марта айри бўлиб шоҳланган. Кўсаги тухумсимон, уч бўлакли, етилмагани қисқа тукли, пишгани деярли туксиз. Май–июнь ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида – Боғлидара довоғида, Оқтош қишлоғи атрофида, Ҳисор тизмасида – Бойсун яқинидаги Каттақамиш қишлоғи атрофларида учрайди. Туркманистонда ҳам учрайди (Келиф атрофида).

Ўсиш шароити. Гипсли, ола жинсларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 5–10 см. Стебель укороченный, густо облиственный, ветвистый, коротко оттопырено волосистый. Листья мясистые, обратнойцевидные, к основанию постепенно суженные в черешках. Соцветие щитковидное, многократно дихотомически-ветвящееся. Коробочка яйцевидно-трёлопастная, молодая – коротко опушенная, зрелая – почти голая. Цветёт и плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности Байсуна у селения Каттакамыш; хребет Кугитанг (ущелье Боғлидара, окрестности кишлака Акташ). За пределами Узбекистана – Туркменистан (окрестности Келифа).

Места обитания. Гипсированные пестроцветы.



Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Сурханского государственного заповедника.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: around Baysun town near the settlement of Kattakamysh; the Kughitang range: the Boglidara gorge, around the Aktash village (Surkhandarya region). Inhabits gypseous soils. Single specimens can be found. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



157. КУДРЯШЕВ СУТЛАМАСИ

Молочай Кудряшева / *Euphorbia kudrjashevii* (Pazij) Prokh.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган, жингалак туклар билан қопланган кўп йиллик ўт. Пояси тик, оддий, барглари кўп. Поянинг пастки барглари тангачасимон, қўнғир рангли, чўзиқ, поядаги барглари эса чўзиқ қалами, узунлиги 2-4,5 см, эни 2-4 мм, асоси юмалоқ, учли, текис қиррали. Соябони 3-6 та, оддий нурли. Кўсакчаси юмалоқ, узунлиги 6 мм, жингалак тукли. Июнь-июль ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Бешнов тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори (яйлов) қисмида ўсади.

Сони. 1937 йили бир марта йиғилган. Ўсимликни топиш учун сўнги йилларда олиб борилган изланишлар натижа бермаган. Тур бутунлай йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғининг яхши унмаслиги, тоғнинг юқори қисмида учраши унинг кам тарқалишига сабаб бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Причины изменения численности и ареала. Пассивный способ распространения семенного материала, выпас и изоляция.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Beshnau mountain (Kashkadarya region). Inhabits subalpine zone. The quantity is unknown. It was collected only once in 1937. Several attempts to find out these species had no success. Limiting factors: passive way of seed material distribution, pasturing and isolation. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



Статус 1. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20 см, курчаво пушистое. Стеблей несколько, они прямостоячие, простые, густо облиственные. Нижние листья чешуевидные, бурые, продолговатые; стеблевые – продолговато-линейные, длиной 2-4,5 см, шириной 2-4 мм; в основании округлые, острые, цельнокрайные. Зонтик 3-6-лучевой, с простыми лучами. Коробочка шаровидная, длиной 6 мм, курчаво пушистая. Цветёт и плодоносит в июне-июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – горы Бешнау.

Места обитания. Субальпийский пояс гор.

Численность. Собран один раз в 1937 г. Многократные попытки найти вид не увенчались успехом. Вид, по видимому, исчез.

Размножение. Семенное.



158. ТИҒИЗ СУТЛАМА

Молочай ложногустоватый / *Euphorbia densiusculiformis* (Pazij) Botsch.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий худудига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 8 см га етадиган бир йиллик ўт. Пояси қисқа, шохланган. Барглари этли, кураксимон ёки чўзиқ-тухумсимон, қисқа бандли. Қалқонсимон тўпгули барг қўлтиғидаги гулли шохлар билан ўралган. Кўсакчаси, одатда, узун бандли, тухумсимон, уч бўлаккли, силлиқ. Апрель-май ойларида гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Бойсун ва Шеробод атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсли қолдиқ тоғларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение высотой до 8 см. Стебель укороченный, ветвистый. Листья мясистые, лопатчатые или продолговато-яйцевидные, короткочерешковые. Соцветие щитковидное, окруженное пазушными цветonosными ветвями. Коробочка обычно на длинной ножке, яйцевидно-трёхлопастная, гладкая. Цветёт и плодоносит в апреле-мае.

Распространение. Сурхандарьинская область: окрестности Байсуна и Шерабада.

Места обитания. Пестроцветные низкогорья.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the surroundings of Baysun and Sherabad towns (Surkhandarya region). Inhabits gypseous low mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



159. УЧТИШЛИ СУТЛАМА

Молочай трёхзубчатый / *Euphorbia triodonta* Prokh.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудига хос жуда камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 6–15 см, туксиз, кўк-яшил рангли, бир йиллик ўт. Пояси қисқа, деярли асосидан шохланган. Поядаги барглари бандсиз, текис қиррали, пастки 2 жуфт барглари қарама-қарши, қолганлари навбат билан жойлашган, узунлиги 4,5–5 мм, эни 1–1,5 мм. Гулолди барглари қарама-қарши жойлашган, қалами, узунлиги 10–15 мм, эни 1,5–4 мм, учта томирли. Тўпгули айри бўлиб шохланган, тарвақайлаган. Кўсакчасининг узунлиги 3–3,5 мм, эни 2–2,5 мм. Уруғи чўзиқ, олти қиррали, узунлиги 1,5–2 мм, оқиш ёки кулранг. Апрель ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Сурхон-Шеробод водийси (Шеробод атрофлари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Гипсли ва шўр тупроқли енбағирларда усади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Статус 1. Редкий узкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение, голое, сизоватое, высотой 6–15 см. Стебель укороченный, почти от основания ветвящийся. Стеблевые листья сидячие, цельнокрайные, 2 нижние пары супротивные, остальные-очередные, длиной 4,5–5 мм, шириной 1–1,5 мм. Прицветные листья супротивные, линейные, длиной 10–15 мм, шириной 1,5–4 мм, 3-нервные. Соцветие дихотомически ветвистое, растопыренное. Коробочка длиной 3–3,5 мм, шириной 2–2,5 мм. Семена продолговато-шестигранные, длиной 1,5–2 мм, беловатые или серые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхондарьинская область: Сурхон-Шерабадская долина – окрестности г. Шерабад.

Места обитания. Засоленные и гипсовые склоны низкорослых.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 212, 257].

Т. Насимова.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Surkhan-Sherabad valley (Surkhandarya region). Inhabits saline and gypsum slopes of low mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



160. ҚАДАҲСИМОН СУТЛАМА

Молочай твёрдобокальчатый / *Euphorbia sclerocyathium* Korovin et Popov

Мақоми 1. Орол ва Каспий атрофидаги чўлларда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см оралиғидаги туксиз, кўк-яшил, кўп йиллик ўт. Пояси кўп, тик, асосидан шохланган. Барглари этли, бандсиз, текис қиррали, наштарсимон, эллипс шаклда, баъзан қалами-наштарсимон. Кўсакчаси 4,5 мм узунликда, юмалоқ-тухумсимон, силлиқ. Уруғи тухумсимон, 2–3 мм узунликда, оч кулранг. Май–август ойларида гуллаб, меваси июнь–сентябрда етилади.



Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Устюртда, Коринёриқ, Шахбахта ва Борсакелмас қишлоқлари ҳамда Табансу, Қорабавур қудуқлари атрофларида тарқалган. Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли ва қумли чўлларда, шўрхоқ, шўрланган кулранг-кўнғир тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва ҳудудда нефть-газ саноатининг ривожланиши сабабли камайиб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [159, 212, 257].

Х.Ф. Шомуродов.

Статус 1. Редкий эндемик Приаральских и Прикаспийских пустынь.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 20–40 см, сизое, голое. Стебли многочисленные, прямостоячие, от основания сильно-ветвистые. Листья мясистые, сидячие, цельнокрайные, ланцетовидно-эллиптические, реже линейно-ланцетовидные. Коробочка длиной 4,5 мм, шаровидно-яйцевидная, гладкая. Семена яйцевидные, длиной 2–3 мм, бледно-серые. Цветёт в мае–августе, плодоносит в июне–сентябре.

Распространение. Каракалпакстан: Устюрт, окрестности колодца Табансу, Карабаур, посёлок Карын-Ярык, селение Барсакельмас. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Каменистые и песчаные пустыни, солончаки, засоленные серо-бурые и гипсоносные почвы.

Численность. Встречается спорадически единично и небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное (за счёт корневища).

Причины изменения численности и ареала. Развитие нефте-газового сектора в регионе и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 212]

Х.Ф. Шомуродов.

Rare endemic species of the Aral and Caspian deserts. It is spread at the Ustyurt Plateau, nearby Tabansu, Karyn-Yaryk, Barsakelmas (Karakalpakstan). Inhabits stony and sandy deserts, saline soils, saline grey-brown soils. Sporadically isolated or small groups can be found. Limiting factors: pasturing and increasing of oil-gaz operational infrastructures. Measures of protection: not protected.



ТАЛОҚДОР ИДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО НАСТОЯЩИЕ ПАПОРОТНИКИ – ASPLENIACEAE

161. ҚОЯ ҒОРЎТИ

Листовик сколопендровый / *Phyllitis scolopendrum* (L.) Newman

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб тур.
Қисқача тавсифи. Қирққулоқ (папоротник). Барглари йирик, узунлиги 40 см га етади, эни 6 см, узун бандли. Япроғи наштар-тасмасимон, четлари тўлқинсимон, асоси юраксимон. Соруслари қалами, узунлиги 2,5 см, асосий томирнинг икки томонида сал қийшиқ жойлашган, пардали. Июль–августда споралайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом тизмаси (Сижжаксой)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Туркманистон (Копетдоғ) ва Ўрта Ер денгизи атрофларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларнинг сояларида ўсади.

Сони. Якка-якка ва кичик гуруҳлар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Споралари билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [63, 159].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий вид в Западном Тянь-Шане.

Краткое описание. Папоротник. Листья крупные, до 40 см длины и 6 см ширины, длинночерешковые; пластинка листа ланцетно-ремневидная, с волнистым краем, в основании сердцевидная; сорусы линейные, до 2,5 см длины, косо расположенные по обе стороны главной жилки, имеются покрывальца. Спороношение в июле–августе.

Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет (Сиджаксай). За пределами Узбекистана: Копетдаг, Средиземноморье.

Места обитания. В тени скал среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически единичными особями и группами.



Размножение. Спорами.

Причины изменения численности и ареала. Не известны.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [63, 159].

Ф.О. Ҳасанов

Rare relict species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent region: the Ugam range, Sidjaksay. Inhabits shadows of rocks. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkhal national park.



**ТОРОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ГРЕЧИШНЫЕ –
POLYGONACEAE**

162. МАЙИН ТУКЛИ ҚАНДИМ

Кандым мягкий / *Calligonum molle* Litv.

Мақоми 2. Қизилқумда кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–100 см баландликдаги бироз тирсаксимон шохланган бута. Гули оч пушти. Гулқўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилади. Меваси юмалоқ-тухумсимон, узунлиги 25–30 мм, эни 20–25 мм, қизғиш. Қанотчалари ингичка, эни 2–3 мм. Ёнқоқчаси тўғри, узунлиги 10–13 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда мевалайди.



Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда (Денгизкўл атрофлари) тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум уюмларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Баъзан кичик-кичик тўплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур тарқалган ерларда муттасил чорва моллари боқилади. Шунингдек, ундан ўтин сифатида фойдаланилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 50–100 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки светло-розовые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод округло-яйцевидный, длиной 25–30 мм и шириной 20–25 мм, красноватый. Крылья узкие, шириной 2–3 мм. Щетинки сидячие в 2 ряда, трижды-четырежды

ветвящиеся на нитевидные доли. Орешек прямой, длиной 10–13 мм. Цветет в апреле-мае, плодоносит в мае-июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – окрестности озера Денгизкуль. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Закрепленные грядово-бугристые пески.

Численность. Не установлена, редко образует небольшие популяции.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Использование массива под выпас. Заготовка на топливо.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake (Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing and use as wood. Measures of protection: not protected.



163. МАТТЕЙ ҚАНДИМИ

Кандым Маттея / *Calligonum matteianum* Drobow

Мақоми 1. Қизилқумдаги кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–150 см, бироз эгри-тирсаксимон шохланган бута. Гуллари пушти. Гулқўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилади. Меваси деярли шарсимон, эни 15–20 мм, очсариқ ёки қизғиш. Дағал тукларининг узунлиги 5–7 мм, 8 қатор бўлиб ўрнашган, ингичка, юмшоқ, эгилувчан. Ёнғоқчаси дағал туклар орасида жойлашганлиги учун деярли кўринмайди, узунлиги 7–12 мм, 90 даража буралган. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда (Денгизкўл атрофида) тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум тепаликлариди ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда жуда кам миқдорда тарқалган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ. Об-ҳаво қулай келган йиллари уруғидан чиққан ниҳолларни учратиш мумкин.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Ўсимлик тарқалган жойларда кўшлар чорва моллари боқилади. Шунингдек, ўтин сифатида ишлатилиши ўсимлик кўпайишига салбий таъсир қилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.



Статус 1. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 70–150 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки розовые. Околоцветник при плодах отогнут вниз.

Плод почти шаровидный, шириной 15–20 мм, светложёлтый или красноватый. Щетинки расположены в 8 рядов, тонкие, мягкие, гибкие, длиной 5–7 мм. Орешек почти скрытый щетинками, длиной 7–12 мм, повернутый на 90 градусов. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – озеро Денгизкуль. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Грядово-бугристые закреплённые пески.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake (Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



164. НОЗИК ҚАНДИМ

Кандым изящный / *Calligonum elegans* Drobow

Мақоми 2. Фарғона водийсидаги туб ола жинсларда тарқалган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–100 см, тирсаксимон шохланган бута. Гулқўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилган. Меваси овалсимон ёки шарсимон, узунлиги 10–15 мм, сариқ ёки қизил. Қанотчалари юпқа, ясси, четлари нотекис майда тишчали, қирралари майда тишли. Ёнғоқчаси 10 мм узунликда, 90 даража буралган. Апрельда гуллаб, май ойида мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона водийси: Фарғона вилояти Гумхона, Оқчўп, Оқбел, Супатоғ ва Қорақалпоқ чўлида тарқалган. Тожикистон (Вахш водийси)да ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Туб ола жинсли тупроқларда, туб жинслари ер юзига яқин жойлашган қумларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда сийрак ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқиши ўсимликка салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.

Rare endemic species of the gypseous rocks in the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley: Gumkhona, the Karakalpak Steppe, Akchop, Akbel, Supatau (Ferghana region). Inhabits outcrops of gypseous rocks and sands with not deep bed of primary rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



Статус 2. Редкий вид пестроцветных толщ Ферганской долины.

Краткое описание. Кустарник высотой 50–100 см с коленчато-извилистыми ветвями. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод овальный или слегка шаровидный, длиной 10–15 мм, жёлтый или красный. Крылья нежные, плоские, по краю неравно-мелкозубчатые. Орешек длиной 10 мм, повернут на 90 градусов. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ферганская долина: Ферганская область – Гумхона, Акчоп, Акбель, Супатау и Каракалпакская степь. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и пески с неглубоким залеганием коренных пород.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.



165. ОҲАКТОШ ҚАНДИМИ

Кандым известковый / *Calligonum calcareum* Pavlov

Мақоми 1. Туркистон тизмасида кичик май-дончаларда ўсадиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см баландликдаги тирсаксимон эгри-бугри шохланган бута. Гуллари оқ. Гулқўрғони мевалаётганида пастга эгилади. Меваси чўзиқ-овал шаклида, узунлиги 10–15 мм, эни 7–10 мм, сариқ ёки қизил. Қанотчалари кенг-наштарсимон, асоси ўйилган, юқори қисми ўткир учли, қирраси нотекис ўткир тишчали, устки қисми (сирти) оддий ёки айрисимон тиканли. Ёнғоқчаси тўғри, узунлиги 7–10 мм. Апрельда гуллаб, май ойида мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Сўх ва Исфара дарёлари ҳавзаларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Очқ оҳактошли ёнбағирларда ва дарё қирғоқларидаги гипсли қум-шағалли жойларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Айрим об-ҳаво қулай келган йиллари уруғидан чиққан ниҳолларини кузатиш мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ўсимликнинг кўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.

Статус 1. Редкий эндемик Туркестанского хребта.

Краткое описание. Кустарник высотой 30–40 см с коленчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод продолговато-овальный, длиной 10–15 мм, шириной 7–10 мм, жёлтый или светло-красный. Крылья широко ланцетные, при основании с выемкой, наверху заострённые (не закруглённые). Края крыльев неравно-острозубчатые, на поверхности у края с простыми, реже вильчатыми щетинками. Орешек длиной 7–10 мм, прямой. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Ферганская область: Бассейны рек Сох и Исфара. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Открытые известняковые склоны и гипсированные песчано-галечниковые берега рек.

Численность. Не установлена.

Размножение. В отдельные благоприятные годы наблюдаются семенные всходы.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.



Rare endemic species of the Turkestan range. It is spread at the Sokh and Isfara river basins (Ferghana region). Inhabits open limestony slopes and gypseous sandy-pebble river banks. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.




166. ПАЛЕЦКИЙ ҚАНДИМИ

Кандым Палецкого / *Calligonum paletzkianum* Litv.

Мақоми 3. Қизилқумдаги кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 100–200 см баландликдаги эгри-бугри тирсаксимон шохланган бута. Гули оқ. Гулкўрғони мевалаётганда пастга қараб эгилган. Меваси эллипс-шарсимон ёки деярли шарсимон, эни 40–50 мм, қизил. Қанотчалари ту-



хумсимон, эни 3–5 мм, туксиз. Четлари 1,5–3 мм ўйилган. Ёнғоқчаси 12–15 мм узунликда, тўғри, ҳар томонидан кўриниб туради. Апрель–май ойларида гуллайди, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда (Денгизкўл атрофларида) тарқалган. Туркменистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамланган қум уюмларида ўсади.

Сони. Кам учрайди. Кичик-кичик тўплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган майдонлардан чорвачиликда муттасил фойдаланилади, шунингдек, ўтин сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстиришга уриниб кўрилган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.

Статус 3. Редкий вид Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 100–200 см с коленчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут книзу. Плод эллиптически-шаровидный или почти шаровидный, шириной 40–50 мм, красный. Крылья овальные, шириной 3–5 мм, голые. Края крыльев до 1,5–3 мм надрезанные. Орешек длиной 12–15 мм, прямой, видимый со всех сторон. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – озеро Денгизкуль. За пределами Узбекистана: Туркменистан, Таджикистан.

Места обитания. Закрепленные грядово-бугристые пески.

Численность. Встречается очень редко, образуя небольшие популяции.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Усиленный выпас, заготовка на топливо.

Культивирование. Были попытки культивировать в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

М.М. Набиев.



Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: around the Dengizkul Lake (Bukhara region). Inhabits fixed ridge-hilly sands. Very rarely forming small populations can be found. Limiting factors: over-pasturing. Measures of protection: not protected.



167. ЗОКИРОВ ҚАНДИМИ

Кандым Закирова / *Calligonum zakirovii* (Khalk.) F.O. Khass.

Мақоми 1. Қизилқумдаги кичик майдонларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–150 см, бироз эгри-тирсаксимон шохланган буга. Гуллари оқ. Гулқўргони мевалаётганда пастга қараб эгилади. Меваси деярли шарсимон, эни 10–12 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, май–июнда мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқум чўл станцияси атрофида тарқалган.

Ўсиш шароити. Мустаҳкамлашган гипсли тепаликларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган. Кичик майдонларда жуда кам миқдорда тарқалган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Ўсимлик тарқалган жойларда кўплаб чорва моллари боқилади. Шунингдек, ўтин сифатида ишлатилиши ўсимлик кўпайишига салбий таъсир қилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 204, 270].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Кустарник высотой 70–150 см со слабоколенчато-извилистыми ветвями. Цветки белые. Околоцветник при плодах отогнут вниз. Плод почти яйцевидный, розоватый, с плоскими чешуйками, 10–12 мм. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы – окр. Кызылкумской пустынной станции.

Места обитания. Гипсы.

Численность. Не установлена.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 204, 270].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: nearby the Kyzylkum biostation. Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



ТОШБАҚАТОЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО РУТОВЫЕ –
RUTACEAE

168. БУХОРО ТОШБАҚАТОЛИ

Цельнолистник бухарский / *Haplophyllum bucharicum* Litv.

Мақоми 2. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп пояли ярим бута, бўйи 15–35 см, шохлари туксиз. Барглари сал этли, наштарсимон, бутун, деярли бандсиз. Тупгули рўваксимон, яси, камгулли. Косача барглари тукилмайди, чузиқ-тухумсимон, тўмтоқроқ, узунлиги 1–1,5 мм. Гултожи сариқ, туксиз, кенг тухумсимон, тўмтоқ, қисқа 6–8 мм узунлиқдаги қайтақили. Чангчи иплари кўшилмаган, деярли тенг, безчали туклари йўқ, туксиз, асоси тўп тукли. Тугунчаси бандли, туксиз, бўртмали. Қусаги бандли, очиладиган, туксиз, бўртмали, эни 4–5 мм. Май–июнда гуллаб, меваси июнь–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқлари (Дехқонобод, Оқраёт, Тойчи, Шўроб атрофлари) ҳамда Кўхитанг тоғолди ҳудудларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Қизил қумтошли тупроқларда ўсади.

Сони. Шўроб атрофида 120, Келиф-Шеробод (Зарабоғ) тепаликларида 200 га яқин туп борлиги аниқланган. Арелининг бошқа қисмида сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий майдонларнинг ўзлаштирилиши ва молларнинг кўплаб боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [159, 310].

Н.К. Раҳимова.

Статус 2. Узколокальный эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многостебельный полукустарник 15–35 см высоты с травянистыми голыми веточками. Листья чуть мясистые, ланцетные, цельнокрайные, почти сидячие. Соцветие метельчато-щитковидное, малоцветковое. Чашелистики остающиеся, продолговатояйцевидные, туповатые, 1–1,5 мм длины. Лепестки желтые, голые, широко яйцевидные, тупые вогнутые, с очень коротким ноготком, 6–8 мм длины. Нити тычинок свободные, почти равные, без железок, голые, при основании бородавчатые. Столбик толстый, голый. Завязь на ножке, голая, бугорчатая. Коробочка открывающаяся на ножке, голая, бугорчатая с придатками, 4–5 мм ширины. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–августе.

Распространение. В Кашкардинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта (окрест-

ности поселков Дехканабад, Акрабад, Тойчи, Шураб), предгорья Кугитанга. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. 120 растений в окр. Шуроб, 200 растений на Келиф-Шерабадской гряде (Зарабаг). На остальной части ареала численность не известна.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Дегградация естественных местообитаний и выпас.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 310].

Н.К. Раҳимова.



Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the south-western branches of the Hissar range (around Dехkanabad, Akraбаd, Toychi, Shurab villages), the piedmonts of the Kughitang range (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits red sandstones. 120 plants were revealed nearby the village Shurob, and 200 plants-nearby Zarabag village. The numbers of the other populations is unknown. Limiting factors: degradation of gypseous slopes and pasturing. Measures of protection: not protected.

ТОШЁРАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КАМНЕЛОМКОВЫЕ – SAXIFRAGACEAE

169. УГОМ БАДАНИ

Бадан угамский / *Bergenia ugamica* V.N. Pavlov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб, реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см гача етадиган қўп йиллик ўт. Илдизпояси ва пояси йўғон. Ёпирма барглари бандли, қалин, узунлиги 15 см гача, эни 13 см, четлари кунгурали ёки қўшалоқ тишли. Тўпгули зич рўвак-қалқонсимон, безчасимон тукли. Гуллари тўқ пушти рангли. Чангчилари 10 та. Устунчаси 2 та. Июль–август ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом ва Писком тизмаларида тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2300–2500 м баландликда қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Табиатда кичик тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [19, 27, 159].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий, узколокальный, реликтовый вид Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебель толстый, переходящий в толстое корневище. Прикорневые листья черешковые, толстые, длиной до 15 см и шириной до 13 см, по краю неясно городчатые или двоякозубчатые. Соцветие плотное, метельча-

то-щитковидное, железисто опушенное. Цветки ярко-малиново-розовые. Тычинок 10, столбиков 2. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: Угамский и Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Трещины скал в субальпийском поясе гор (2300–2500 м).



Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [19, 27, 159].

К.Ш. Тожибаев.

Rare, relict species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range: the Ugam valley (Tashkent region). Inhabits cracks of rocks in the subalpine zone (2300–2500 m). The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



170. ҲИСОР БАДАНИ

Бадан гиссарский / *Bergenia hissarica* Boriss.

Мақоми 2. Ҳисор тизмасига хос камёб, реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Ёпирма барглари йирик, тескари-тухумсимон, тўмтоқ, четлари қаттиқ киприксимон тукли. Илдиз-пояси йўғон. Пояси ер бағирлаб ўсади, деярли баргсиз. Тўпгуллари ёйиқ. Тожбарглари оқ рангли, йирик, юмалоқ. Уруғи майда. Май-июнь ойларида гуллайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида Тўпаланг дарёси ҳавзаси (Тамшуш)да, Муш ва Хурватан қишлоқлари оралиғида, Шотрут дарёсининг Тўпаланг дарёсига қуйилиш ерида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги қояларнинг ёриқларида ва тошли тик ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари томонидан истеъмол қилиниши, ўзига хос шароитда ўсганлиги учун ҳам камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [19, 27, 159].

К.Ш. Тожибаев.



Статус 2. Редкий, реликтовый эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение, с крупными розеточными обратнойцевидными, тупыми, по краю жёстко реснитчатыми листьями, высотой около 20 см. Корневище мощное. Стебель приподнимающийся почти безлистный. Соцветие рыхлое. Лепестки белые, крупные, округлые. Семена мелкие. Цветёт в мае-июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – река Тупаланг (Тамшуш) – между кишлаками Муш и Хурватан и по реке Шатрут у слияния с рекой Тупаланг.

Места обитания. Трещины скал и каменные крутые склоны гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. По-видимому, семенное.

Причины изменения численности и ареала. Поедается животными. Приуроченность к местообитаниям.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [19, 27, 159].

К.Ш. Тожибаев.

Rare relict endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range: the Tupalang valley (Tamshush); between the villages Mush and Khurvatan and along the Shatrut river up to joinig with the Kshrut river (Surkhandarya region). Inhabits cracks of rocks and stony steep slopes of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: confinedness to habitat, eating by animals. Measures of protection: not protected.



ТУТДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ТУТОВЫЕ – MORACEAE

171. ЁВВОЙИ АНЖИР

Инжир дикий / *Ficus carica* L.

Мақоми 2. Марказий Осиё ҳудудига хос ниҳоятда камёб, ареали ажралган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 5–8 м га етадиган дарахт ёки бута. Барглари навбат билан жойлашган, 3–5 бўлакли, пастки томони тукли. Тўпгули барг қўлтиғида биттадан жойлашган, қисқа бандли, меваси ноксимон. Бир йилда икки-уч мартагача ҳосил беради. Апрель ойида гуллаб, меваси июль–август ойларида пишади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида Сангардак ва Тўпаланг дарёлари-нинг ҳавзаларида тарқалган. Тожикистон ва Туркменистонда ҳам ўсади.



Ўсиш шароити. Дарё ҳавзаларида тош-шағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Вегетатив йўл билан (қаламчасидан ва бачкисидан) кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишки совуқ, баҳорги селлардан зарар кўради. Шунингдек, ўтин сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Анжир навларини етиштиришда фойдаланилади.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [205, 225].

Р.И. Қозоқбоев.

Статус 2. Крайне редкий вид в Центральной Азии.

Краткое описание. Небольшое дерево или кустарник высотой 5–8 м, с очередными 3–5-лопастными, снизу пушистыми листьями. Соцветия пазушные, на коротких ножках, одиночные, грушевидной формы. Плод грушевидный. В год плодоносит 2–3 раза. Цветёт в апреле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейны рек Сангардак, Тупаланг. За пределами Узбекистана: Китай, Таджикистан и Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые субстраты в долинах рек.

Численность. Не установлена.

Размножение. Корневыми отпрысками, пневой порослью и черенками.

Причины изменения численности и ареала. Повреждение морозами, селевыми потоками, заготовка на топливо.


Культивирование. Используется для выведения новых сортов инжира.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [205, 225].

Р.И. Казакбаев.

Extremely rare species in Central Asia. It is spread at the Hissar range: the Sangardak and Tupalang river basins (Surkhandarya region). Inhabits stony substrates in the river valleys. The quantity is unknown. Limiting factors: damage by frosts, mud-streams. Measures of protection: not protected.



ТУЯТОВОНДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ПАРНОЛИСТНИКОВЫЕ - ZYGOPHYLLACEAE

172. БУХОРО ТУЯТОВОНИ

Парнолистник бухарский / *Zygophyllum bucharicum* B Fedtsch.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги паст тоғларда тарқалган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м га етадиган серсох бута. Барглари 2 баргчали, 5–7 мм узунликдаги бандлари орқали шохларга ўрнашган. Япроқчалари қалами, серэт, узунлиги 5–7 мм, ёш япроқчалари майин тукли, вақт ўтиши билан туксизланади. Тожбарглари сарик, 10–12 мм узунликда. Меваси деярли шарсимон, туксиз, 5 уячали кутича, уячалари кенг қанотчали. Апрель–май ойлариди гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмаси ва Сурхондарёнинг қуйи оқимида тарқалган. Туркменистон ва Жанубий Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Паст тоғлардаги гипсли ола жинсларда ўсади.

Сони. 4 популяцияси (60 туп ўсимлик) борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Майдони қисқариб бораётган ола жинсли ёнбағирларда ўсадиган реликт тур.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [30, 159, 310].

Э.Э. Эргашев.

Статус 1. Редкий реликтовый эндемик Южно-го Памиро-Алая.

Краткое описание. Очень корявый кустарник высотой до 1 м. Листья с 2 листочками, на черешках длиной 5–7 мм, на коротких веточках. Листочки очень мясистые, линейные, длиной 5–7 мм, молодые – слегка пушистые, взрослые – голые. Цветки жёлтые, длиной 10–12 мм. Плод голая, почти шарообразная 5-гнездная, по гнездам ширококрылая выемчатая коробочка. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда (найден впервые на территории Узбекистана в 2009 г. в 5 км восточнее к. Акташ). За пределами Узбекистана: Туркменистан, Таджикистан. Викарный вид *Z.*

dumosum Boiss. в Палестине.

Места обитания. Краснопесчанниковые породы.

Численность. Зарегистрировано 4 популяции (60 кустов).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовый вид на сокращающихся пестроцветных склонах.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [30, 159, 310].

Э.Э. Эргашев.



Rare, relict endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range (found for the first time in Uzbekistan, in 2009, 5 km to the east of village Aktash) (Surkhandarya region). Inhabits dry gypseous rocks in the low mountains. 4 populations with 60 plants can be found. Limiting factors: relict species growing on the decreasing gypseous slopes. Measures of protection: not protected.




УЗУМДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ВИНОГРАДНЫЕ – VITACEAE

173. ЁВВОЙИ ТОК (УЗУМ)

Виноград винный (дикий) / *Vitis vinifera* L.

Мақоми 3. Ўзбекистондаги ареали ажралган камёб тур.

Қисқача тавсифи. Узунлиги 30 м гача етадиган ўралиб ўсувчи ўсимлик. Барглари оддий, деярли юмалоқ, 3–5 бўлакли ёки панжасимон қирқилган, асоси ўйилган, четлари ўткир тишли ёки кунгирали.



Тўпгули тигиз ёки ёйиқ рўвак. Меваси турли ранг ва шаклда. Май–июнь ойида гуллаб, июль–октябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Сурхондарё, Тошкент вилоятлари: Нурота тизмаси (Гурдара ва Болосой даралари), Ҳисор тизмаси (Сангардак ва Тўпаланг дарёлари ҳавзалари)да; Ғарбий Тянь-Шань – Писком, Угом, Қоржонтов, Чотқол тизмаларида тарқалган. Тожикистон, Қирғизистон ва Қозоғистонда ҳам учрайди.



Ўсиш шароити. Дарё ёқалари, дараларда, шағал, майда зарра жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ҳамда вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ҳамда ўтин сифатида ишлатилиши натижасида қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Марказий Осиёдаги барча ботаника боғларида, махсус боғдорчилик тажриба участкаларида, селекция станцияларида янги навлар етиштиришда фойдаланилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота ва Чотқол давлат қўриқхоналарида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [91, 159].

Р.И. Қозоқбоев.

Статус 3. Редкий вид Узбекистана с разорванным ареалом.

Краткое описание. Стелющаяся лиана длиной до 30 м. Листья простые, почти округлые, 3–5-лопастные или пальчато рассечённые, при основании с выемкой, по краю с тупыми или заострёнными зубцами. Соцветие – густая или рыхлая метёлка. Плод различной формы, величины и цвета. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–октябре.

Распространение. В Ташкентской, Джизакской и Сурхандарьинской областях: хребет Нуратау – ущелья Болосай и Гурдара; Гиссарский хребет – бассейн реки Сангардак и Тупаланг; Западный Тянь-Шань – хребты Пскемский, Угамский, Каржантау и Чаткальский. За пределами Узбекистана: от Средиземноморья до Китая и Японии.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны и долины рек, ущелья.

Численность. Встречается единичными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Использование на топливо и выпас.

Культивирование. По всей территории Центральной Азии в ботанических садах, специализированных питомниках и на селекционных станциях; используется для выведения столовых, кишмишных и винных сортов винограда.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Чаткальском заповедниках и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [91, 159].

Р.И. Казакбаев.

Rare species in Uzbekistan with reducing area. It is spread at the Hissar range: the Sangardak and Tupalang valleys; the Nuratau range (Gurdara, Bolosay); the western Tien-Shan: the Pskem, the Karzhantau and Chatkal ranges (Tashkent, Jizzakh and Surkhandarya regions). Inhabits fine earth-slopes, river valleys, defiles. Single specimens or small groups can be found. Limiting factors: used as fuel, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Chatkal nature reserves, the Ugam-Chatkal national park.

ХУРМОДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ЭБЕНОВЫЕ - EBENACEAE

174. САФСАН ХУРМО

Хурма кавказская / *Diospyros lotus* L.

Мақоми 2. Жуда камёб, ареали қисқариб бораётган реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–20 м га етадиган кўнғир қора пўстлоқли дарахт. Барглари мустақкам, қайишсимон, чўзиқ, узунлиги 15 см. Гуллари сарғиш-қизил, кўнғироқсимон, икки уйли. Чангчили гуллари яримсоябонга тўпланган, уруғчи гуллари якка-якка ёки бир нечтадан ўрнашган. Меваси этли резавор, шарсимон, аввалига қизғиш, кейинчалик кўнғир-қорамтир рангга киради. Май–июнда гуллаб, меваси октябрь–ноябрда пишди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тупаланг ва Сангардак дарёлари ҳавзалари, Қўштут, Тамшуш, Хондиза қишлоқлари атрофлари)да тарқалган. Тожикистон, Кавказ, Кичик Осиё, Эрон, Хитой ва Японияда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмларидаги дараларнинг шағалли ёнбағирлари, булоқларнинг бўйларида ўсади.

Сони. Кам учрайди, баъзан 5–15 тупи бирга ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан (бачкисидан) кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ҳўжалик мақсадлари учун ерларнинг ўзлаштирилиши, қурилиш ҳамда ўтти учун ишлатилиши туфайли камайиб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. Қадим замонлардан бери ареали доирасида экиб келинади. ЎзР ФА Ботаника боғида 1948 йилдан буён экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [82, 159].

Р.У. Қодиров.

Статус 2. Редкий реликтовый вид с сокращающимся ареалом.

Қатқоқ описание. Дерево высотой до 15–20 м с темно-серой корой. Листья продолговатые, длиной до 15 см, кожистые. Цветки желтовато-красные, колокольчатые, двудомные. Мужские цветки собраны в полузонтики, одиночные или по нескольку. Плод шаровидная, мясистая ягода, вначале красноватая, затем чёрно-бурая с сизым налётом. Цветёт в мае–июне, плодоносит в октябре–ноябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет: бассейны рек Сангардак и Тупаланг, окрестности кишлаков Куштут, Тамшуш и Хондиза. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кавказ, Малая Азия, Иран, Китай, Япония.

Места обитания. Щербнистые склоны ущелий близ родников в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Встречается редко, небольшими (по 5–15 деревьев) группами.



Размножение. Семенное и вегетативное (отводками).

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территории. Используется в качестве строительного материала и на топливо.

Культивирование. С древних времен культивируется в пределах ареала. С 1948 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [82, 159].

Р.У. Кадыров.

Very rare relict species with the reducing area. It is spread at the Hissar range: the Sandargak and Tupalang river basins, nearby the villages Kshutut, Tamshush and Khandiza (Surkhondarya region). Inhabits slopes of gorges near springs in the lower and middle belts mountains. Growing in small groups (5–15 trees). Limiting factors: economic reclamation of the territory. It is used as building material and firing. Measures of protection: not protected.



ЧИЛОНЖИЙДАДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО КРУШИНОВЫЕ - RHAMNACEAE

175. ЁВВОЙИ ЧИЛОНЖИЙДА

Унаби обыкновенная / *Ziziphus jujuba* Mill.

Мақоми 2. Ареали кескин қисқариб бораётган кам-ёб, реликт, субтропик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 12 м гача етадиган тарвақайлаган, мевасиз шохларида барглари икки қатор жойлашган, ёнбаргчалари йирик тиканлардан иборат дарахт. Барглари чўзиқ тухумсимон, уч томирли, четлари тишсимон ўйилган. Гуллари майда, яшилроқ, ўткир ҳидли. Меваси чўзиқ-юмалоқ ёки юмалоқ, диаметри 1,5 см гача етади. Июнь-сентябрь ойларида гуллаб, мева беради.



Тарқалиши. Тошкент, Қашқадарё ва Сурхондаре вилоятлари: Гарбий Тянь-Шань (Угом, Чотқол, Қоржонтов тизмалари), Кўхитанг тизмаси - Боғлидара сойи ва Ҳисор тизмалари (Ғузур дарёси хавзасида, Шўроб, Қўштутсой, Зинчаб, Зарчов, Дуоба ва Тамшуш қишлоқлари атрофлари)да тарқалган. Тожикистон, Туркменистон, Кавказортида ҳам тарқалган. Бу тур Ўрта Ер денгизидан Япониягача тарқалган.

Ўсиш шароити. Куруқ, шағалли, тошли ва юмшоқ тупроқли ёнбағирларда ҳамда дарё ва сой бўйларида ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда ва кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан ва илдиз бачкиларидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Меваларининг териб олинishi, тупларининг ўтин учун кесилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Жуда қадимдан мевали ва доривор ўсимлик сифатида экиб келинган. ЎзР ФА Ботаника боғида 1958 йилдан буён экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат қўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида сақланади.

Манбалар. [83, 159].

Р.И. Қозоқбоев.

Статус 2. Редкий реликтовый субтропический вид с резко сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 12 м с простёртыми ветвями и двурядными листьями с крупными колючими прилистниками на стерильных побегах. Листья продолговато-яйцевидные, трёхнервные, по краю зубчатые. Цветки мелкие, зеленоватые, с сильным запахом. Плод удлиненно-шаровидный, до 1,5 см в диаметре. Цветёт и плодоносит в июне-сентябре.

Распространение. В Ташкентской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Западный Тянь-Шань: Угамский, Чаткальский, Каржантау; хребет Кугитанг: Боғлидара саяи, Гиссарский хребты; долина реки Гузар, окрестности кишлаков Шураб, Куштутсай, Зинчоб, Дуоба и Тамшуш. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан и Закавказье, от Средиземноморья до Японии.

Места обитания. Сухие, щебнистые, каменистые и мягкие склоны вдоль саев и рек.

Численность. Встречается единичными экземплярами, редко - небольшими группами.

Размножение. Семенное и корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Сбор плодов, заготовка на топливо.


Культивирование. В культуре с древних времен как плодородное и ценное лекарственное растение. С 1958 года культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [83, 159].

Р.И. Казакбаев.

Rare relict subtropical species with reducing area It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Chatkal, the Korzhantau ranges, the Hissar range: the Guzar river valley, nearby the villages Shurab, Kushtutsai, Zinchob, Duoba and Tamshut, the Kughitang range: the Boglidara valley (Tashkent, Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits dry, stony and soft slopes along the rivers. Single specimens, rarely small groups can be found. Limiting factors: picking of fruits, felling for fuel wood. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve and the Ugam-Chatkal national park.



ЧИННИГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLLACEAE

176. КАЧИМСИМОН ЕТМАК (БЕХ)

Аллохруза качимовидная / *Allochrysa gypsophiloides* (Regel) Schischk.

Мақоми 3. Марказий Осиё тоғларидаги ареали кескин қисқариб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см орасидаги кўп йиллик ўт. Пояси ингичка, кўп. Барглари 10–25 мм узунликда, ясси, қалами, тикансиз. Гуллари пушти ранг, пояннинг тепасида ёйиқ рўваксимон тўпгул ҳосил қилади. Меваси – кўсаксимон. Май–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган, Жиззах, Самарқанд, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Курама, Чотқол, Молгузар, Нурота, Ҳисор, Кўхитанг ва Зарафшон тизмаларида тарқалган. Тожикистон, Қирғизистон ва Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 400–1400 м баландликда тошли ва шағалли ёнбағирларда ва баъзан ташландиқ ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан саноат хомашёси ва доривор ўсимлик сифатида кўплаб йиғиб олинади. Етмақдан тўқимачилик, мўйначилик, қандолатчилик саноатида, табобатда ва кундалик ҳаётда кенг фойдаланилади. Шунинг учун у камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон, Китоб, Чотқол кўриқхоналари ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Саноат эҳтиёжи учун экиладиган майдонларни кенгайтириш керак. Табиатда етмақзорлар тикланганидан сўнг ҳам уни масъул идоралар ижозати билан йиғиш лозим.

Манбалар. [21].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Эндемик горных районов Центральной Азии с сильно сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–60 см. Стебли тонкие, их несколько.

Листья длиной 10–25 мм, плоские, линейные, не колючие. Цветки бледно-розовые, собраны на концах веток в рыхлое, раскидистое, метельчатое соцветие. Плод – коробочка. Цветёт в мае–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях: Кураминский, Чаткальский, Мальгузарский, Нуратинский, Кугитангский, Гиссарский и Зеравшанский хребты. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны на высоте 400–1400 м; иногда заброшенные пашни.

Численность. Встречается небольшими популяциями и единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленная промышленная заготовка и сбор населением в качестве лекарственного сырья. Широкое использование в быту, в текстильной, меховой, кондитерской и фармакологической промышленности.


Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском, Китабском, Чаткальском заповедниках и Угам-Чаткальском национальном парке. Необходимо расширение промышленных плантаций. После восстановления запасов следует ввести строго лицензионный сбор.

Источники. [21].

Ф.О. Хасанов.

Endemic of mountains of Central Asia with the strongly reducing area. It is spread at the Kurama, the Chatkal, the Malguzar, the Nuratau, the Hissar, the Kughitang and Zeravshan ranges (Tashkent, Namangan, Jizzakh, Samarkand, Kashkadarya, Surkhandarya regions). Inhabits stony slopes at a height of 400–1400 m; sometimes neglected arable lands. Small populations, single specimens can be found. Limiting factors: collecting as medicinal plant. Measures of protection: protected in the Surkhan, the Kitab and Chatkal nature reserves and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to enlarge the industrial plantation. After the restoration of stocks it is necessary to introduce strongly licensed picking.



177. МИХЕЛЬСОН ЗҶРЧАСИ

Смолевка Михельсона / *Silene michelsonii* Preobr.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25-30 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояларининг асоси жуда кўп қуриб қолган барг қолдиқлари билан ўралган. Барглари чўзиқроқ тескари тухумсимон, учи ўткир. Косачаси сал пуфаксимон, юпқа, цилиндр-кўнғироқсимон, 10 та томирли. Тожбарги оқ, туксиз. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қояларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [22, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Очень редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25-30 см, с многочисленными сухими остатками листьев у основания. Листья продолговато-яйцевидные, на верхушке внезапно оттянутые в короткое остроконечие. Чашечка слегка вздутая, перепончатая, цилиндрически-колокольчатой формы, с 10 жилетками. Лепестки белые, голые. Цветёт в июне, плодоносит в июле.



Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет.

Места обитания. Скалы.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф.О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (Surkhandarya region). Inhabits rocks. Single specimens can be found. Measures of protection: not protected.



178. МОМИҚ ЗҰРЧА

Смолевка пушистая / *Silene tomentella* Schischk.

Мақоми 2. Қизилқумдаги қолдиқ тепаликларда тарқалган жуда камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см оралиғидаги кўп йиллик ўт. Пояси кўп, пастки қисми ёғочланувчи. Барглари ингичка наштарсимон, 4–6 см узунликда, эни 3–5 см, поянинг пасткидагилари ингичкалашиб бориб, бандга айланган, юқорисидаги барглари анча майда. Тўпгули шингилсимон. Косачаси цилиндрсимон, тўғнағичсимон, узунлиги 18–20 мм. Тожбарги оқиш, косачадан бир ярим марта узун. Тожбаргининг 2/3 қисми қирқилган. Меваси кўсакча, тухумсимон, узунлиги 11 мм, эни 6 мм.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тепаликлар (Оқтоғ ва Қулжуктоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тепаликларда, тошларнинг бўлаклари орасида ва тошли курук ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [22, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Очень редкий эндемик останцевых возвышенностей Кызылкумов.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–40 см. Стебли многочисленные, при основании древеснеющие. Листья узколанцетные, длиной 4–6 см, шириной 3–5 см, нижние оттянутые в длинный черешок, верхние более мелкие. Соцветие кистевидное. Чашечка цилиндрическая, булавовидная, длиной 18–20 мм. Лепестки беловатые, в полтора раза длиннее чашечки. Пластика лепестка на две трети надрезанная. Коробочка яйцевидная, длиной 11 мм, шириной 6 мм. Цветет в мае, плодоносит в июле.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкумы – останцевые возвышенности Актау, Кульджуктау.

Места обитания. Обломки камней, сухие каменистые склоны останцевых возвышенностей.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.

Культивированне. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф.О. Ҳасанов.

Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Aktau, the Kuldjuktai (Bukhara and Navoi regions). Inhabits fragments of stones, dry stony slopes of low mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.




179. ПОПОВ ЗҶРЧАСИ

Смолевка Попова / *Silene popovii* Schischk.

Мақоми 2. Зарафшон тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 20–25 см га етадиган сершоҳ ва сербарг кўп йиллик ўт. Гул-поясининг узунлиги 15–20 см. Мевасиз пояси ва поянинг пастки қисмидаги барглари ингичка чизиқли, поянинг юқорисидагилари учли-наштарсимон. Гуллари поянинг учида 3–7 тадан жойлашган. Гулолди баргчалари ўтсимон, поянинг юқори қисмида жойлашган баргларга ўхшаш. Косачаси цилиндрсимон, узунлиги 13–15 мм. Тожбарглари оч пушти рангли. Кўсакчаси чўзиқ, узунлиги 10 мм. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.



Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Кўхи-Сурх, Жонқора тоғлари ва Тахта-Қорача довони)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмида ва тоғ этакларидаги шағалли ва оҳақтошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [22, 97, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Очень редкий эндемик Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 20–25 см с многочисленными бесплодными густооблиственными побегами.

Цветоносные стебли высотой 15–20 см.

Листья бесплодных побегов и нижние стеблевые узколинейные, верхние стеблевые – линейно-ланцетовидные.

Цветки на верхушке стебля в количестве 3–7.

Прицветники травянистые, сходные с верхними листьями. Чашечка цилиндрическая, длиной 13–15 мм.

Лепестки яркорозовые. Коробочка продолговатая, длиной 10 мм. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской области: Зеравшанский хребт – Кухи-Сурх, Джан-Кара, перевал Тахта-Карача.

Места обитания. Щебнистые и известковые скалы в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 97, 310].

Ф.О. Хасанов.



Very rare endemic species of the Zeravshan range. It is spread at the Zeravshan range: the Kukhi-Surkh, the Djan-Kara, the Takhta-Karacha pass (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits calcareous rocks in the foothills and lower mountain belt. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



180. ТОҒ ЗҰРЧАСИ

Смолевка горная / *Silene oreina* Schischk.

Мақоми 1. Зарафшон тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик, кўп бошчали (каудексли) ва кўп пояли, бўйи 10–15 см орасидаги ўт. Барглари учини чўзилган, жуда ўткир, безчасимон қалин туклар билан қопланган. Илдиз бўғизидagi барглари тескари наштарсимон, асосига қараб ингичкалашиб боради. Поядаги барглари кенг чўзиқ. Гуллари оқ, поянинг учида 1–3 тадан ўрнашган. Косачаси гулидан 2–3 марта узун, дастлаб цилиндрсимон, кейинроқ кўнғироқсимон шакли. Карпофори туксиз. Кўсаги тухумсимон. Май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Аллаиришан, Оқсой, Оғалик ва Тарағай қишлоқлари атрофлари) да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли, тошшағали жойларда ва қояларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди. Якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқиладиган ерларда ўсимлик жуда катта зарар кўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [22, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение с многоглавым каудексом и многочисленными стеблями длиной до 10–15 см. Листья на верхушке оттянутые, очень острые, густоопушенные железистыми волосками. Прикорневые листья – обратнoланцетные, к основанию суженные, стеблевые широко-продолговатые. Цветки белые, на верхушках стеблей, по 1–3. Чашечка в 2–3 раза длиннее цветков, вначале цилиндрическая, позднее колокольчатая. Карпофор голый. Коробочка яйцевидная. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет – Аллаиришан, Аксай, Агалык, Тарагай.

Места обитания. Каменистые, каменисто-щебнистые и скалистые субстраты.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. В культуре не известен.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [22, 310].

Ф.О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the Zeravshan range. It is spread at the Zeravshan range: Allairishan, Aksai, Agalyk, Taragay (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony, stony and rocky substrates. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



181. НАТАЛИЯ ЗЎРЧАСИ

Смолевка Наталии / *Silene nataliae* F.O. Khass.

Мақоми 1. Кўхитанг тизмасидаги реликт эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ярим бутача. Барглари илдиз бўғизидида жойлашган, бўлмали, узунлиги 3–5 см, иккала томони оддий ёки безчали туклар билан қопланган. Гуллари 3–6 та. Косачаси оддий ва безчали туклар билан қалин қопланган, кенг кўнғироқсимон, пуштиранг, узунлиги 12–14 мм, тишчаларининг узунлиги 2–4 мм, гултожи сарик, юқори қисми пуштиранг, қайтақиси 5–6 мм узунликда, икки бўлакли, тишчасиз. Чангчи ва устунчаси туксиз. Карпофори 4–5 мм узунликда, туксиз. Кўсагининг узунлиги 6–7 мм, туксиз. Июлда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Кўхитанг тизмаси (Сурхондарё вилояти)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 2200 м баландликдаги қояларнинг шимолий ёнбағирларида ўсади.

Сони. 60 туп ўсимликдан иборат 3 та популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қисқа аралга эга махсус жойдагина ўсишга мослашган (стенобионт) реликт ўсимлик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхонқўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалари. [309].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Цветы 3–6. Чашечка густо покрыта простыми и железистыми волосками, широко колокольчатая, розоватая, 12–14 мм длины с зубцами 2–4 мм длины. Лепестки желтые, наверху фиолетово окрашенные. Тычинки и столбик голые. Карпофор 4–5 мм длины, голый. Коробочка 6–7 мм длины голая. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг (Мачайлы).

Места обитания. Скалы северных экспозиций на высоте 2200 м.

Численность. 3 популяции (60 растений).

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Узколокальный реликтовый стенобионт.

Культивирование. Сведения нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [309].


Ф.О. Хасанов.



Статус 1. Эндемичный реликтовый вид хребта Кугитанг.

Краткое описание. Полукустарничек с прикорневой розеткой лопатчатых листьев 3–5 см длины, опушенных с обеих сторон простыми и железистыми волосками. Стебли 15–30 см длины, густо железисто волосистые.

Very rare relict endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range: Machayli (the Surkhandarya region). Inhabits rocks (2200 m). 3 populations (60 plants) can be found. Limiting factors: relict steno-biont. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



182. БЕЗЧАЛИ ЗЎРЧА

Смолевка почтижелезистая / *Silene paranadena* Bondarenko et Vved.

Мақоми 2. Шимоли-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт ўсимлик, баландлиги 30–50 см, поялари кўп, асосига яқин жойлари қаттиқ ёғочсимон. Барглари наштарсимон, узунлиги 3–6 см, эни 10–12 мм. Гуллари шохчаларининг учларида биттадан жойлашган, йирик, узунлиги 30–32 мм. Гултожи оқ-пуштиранг, чуқур иккига бўлинган. Косачаси тўгнағичсимон цилиндр шаклида, шишмайди, узунлиги 22–25 мм, найчаси туксиз, тишчалари оқ тукли. Меваси кўсак, узунлиги 10–12 мм. Апрель–июнда гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Нурота ва Молгузар тизмаларида тарқалган (Жиззах, Навой ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шаронти. Тоғларнинг ўрта қисмларидаги майда чағир тошли шимолий ёнбағирларда, бутазорлар орасида ўсади.

Сони. Кам тарқалган, якка-якка ёки кичик гуруҳлар ташкил қилиб ўсади.

К ў п а й и ш и . Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Молларнинг кўплаб боқилиши ва табиий муҳитнинг салбий таъсирида камайиб кетган бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [17, 22, 310]

И.В. Белолипов.

Статус 2. Редкий эндемик Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–50 см. Листья ланцетные, длиной 3–6 см и шириной 10–12 мм. Цветки на концах веточек одиночные, довольно крупные, длиной 30–32 мм, с бело-розовыми глубоко двураздельными лепестками. Чашечка булабовидно-цилиндрическая, невздувающаяся, длиной 22–25 мм, с голой трубкой и бело-войлочными зубцами. Плод – коробочка длиной 10–12 мм. Цветёт и плодоносит в апреле-июне.

Распространение. В Джизакской, Навойской и Самаркандской областях: хребты Мальгузар и Нуратау.

Места обитания. Произрастает на мелкоземистых склонах преимущественно северной экспозиции в среднем поясе гор, среди кустарников.

Численность. Встречается спорадически, единично или группами по несколько растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [17, 22, 310].

И.В. Белолипов.



Rare endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Nuratau ranges (Jizzakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits soil slopes of the northern exposition in the middle mountainous zone. Single specimens and small groups occur sporadically. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



183. БИГИЗСИМОН ОҚТИКАН

Колючелистник беловатый / *Acanthophyllum albidum* Schischk.

Мақоми 3. Фаргона водийси адирларида сақланиб қолган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Баландлиги 30 см га етадиган, ёгочланувчи ярим бута. Барглари бигизсимон, пояда қарама-қарши жойлашган, узунлиги 2–4 см, эни 1,5 см. Гуллари пояларининг учида, диаметри 5 см га етадиган қалқонсимон тўпгул ҳосил қилиб жойлашган. Косачаси найсимон, узунлиги 6–7 мм. Тожбарглари оқ, асоси сал пушти ранг, эни 1,5 мм.

Тарқалиши. Фаргона, Наманган вилоятлари: Фаргона водийсида денгиз сатҳидан 500–800 м баландликда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тошли ва майда зарра жинс тунроқли адирларда ўсади.

Сони. Пон адирлари (Чодаксой ҳавзаси)да якка-якка ҳолда тарқалган, 10 м² да ўртача 3–4 тупи ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Оқтикан ўсиб турган ерларнинг қишлоқ хужалик экинлари (ғалла ва бошқалар) учун ўзлаштирилиши ареалининг қисқариб кетишига сабаб бўлди.

Маданийлаштирилиши. Бу тур ЎЗР ФА Ботаника боғида маданий шароитда экиб ўстирилган. Уруғининг униб чиқиши 1 фойздан кам эканлиги аниқланган.

Муҳофаза чоралари. Мавжуд туплари қатъий назорат остига олиниши керак.

Манбалар. [21, 347].

Н.Ю. Бешко.

Статус 3. Очень редкий узкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 30 см, сильно древеснеющий. Листья игловидные, супротивные, длиной 2–4 см, шириной 1,5 см. Цветки собраны на конце стебля в щитковидные, до 5 см в диаметре, соцветия. Чашечка трубчатая, длиной 6–7 мм. Лепестки белые, у основания чуть розовые, шириной 1,5 мм. Цветет в мае, плодоносит в июле.

Распространение. В Ферганской и Наманганской областях: растёт на адырах на высоте 500–800 м.

Места обитания. На каменистых, каменисто-мелкоземистых почвах.

Численность. В Папских адырах встречается одиночными экземплярами, по 3–4 на 10 м².

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под зерновые и другие культуры.

Культивирование. Выращивался в культуре сотрудниками Ботанического сада АН РУз. Полевая всхожесть семян очень низкая – менее 1 %.

Меры охраны. Необходим строгий контроль за состоянием популяций.

Источники. [21, 347].

Н.Ю. Бешко.

Very rare endemic species of the Ferghana valley. It grows in foothills at the height of 500–800 m (Ferghana and Namangan regions). Inhabits stony, stony-fine earth soils. Populations are about 3–4 plants on 10 sq. m. in the Pap hills. Limiting factors: development of the territories for crops cultivation. Measures of protection: strict control of the state of populations is necessary.



184. НИНАСИМОН ОҚТИКАН

Колючелистник горбатоприцветниковый / *Acanthophyllum cyrtostegium* Vved.

Мақоми 3. Қизилқумдаги қолдиқ тепаликларда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган, поясининг пастки қисми ёғочланувчи, кўп пояли яримбута. Барглари игнасимон, уч қиррали, тиканли. Гулларда баргчалари деярли қалами, тиканли, асоси бўртиқли. Гуллари учтадан поянинг учидаги куббасимон тўпгулда, узун гулбандларда ўрнашган. Косачаси цилиндрсимон. Тожбарги 15–16 мм узунликда, пушти рангли. Тугунчаси 4 уруғ куртакли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тоғлар (Кулжуктоғ, Овминза тоғи, Қинғиртоғ ва Кўкчатоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қумларда, тош-қумли ерларда ва ола жинсларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда тарқалган, баъзан кумоқ ерларда 3–5 ўсимликдан ташкил топган кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ёш ниҳолларини чорва моллари тепкилаб ташлайди.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғи тажриба даласида 1979–1989 йиллари ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Мавжуд ўсимлик тўпларини назорат остига олиш ва ёш ниҳолларини чорва молларидан муҳофаза қилиш лозим.

Манбалар. [21].

Н.Ю. Бешко.

Статус 3. Очень редкий эндемик останцевых возвышенностей Кызылкумов.

Краткое описание. Многолетний, у основания древеснеющий, с многочисленными стеблями полукустарник высотой до 20–30 см. Листы игловидные, трёхгранные, очень колючие. Прицветники почти линейные, колючие, при основании горбатые. Цветки в трёхцветковых дихазиях на довольно длинных цветоножках в шишковидных соцветиях на верхушках стеблей. Чашечка цилиндрическая. Лепестки розовые, длиной 15–16 мм. Завязь с 4-мя семяпочками. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Навоийской и Бухарской областях: Кульджуктау, Ауминзатау, Кингиртау, Кокчатау.

Места обитания. Пески, каменисто-песчаные субстраты, выходы пестроцветных пород.

Численность. Встречается разрежено, единично, редко образует небольшие группы из 3–5 растений на песчаных местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Вытаптывание всходов скотом.

Культивирование. В 1978–1985 гг. культивировался на опытном участке Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Необходимо ввести контроль за популяциями и охранять молодые всходы от вытаптывания.

Источники. [21].

Н.Ю. Бешко.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktai, the Auminzatau, the Kingirtai, the Kokchatau (Navoi and Bukhara region). Inhabits sands, stony-sandy substrates, outcrops of gypsaceous beds. Solitary specimens or small groups of 3-5 plants can be found sporadically in sandy places. Limiting factors: trampling down of seedlings by cattle. Measures of protection: it is necessary to control populations and protect young seedlings from trampling down.



185. ЎЗБЕКИСТОН ЧИННИГУЛИ

Гвоздика узбекистанская / *Dianthus uzbekistanicus* Lincz.

Мақоми 3. Помир-Олойнинг ғарбий қисмидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, оддий, баъзан юқори қисмидан шохланган, туксиз, пастки қисми ғадирбудур, узунлиги 20–35 см. Барглари кўкимтир-яшил, ўткир учли. Гуллари якка-якка, асоси қалин тукли, пушти рангли. Меваси – кўсакча, кўп уруғли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд, Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Тахта Қорача довори, Қизилолма ва Тарағай қишлоқлари атрофлари) ва Ҳисор тизмаси (Боғча қишлоғи атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли жойларда, тош ва оҳақтош синиқлари ва ёриқлари орасида ўсади.

Сони. Бир гектар ерда 40–100 тагача тупдан иборат тўплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари гулдасталар учун узиб олинади. Чорва моллари истеъмол қилади.

Маданийлаштирилиши. 1965 йилдан бошлаб ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Китоб давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Гуллари юлинишининг олди олиниши лозим. Шунингдек, уруғи етилиб, тарқалиши учун гуллаган ва мевалаган пайтида чорва моллари боқишни чеклаш тавсия этилади.

Манбалар. [23, 159].

Н.Ю. Бешко.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебли длиной 20–35 см, многочислен-

ные, простые, в верхней части иногда ветвящиеся, голые, внизу шероховатые. Листья синевато-зелёные, острые. Цветки розовые, одиночные, у основания с обильными волосками. Плод – коробочка с многочисленными семенами. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет – перевал Тахта-Карача, окрестности кишлака Кызыл-Алма, Тарагай; Гиссарский хребет – окрестности кишлака Бахча.

Места обитания. Каменисто-щебнистые субстраты, среди камней и известняковых обломков, трещины скал.

Численность. Образует небольшие популяции от 40 до 100 экземпляров на 1 га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор цветков на букеты. Выпас.

Культивирование. С 1965 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций охраняется на территории Китабского заповедника. Необходимо ограничить выпас в периоды цветения и плодоношения растений с целью сохранения семян для расселения вида; запретить сбор цветков.

Источники. [23, 159].


Н.Ю. Бешко.



Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Zeraвшan range: the Takhata-Karacha passage, nearby the villages Kyzyl-Alma, Taragai; the Hissar range:

nearby the village Bakhcha (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony substrates, among stones and lime-stone fragments, clefts of rocks.

Forms small populations containing from 40 to 100 specimens per 1 hectare. Limiting factors: picking of flowers, pasturing. Measures of protection: some populations protected in the Kitab state nature reserve. It is necessary to limit pasturing in the periods of plant flowering and fruiting to reserve seeds for the species distribution; to forbid picking of flowers.



ЧИНОРДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ПЛАТАНОВЫЕ – PLATANACEAE

186. ШАРҚ ЧИНОРИ

Платан восточный / *Platanus orientalis* L.

Мақоми 3. Ареали ажралган камёб, реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 м га етадиган кенг шохшаббали дарахт. Барги панжасимон қирқилган, 5–7 бўлакли, эни 12–18 см. Бўлаклари чўзиқроқ, ўйилган, йирик тишчали. Гуллари бир жинсли, шарсимон тўпгулга йиғилган. Мевали каллакчаси 2–7 тадан, диаметри 2–5 см атрофида. Меваси ёнғоқчасимон, тумшукчали, ётиқ қалин туклар билан қопланган. Апрель ойида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.



Тарқалиши. Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида Сангардак, Тўпаланг, Қашқадарё, Обизаранг дарёларининг ҳавзаларида ўсади. Ўрта Ер денгизи – Болқон яриморолидан Ҳимолайгача тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида, дарё бўйларида, булоқлар атрофида, тошлоқларда ўсади.

Сони. Одатда якка-якка ҳолда ўсади. Баъзан кичик чинорзорлар ташкил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан (илдизи ва бачкисидан) кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Турли эҳтиёжлар учун кесиб кетилиши тобора камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Жуда қадимдан манзарали дарахт сифатида барча суғориладиган ерлар (Марказий Осиё ва бошқа жойлар)да экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Асрга тенгдош йирик чинорларнинг ҳар бири назорат остига олинган ва давлат томонидан қўриқланади.

Манбалар. [45, 159].

Р.И. Қозоқбоев.

Статус 3. Редкий реликтовый вид с разорванным ареалом.

Краткое описание. Дерево высотой до 30 м, с широкой, раскидистой кроной. Листья 5–7-лопастные, 12–18 см ширины. Лопасты продолговатые, выемчато-крупнозубчатые. Цветки однополые, собраны в шаро-

видные соцветия. Плодовые головки по 2–7, около 2–5 см в диаметре. Плоды орешкообразные с носиком, по всей поверхности опушенные жёсткими прижатыми волосками. Цветёт в апреле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Сурхандарьинской, Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет – бассейны рек Сангардак, Тупаланг, Обизаранг, Кашкадарья. Общее распространение: Средиземноморье – от Балканского полуострова до Гималаев.

Места обитания. Берега рек, у родников, на наносных легких галечниковых почвах в среднем поясе гор.

Численность. Одиночные деревья, небольшие группы деревьев и очень редко рощи, не образующие сплошных массивов.

Размножение. Семенное и вегетативное (корневыми отпрысками).

Причины изменения численности и ареала. Отрицательно влияют на них хозяйственная деятельность человека, заготовка на топливо.

Культивирование. Очень популярная древесная порода, с давних времен используемая для озеленения поселений в Центральной Азии и других регионах.

Меры охраны. Большинство вековых деревьев и естественные рощи объявлены памятниками природы.

Источники. [45, 159].

Р.И. Казакбаев.

Rare relict species with the reducing area. It is spread at the Hissar range: the Sangardak, the Tupalang, the Obizarang, the Kashkadarya basins (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits river banks, near springs, alluvial light pebble soils in the middle belt of mountains. Single trees, small groups of trees and and rarely small groves. Limiting factors: antropogenic factor. Measures of protection: the majority of venerable trees and natural groves are nature sanctuaries.



ЧУЧМОАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО АМАРИЛЛИСОВЫЕ – AMARYLLIDACEAE

187. АРАЛАШ ПИЁЗ

Лук смешанный / *Allium praemixtum* Vved.

Мақоми 1. Нурота ва Ғарбий Тянь-Шаннинг жануби-ғарбий қисмида жуда кам тарқалган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 150 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи тухумсимон, диаметри 5 см гача, чармсимон, қизил-кўнғир рангли қобиқ билан ўралган. Пояси ғовак, ярмидан пасти пуфаксимон шишган, асоси баргларнинг новлари билан ўралган. Барглари цилиндрсимон, найсимон, тўғри, учига қараб ингичкалашиб боради. Тўпгули шарсимон, тиғиз. Юлдузсимон гулқўрғон бўлакчалари оқ-яшил томирли. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Навоий, Самарқанд, Жиззах, Тошкент вилоятлари: Курама, Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган. Тожикистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 900–1200 м баландликда қоя тошларнинг ёриқлари, тошли ёнбағирлар ва оҳактошли ерларда ўсади.

Сони. 1000 га яқин тупи борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан озуқа сифатида йиғиб олинади. Унинг табиий ҳолда кўпайишига ҳам салбий таъсир қилувчи омиллар бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [18, 58, 362, 364].

Н.Ю. Бешко.

Статус 1. Очень редкий эндемик Нуратинских гор и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 150 см. Луковица яйцевид-

ная, до 5 см в диаметре, с красно-бурыми кожистыми оболочками. Стрелка полая, ниже середины вздутая, при основании одета расставленными влагалищами листьев. Листья цилиндрические, дудчатые, прямые, к верхушке утончающиеся. Соцветие густое, шаровидное. Листочки звездчатого околоцветника белые с зеленой жилкой. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Самаркандской, Навоийской, Джизакской, Ташкентской областях: горы



Нуратау, Актау, Кураминский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау).

Места обитания. Каменистые склоны и трещины известняковых скал в среднем поясе гор, на высоте 900–1200 м.

Численность. Около 1000 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [18, 58, 362, 364].

Н.Ю. Бешко.

Very rare endemic species of the Nuratau mountains and the western Tien-Shan. It is spread at the Nuratau, the Aktau, the Mogoltau mountains and of the Kurama range (Samarkand, Navoi, Jiz-zakh, Tashkent regions). Inhabits stony slopes and clefts of limestone rocks in the middle belt of mountains, at the altitude of 900–1200 m. s. l. 1000 plants can be observed. Limiting factors: collecting by local people. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



188. АФЛОТУН ПИЁЗИ

Лук афлатунский / *Allium aflatunense* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга хос ареали ажралган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80–200 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзди ўт. Пиёзи йирик, диаметри 6 см гача етади. Қобиғи қора-кулранг. Поясининг тубини эни 10 см келадиган тасмасимон барглари ўраб олган. Тўпгули шарсимон, гуллари кўп ва тиғиз, юлдузсимон гулкўрғон бўлакчалари оч бинафша рангли. Май–июнь ойларида гуллаб, уруғи июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком, Угом, Чотқол тизмаларида тарқалган. Қирғизистонда, Чотқол ва Фарғона тизмаларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида ўтлар билан қопланган ёнбағирларда ва дарё бўйларидаги сизот сувлари унча кўп бўлмаган жойларда ўсади.

Сони. Бир-бирдан ажралган ҳолда кичик-кичик тўплар ташкил қилади.

Кўпайиши. Асосан уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Пиёзининг маҳаллий аҳоли томонидан озуқа сифатида ишлатиш ҳамда доривор ва манзарали ўсимлик сифатида томорқа ерларига экиш учун қазиб олинishi, куз ва қишда турли ҳайвонлар томонидан пиёзларининг ейилиши камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера кўрикхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].
Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня с разорванным ареалом.

Краткое описание.

Многолетнее луковичное растение высотой 80–200 см. Луковица крупная, до 6 см в диаметре, с черновато-серыми оболочками. Стрелка у основания невысоко охвачена влагалищами ремневидных листьев шириной до 10 см. Соцветие почти шаровидное, многоцветковое, густое, листочки звездчатого околоцветника светло-фиолетовые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Ташкентская область: Пскемский, Угамский, Чаткальский хребты. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Чаткальский и Ферганский хребты).

Места обитания. Травянистые склоны и прирусловые террасы в среднем и верхнем поясе гор.

Численность. Произрастает небольшими, значительно удалёнными друг от друга популяциями.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор луковиц местным населением как пищевое и лекарственное сырьё, для пересадки на приусадебные участки (декоративен).



Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Ҳасанов.

Rare, endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem, the Ugam, the Chatkal ranges (Tashkent region). Inhabits grassy slopes and river valleys in the middle and upper belt of mountains. About 1000 plants can be found. Limiting factors: picking of bulbs for medicinal traits and food by local population. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve.



189. ПИСКОМ ПИЁЗИ

Лук пскемский / *Allium pskemense* V. Fedtsch.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга хос жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–120 см оралиғидаги кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзининг диаметри 6–7 см, усти қўнғир қобик билан қопланган. Пояси 3–7 та, йўғон, шишган, узунлиги 40 см га етади. Тўпгули шарсимон, диаметри 7–10 см. Гулкўрғон бўлакчалари оқ рангли. Июлда гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом, Писком, Чотқол ва Курама тизмаларида тарқалган. Қозогистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200–2000 м баландликда оҳақтошли, чиқиб бўлмайдиган қояларнинг ериқларида, баъзан сурилмаларда ўсади.

Сони. Умумий сони 60–100 минг туп атрофида бўлган 40 га яқин популяцияси борлиги маълум.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йул билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғини турли хашаротлар зарарлаши ва ёш ниҳолларнинг бошқа ўсимликлар орасида ўса олмаслиги, воқеа етиш муддатининг кўплиги (3–7 йил) ҳамда маҳаллий аҳоли томонидан озиқ-овқат ва доривор ўсимлик сифатида йиғиб олиниши камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маҳаллий аҳоли уни томорқа ерларида экиб ўстиради. Хориждаги ботаника боғларида, селекция билан шуғулланувчи институтларда экилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера давлат қуриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [58, 362, 168, 364].

И. Г. Левичев.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой 60–120 см. Луковица небольшая, 6–7 см в диаметре, оболочка красно-бурого цвета. Стрелка с 3–7 толстыми, дудчатыми листьями длиной до 40 см. Соцветие шаровидное, 7–10 см в диаметре, листочки околоцветника молочно-белые. Цветёт в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Угамский, Пскемский, Чаткальский, Кураминский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Известковые недоступные скалы (трещины и уступы), реже осыпи в среднем поясе гор на высоте 1200–2000 м.

Численность. Около 40 популяций общей численностью 60–100 тыс. экземпляров.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Высокий процент повреждения семян насекомыми, низкая всхожесть, малая конкурентоспособность семенных всходов и длительный (3–7 лет) период ювенильной стадии являются лимитирующими факторами. К ним присоединяется антропогенный фактор: местное на-



селение интенсивно использует лук пскемский в пищу, считая его лекарственным растением, заготавливает луковицы.

Культивирование. В пределах ареала часто выращивается на огородах. Культивируется во многих ботанических садах, в некоторых селекционных институтах в нашей стране и за рубежом.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном государственном заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [58, 362, 168, 364].

И. Г. Левичев.

*Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Pskem, the Chatkal, the Kurama ranges (Tashkent region). Inhabits calcareous inaccessible rocks (cracks and ledges), rarely mounds in the middle belt of mountains at the height of 1200–2000 m. About 40 populations, total number 60–100 thousand of specimens can be found. Limiting factors: high percentage of seed damage by insects, low germinating capacity, low competition capacity of seedlings and long (3–7 years) juvenile stage are the also the anthropogenic factor: local people intensively use *Allium pskemense* as food and medicinal plant. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere state reserve and the Ugam-Chatkal national park.*



190. ОЛОЙ ПИЁЗИ

Лук алайский / *Allium alaicum* Vved.

Мақоми 1. Олой тиз-масидаги ғоят камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзи 1-2 см кенгликда, қорамтир, қоғозсимон қобиқли (пўстли). Пояси 30-60 см узунликда, пастки қисми пастга эгилган, тукли. Барглари 2-3 та, қаламинаштарсимон, эни 10-15 мм, пастга қараб эгилган туклар билан қалин қопланган, поясидан қисқа. Соябони кўп гулли, деярли шарсимон, диаметри 30-40 мм. Гул бандлари тенг, гулёнбаргчалари йўқ. Юлдузсимон гулқўрғон бўлаклари оқиш, кирсимон қип-қизил рангли, узунлиги 6 мм, қалами, тўмтоқроқ, кейинроқ пастга қараб эгилади. Чангчи ипи 6 мм узунликда, бигизсимон. Кўсаги (кутичаси) шарсимон, диаметри 4 мм. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Яқинда Андижон вилояти (Имом-ота қишлоғидан 10 км жануб)дан топилган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистон (Ўш вилояти)да ўсади.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларнинг майин тупроқли ёнбағирларида ўсади.

Сони. 50 туп ўсимликдан иборат 2 та популяцияси топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Мол боқилиши сабабли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик предгорий Алайского хребта.

Краткое описание. Луковица 1-2 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 30-60 см высоты, в нижней части покрытая вниз отогнутыми волосками. Листья 2-3, линейно-ланцетные, 10-15 мм ширины,



густо опушенные вниз отогнутыми волосками, короче стебля. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 30-40 мм в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников. Листочки звездчатого околоцветника беловатые с грязно-пурпуровой жилкой, 6 мм длины, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 6 мм длины, шиловидные. Коробочка шаровидная 4 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. был Недавно обнаружен в Андижанской области (10 км южнее кишлака Имом-ата). За пределами Узбекистана - Кыргызстан (Ошская область).

Места обитания. Мягкие склоны в низкогорьях.

Численность. Обнаружено 2 популяции (около 50 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов.

Very rare endemic species of the Alay range. The species was found nearby the village Imomata, the Alay range (the Andizhan region). Inhabits fine earth slopes with shrubs, 600 m. s. l. 2 populations with about 50 plants were found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



191. БОЧАНЦЕВ ПИЁЗИ

Лук Бочанцева / *Allium botschantzevii* Kamelin

Мақоми 1. Помир-Олойнинг жануби-ғарбидаги эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзи 1–2 см кенгликда, қорамтир, қоғозсимон қобиқ (пўст) билан ўралган. Пояси 30–60 см баландликда, пастки қисми пастга эгилган тукли. Барглари 2–3 та, қалами-наштарсимон, эни 10–15 мм, пастга эгилган, қалин туклар билан қопланган, поясидан қисқа. Соябони кўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 30–40 мм. Гулбандлари деярли тенг, гулолди баргчалари йўқ. Гулкўрғон бўлаклари юлдузсимон, оқиш, хира тўқ қизил рангли, узунлиги 6 мм, қалами, тўмтоқроқ, кейинроқ пастга қайрилади. Чангчи ипи 6 мм узунликда, бигизсимон. Кўсаги шарсимон, диаметри 4 мм.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарёда – Дехқонободдан 20 км жанубда (Толли дово-ни) тарқалган.

Ўсиш шароити. Бўз тупроқларда ўсади.

Сони. 20 га яқин ўсимлик топилган.

Кўпайиши. Уругидан кўпайган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаб-лари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редчайший эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица 1–2 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 30–60 см высоты, в нижней части покрытая вниз отогнутыми волосками. Листья 2–3, линейно-ланцетные, 10–15 мм ширины, густо опушенные вниз отогнутыми волосками, короче стебля. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 30–40 мм в диаметре. Цветоножки почти

равные без прицветников. Листочки звездчатого околоцветника беловатые с грязно-пурпуровой жилкой, 6 мм длины, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 6 мм длины, шиловидные. Коробочка шаровидная 4 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: 20 км южнее Дехканабада (перевал Таллы).

Места обитания. Серые глины.

Численность. Найдено около 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов.



Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at 20 km southern of Dekhkanabad – the Tally pass (Kashkadarya region). Inhabits grey clays. 20 plants were found. Seed and vegetative. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



192. БАКХАУЗ ПИЁЗИ

Лук Бакхауза / *Allium bakhousianum* Regel (= *A. gulczense* O. Fedtsch.)

Мақоми 1. Олой ва Фарғона тизмасида кичик майдонда сақланиб қолган ғоят камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3–5 см, қорамтир, қоғозсимон пўстли (қобикли). Поясининг бўйи 90–150 см, силлиқ. Барглари 5–6 та, қайишсимон, эни 4–8 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 5–10 см. Гулбанди деярли тенг, узунлиги 3–5 см, гулёнбаргчалари йўқ. Гулкўрғон бўлаклари юлдузсимон, оқ, яшил томирли, узунлиги 10 мм, қалами, тўмтоқроқ, кейинчалик пастга қараб эгилади. Чангчи иплари 7–8 мм узунликда, бигизсимон, ичкаридагиларининг туби икки тишчали. Кўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Фарғона вилояти (Шоҳимардон дарёси воҳаси)да тарқалган (Фарғона вилояти). Ўзбекистондан ташқарида Хитой ва Қирғизистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Йирик тош бўлақларидан иборат сурилмаларда ўсади.

Сони. 2008 йили 30 тупи борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Камайиб кетишига уруғлари унувчанлигининг пастлиги сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий декоративный белоцветковый лук Алайского и Ферганского хребтов.

Краткое описание. Луковица 3–5 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 90–150 см высоты, гладкая. Листья 5–6, ремневидные, 4–8 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–10 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников 3–5 см длины. Листочки звездчатого околоцветника белые с зеленой жилкой, 10 мм длины, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 7–8 мм длины, шиловидные, внутренние при основании двузубые. Коробочка шаровидная 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Встречается только в Ферганской области в бассейне реки Шахимардан. За пределами Узбекистана: Китай и Кыргызстан.

Места обитания. Крупнообломочные осыпи.
Численность. В 2008 году зарегистрировано 30 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая семенная всхожесть.


Культивирование. Культивировался в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов.

Very rare decorative white-flowering species of the Alay and Ferghana ranges. It is spread at the Shakhimardan valley (Ferghana region). Inhabits stony slopes. In 2008, 30 plants were observed. Limiting factors: low seed germination. Measures of protection: not protected.



193. КАТТА ПИЁЗ

Лук большой / *Allium majus* Vved.

Мақоми 1. Помир-Олойдаги камёб, манзарали эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3–5 см, қорамтир, қоғозсимон пўст билан қопланган. Пояси 60–80 см узунликда, силлиқ. Барглари 4–5 та, қайишсимон, эни 4–8 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 5–10 см. Гулбандлари деярли тенг, гулёнбаргчалари йўқ. Гулқўрғон бўлакчалари юлдузсимон, оч бинафшаранг, узунлиги 6–7 мм, қалами, тўмтоқроқ,



кейинроқ пастга қараб эгилади. Чангчи иплари бигизсимон, узунлиги 4–5 мм. Кўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Зарафшон ва Ҳисор тизмаларининг ёнбағирларида тарқалган эндемик тур.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ва олажинсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 30 тупи Китоб геология кўрикхонаси яқинида, 100 тупи Ҳисор кўрикхонаси атрофида ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан пиёзининг қовлаб олиниши ва чорва боқилиши туфайли каммайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Китоб ва Ҳисор кўрикхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Высокодекоративный эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица 3–5 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 60–180 см высоты, гладкая. Листья 4–5, ремневидные, 4–8 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–10 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников 3–5 см длины. Листочки звездчатого околоцветника светло фиолетовые, 6–7 мм длины, линейные, туповатые, позже вниз отогнутые. Нити тычинок 4–5 мм длины, шиловидные. Коробочка шаровидная 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская область: эндемичный узбекистанский вид лука, произрастающий на каменистых склонах Зеравшанского и Гиссарского хребтов.

Места обитания. Каменистые и пестроцветные склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Около 30 растений произрастают рядом с Китабским геологическим заповедником и около 100 растений в Гиссарском государственном заповеднике.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Заготовка луковиц населением и выпас.


Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Китабском и Гиссарском заповедниках.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов.

Highly decorative endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the stony slopes of the Zeravshan and Hissar ranges (Kashkadarya region). Inhabits stony slopes and red sands. In the Kitab state reserve, there are about 30 plants and in the Hissar state reserve about 100 plants. Limiting factors: digging of bulbs by local population and pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab (Geological) and Hissar state reserves.



194. ЙИРИК ПИЁЗ

Лук гигантский / *Allium giganteum* Regel

Мақоми 3. Жанубий Помир-Олой ва Копетдоғдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 3–5 см, қорамтир, қоғозсимон пўстли. Пояси 60–130 см узунликда, силлиқ. Барглари 4–5 та, силлиқ. Соябони кўпгулли, деярли шарсимон, диаметри 5–12 см. Гулбандлари деярли тенг, гул-ёнбаргчалари йўқ, узунлиги 3–6 см. Гулқўрғон бўлаклари юлдузсимон, оч бинафша рангли, узунлиги 5–6 мм, овалсимон, тўмтоқроқ, эгилмайдиган. Чангчи иплари бигизсимон, узунлиги 4–5 мм. Кўсаги шарсимон, диаметри 5–6 мм.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида – Кампиртепа сойининг жанубий ёнбағри, Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий ёнбағирлари ва Боботоғ тизмасида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида Эрон, Афғонистон, Тожикистон ва Туркменистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 5–8 та тупдан иборат кичик тўплар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Мол боқилиши ва уруғининг паст унвчанлиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқ-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая и Копетдага.

Краткое описание. Луковица 3–5 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 60–130 см высоты, гладкая. Листья 4–5, ремневидные, 4–8 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, почти шаровидный, 5–12 см в диаметре. Цветоножки почти равные, без прицветников 3–6 см длины. Листочки звездчатого околоцветника светло фиолетовые, 5–6 мм длины, овальные, туповатые, не отгибающиеся. Нити тычинок 4–5 мм длины, шиловидные. Коробочка шаровидная, 5–6 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет и его юго-западные отроги, Бабатаг, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Иран, Афганистан, Таджикистан и Туркменистан.

Места обитания. Каменистые склоны в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Образует небольшие группы (по 5–8 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас и низкая семенная всхожесть.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the southern Pamir-Alay and Kopetdag. It is spread at the Hissar range and its southern outskirts, the Kughitang, the Babatag (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in the low and middle mountainous zone. Small populations by 5–8 plants can be found sporadically. Limiting factors: low seed germination and pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state nature reserve.



195. ИСОҚУЛ ПИЁЗИ

Лук Исакула / *Allium isakulii* R. M. Fritsch et F. O. Khass.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзининг эни 1–2 см, қорамтир, қоғозсимон пўсти қўнғир рангда. Пояси 15–30 см узунликда, силлиқ. Барглари 2–3 та, тилсимон, 5–10 см узунликда, эни 2–4 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 10–15–35 см. Гулбандлари деярли тенг, гулёнбаргчалари йўқ, узунлиги 5–10–17 см. Гулқўрғон бўлаклари юлдузсимон, қалин этли, оч сиёҳранг, узунлиги 10–12 мм, учбурчак-ланцетсимон, ўткирроқ. Чангчи ипларининг узунлиги 4–5 мм, учбурчак. Кўсаги шарсимон, диаметри 3–5 мм.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота, Молғузар, Оқтоғ, Қоратоғ тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Тожикистон (Мўғилтоғ).

Ўсиш шароити. Кўеи тик тушадиган тоғ ёнбағирларининг сувайирғичларга яқин қисмидаги қоьлар остида ва қуруқ тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида учрайди. Нурота тизмасида (100 та туп), Қоратоғ ва Оқтоғда (20–50 та туп) популяциялари маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Мол боқилиши ва уруғининг паст унувчанлиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқ-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [58, 362, 364]

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица 1–2 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 15–30 см высоты, гладкая. Листья 2–3, языковидные, 5–10 см длины, 2–4 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, рыхлый, почти шаровидный, 10–15–35 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников, 5–10–17 см длины. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, остающиеся, светло фиолетовые, 10–12 мм длины, треугольно-ланцетные, островатые. Нити тычинок 4–5 мм длины, треугольные, высоко между собой спаянные. Коробочка шаровидная 3–5 мм в диаметре. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Мальгузар, Нуратау, Актау, Каратау. За пределами Узбекистана: Таджикистан (Моголтау).

Места обитания. Солнечные экспозиции на щебнистых склонах под скальными породами в приводораздельных частях.

Численность. Встречается единично или небольшими группами. Известны 3 популяции (около 100 экземпляров) в Нуратау и около 20–50 экземпляров в Актау и Каратау.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая семенная всхожесть и перевыпас.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов.

Highly decorative endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar, the Nuratau, the Aktau, the Karatau ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi regions). Inhabits shiny slopes under the rocks in upper part of the low mountains. Single specimens and small groups occur sporadically. There are populations with about 100 plants known in the Nuratau and about 20–50 plants in the Aktau and Karatau. Limiting factors: low seed germination and pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



196. ПУШТИ ГУЛЛИ ПИЁЗ

Лук розовоцветный / *Allium rhodanthum* Vved.

Мақоми 0. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бош пиёзининг эни 2–3 см, қорамтир, қоғозсимон пўстли. Пояси 15–30 см узунликда, силлиқ. Барглари 1–2 та, кенг наштарсимон, узунлиги 5–10 см, эни 2–4 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 10–15 см. Гулбандлари тенг, гулёнбаргчалари йўқ, узунлиги 5–10 см. Гулкўрғон бўлаклари юлдўзсимон, этли, пуштиранг, узунлиги 7–10 мм, чўзиқ-овалсимон, баъзан наштарсимон, тўмтоқ. Чангчи иплари пушти, узунлиги 16–13 мм, бигизсимон, анча қисми ўзаро бирлашган. Кўсаги шарсимон, диаметри 3–4 мм.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Хаудактоғ қумларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қумларда ўсади.

Сони. 20 йил давомида уни топиш устида олиб борилган ишлар натижасиз тугади. Бу тур бутунлай йўқолган бўлса керак.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ҳаддан ташқари кўп мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 0. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица 2–3 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 15–30 см высоты, гладкая. Листья 1–2, широко ланцетные, 5–10 см длины, 2–4 см ширины, гладкие. Зонтик многоцветковый, рыхлый, почти шаровидный, 10–15 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников 5–10 см длины. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, интенсивно розовые, 7–10 мм длины, продолговато овальные, реже ланцетные, тупые.

Нити тычинок фиолетовые 10–13 мм длины, шиловидные, высоко между собой спаянные. Коробочка шаровидная 3–4 мм в диаметре. Цветет в апреле, плодоносит в мае.



Распространение. Сурхандарьинская область: пески Хаудактау.

Места обитания. Пески.

Численность. Многочисленные попытки в течение 20 лет найти этот вид в Хаудактау не увенчались успехом. Вид, по видимому, полностью исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Перевыпас.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic plant of the southern Pamir-Alay. It is spread at the sands Khaudaktau (Surkhandarya region). Inhabits sandy dunes. Over last 20 years,

several attempts to find this species were unsuccessful. Probably disappeared. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



197. РАВЕН ПИЁЗИ

Лук Равена / *Allium ravenii* F.O. Khass. et al.

Мақоми 1. Устюртдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзининг эни 1 см, қорамтир, қоғозсимон пўстли. Пояси 15–30 см узунликда, силлиқ. Барглари 1–2 та, узунлиги 5–20 см, эни 0,5 см, силлиқ. Соябони кўпгулли, сийрак, деярли шарсимон, диаметри 1–1,5 см. Гулбандлари тенг, гулёнбаргчалари йўқ, узунлиги 6 мм. Гулкўрғон бўлаклари юлдузсимон, этли, пуштиранг, узунлиги 5–7 мм, чўзиқ-овалсимон.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Устюрт платоси (шарқий чинк атрофлари)да.

Ўсиш шароити. Чинк атрофидаги гипсли тупроқларда ўсади.

Сони. 20 га яқин туплари топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайиши мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ҳаддан ташқари кўп чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [365].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий эндемик плато Устюрт.

Краткое описание. Луковица 1 см ширины с черноватыми, бумагообразными оболочками. Стрелка 15–30 см высоты, гладкая. Листья 1–2, цилиндрические, 5–20 см длины, 0.5 см ширины, гладкие. Зонтик немногочетковый, рыхлый, 1–1,5 см в диаметре. Цветоножки почти равные без прицветников 5–10 см длины. Листочки звездчатого околоцветника мясистые, интенсивно розовые, 6 мм длины. Нити тычинок короче листочков. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: плато Устюрт.

Места обитания. Гипсы наверху чинка.

Численность. Выявлено 20 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Перевыпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [365].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic plant of the Ustyurt Plateau. It is spread at Karakalpakstan (the Ustyurt Plateau). Inhabits gypseous slopes of the Ustyurt Plateau. 20 plants were found. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.




198. МАНЗАРАЛИ ПИЁЗ

Лук декоративный / *Allium decoratum* Turginov et Tojibaev

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзбоши 1,5–2 (3) см диаметрда, қоғозсимон қобик билан қопланган. Пояси 10–15 см баландликда, барглари 1–3 тадан, баъзан 4 тагача, узунлиги 9–10 см, эни 3–3,5 см. Тўпгули шарсимон, ҳар бир гулнинг узунлиги 2,5–3 см, гуллари юлдузсимон, оч қизил ва қизғиш рангда, узунлиги 6–6,5 мм, ўткир ланцетсимон. Чангчи иплари тўғри, гулқўрғондан чиқиб туради, чангчилари бигизсимон. Кўсаги шарсимон, июнда гуллаб, уруғи июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Жануби-ғарбий Ҳисор тизмасида, Бойсун тоғининг Хўжа-Гургур-ота, Хўжа Қўчқор-ота, Санжар ва Чўлбайир тоғларида тарқалган.



Ўсиш шароити. Ўсиш минтақаси, денгиз сатҳидан 2500–3200 м баландликда майда тупроқли ва майда тошли ёнбағирликларда учрайди.

Сони. 4–5 га майдонда тарқалган 1000–1500 атрофида.

Кўпайиши. Уруғидан.

Маданийлаштирилиши: ЎзР ФА Ботаника боғига экилганда, натижалар самарасиз бўлган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [371].

О.Т. Тургинов.

Статус 1. Редкий эндемик юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковица шаровидная, 1,5–2 (3) см толщины, бумагообразными оболочками, беловатые. Стебель толстый, 10–15 см высоты. Листья в числе (1)–2–3 ланцетные, продолговатые или эллиптические, 9–10 см длины, 3–3,5 см ширины. Зонтик шаровидный, многоцветковый. Цветоножки равные 2,5–3 см длины, при основании без прицветни-

ков. Листочки звездчатого околоцветника бледно-красные, и красные жилкой, 6–6,5 мм длины, ланцетные острые, после цветения вверх торчащие, жесткие. Нити тычинок короче равных, более длины листочков околоцветником, наружные шиловидные; внутренние в 1,5 раза более широкие, треугольно-шиловидные. Цветёт в июне–июле, коробочка шаровидная.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта – Байсун, Ходжа-Гургур-ата, Ходжа Кочкар-ата, Санжар и горы Чульбайр.

Места обитания. Мелкоземистые, каменистые склоны в верхнем поясе гор на высоте 2650–3200 м.

Численность. Около 1000–1500, на 4,5–5 га площади.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Посадка взрослых экземпляров и высев семян в Ботаническом саду АН РУз окончилась неудачей.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [371].

О.Т. Тургинов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the south-western spurs of the Hisar range – in the Baysun, the Khoja Gurgur-ata, the Khoja Kuchkor-ata, the Sanjar and in the Tschulbair mts. (Surkhandarya region). Inhabits subalpine and alpine zones (altitudes ca. 2650–3200 m) with stony and rocky fine earth soils. The total number of all populations is about 1000–1500 plants on the area of 4,5–5 hectares. Measures of protection: not protected.



199. САҲРО ПИЁЗИ, ЧЎЛ ПИЁЗИ

Лук пустынный / *Allium eremoprasum* Vved.

Мақоми 2. Помир-Олой ғарбий тармоқларининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Пиёзи тухумсимон, эни 1 см га яқин, кулранг юпқа терисимон буришган пўстлоқли. Пиёзчаларининг сирти чуқурчали. Пояси (10) 15–25 см, деярли ярмигача баргларнинг новлари билан ўралган. Барглари 2 та, ипсимон, эни 1–2 мм, гуллаш пайтида қуриб кетади. Соябони камгулли, сийрак. Гулбандлари 3–4 см гача узунликда, тенгсиз, гулёнбаргчалари бор. Гуллари қўнғироқсимон. Гулқўрғон бўлаклари оқиш еки хира пушти ранг, қирмизи томирли, узунлиги (5) 6–7 мм, наштарсимон. Чангчи иплари гулқўрғонидан 1,5 марта қисқа, учбурчак, ярмига-

(10) 15–25 см высоты, примерно до ½ одет влажлищами листьев. Листья в числе 2, нитевидные, 1–2 мм ширины, ко времени цветения увядающие. Зонтик немногочетковый, рыхлый. Цветоножки до 3–4 см длины, неравные, с прицветниками. Листочки колокольчатого околоцветника грязно-розовые или беловатые, с грязно-пурпуровой жилкой, (5) 6–7 мм длины, ланцетные. Нити тычинок в 1,5 раза короче околоцветника, до ½ между собой и с околоцветником сросшиеся, треугольные, цельные, внутренние почти 3 раза шире наружных. Коробочка около 3 мм в диаметре. Цветет в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Самаркандской и Навоийской областях: хребет Актау, Зирабулак-Зиявуддинские горы.

Места обитания. Каменистые склоны и скалы в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, одиночно или небольшими группами по несколько растений.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Естественно редкий стеногопный петрофильный вид. Основную угрозу представляют горные разработки (добыча мрамора, строительного камня, щебня и других полезных ископаемых).

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364].

Н.Ю. Бешко.



ча ўзаро ва гулқўрғон билан бирлашган, ичкаридагилари ташқилари деярли 3 марта кенг. Кўсаги юмалоқ, диаметри 3 мм га яқин.

Тарқалиши. Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Октоғ тизмасида ва Зирабулоқ-Зиявуддин тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги тошли ёнбағирларда, қояларда ўсади.

Сони. Якка ва кичик гуруҳлар ҳолида учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда камёб, ўсиш майдонлари чекланган стенобионт петрофит ўсимлик. Мармар қазиб олиш, тош майдалаш ва тоғ-кон ишлари туфайли камайиб кетади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364]

Н.Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий эндемик западных отрогов Памиро-Алая.

Краткое описание. Луковичный многолетник. Луковица яйцевидная, около 1 см ширины, с сероватыми, морщинистыми тонко кожистыми оболочками. Луковички ямчатые. Стебель тонкий,

Rare endemic species of the western branches of the Pamir-Alay. It is spread at the Aktau ridge, the Zirabulak and Ziyavuddin mountains (Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony slopes and rocks in the lower mountain belt. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: marble, crushed stone and rubble quarrying, mining operations. Endemic stenotopic petrophyte species. Measures of protection: not protected.



200. ЯШИЛ ГУЛЛИ ПИЁЗ

Лук зеленоватый / *Allium viridiflorum* Pobed.

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги ғоят камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пиёзбоши 1–2 см кенгликда, кулранг, юпқа қобиқли (пўстли). Пиёзчалари қисқарган, кам сонли. Поясининг узунлиги 20–23 см, эни 1,0 мм. Барглари бўлинган, 4 та, ипсимон, зич жойлашган, қалами новсимон бўлакли, қисқа пояли. Соябони сийрак, гуллаш давридан сўнг 7–9 см кенгликда. Гулбандлари тенг, ипсимон, узунлиги 4–5 см, тубида гулён-баргчалари йўқ, қуйидан юқорига букилган. Юлдузсимон гулкўрғон бўлақларининг узунлиги 4–5 мм, яшил, тенг, тўмтоқ, гуллагандан кейин буралиб қолмайди. Чангчи иплари гулкўрғондан калта, асосидан бошлаб бир-бири билан қўшилган, тишсиз. Кўсакча гулкўрғондан озгина узунроқ, деярли шарсимон, 3 уруғли. Уруғи юмалоқ, қора, чуқурчали.

Тарқалиши. 2013 йилда Наманган вилоятидан (Поромон қишлоғидан 2 км шимол томонда) топилган. Ўзбекистондан ташқари, Қирғизистонда ўсади.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг қуйи минтақасидаги юмшоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. 20 туп ўсимликдан иборат 1 та популяцияси топилган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши сабабли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [58, 362, 364, 371].

Ф. Каримов.

Статус 1. Редкий эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Луковицы одиночные 1–2 см толщины, с перепончатыми серыми цельными оболочками. Луковички удлиненные, немногочисленные. Стебли 20–23 см высоты, 1,0 мм толщины. Листья, рассеченные на 4-нитевидные, скрученные, желобчатые доли, короче стебля. Чехол отстающийся, бело-перепончатый, короче зонтика. Зонтик рыхлый, после зацветания 7–9 см ширины, полусферический, немногочетковый. Цветonoжки равные, нитевидные 4–5 см длины, при основании без прицветников, нижние вверх изогнутые. Листочки звездчатого околоцветника 4–5 мм длины, зеленые, равные, тупые, после цветения не скручивающиеся. Нити тычинок короче околоцветника, с ним и между собой при основании сросшиеся, без зубцов. Коробочка немного длиннее околоцветника, почти шаровидная, 3-х семенная. Семена круглые, черные, ямчатые. Цветет в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. В 2013 г. был обнаружен в Наманганской области (1 км к северу от кишлака Поромон). За пределами Узбекистана: Кыргызстан.



Места обитания. Каменистые склоны нижнего пояса гор.

Численность. Обнаружена 1 популяция (около 20 растений).

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [58, 362, 364, 371].

Ф. Каримов.

Very rare endemic species of the Chatkal range. The species has been recently found nearby the village Poromon, the Chatkal range (Namangan region). Inhabits stony slopes in the lower mountain belt. Only 1 population (about 20 plants) was found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



201. ВИКТОР ОМОНҚОРАСИ

Унгерния Викторса / *Ungernia victoris* Vved. ex Artjuschenko

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олой тизмасидаги ареали жуда қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см га етадиган кўп йиллик, пиёзли ўт. Пиёзининг эни 4–7 см, қорамтир-кўнғир рангли, кўп қаватли қобиқлар билан ўралган. Барглари 7–10 та, қалами, кўкимтир, силлиқ. Гулпоясини август ойида барглари қуриб кетгандан сўнг ўсиб чиқади. Тўпгули соябонсимон, 4–7 гулли. Кўсакчаси кенг юраксимон паллали. Август ойида гуллаб, мевасини сентябрда этилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасида, Чўлбайир тоғларида, Хонақасув дарёсининг юқори қисмларида тарқалган. Ареалининг шимолий чегаралари Қўштут, Шўра, Хонақа доvonлари, жанубда эса Боботоғининг шимолий ёнбағирлари орқали ўтади. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида майда зарра жинс тупроқли ёнбағирлар, даралар ва баъзан сурималарда ўсади.

Сони. Бир-биридан узок масофаларда жойлашган, унча кагта бўлмаган (1–1,5 га) майдонларни эгаллайди. Умумий майдони тахминан 350 га етади.



Кўпайиши. Уруғидан ва пиёзидан (уни бўлақларга ажратиб) кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Баргларининг ҳар йили узлуксиз доривор хом ашё сифатида йиғиб олиниши туфайли пиёзлари майдалашиб, ўсимликнинг ер усти қисми ҳам қурий бошлаган.

Маданийлаштирилиши. 1970 йилдан табиий ареалига яқин жойларда экиб ўстирила бошланди.

Муҳофаза чоралари. Табиатда сақланиб қолган майдонлари назорат қилиниши, рухсатсиз йиғмаслик талаб этилади. Шунингдек, маданий шароитда ўстириш бўйича илмий ишлар олиб борилиши лозим. Чўлбайир тоғида табиий ҳолда ўсувчи омонқораларни сақлаб қолиш ва уруғини териш учун буюртмахона ташкил қилиниши керак.

Манбалар. [155–159].

И.И. Мальцев.

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая с сильно сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 20–25 см. Луковица толщиной 4–7 см с многочисленными чёрно-бурыми оболочками. Ли-

стья в количестве 7–10, линейные, сизоватые, гладкие. Цветок появляется в августе, после высыхания листьев. Соцветия зонтиковидные, 4–7-цветковые. Коробочка с широкосердцевидными створками. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – горы Чулбайир, бассейн реки Ханакасу. На севере граница ареала проходит вдоль перевалов Куштут, Шура, Ханака, на юге – по северным склонам Бабатага. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны, реже осыпи, ущелья среднего пояса гор.

Численность. На разобшённых участках образует небольшие (1–1,5 га) заросли. Общая площадь – примерно 350 га.

Размножение. Семенное и вегетативное – отпочковыванием луковиц.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивная заготовка листьев в качестве лекарственного сырья, в результате чего луковицы истощаются и заросли возобновляются медленно.

Культивирование. С 1970 года проводится посев вблизи естественных мест обитания.

Меры охраны. Необходимо усилить контроль за естественными местами обитания, ввести строгий лицензионный сбор, расширить изучение в культуре, организовать заказник в районе Чулбайира для сохранения естественных зарослей и сбора семян.

Источники. [155–159].

И.И. Мальцев.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay with reducing area. It is spread at the Hissar range: the Chulbair mountains, the Khanakasu river basin. In the north, the area-line lies along the Kushtut, the Shura, the Khanaka passes, in the south - in the northern slopes of the Babatag (Surkhandarya region). Inhabits fine earth slopes, rarely mounds, gorges in the middle belt of mountains. Small isolated populations covering 1–1.5 hectares each. Total area is about 350 ha. Limiting factors: Intensive use of leaves as medicinal raw material; as a result, bulbs become weak; and, brakes revegetate slowly. Limiting factors: it is necessary to enhance monitoring of the natural habitats, to introduce strict license tax, to integrate the study in cultivation, to organize the reserve in the Chulbair region for protection of natural populations and for seeds collection.



202. САРИҚ ШТЕРНБЕРГИЯ

Штернбергия жёлтая / *Sternbergia lutea* (L.) Spreng.



Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубида жуда кам тарқалган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўт. Пиёзи йирик, деярли юмалоқ, эни 4 см га, узунлиги эса 5 см га етади. Барглари кенг наштарсимон, тўмтоқ, тарновсимон, четлари ўткир майда тишчали. Барги гули билан бир вақтда – кузда ўсиб чиқади. Гуллари бандсиз, сариқ рангли. Гулпояси найзасимон, чўзиқроқ. Сентябрь–октябрь ойларида гуллайди.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағирларида жойлашган Шарғун қишлоғи атрофида тарқалган. Тожикистонда, Туркманистонда ва Кавказда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Эҳтимол, манзарали бўлганлиги учун пиёзи қазиб олинса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника сада ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда ўсиб турган жойлари назорат остига олинishi ва маданий шароитда экиб ўрганилиши лозим.

Манбалар. [79, 159].

И.И. Мальцев.

Статус 3. Очень редкий спорадически встречающийся вид в южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 20 см. Луковица большая, почти округлая, шириной до 4 см и длиной 5 см. Листья широколанцетные, тупые, вогнутые, по краю мелкозубчато-островатые, появляются осенью одновременно с цветками. Цветки жёлтые, сидячие. Цветочная стрелка удлинённая. Цветёт в сентябре–октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности кишлака Шарғунь. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Туркменистан, Кавказ.

Места обитания. Карнизы скал, каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Вероятно, заготовка луковиц.

Культивирование. Культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимы контроль за состоянием естественных местообитаний и изучение в культуре.

Источники. [79, 159].

И.И. Мальцев.

Very rare species sporadically found in the southern Uzbekistan. It is spread at the Hissar range: nearby the village Shargun (Surkhandarya region). Inhabits rock ledges, stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



203. ФИШЕР ШТЕРНБЕРГИЯСИ

Штернбергия Фишера / *Sternbergia fischeriana* (Herb.) M. Roem.

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубий минтақаларига хос жуда кам учрайдиган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10 см га етадиган кўп йиллик пиёзли ўсимлик. Пояси япасқи. Барглари 4–8 та, туксиз, қалами. Гуллари 8–10 мм узунликдаги гулбандда жойлашган. Гулқўрғонининг ташқи баргчалари чўзиқ. Кўсакчаси очилмайди. Уруги деярли юмалоқ. Март ойида гуллаб, меваси апрелда стилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасида Китоб, Шахрисабз шаҳарлари атрофларида, Оқсув дарёси ҳавзасида ҳамда Зарафшон тизмасининг ғарбий қисмида тарқалган. Шарқий Кавказортида ва шимолий Эронда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ олди ёнбағирларидаги соз тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиатда бу ўсимлик тарқалган ерларнинг қишлоқ хўжалиги учун ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида синаб кўрилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Китоб давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тўплари устидан қатъий назорат ўрнатиш ва маданий ҳолда экиб ўрганиш лозим.

Манбалар. [79, 159].

И.И. Мальцев.

Статус 3. Очень редкий спорадически встречающийся вид в южной Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее луковичное растение высотой до 10 см. Стебель сплюснутый. Листья в количестве 4–8, голые, линейные. Цветки на цветоножках длиной 8–10 мм. Наружные листочки околоцветника продолговатые. Коробочка нераскрывающаяся. Семена почти шаровидные. Цветёт в марте, плодоносит в апреле.

Распространение. Кашкадарьинская область: Гиссарский хребет – окрестности города Китаба, Шахрисабза, бассейн реки Аксу. Западная оконечность Зеравшанского хребта. За пределами Узбекистана: Восточное Закавказье, Северный Иран.

Места обитания. Лесовые склоны предгорий.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозкультуры. Выпас.


Культивирование. Испытывается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Китабском заповеднике. Необходимы строгий контроль за состоянием популяций и изучение в культуре.

Источники. [79, 159].

И.И. Мальцев.

Very rare species sporadically found in the southern Uzbekistan. It is spread at the Hissar range; nearby Kitab and Shakhrisabz towns, the Aksu river basin; the western part of the Zeravshan range (Kashkadarya region). Inhabits loess slopes of the foothills. The quantity is unknown. Limiting factors: reclamation of lands under crops. Pasturing. Measures of protection: protected in the Kitab state reserve. The strict control of the state of populations and investigations in cultivation are required.



ШИЛВИДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ЖИМОЛОСТНЫЕ – CAPRIFOLIACEAE

204. ҒАЛАТИ УЧҚАТ

Жимолость странная / *Lonicera paradoxa* Pojark.

Мақоми 1. Помир-Олойдаги жуда камёб, ареали ажралган, реликт эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Тарвақалайган шох-шаббали бута. Барглари эллипссимон ёки тесқари-тухумсимон, бўлакли, узунлиги 20 мм, четлари қисқа киприксимон, ҳар икки томони қисқа тукли. Гуллари барг қўлтиғида жойлашган. Меваси юмшоқ, қизил рангли, майда. Уруғлари 4–5 та, оқиш. Июль-августда гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах ва Фарғона вилоятлари: Олой тизмаси (Шоҳимардон қишлоғи атрофи) ва Туркистон тизмасида тарқалган. Тожикистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмларида тошли-шағалли ёнбағирларда ва сийрак арчазорларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғи ва илдиз бачкиларидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўтин сифатида ишлатилади. Чорва молларидан ҳам зарар кўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Буюртмахоналар ташкил қилиш ва ЎЗР ҒА Ботаника боғида биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [20, 248].

Ғ.А. Лазьков.

Статус 1. Очень редкий узкий реликтовый эндемик Памиро-Алая с разорванным ареалом.

Краткое описание. Кустарник с растопыренными ветвями. Листья эллиптические или обратнояйцевидные, лопастные, длиной до 20 мм, по краю короткореснитчатые, с обеих сторон коротковолокнистые. Цветки в пазухах листьев. Плоды ягодообразные, красные. Цветёт в июле-августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. В Джизакской и Ферганской областях: Алайский хребет – окрестности кишлака Шахимардан; Туркестанский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан и Кыргызстан.

Места обитания. Щербнисто-каменистые склоны в верхнем и среднем поясах гор, среди разреженных зарослей арчи.

Численность. Встречается очень редко, единичными экземплярами.



Размножение. Семенное и корневыми отпрысками.

Причины изменения численности и ареала. Вырубка на топливо, выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходима организация заказника, изучение биологических особенностей в условиях Ботанического сада АН РУз.

Источники. [20, 248].

Ғ.А. Лазьков.

Very rare relict endemic species of the Pamir-Alay with the disjunctive area. It is spread at the Alay range: nearby the village Shakhimardan; the Turkestan range (Jizzakh and Fergana regions). Inhabits stony slopes in the upper and middle belt of mountains, among sparse juniper stands. Very rarely single specimens can be found. Limiting factors: cutting down as fuel, pasturing. Measures of protection: it is necessary to organize a state reserve, to study biological characteristic features under the conditions of the Botanical Garden (Tashkent).



ШИРАЧДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО АСФОДЕЛЕВЫЕ – ASPHODELACEAE

205. АЛЬБЕРТ ШИРАЧИ

Ширач Альберта / *Eremurus alberti* Regel

Мақоми 2. Ўзбекистонда кам учрайдиган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқарган, панжасимон, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган, қалинлиги 7–10 мм. Барглари кенг қалами, ташқи томонида-гиларининг кенглиги 1,5–2 см. Шингиллари сийрак, кўп гулли, узунлиги 10–50 см. Гулларди баргчалари йирик, учбурчак наштарсимон. Тўпгулининг пастидаги гул-бандлари гулқўрғонидан 2–2,5 марта узун. Гулқўрғон баргчалари бир томирли, оқиш-қизғиш рангли, асосига қараб чўзилган. Чангчилари гулқўрғонидан 1,5 марта қисқа. Кўсакчаси юмалок, уч уяли, силлиқ, эни 2–2,5 см. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Боботоғ, Шеробод водийсида, Деҳқонобод шаҳри атрофларида тарқалган. Тожикистон, Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 900–1200 м баландликда паст тоғлардаги ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган, баъзан 2–3 та тупи биргаликда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллаш даврида кўп миқдорда гулдасталар учун узиб олиниши натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида 1960 йилдан буён ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Табиатда ўсиб турган туплари назорат остига олиниши лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–80 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися веретеновидными корнями толщиной 7–10 мм. Листья широколинейные, наружные, шириной 1,5–2 см. Кисть негустая, многоцветковая, длиной 10–50 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Цветоножки нижние в 2–2,5 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, бледно-мясо-красные, к основанию оттянутые. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Коробочка шаровидная, с 3 гнездами, гладкая, шириной 2–2,5 см. Цветёт в апреле, плод приносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: горы Бабатаг, Шерабадская долина, окрестности города Дехканабада. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в низкогорьях на высоте 900–1200 м.



Численность. Встречается единично, редко по 2–3 растения.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор на букеты.


Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1960 года.

Меры охраны. Необходим контроль за состоянием популяции.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Species rare in Uzbekistan. It is spread at the Babatag mountains, the Sherabad valley, nearby Dekhanabad (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks in the low mountains at the height of 900–1200 m. Single specimens, seldom 2–3 plants can be found. Limiting factors: mass picking of flowers. Measures of protection: control of the state of populations is required.



206. БЕШТОМИР ШИРАЧ

Ширач Ин / *Eremurus iae* Vved.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, илдизлари кўп, йўғонлашган. Барги кенг қалами, 15–20 мм кенгликда, кўкимтир рангли. Шингили цилиндрсимон, узунлиги 20–30 см, сийрак, кам гулли. Гулолди баргчалари ингичка учбурчак шаклда. Шингилининг пастдаги гулбандлар гулкўрғонидан икки баробар узун. Гулкўрғон баргчалари 3–5 томирли. Чангчилари гулкўрғондан узунроқ. Меваси – кўсакча, юмалоқ, йирик (эни 1 см дан ортиқ), силлиқ. Май–июнда гуллаб, меваси июнь–июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг Чўлбайир тоғларида, Тўпаланг дарёси ҳавзасида, Бойсунтоғнинг шимолий ёнбағирларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли, тошли-соз тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди. Якка-якка ҳолда ёки 2–3 тадан кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан, баъзан эса вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан йиғилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли каммайиб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. 1962 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Буюртмахоналар ташкил қилиш ҳамда уруғ олиш мақсадида экиб ўстириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 60–80 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися слабоутолщенными многочисленными корнями. Листья широколинейные, шириной до 15–20 мм, сизые. Кисть цилиндрическая, длиной 20–30 см, негустая, немногочетковая. Прицветники узкотреугольные. Нижние цветоножки в 2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 3–5 жилками. Тычинки длиннее околоцветника. Плод – коробочка шаровидная, гладкая, крупная (более 1 см). Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – горы Чутьбаир, бассейн реки Тупаланг, северный склон Байсунтау.

Места обитания. Каменисто-глинистые, преимущественно северные склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается крайне редко, единично или небольшими (по 2–3 растения) группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением, выпас.

Культивирование. С 1962 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходима организация заказника, введение в культуру с целью размножения.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.



Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Chulbair mountains, the Tupalang river basin, the north slope of the Baysuntau (Surkhandarya region). Inhabits stony-clayish, mainly the northern slopes in the middle belt of mountains. Single or small groups (2–3 plants) extremely rarely can be found. Limiting factors: collection by the local population, pasturing. Measures of protection: it necessary to organize a state reserve, to introduce into cultivation for the purpose of its reproduction.



207. БОЙСУН ШИРАЧИ

Ширач байсунский / *Eremurus baissunensis* O. Fedtsch.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камайиб кетган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–80 см оралиғидаги кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, урчуқсимон йўғонлашган илдизларининг эни 4–6 мм. Барглари ингичка қалами, эни 4–6 мм. Шингили сийрак, кўп гулли, узунлиги 25–45 см. Гулолди баргчалари йирик, учбурчак наштарсимон. Шингилининг пастидаги гулларининг бандлари гулқўрғонидан 1,5 марта узун. Гуллари ҳидли. Гулқўрғон баргчалари оқ, битта томирли. Чангчилари нотекис ва гулқўрғонидан қисқа. Меваси – кўсакча, чўзиқроқ силлиқ, эни 6–7 мм, узунлиги 15–20 мм, уруғлари ингичка қанотчали. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари: Кўхитанг тизмаси, Деҳқонобод, Бойсун ҳамда Денов шаҳарлари оралиғидаги пасттоғларда тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Ола жинсли ва гипсли ерларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг алоҳида ўсиш шароитларини талаб этадиган субстрат турга мансублиги, шунингдек унинг одамлар ва чорва моллари томонидан пайҳон қилинаётганлигидир.

Маданийлаштирилиши. 1964 йилдан бошлаб ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстиришга ҳаракат қилинган, аммо бу уринишлар натижа бермаган.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Табиатдаги тупларининг ҳолатини ўрганиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 60–80 см с укороченным корневищем и веретеновидными корнями толщиной 4–6 мм. Листья узколинейные, шириной 4–6 мм. Кисть рыхлая, многоцветковая, длиной 25–45 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5 раза длиннее околоцветника. Цветки душистые. Листочки околоцветника с 1 жилкой, белые. Тычинки неровные, короче околоцветника.



Плод – коробочка удлинённая, гладкая, шириной 6–7 мм, длиной 15–20 мм. Семена узкокрылые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: хребет Кугитанг, низкогорья между городами Дехканабад, Байсун, Денау. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и гипса.

Численность. Встречается крайне редко единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Требуемость растения к субстрату, сбор населением, выпас.


Культивирование. С 1964 года неоднократно предпринимались попытки интродуцировать вид в Ботаническом саду АН РУз. Через 2–3 года растения выпадали.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике. Требуются тщательные наблюдения и регулярная оценка состояния популяций.

Источники. [261, 279–282, 358].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the low mountains between Dekhanabad, Baysun, Denau (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Single specimens extremely rarely can be found. Limiting factors: demand of plant to the substrate, picking by the local population, pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan nature reserve. Careful observations and estimation of the state of populations are required.



208. КОРОВИН ШИРАЧИ

Ширач Коровина / *Eremurus korovinii* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Ғарбий Тянь-Шанга хос ўта камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқарган, нурсимон жойлашган бўлаклари бироз йўғонлашган. Барглари 30 см узунликда, эни 2 см, ингичка қалами, тарновсимон, кўкимтир, қиррали, қисқа тукли. Тўпгули кенг цилиндрсимон шингилдан иборат. Гуллари кенг кўнғироқсимон, оч пушти рангли, тубида сариқ доғи бор. Гулкўрғон баргчалари 15–18 мм узунликда. Меваси – кўсакча, юмалоқ, силлиқ, диаметри 10–15 мм. Июль ойида гуллаб, уруғ беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Курама тоғида ўсган. Бир марта 1880 йилда Маҳмуд Мусо томонидан Кандирдовондан йиғилган. Кейинги қидиришлар натижасиз тугаган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг тошли ёнбағирларида ўсган.

Сони. Аниқланмаган. Йўқолиб кетган бўлиши мумкин.

Кўпайиши. Аниқ маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кандирдовон, асосан, чорва моллари ҳайдаб ўтиладиган йўл бўлганлиги сабабли, ўсимлик оёқ остида қолиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимликни Курама ва Чотқол тизмаларидан излашни давом эттириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 293, 358].

К.Ш. Тожибаев

Статус 1. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см с укороченным корневищем, радиально расходящимися слабоутолщенными корнями. Листья длиной до 80 см и шириной 2 см, узколинейные, желобчатые, килеватые, сизые, коротко-опушенные. Соцветие в виде рыхлой цилиндрической кисти. Цветки ширококолокольчатые, светло-розовые, с жёлтым пятном у основания. Листочки околоцветника длиной 15–18 мм. Плод – гладкая шаровидная коробочка 10–15 мм в диаметре. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Кураминский хребет. Известен только по одному сбору. В 1880 году был собран Махмудом Мусой на перевале Кендырдаван. Дальнейшие попытки найти растение оказались безуспешными.

Места обитания. Каменистые склоны гор.

Численность. Не установлена. По-видимому, вид исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Перевал Кендырдаван используется как скотопрогон, что могло явиться причиной исчезновения вида.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Необходимо продолжить поиски этого вида на Кураминском хребте и прилегающих склонах Чаткальского хребта.

Источники. [261, 279–282, 293, 358].

К.Ш. Тожибаев

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Kurama range (Tashkent region). It is known only by one specimen. In

1880, Makhmud Musa collected it in the Kendyrdavan pass. Further attempts to find this plant were unsuccessful. Inhabits stony slopes of mountains. Specimens has probably disappeared. Limiting factors: the Kendyrdavan pass is used as a pasture that could be the reason of the species disappearance. Measures of protection: it is necessary to go on searching of these species in the Kurama range and adjacent slopes of the Chatkal range.



209. МОМИҚ ШИРАЧ

Ширач пушистый / *Eremurus pubescens* Vved.

Мақоми 2. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80–100 см келади-ган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган, эни 5–7 мм. Барги қалами, эни 2 см атрофида. Шингили сийрак, кўп гулли, узунлиги 40–55 см. Гулолди баргчалари ингичка учбурчак шаклда, момик тукли. Шингилидаги пастки гулларининг гулбанди гулқўргонидан 2–2,5 марта узун. Гулқўргон баргчалари оқиш-қизғиш рангда. Чангчилари гулқўргон баргчаларидан қисқа. Кўсакчаси юмалоқ, эни 1,5 см, юпқа қобиқли. Май ойида гулаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Тўпаланг, Сангардак дарёлари ҳавзасида, Бойсунтоғда ва Чўлбайир тоғларида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик тушлар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уругидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан териб кетилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1961 йилдан бошлаб ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чўлбайир ёки Бойсунтоғда буюртмахона ташкил қилиниши лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое густоопушенное растение, высотой 80–100 см, с укороченными и радиально расходящимися веретеновидно-утолщёнными (5–7 мм) корнями. Листья линейные, шириной около 2 см. Кисть рыхловатая, многоцветковая, длиной 40–55 см. Прицветники узкотреугольные, мохнатые. Нижние цветоножки в 2–2,5 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника белые с розовым оттенком. Тычинки короче

листочков околоцветника. Коробочка шаровидная, тонкокожистая, шириной около 1,5 см. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Бассейн рек Тупаланг и Сангардак, горы Чулбайир и Байсунтау. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Щербнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.



Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор населением и выпас скота.

Культивирование. С 1961 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Необходимо организация заказника Чульбайирских или Байсунских гор.

Источники. [261, 279–282, 358].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Tupalang and Sangardak river basins, the Chulbair and Baysuntau mountains (Surkhandarya region). Inhabits slopes in the middle belt of mountains. Small groups of specimens can be found. Limiting factors: picking by population, cattle pasturing. Measures of protection: it is necessary to organize a protected area on the Chulbair or Baysun mountains.



210. НОР ШИРАЧ (ХУЛКА БОЛА)

Ширач мощный / *Eremurus robustus* Regel

Мақоми 3. Тянь-Шань ва Помир-Олойдаги ареали ажралган ва қисқариб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 100–250 см га етадиган кўп йиллик йирик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари кенг қалами, эни 4–8 см, силлиқ. Шингили тигиз, кўп гулли, цилиндр шаклда, узунлиги 35–120 см. Гулларди баргчалари учбурчак шаклда. Шингилининг пастки қисмидаги гулларнинг банди гулкўрғонидан 1,5–2 марта узун. Гулкўрғон баргчалари якка томирли, оч пушти рангли. Чангчилари гулкўрғонидан бироз қисқа. Меваси – юмалоқ, силлиқ кўсакка ўхшайди, эни 1,5–2,5 см. Май-июлда гуллайди, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Наманган, Жиззах, Самарқанд, Фарғона, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань ва Помир-Олоининг барча тизмалари, Тожикистон, Қозоғистон, Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги майда-жинс тупроқли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ва кичик туплар ҳосил қилиб ўсади. Тошкент вилояти худуди бўйича 100 000 атрофида тури бор.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йул билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан териб олинishi ва чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1954 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол, Зомин, Ҳисор, Китоб, Нурота, Сурхон қўриқхоналарида, Угом-Чотқол ва Зомин миллий табиат боғларида муҳофаза қилинади. Ботаника боғларида кўпайтириш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].


Ф.И. Каримов.

Статус 3. Сокращающийся эндемик Тянь-Шаня и Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое мощное растение высотой 100–250 см с укороченным корневищем и радиальнорасходящимися веретеновидными утолщёнными корнями. Листья широколинейные, наружные шириной 4–8 см, гладкие. Кисть очень густая, многоцветковая, цилиндрическая, длиной 35–120 см. Прицветники треугольные. Нижние цветоножки в 1,5–2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, светло-розовые. Тычинки немного короче околоцветника. Плод – шаровидная, гладкая коробочка шириной 1,5–2,5 см. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Ташкентской, Наманганской, Джизакской, Самаркандской, Ферганской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: все горные хребты западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Места обитания. Мелкоземистые и мелкоземисто-каменистые склоны в среднем поясе гор.



Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими группами. По Ташкентскому вилояту произрастает около 100 000 особей.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Массовый сбор населением.



Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1954 года.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского, Зааминского, Гиссарского, Китабского, Нуратинского, Сурханского заповедников, Угам-Чаткальского и Зааминского национальных парков. Необходимо размножение в ботанических садах.

Источники. [261, 279–282, 358].

Ф.И. Каримов.

Endemic species of the Tien-Shan and Pamir-Alay with reducing area and population. It is spread at all mountain ranges of the western Tien-Shan and western Pamir-Alay (Tashkent, Jiz-zakh, Samarkand, Ferghana, Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth and fine earth-stony slopes in the middle belt of mountains. Single specimens and small populations can be found sporadically. Limiting factors: mass picking by the local population. Measures of protection: protected in the territory of the Chatkal, the Zaamin, the Hissar, the Kitab, the Nuratau, the Surkhan state nature reserves and the Ugam-Chatkal and Zaamin national parks. Reproduction in botanical gardens is required.

211. НУРОТА ШИРАЧИ

Ширач нуратинский / *Eremurus nuratavicus* A.P. Khokhr.

Мақоми 1. Нурота тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–120 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари ингичка қалами, эни 10–30 мм. Шингили сийрак, узунлиги 15–25 см. Гулларди баргчалари оқ, узунлиги 12–14 мм. Гулбандларининг узунлиги 10–15 мм, гулқўрғонидан биров узунроқ. Гулқўрғон баргчалари 3 томирли, оч сариқ, қўнғир чизикли, узунлиги 8–11 мм. Чангчилари гулқўрғонидан узунроқ. Меваси – кўсақдай, юмалоқ. Уруғлари ингичка қанотчали. Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта минтақасидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони 1000 тадан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. 1980 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида экилади.

Муҳофаза чоралари. Нурота кўрикхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [18, 314].

Н.Ю. Бешко.

Статус 1. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40–120 см, с укороченным корневищем и веретеновидно-утолщёнными корнями. Листья узколинейные, шириной 10–30 мм. Кисть негустая, длиной 15–25 см. Прицветники белые, длиной 12–14 мм. Цветоножки длиной 10–15 мм, немного длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 3 жилками, бледно-желтоватые, с коричневой полосой, длиной 8–11 мм. Тычинки длиннее околоцветника. Плод – коробочка, шаровидная. Семена узкокрылые. Цветёт в мае, плодоносит в июле.

Распространение. Джизакская область: Хребет Нуратау.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Общая численность не превышает 1000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. С 1980 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского заповедника.

Источники. [18, 314].

Н.Ю. Бешко.



Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh region). Inhabits stony slopes in the middle of mountain belt. There are about 1000 plants can be found. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



212. ОҚГУЛЛИ ШИРАЧ

Ширач молочноцветковый / *Eremurus lactiflorus* O. Fedtsch.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ва Нуротадаги камайиб бораётган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45–100 см оралиғидаги кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари кенг қалами, эни 13–25 мм, силлиқ. Шингили сийрак, кўп гулли, узунлиги 15–30 см. Гулларди баргчалари ингичка учбурчак наштарсимон. Шингилининг пастидаги гулларининг банди гулкўрғонидан 1,5–2 марта узун. Гулкўрғон баргчалари бир томирли. Чангчилари нотекис, гулкўрғонидан қисқа. Меваси – кўсакдай, юмалоқ, 3 та бўртмали, силлиқ, эни 20–30 мм. Май–июнда гуллаб, меваси июнь–июль ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент, Жиззах ва Навоий вилоятлари: Қоржантов, Угом, Писком, Чотқол, Курама ва Нурота тизмаларида тарқалган. Қирғизистон ва Қозоғистонда ҳам ўсади.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Кичик тўплар ва якка-якка ҳолда тарқалган. Тошкент вилоятида олиб борилган тадқиқотлар давомида 40 000–50 000 тупи аниқланган. Нурота тоғ тизмасида тахминан 100 та туп икки жойда ўсиши аниқланган.

Кўпайиши. Уругидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан териб олинishi, янги ерларни ўзлаштириш ва чорва моллари таъсирида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экилади.

Муҳофаза чоралари. Чотқол ва Нурота кўриқхоналарида, Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади. Табиатдаги мавжуд туплари назорат остига олинishi лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Сокращающийся по численности эндемик Западного Тянь-Шаня и Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–100 см, с укороченным корневищем и веретеновидно-утолщенными корнями. Листья широколинейные, шириной 13–25 мм, гладкие. Кисть негустая, многоцветковая, длиной 15–30 см. Прицветники узко-треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5–2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой. Тычинки неравные, короче околоцветника. Плод – шаровидная коробочка с 3 выпуклостями, гладкая, шириной 20–30 мм. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.





Reducing endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Pskem and Chatkal range, the Karzhantau mountains (Tashkent region), the Nuratau range (Jizzakh and Navoi regions). Inhabits and stony slopes in the middle belt of mountains. Single specimens rarely can be found in the accessible for human places, in almost inaccessible regions grows in groups. The population number in the Tashkent region is about 40 000 – 50 000 plants, at the Nuratau range-about 100 pants were counted in two locations. Limiting factors: picking of flowers. Measures of protection: protected in the Chatkal and Nuratau state nature reserves and the Ugam-Chatkal national park. Regular control of the state of populations is required.



Распространение. В Ташкентской, Джизакской и Навоийской областях: все хребты Западного Тянь-Шаня и Нуратинский хребет. За пределами Узбекистана: Кыргызстан, Казахстан.

Места обитания. Щербнистые и каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Произрастает небольшими группами и единичными экземплярами. Последние исследования по Ташкентскому вилояту показали произрастание 40 000–50 000 особей. На хребте Нуратау учтено около 100 растений в 2 пунктах.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор на букеты, освоение земель и выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз с 1966 года.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском и Нуратинском заповедниках, Угам-Чаткальском национальном парке. Необходим постоянный контроль за состоянием популяций.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.



213. САРИҚ ШИРАЧ

Ширач жёлтый / *Eremurus luteus* Baker

Мақоми 1. Ўзбекистондаги жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Буйи 35–60 см оралғидаги кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари ингичка қалами, эни 4–7 мм. Шингили сийрак, нисбатан кам гулли, узунлиги 20–30 см. Гулолди баргчалари йирик учбурчак наштарсимон, шингилининг пастки қисмидаги гулларининг банди гулқўрғонидан 1,5 марта узун. Гуллари ҳидли. Гулқўрғон баргчалари якка томирли, оч сариқ. Чангчилари нотекис, гулқўрғонидан қисқа. Меваси кўсакчадай, чўзиқ, силлиқ. Уруғлари ингичка қанотчали. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё, Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор (Қизилча, Ғузор, Дарбанд, Оқравот ва Дехқонобод атрофлари) ва Кўҳитанг тизмалари оралғидаги паст тоғларда тарқалган. Туркменистон, Эрон ва Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Очиқ ола жинс ва гипсларда ўсади.

Сони. Жуда кам сақланган, табиатда якка-якка холда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шароитига мослашганлиги ва чорва молларининг боқилиши ҳамда аҳоли томонидан терибли олиниши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. 1965 йилдан буён ЎЗР ФА Ботаника боғида экиб ўстиришга қаратилган кўплаб уринишлар натижа бермаган.


Муҳофаза чоралари. Табиатдаги мавжуд туплари устидан кузатишлар олиб бориш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 35–60 см, с укороченным корневищем и слабоверетеновидно-утолщёнными корнями. Листья узколинейные, шириной 4–7 мм. Кисть негустая, сравнительно немногочетковая, длиной 20–30 см. Прицветники крупные, треугольно-ланцетные. Нижние цветоножки в 1,5 раза длиннее околоцветника. Цветки душистые. Листочки околоцветника с 1 жилкой, бледно-жёлтые. Тычинки разной длины, короче околоцветника.



Плод – коробочка, удлинённая, гладкая. Семена узкокрылые. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: низкогорья в юго-западных отрогах Гиссарского хребта (окрестности Кызылчи, Гузара, Дербента, Акрабата и Дехканабада) и хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан, Иран и Афганистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород и гипса.

Численность. Встречается крайне редко, единичными экземплярами.

Размножение. Семенос.

Причины изменения численности и ареала. Требуемость растений к местам обитания, выпас скота, сбор населением.

Культивирование. С 1965 года неоднократно интродуцировался в Ботаническом саду АН РУз. Через 2–3 года растения выпали.

Меры охраны. Требуется постоянные наблюдения за состоянием растений в природе.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare species in Uzbekistan. It is spread at the low mountains of the western branches of the Hissar range, from Kyzylcha, Guzar and Dekhanabad to the Kughitang range (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits outcrops of gypcaseous rocks. Single specimens extremely rarely can be found. Limiting factors: exigence of plants to habitat, cattle pasturing, collection by the population. Measures of protection: regular control of the state of populations in nature is required.



214. СУВОРОВ ШИРАЧИ

Ширащ Суворова / *Eremurus suworowii* Regel

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–70 см келадиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, бўлаклари йўғонлашган. Барглари ингичка қалами. Поясининг пастки қисми, одатда, ғадир-будур тукли. Шингилли деярли цилиндрсимон, сийрак, кам гулли, узунлиги 15–50 см. Гулларди баргчалари тор учбурчак шаклда. Пастки гулларнинг банди гулкўрғонидан 1,5–2,5 марта узун. Гулкўрғон баргчалари бир томирли, оч сариқ рангда. Чангчилари гулкўрғонидан қисқа. Кўсакчаси юмалоқ, текис, эни 1–1,4 см. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тўпаланг ва Сангардак дарёлари ҳавзаси), Чўлбайир тоғлари, Кўхитанг ҳамда Боботоғда тарқалган. Тожикистон ва Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори ва қуйи қисмларидаги майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик туплар ташкил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан, баъзан вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсадиган жойларнинг ўзлаштирилиши, чорва молларининг боқилиши ҳамда аҳоли томонидан йиғилиши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1960 йилдан буён ЎЗР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Сурхон давлат кўриқхонасида сақланади. Чўлбайир тоғларида ўсимликнинг ҳолатини кузатиб туриш учун буюртмахона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50–70 см, с укороченным корневищем и радиально расходящимися немногочисленными корнями. Листья узколинейные. Стебель обычно внизу шероховато-пушистый. Кисть почти цилиндрическая, рыхлая, немногочетковая, длиной 15–50 см. Прицветники узко-треугольные. Нижние цветоножки часто в 1,5–2,5 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, бледно-жёлтые. Тычинки короче околоцветника. Коробочка шаровидная, гладкая, шириной 1,4 см. Цветёт в апреле–мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет (бассейны рек Тупаланг и Сангардак), горы Чульбаир, хребты Бабатаг и Кугитанг. За пределами Узбекистана:

Таджикистан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны в высоких предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночно и небольшими группами.

Размножение. Семенное, реже вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение территорий, сбор населением, выпас скота.

Культивирование. С 1960 года выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется на территории Сурханского заповедника. Необходимы организация заказника в Чульбаирских горах и регулярная оценка состояния популяций.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.



Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar, the Chulbair, the Babatag, the Kughitang ranges (Surkhandarya region). Inhabits fine earth slopes in the foothills and lower belt of mountains. Single specimens and small groups can be found. Limiting factors: reclamation of areas, collecting by the population, cattle pasturing. Measures of protection: some populations are protected in the Surkhan state nature reserve. Organization of the state reserve in the Chulbair Mountains and regular control of the state of populations are required.



215. ЯШИЛ ГУЛЛИ ШИРАЧ

Ширач зеленоцветный / *Eremurus chloranthus* Popov

Мақоми 0. Туркистон тизмасида жуда кам тарқалган, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60–70 см дан ошмайдиган кўп йиллик ўт. Илдизпояси қисқа, нурсимон жойлашган, урчуқсимон бўлаклари бироз йўғонлашган. Барглари кенг-қалами, эни 15 мм. Шингили қалин, кўп гулли, деярли цилиндрсимон, узунлиги 25–30 см, Гулолди баргчалари учбурчак наштарсимон, четлари киприксимон тукли. Шингилининг пастадаги гулбанди гулкўрғонидан қисқароқ. Гулкўрғон баргчалари якка томирли, яшилроқ рангли, узунлиги 14–15 мм. Чангчилари гулкўрғонидан 1,5 марта қисқа. Кўсакчаси номаълум. Июлда гулдайди.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Туркистон тизмасидаги Гуралашсойнинг юқори қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги нам соз тупроқли ёнбағирлар.

Сони. Фақатгина бир марта Гуралашсойдан йиғилган (1926 йил 20 июлда). 1980–1981 йилларда олиб борилган қидириш ишлари натижа бермади. Тур йўқолиб кетган бўлиши ҳам мумкин.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Зомин давлат қўриқхонасида сақланади.

Манбалар. [261, 240, 279–282, 358].


К.Ш. Тожибаев.

Статус 0. Очень редкий эндемик Туркестанского хребта.

Краткое описание. Растение высотой 60–70 см с укороченным корневищем и несильно-веретеновидно-утолщёнными корнями. Листья широколинейные, шириной около 15 мм. Кисть густая, многоцветковая, почти цилиндрическая, длиной 25–30 см. Прицветники узко-треугольно-ланцетные, реснитчатые. Цветоножки нижние немного короче околоцветника. Листочки околоцветника

с 1 жилкой, зеленоватые, длиной 14–15 мм. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Плод – коробочка, неизвестна. Цветёт в июле.

Распространение. Самаркандская, Джизакская область: Туркестанский хребет – верховья Гуралашая.



Места обитания. Вероятно, произрастает на влажных склонах и сазах в верхнем поясе гор.

Численность. Найден один раз в ущелье Гуралаш (20 июля 1926 г.). Поиски в 1980 и 1981 гг. результатов не дали. Вид, по-видимому, исчез.

Размножение. Сведений нет.


Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Зааминском государственном заповеднике.

Источники. [261, 240, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.



Very rare endemic species of the Turkestan range. It is spread at the Turkestan range: the Guralashsay (Jizzakh region). Probably inhabits, wet fine soils in the upper mountain belt. Found only in the Guralash Gorge (July 20, 1926). The research carried out in 1980–1981 were unsuccessful. Probably disappeared. Measures of protection: protected in the Zaamin state reserve.

216. ЭЧИСОН ШИРАЧИ

Ширащ Эчисона / *Egemurus aitchisonii* Baker

Мақоми 3. Ўзбекистонда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70–120 см орасидаги кўп йиллик ўт. Илдиз пояси қисқарган, нурсимон жойлашган, бўлаклари урчуқсимон йўғонлашган. Барглари кенг қалами, эни 5–8 см, оч яшил рангли, туксиз. Пояси туксиз ёки пастки қисми ғадир-будур тукли. Шингили сийрак, камгулли, цилиндрсимон, 20–45 см узунликда. Гулолди баргчалари учбурчак шаклда, чўзинчоқ. Шингилининг пастсидаги гулбанди гулкўрғонидан икки марта узун. Гулкўрғон баргчалари бир томирли, пушти ранг. Чангчилари гулкўрғонидан 1,5 марта қисқа. Меваси – эни 1,5–2 см келадиган юмалоқ кўсакча. Май–июнь ойларида гуллаб, июнь–июлда уруғлайди.

Тарқалиши. Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон ва Ҳисор тизмаларида, Чўлбайир, Бойсун, Кўхитанг тоғларида тарқалган. Қирғизистон, Тожикистон, Афғонистонда ҳам тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмида майда жинс тупроқли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан, баъзан вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аҳоли томонидан йиғиб олинishi ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. ЎЗР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Сурхон кўрикхоналарида муҳофаза қилинади, Чўлбайир тоғларида буюртмахона ташкил этиш лозим.

Манбалар. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий в Узбекистане вид.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 70–120 см с укороченным корневищем и радиально расходящимися веретеновидно-утолщенными корнями. Листья широколинейные, шириной 5–8 см, ярко-зелёные, голые. Стебель голый или при основании шероховато-опушенный. Кисть рыхлая, немногочетковая, цилиндрическая, длиной 20–45 см. Прицветники треугольные, длиннооттянутые. Нижние цветоножки в



2 раза длиннее околоцветника. Листочки околоцветника с 1 жилкой, розовые. Тычинки в 1,5 раза короче околоцветника. Плод – шаровидная коробочка, шириной 1,5–2 см. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Самаркандской, Сурхондарьинской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский и Гиссарский хребты, горы Чульбаир, Байсунтау, Кугитанг. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Кыргызстан, Афганистан.

Места обитания. Мелкоземистые и мелкоземисто-каменистые склоны в нижнем поясе гор.



Численность. Встречается редко, единичными экземплярами, иногда небольшими группами.

Размножение. Семенное, редко – вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный сбор населением, выпас скота.

Культивирование. Выращивается в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Сурханском государственных заповедниках. Необходима организация заказника в горах Чульбаир.

Источники. [261, 279–282, 358].

К.Ш. Тожибаев.

Rare species in Uzbekistan. It is spread at the Zerafshan and Hissar ranges, the Chulbaier, the Baysuntau, the Kughitang mountains (Samarkand, Surkhondarya and Kashkadarya region). Inhabits fine earth and fine earth-stony slopes in the lower belt of mountains. Solitary specimens or small groups rarely can be found. Limiting factors: the intensive collection by local population, cattle pasturing. Measures of protection: protected in the Hissar and Surkhan state reserves. It is necessary to organize a protected area in the Chulbaier mountains.

ШОТАРАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО ДЫМЯНКОВЫЕ – FUMARIACEAE

217. ТУРКИСТОН ШОТАРАЧАСИ

Дымяночка туркестанская / *Fumariola turkestanica* Korsh.

Мақоми 2. Олой тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см орасидаги кўп йиллик, кўкимтир ўт. Пояси битта, ингичка, асосидан шохланган. Барглари узун бандли, икки қарра уч бўлакка бўлинган, туксиз. Япроқлари 2–3 бўлакли. Тўпгули соябонсимон, кам гулли, шингили баргларидан қисқа. Гуллари майда, кўримсиз, сарғиш. Меваси ёнғоқча, узунлиги 3 мм, эни 1 мм, қорамтир рангли, ғадир-будур. Май-июнь ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Шохимардон ва Исфайрам дарёлари ҳавзаларида тарқалган. Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Оҳақтошли қояларнинг ёриқларида ўсади.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик ареалига аниқлик киритиш ва биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [167, 242].

Г.А. Лазьков.

Статус 2. Редчайший эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое сизоватое растение высотой 10–15 см. Стебель одиночный, тонкий, ветвистый от основания. Листья длинно-черешковые, дважды тройчаторассечённые, голые. Сегменты листа двух-трёхлопастные. Соцветие – зонтиковидная кисть, не выступающая из листьев, с мелкими, невзрачными, немногочисленными желтоватыми цветками. Плод – орешек, длиной 3 мм, шириной 1 мм, при созревании чернеющий, слабощероховатый. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ферганская область: бассейн реки Шохимардан. За пределами Узбекистана: Кыргызстан (Исфайрам).

Места обитания. Трещины известняковых скал.

Численность. Достоверно известно 5 небольших популяций на скалах между кишлаками Вуадиль, Шохимардан и Ярдан. В связи с приуроченностью к скалам численность очень мала.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимы уточнение ареала, контроль за популяциями и изучение биологических особенностей.

Источники. [167, 242].

Г.А. Лазьков.



Сони. Водил, Шохимардон ва Ёрдон кишлоқлари ўртасидаги қояларда 5 та тупи мазжуд. Тошқояларда ўсиши туфайли сони ҳам ниҳоятда кам.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Shakhimardan river basin (Fergana region). Inhabits clefts of limestone rocks. Known for certain 5 small populations in rocks between the Vuadil, the Shakhimardan and Yardan villages. The number of plants is very low because the species is a stenotopic petrophyte. Measures of protection: it is necessary to define more exactly the area, to control populations and to study biological characteristic features.

ШҶРАДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО МАРЕВЫЕ – CHENOPODIACEAE

218. ҲТКИРБАРГ БАЛИҚКҶЗ

Климакоптера остролистная / *Climacoptera oxyphylla* U.P. Prатов

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубий қисмида кичик майдонда сақланиб қолган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см, асосидан шохлаган, бир йиллик ўт. Ўсимликнинг пастки қисми қалин, юқори қисми эса сийраклашган, узун, кўп хужайрали, чалкаш, ярим ётиқ туклар билан қопланган. Шохчалари ва барглари кетма-кет жойлашган, поядаги барглари-нинг банди поясига ёпишган. Барглари этли, қалами ярим цилиндрсимон, учи ўткир, баргининг учи ғуж тукли. Гуллари якка, рўваксимон тўпгулга йиғилган. Гулолди барги этли, учи ўткир, ён-баргча ва гулкўрғонлардан узунроқ. Гулкўрғони 5 баргчали, узунлиги 6 мм, мевалаган пайтида юқори қисми тукли қанотчалар ҳосил қилади. Чангчиси 5 та. Тумшукчаси бигизсимон, гулкўрғонидан қисқа. Уруғи ётиқ жойлашган.



Тарқалиши. Сурхандарё вилояти: Ўзбекистоннинг жанубида Шеробод водийсидаги Майдон қишлоғи атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Очиқ ола жинсли ерларда ўсади.

Сони. Кам учрайди, якка-якка ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларда ўсиши ва у ўсган ерларда чорва молларининг боқилиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маданийлаштирилмаган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Чорва молларини боқилгани (айниқса, ўсимликнинг уруғи етилган даврда) чеклаш лозим.

Манбалар. [159, 253].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Узколокальный эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 10–15 см, ветвящееся от основания, опушенное внизу густыми, кверху редующими, длинными, многоклеточными, спутанными или полуприжатыми волосками. Ветви и листья

очередные, стеблевые листья низбегающие, мясистые, линейные, полуваляковатые, на конце островатые, с волосками, собранными в кисточку. Цветки одиночные, собраны в метельчатое соцветие. Прицветные листья мясистые, на конце с остроко-нечием, длиннее прицветников и околоцветника. Листочков околоцветника 5, длиной до 6 мм, при плодах крылатые, над крыльями опушенные. Тычинок 5. Рыльца шиловидные, короче околоцветника. Семена горизонтальные.

Распространение. Сурхандарьинская область: юг Узбекистана, Шерабадская долина, окрестности кишлака Майдан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.

Численность. Малочислен, встречается единичными особями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к пестроцветным поро-

дам, поедание животными.

Культивирование. Не культивируется.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Необходимо ограничение выпаса скота в период созревания семян.

Источники. [159, 253].

У.П. Пратов.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the southern Uzbekistan, the Sherabad valley nearby the village Maidan (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks. Not numerous, single specimens can be found. Limiting factors: gypseous rocks, eaten by animals. Measures of protection: not protected.



219. МАЛИГИН БАЛИҚКЎЗИ

Климакоптера Малигина / *Climacoptera malyginii* (Korovin ex Botsch.) Botsch.

Мақоми 2. Мирзачўлда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик, ўт ўсимлик, бўйи 30–35 см, ёш ниҳол пайтида узун, ингичка, чалкаш тукли, кейинчалик туксизлана бошлайди. Барглари этли, қалами, учи тўмтоқ. Гулолди барглари поянинг пастида гулёнбаргчалардан узун, юқорисида улардан қисқа. Гулёнбаргчалари гулкўрғонидан қисқа, тухумсимон. Гулкўрғон бўлаклари наштарсимон, туксиз, меваси етилиши билан ярмидан пастида қанотчалар пайдо бўлади. Чангдонининг узунлиги 1,5 мм, ярмигача бўлинган, учидаги бўртмаси пуфаксимон. Уруғчиси гулкўрғонидан узун. Июнь–сентябрь ойларида гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Эндемик тур. Сирдарё воҳаси (Мирзачўл)да тарқалган (Сирдарё вилояти).

Ўсиш шароити. Шўрхок тупроқларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда ўсади. Сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур тарқалган жойларда дехқончилик қилиниши ва мол боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [35, 159].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Голодной степи.

Краткое описание. Однолетнее растение, 30–35 см высоты, в молодом состоянии опушенное длинными, тонкими, спутанными волосками, в последствии голые. Листья мясистые, линейные, тупые. Прицветные внизу длиннее, вверху короче прицветничков. Прицветнички яйцевидные, короче околоцветника. Листочки околоцветника ланцетные, голые, ниже середины развивают крылья. Пыльники около 1,5 мм длины, разделенные до половины, придатки пузыревидные. Пестик длиннее околоцветника. Цветет и плодоносит в июне–сентябре.

Распространение. Сырдарьинская область: встречается в бассейне реки Сырдарья – Мирзачуль.

Места обитания. На солончаках.

Численность. Встречается спорадически на небольших участках.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхоз культуры и интенсивный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 159].

У.П. Пратов.



Rare endemic species of the Mirzachul. It is spread at the Syrdarya river basin: the Mirzachul (Syrdarya region). Inhabits saline soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



220. ПЯТАЕВА БАЛИҚКЎЗИ

Климакоптера Пятаевой / Climacoptera pjataevae U.P. Pratov

Мақоми 2. Ғарбий Ҳисорда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 10–15 см, қалин, узун, чалкаш ва сийрак, қисқа, деярли тўғри тукли. 3–7 жуфт шохлари ва барглари қарама-қарши, қолганлари кетма-кет ўрнашган. Поядаги барглари серэт, қалами, тўмтоқ, узунлиги 12–(14) мм, эни 1,5 мм. Гуллари рўвақда ўрнашган. Гулолди барги серэт, узунлиги 10 мм, гулқўрғон ва ёнбаргчаларидан узун. Гулён-баргчалари, гулқўрғонига тенг ёки гулқўрғонидан қисқа. Гулқўрғони 5 бўлакли, меваси етилганда ярмидан пастроғида пардасимон қанотчалар пайдо бўлади. Чангчиси 5 та, чангдонининг учида

ларнинг салбий таъсири туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [159, 253].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Однолетнее растение, 10–15 см высоты, опушенное густыми длинными спутанными и рассеянными короткими волосками. Листья супротивные, очередные. Стеблевые листья мясистые, линейные, тупые, 12–(14) мм длины, 1,5 мм ширины. Цветы собранные в метельчатое соцветие. Прицветные листья мясистые до 10 мм длины, длиннее прицветничков и околоцветника. Листочков околоцветника 5, при плодах ниже середины развивающихся пленчатые крылья. Тычинок 5, придатки пыльников пузыревидные, яйцевидные, белые. Семена горизонтальные.

Распространение. Кашкадарьинская область: Встречается в бассейне р. Кашкадарья в окраинах кишлаков Туртсары и Сийрак.

Места обитания. Мелкощепнистые засоленные почвы на подгорной равнине.

Численность. Встречается редко. Численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственное освоение земли и интенсивный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 253].

У.П. Пратов.

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the Kashkadarya river basin: nearby the villages Turtsary and Siyrak (Kashkadarya region). Inhabits saline soils in the piedmont plain. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



пуфаксимон оқ тухумсимон бўртмаси бор. Уруғи текис ўрнашган.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё воҳасидаги Тўртсари ва Сийрак қишлоқлари атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғолди текисликларидаги майда чағиртошли ва шўрланган тупроқларда тарқалган.

Сони. Сийрак тарқалган. Сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши ва антропоген омил-



221. ТҶМТОҚ ГУЛЎНБАРГЧАЛИ БАЛИҚКЎЗ

Климокаптера тупоприцветничковая / *Climacoptera amblyostegia* (Botsch.) Botsch.

Мақоми 2. Қизилқум ва Мирзачўлда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 5–30 см, асосидан шохланган, ёш ниҳол пайтида тукли, кейинроқ туксизланади. Барглари этли, қалами, учи тўмтоқ. Гулолди барги кичикроқ, гулўнбаргчалардан узун. Гулўнбаргчалари тухумсимон, ўртасидан пастроғида қанотчалари бор. Чангдон бўртмаси пуфаксимон. Июль–сентябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Сирдарё, Навоий ва Бухоро вилоятлари: Мирзачўлда ва Қизилқумда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қозоғистонда ҳам тарқалган.



Ўсиш шароити. Шўрхоқ тупроқларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш

сабابلари. Ерларнинг дехқончилик учун ўзлаштирилиши ва чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши.

Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари.

Муҳофаза қилинмайди.


Манбалар. [35, 159].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Голодной степи и Кызылкума.

Краткое описание.

Однолетнее растение, 5–30 см высоты, от основания кустиковидно ветвистое, опушенное в молодом состоянии длинными, тонкими, спутанными волосками, впоследствии голое. Листья мясистые, линейные, тупые. Прицветные длиннее прицветничков.



Прицветнички яйцевидные, тупые, короче околоцветника. Листочки околоцветника ланцетные, голые, ниже середины развивают крылья. Крылья вместе с околоцветником 10–14 мм в диаметре. Придатки пыльников пузыревидные. Семена горизонтальные. Цветет и плодоносит в июле–сентябре.

Распространение.

Сырдарьинская, Навоийская и Бухарская области: Долина реки Сырдарья, Кызылкум, Мирзачуль. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. На солончаках.

Численность. Немногочисленные, сильно разрозненные популяции.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сельскохозяйственное освоение земель, выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [35, 159].

У.П. Пратов.

Rare endemic species of the Kyzylkum and Mirzachul. It is spread at the Kyzylkum, the Mirzachul and the Syrdarya river basin (Syrdarya, Navoi and Bukhara regions).

Inhabits saline soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats, agriculture and pasturing. Measures of protection: not protected.

222. МЕРКУЛОВИЧ БАЛИҚҚЎЗИ

Климокаптера Меркуловича / *Climacoptera merkulowiczii* (Zakirov) Botsch.

Мақоми 2. Қизилқумда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 10–40 см, қалин, қисқа, тарвақайлаган, сийрак узун, чалкаш, кейинроқ камайиб кетадиган тукли. Асосидан шохланган. Барглари этли, қалами, ярим цилиндрсимон, тўмтоқ, гулолди барги овалсимон, қайиқчасимон, гулёнбаргчалари ва гулкўрғонидан қисқа ёки унга тенг, четлари

мена горизонтальные. Цветет и плодоносит в августе–октябре.

Распространение. Бухарская область: Кызылкум.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение земельных участков под сельхозкультуры и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется

Источники. [35, 159].

У.П. Прагов.

Rare endemic species of the Kyzylkum desert. It is spread at the Kyzylkum (Bukhara region) Inhabits saline soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



пардасимон ҳошияли. Гулкўрғон бўлаклари кенг наштарсимон, пуштиранг. Август ва октябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда тарқалган.

Ўсиш шароити. Шўрхок тупроқларда ўсади.

Сони. Кичик-кичик майдонларда жамоалар ҳосил қилади.

Кўпайиши. Уруғи орқали кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [35, 159].

У.П. Прагов.

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Однолетнее растение, 10–40 см высоты, опушенное короткими, торчащими и более редкими длинными, спутанными, позднее стирающимися волосками. Листья мясистые, линейные. Прицветные овальные, тупые, короче прицветничков и околоцветника. Прицветнички овальные или равны ему, по краю узко пленчато окаймленные. Листочки околоцветника широколанцетные или яйцевидные, пленчатые, опушенные. Пыльники с пузыревидным розовым придатком. Се-



223. ҚАНОТИ ТУКЛИ БАЛИҚКЎЗ

Климакоптера птилоптера / Climacoptera ptiloptera U.P. Pratov

Мақоми 2. Устюртда тарқалган камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт, бўйи 40–50 см, қисқа, тўғри, чалкаш ва узун қалин тукли. Шох ва барглари навбат билан жойлашган. Поядаги барглари серэт, ингичка қалами, учи тўмтоқ, узунлиги 12 мм, эни 1,5 мм, гулёнбаргчалари ва гулкўрғонидан узун. Гулкўрғони 5 бўлакли, узунлиги 4,7 мм, эни 11 мм, меваси етилганда ўртасидан сал пастроғида усти тукли қанотчалар пайдо бўлади. Чангчиси 5 та, чангдонининг учиди пуфаксимон бўртмаси бор. Уруғи текис ўрнашган. Меваси октябрь ойида етилади.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон Республикаси: Устюрт ва шарқий чинкда тарқалган.

Ўсиш шароити. Шўрланган, кулранг-қўнғир тупроқларда ўсади.

Сони. Сийрак тарқалган. Сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши ва тупроқнинг шўрлиги туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [59, 253].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Устюрта.

Краткое описание. Однолетнее растение, 40–50 см высоты, опушенное густыми, прямыми, оттопыренными и густыми длинными волосками. Ветви и листья очередные. Стеблевые листья мясистые, узколинейные, тупые, 12 мм длины, 1,5 мм ширины. Прицветные листья длиннее околоцветника. Листочков околоцветника 5, 4, 7 мм длины и 11 мм ширины, при плодах чуть ниже середины развивающихся пленчатые, сверху опушенные крылья. Тычинок 5, придатки пыльников белые или розовые, пузыревидные. Семена горизонтальные. Плодоносит в октябре.

Распространение. Каракалпакстан: встречается на Устюрте и на восточном чинке.

Места обитания. На серо-бурых засоленных почвах.

Численность. Встречается редко, небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас и засоление почвы.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [59, 253].

У.П. Пратов.

Rare endemic species the Ustyurt Plateau. It is spread at the Ustyurt Plateau: the eastern cliff (Karakalpakstan) Inhabits saline soils. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



224. СЕРТУК БУЗОҚБОШ

Галимокнемис войлочноцветковый / *Halimocnemis lasiantha* Hjin

Мақоми 2. Фарғона водийсига хос ареали қисқариб бораётган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган, асосидан шохланувчи, тарвақайлаган, қисқа туклар билан қопланган, бир йиллик этдор ўт. Барглари ингичка-қалами, узунлиги 20–40 мм, пластки томони қабариқ, устки томони ясси. Гулқўрғон

Муҳофаза чоралари. Табиий ҳолда ўсиб турган жойларини сақлаб қолиш лозим.

Манбалар. [35, 159].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Редкий с сокращающимся ареалом эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее мясистое растение, ветвящееся от самого основания и редко достигающее высоты 25 см, покрыто короткими оттопыренными волосками. Листья узколинейные, длиной 20–40 мм, снизу выпуклые, сверху плоские. Листочки околоцветника (5) плёнчатые, длиной 6–7 мм, остроконечные. Плоды конические, основания плоские, покрыты длинными спутанными волосками. Цветёт и плодоносит в июле–сентябре.

Распространение. В Наманганской и Ферганской областях: Ферганская долина.

Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы предгорий, сухие русла рек.

Численность. Встречается одиночными кустами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота и интенсивное сельскохозяйственное освоение территорий, где произрастает вид.

Культивирование. Предпринимались попытки выращивания вида в Ботаническом саду АН РУз, которые, однако, не дали результатов.

Меры охраны. Места произрастания вида необходимо сохранить.

Источники. [35, 159].

У.П. Пратов.

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the Ferghana valley (Namangan and Ferghana regions). Inhabits stony soils of foothills, dry river-beds. Single specimens can be found. Limiting factors: Cattle pasturing and the intensive reclamation of species habitats for agriculture. Measures of protection: it is necessary to reserve these species locations.



баргчалари (5) юпқа, узунлиги 6–7 мм, ўткир учли. Меваси конуссимон, асоси ясси, узун чалкаш туклар билан қопланган. Июль–сентябрь ойларида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Наманган, Фарғона вилоятлари: Фарғона водийсида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, тошли-шағалли тупроқларда, қуруқ ўзанларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари истеъмол қилиши ва ўсимлик тарқалган ерларнинг ўзлаштирилиши оқибатида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғи тажриба даласида ўстириб кўрилганда ижобий натижа бермаган.



225. БОЧАНЦЕВ ТОШБИЮРҒУНИ

Нанофитон Бочанцева / *Nanophyton botschantzevii* U.P. Pratov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанда жуда кичик майдонда сақланиб қолган ниҳоятда камёб, реликт, эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см келадиган, тигиз ёстиқча ҳосил қилиб, ер бағирлаб ўсувчи сершоҳ бута. Барглари кетма-кет жойлашган, дағал, учи тиканли, узунлиги 6 мм. Гуллари 2–9 тадан, шохчаларнинг учларида жойлашган. Ҳар бир гул биттадан гулолди ва иккитадан гулёнбаргчага эга. Гулкўрғон баргчалари юпқа. Уруғлари тик, узунлиги 4–6 мм. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси октябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: денгиз сатҳидан 1600–2000 м баландликда Чотқол тизмаси (Нуракота, Белдирсой)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тош-шағалли ёнбағирлар арча ва бутазорларида, асосан, очиқ жойларда ўсади.

душку. Стебли стелющиеся или слегка приподнимающиеся, многократно ветвящиеся. Листья длиной до 6 мм, очередные, на верхушке с коротким шипком. Цветки собраны по 2–9 на концах ветвей. Каждый цветок с прицветным листом и 2 прицветниками. Листочки околоцветника плёчатые. Семена вертикальные, длиной 4–6 мм. Цветёт в июне–июле, плодоносит в октябре.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет (бассейны рек Нуреката и Бельдерсай), на высоте 1600–2000 м.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны, среди арчовников и кустарников, преимущественно на открытых местах.

Численность. Сохранились небольшие заросли на площади около 3 га на водоразделе Уйнатай и пятна по 10–20 кустов в ущелье Иргайлисай.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Район интенсивно используется в качестве летних пастбищ.

Культивирование. Посевы семян не дали положительных результатов: всходы во второй половине лета засыхали.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [156–159, 260, 261].

У.П. Пратов.

Extremely rare, relict endemic species of the western Tien-Shan. It is spread

at the Chatkal range (the Nurekata and Beldersay basins) at the height of 1600–2000 m (Tashkent region). Inhabits stony slopes, among the juniper stands and shrubs, mainly in the open places. Small populations grow in the area of about 3 ha at the watershed of the Uinatau and groups of 10–20 specimens in the Irgailisay gorge. Limiting factors: this area is intensively used as the summer pasture lands. Measures of protection: not protected.

Сони. Уйнатой сувайирғичида кичик майдон (3 гектар атрофи)да ва Иргайлисойда 10–20 тупдан иборат тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик тарқалган жойлардан чорва моллари учун ёзги ўтлоқ сифатида фойдаланилади.

Маданийлаштирилиши. Уруғидан экилганда ижобий натижа бермаган. Униб чиққан ниҳоллари ёзнинг иккинчи ярмида қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [156–159, 260, 261].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Чрезвычайно редкий, узлокальный, реликтовый эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Кустарник высотой 20–40 см, образующий довольно крепкую, плотную по-



226. ДРОБОВ ШЎРАГИ

Солянка Дробова / *Salsola drobovii* Botsch.

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шань ва Олой тизма-сидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–70 см келадиган ярим бута. Бир йиллик пояларининг узунлиги 20 см, оқиш, туксиз, баъзан ғадир-будур. Барглари кетма-кет жойлашган, туксиз, қўкимтир, этли, қалами, узунлиги 1,5–2,5 см, эни 1–1,5 мм, тўмтоқ. Тўпгули ёйиқ бошоқсимон. Гулқўрғон баргчалари чўзиқ-тухумсимон ёки чўзиқ-овал шаклида, узунлиги 4–6 мм, пардасимон, туксиз, рангсиз. Уруғи ётиқ жойлашган. Июлда гуллаб, меваси октябрь ойида етилади.

Тарқалиши. Фарғона водийси: Наманган ва Фарғона вилоятлари – Курама ва Олой тизмаларининг адирларда тарқалган. Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тош-шағал тупроқли ёнбағирларда, баъзан ола жинсларда ва тоғларнинг қуйи қисмида ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан эса йирик тўплар ташкил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг кам уруғ бериши ва уруғидан яхши униб чиқмаслиги, шунингдек, у ўсган жойларда чорва моллари муттасил боқилиши сабабли сони қисқариб кетмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў.П. Пратов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня и Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой 50–70 см. Однолетние побеги длиной 20 см, беловатые, голые, реже шероховатые. Листья очередные, неопушенные, сизые, мясистые, линейные, длиной 1,5–2,5 см и шириной 1–1,5 мм, тупые. Соцветие рыхлоколосовидное. Листочки околоцветника удлинено-яйцевидные или продолговато-овальные, длиной 4–6 мм, плёнчатые, голые, неокрашенные. Семена горизонтальные. Цветёт в июле, плодоносит в октябре.


Распространение. Ферганская долина: Наманганская и Ферганская области – предгорья Кураминского и Алайского хребтов. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан.

Места обитания. На каменистых и щебнистых склонах, реже на пестроцветках в нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночно, реже образует заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Слабое плодоношение, низкая всхожесть семян, а также интенсивное использование территории под выпас скота.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan and Alay range. It is spread at the Ferghana valley, the foothills of Kurama and Alay ranges (Namangan and Ferghana regions). Inhabits stony and slopes, seldom outcrops of gypseous rocks in the lower belt of mountains. Single specimens and rarely large groups can be found. Limiting factors: weak fruiting, low seed germination and also the intensive use lands under cattle pasturing. Measures of protection: not protected.



227. ТИТОВ ШЎРАГИ

Солянка Титова / *Salsola titovii* Botsch.

Мақоми 3. Помир-Олой ва Ғарбий Тянь-Шанга хос реликт, эндемик ўсимлик.


Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган ярим-бута. Бир йиллик новдалари 20 см га етади, ингичка, қалин туклар билан қопланган. Барглари кетма-кет жойлашган, қалами, узунлиги 0,3–1,5 см, эни 0,5–1 мм, қалин кулранг туклар билан қопланган. Тўпгули бошоқсимон, сийрак гулли. Гуллари кўримсиз, гулқўрғон бўлаклари ва чангчилари 5 тадан. Меваси етилгач, гулқўрғон бўлакларида қанотчалар пайдо бўлади. Меваси ётиқ жойлашган. Июнь–октябрь ойларида гуллаб, уруғлайди.

Тарқалиши. Тошкент, Самарқанд вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шанда–Чотқол ва Қурама тизмаларида, Помир-Олойда (Гобдунтоғ, Омонқўтонда) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмида, тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ёки тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилишидан зарар кўради.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол кўриқхонаси ва Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида муҳофаза қилинади. Ўсимлик сақланиб қолган ерларни назорат остига олиш ва ботаника боғларида экиб ўстириш лозим.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў.П. Пратов.

Статус 3. Реликтовый эндемик Памиро-Алая и Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарник высотой 50 см. Однолетние побеги длиной до 20 см, тонкие, покрытые густым опушением. Листья очередные, сероватые от густого опушения, линейные, длиной 0,3–1,5 см, шириной 0,5–1 мм. Соцветия колосовидные с редко расставленными цветками. Цветки невзрачные, листочков околоцветника и тычинок по 5. При плодах на листочках околоцветника развиваются крылья. Семена горизонтальные. Цветёт и плодоносит в июне–октябре.

Распространение. В Ташкентской и Самаркандской областях: Западный Тянь-Шань – Чаткальский и Кураминский хребты; Памиро-Алай – Хобдунтау, Аманкутан.

Места обитания. На каменисто-щебнистых склонах в среднем и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается одиночными экземплярами и небольшими зарослями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского заповедника и Угам-Чаткальского национального парка. Необходимо сохранить имеющиеся популяции и культивировать в ботанических садах.

Источники. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов.

Relict endemic species of the Pamir-Alay and western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Chatkal and Kurama range; the Pamir-Alay: the Khobduntau range, Amankutan (Tashkent and Samarkand regions). Inhabits stony slopes in the middle and lower belts of mountains. Single specimens can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park. It is necessary to protect populations and to cultivate in botanical gardens.



228. ХИВА ШЎРАГИ

Солянка хивинская / *Salsola chiwensis* Popov

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг шимолидаги реликт тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см оралиғидаги, туксиз ярим бута. Барглари кетма-кет жойлашган, этли, ясси. Тўпгули бошоқсимон. Гулкўргон баргчаларда мевалаган пайтида ҳосил бўладиган қанотчалари юпқа пардасимон, буйраксимон ёки тескари тухумсимон. Июль ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Устюрт ва Қизилқум (Султон Увайс тоғ)да тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Кулранг қўнғир гипсли ва ошакчил тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ҳамда тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши, ҳайдаб ўтилиши натижасида камайиб бормокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чорва молларидан сақлаш керак.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Реликтовый вид Северного Узбекистана.

Краткое описание. Полукустарник высотой 30–60 см, голый. Листья очередные, мясистые, по-

лувальковатые. Соцветие колосовидное, при плодах на листочках развиваются полупрозрачные, почковидные или широко обратнойцевидные крылья. Цветёт в июле, плодоносит в сентябре.

Распространение. Каракалпакстан: Встречается на плато Устюрт и в Кызылкумах (Султан Увейсдаг). За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. На серо-бурых гипсованных и мергелистых почвах.

Численность. Встречается как единично, так и в зарослях.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота, скотопрогон.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходимо охранять от выпаса скота.

Источники. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов.

Relict species of the northern Uzbekistan. It is spread at the Ustyurt and Kyzylkum (Sultanuzdag), (Karakalpakstan). Inhabits grey-brown gypseous and marl soils. Single specimens as well as brushwoods can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: it is necessary to protect from pasturing.



229. ТЯНЬ-ШАНЬ АНТОХЛАМИСИ

Антохламис тяньшанский / *Anthochlamys tianschanica* Hjin

Мақоми 2. Фарғона водийсида тарқалган кам-ёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик, сершоҳ ўт ўсимлик, бўйи 30–90 см, пастки қисми туксиз, юқори қисми қисқа, жингалак тукли. Гуллари икки жинсли, рўваксимон тўпгулда ўрнашган. Чангчиси 5 та. Гулкўрғони пардасимон. Барглари оддий, ясси, пасткилари наштарсимон, бандли, юқорисидагилари қалами, учи ўткир. Гулолди барги наштарсимон, учи ўткир, гулкўрғонидан узун, мевасидан кичик. Мевасининг эни 3 мм, учи чуқурчали. Август ва сентябрда гуллаб, мевалайди.

Тарқалиши. Фарғона ва Наманган вилоятлари: Ғарбий Тянь-Шань (Фарғона водийсининг шимоли-шарқий, шимоли-ғарбий қисми)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмларидаги чағиртошли, тошчағиртошли тупроқларда ўсади.

Сони. Асосан, якка-якка холда ўсади. Айрим жойларда кичик-кичик тўплар ҳосил қилади. Сони аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва боқилиши туфайли каммайиб кетган.

Маданийлаштирилиши.

Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари.

Кўриқланмайди.

Манбалар. [35, 156–159, 249].

Ў.П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение, 30–90 см высоты, ветвящееся от основания, внизу голое, в соцветии густоопушенное короткими курчавыми волосками. Листья простые, плоские, нижние ланцетные, черешковые, верхние линейные, острые. Прицветные ланцетные, острые, длиннее околоцветника, короче плодов. Цветы обоеполые, собранные в метелку. Тычинок 5. Листочки околоцветника плёнчатые. Плоды 3 мм ширины с выем-

кой на верхушке. Цветет и плодоносит в августе-сентябре.



Распространение. В Ферганской и Наманганской областях: Западный Тянь-Шань (северо-восточная, северо-западная части Ферганской долины).

Места обитания. На щебнистых и каменисто-щебнистых почвах в предгорьях.

Численность. Встречается одиночно и небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведения нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 156–159, 249].

У.П. Пратов.

Rare endemic species of the Fergana valley. It is spread at the Fergana valley, the western Tien-Shan (Fergana and Namangan regions). Inhabits stony and slopes in the lower mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



230. ФАРҒОНА ДОНАШЎРИ

Спайноцветник Ферганский / *Gamanthus ferganicus* Hjin

Мақоми 2. Фарғона водийсида тарқалган кам-ёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўт ўсимлик, бўйи 5–50 см, асосидан шохланган, қисқа, оддий, ингичка, жингалак тукли, кейинроқ пастки қисми туксизланади. Барглари қарама-қарши ўрнашган, қалами, йўғонроқ, учида узун, бўғимли, эрта тушиб кетадиган бир боғлам тукли, узунлиги 15–20 см, эни 2–2,5 мм. Гулларди барглари қарама-

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақида маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.
Манбалар. [35, 159, 249].

У.П. Пратов.

Статус 2. Редкий эндемик Ферганской долины.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение, 5–50 см высоты, ветвистое от основания, сероватое от густого войлочка из коротких, простых, тонких курчавых волосков, позднее стирающегося. Листья супротивные, линейные, толстоватые, на самом вершине с туповатым кончиком, несущим пучок прямых, длинных, членистых, рано опадающих волосков, 15–20 мм длины и 2–2,5 мм ширины. Прицветные супротивные, несрастающиеся, длиннее прицветничков. Прицветнички короче околоцветника. Листочки околоцветника ланцетные, 4–6 мм длины, по спинке опущенные. Пыльники линейные, 2,5–3 мм длины. Цветет и плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Ферганской, Наманганской и Андижанской областях областей: на востоке Ферганской долины.

Места обитания. На засоленных щебнистых склонах предгорий.

Численность. Встречается одиночными экземплярами или небольшими группами.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Освоение земель под сельхоз культуры.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [35, 159, 249].

У.П. Пратов.



қарши ўрнашган, қўшилмаган, гулёнбаргчаларидан узун. Гулёнбаргчалари гулкўрғонидан қисқа. Гулкўрғон бўлаклари наштарсимон, узунлиги 4–6 мм, сирти тукли. Чангдони қалами, узунлиги 2,5–3 мм. Июнь–июлда гуллаб, меваси етилади.

Тарқалиши. Андижон, Наманган ва Фарғона вилоятлари: Фарғона водийсининг шарқий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги шўрланган, майда чағиртошли тупроқларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ёки кичик жамоалар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг дехқончилик қилиш учун ўзлаштирилиши туфайли қисқариб кетган.

Rare endemic species of the Ferghana valley. It is spread at the eastern part of the Ferghana valley (Ferghana, Namangan and Andijan regions). Inhabits saline gravelly soils in the foothills. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



231. ОЛЬГА БОЗУЛБАНГИ

Зайцегуб Ольги / *Lagochilus olgae* Kamelin

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Яримбутача, бўйи 20–50 см. Поялари кўп, оддий ёки шохланган, барглари қалин. Барглари кенг тухумсимон, асоси понасимон, патсимон бўлмали, томирлари бўртиб туради. Гуллари бандсиз, узунлиги 25–28 мм, учки барглари 4–6 тадан ярим халқа бўлиб жойлашган. Гулларнинг баргчалари ўткир, бигизсимон, юқорига қараб қайрилган, косачага ёпишган. Косачаси тор қўнғироқсимон, узун, ўткир учли, қалами-наштарсимон, найчасига тенг ёки ундан сал узун, вегетациянинг охирида паст-

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукустарничек высотой 20–50 см. Листья широкояйцевидные, в основании клиновидные, перисто-лопастные, с выступающими жилками. Цветки длиной 25–28 мм, сидячие, расположены в 4–6-цветковых полуцветках в пазухах верхних листьев. Чашечка узкоколокольчатая, с длинными заостренными линейно-ланцетными зубцами. Венчик белый. Цветёт в конце мая–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребт Нуратау.

Места обитания. Произрастает на каменисто-щебнистых склонах нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [18, 107, 159].

Н.Ю. Бешко.



га қараб эгилади, тишчали. Гултожи оқ. Май ойининг охири – июлда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Нурота тизмасида ўсади (Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тош-чағиртошли ёнбағирларда турли ўт-шувоқли, йирик ўт ва ярим буталардан иборат жамоаларда ўсади.

Сони. Кам учрайди. Якка-якка ҳолда ёки кичик гуруҳлар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Табиатда ўта кам учраши тахмин қилинади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқхонасида муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [18, 107, 159].

Н.Ю. Бешко.

Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits stony slopes of the low and middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



232. ПРОСКОРЯКОВ БОЗУЛБАНГИ

Зайцегуб Проскорякова / *Lagochilus proskorjakovii* Ikramov

Мақоми 1. Нурота тизмаси учун ўта камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Ярим бутача, бўйи 20–35 см. Поялари оддий ёки шохланган, сийрак, қисқа тукли. Барглари майда, кенг тухумсимон, 3–5 бўлмали, асоси понасимон, тарвақалайган тукли, узун бандли. Гуллари 4–6 тадан шохларининг учидаги баргларнинг қўлтиқларида ярим халқа бўлиб ўрнашган. Гулёнбаргчаларининг учи ўткир, учбурчак бигизсимон, ташқарига қараб сал эгилган. Косачаси 10–15 мм узунликда, тор кўнғироқсимон, воронкасимон кенгайган, қайтақиси кенг кўнғироқсимон, тишчаси текис жойлашган, кенг учбурчаксимон, ташқарисига сал эгилган, қисқа ҳамда безчали туклар билан қопланган. Гултожи оқ. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Нурота тизмасида тарқалган (Жиззах ва Самарқанд вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қуруқ, тош-чағиртошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган, якка-якка ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган. Шароитнинг ноқулайлигидан кам учраса керак.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимлик популяцияларини аниқлаш ва хариталаш, табиий ва маданий шароитда унинг биоэкологик хусусиятларини ўрганиш талаб этилади.

Манбалар. [104, 320].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Статус 1. Чрезвычайно редкий, узкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Полукустарничек высотой 20–35 см. Листья мелкие, широкояйцевидные, 3–5-лопастные, в основании клиновидные, с оттопыренными волосками. Цветки расположены в 4–6-цветковых полумутовках в пазухах верхних листьев. Чашечка 10–15 мм длиной, узко колокольчатая, воронкообразно расширенная, с широко колокольчатым отгибом и почти горизонтально отклоненными широко треугольными зубцами, покрыта короткими волосками и еди-



ничными железками. Венчик белый с грязноватым оттенком. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской и Самаркандской областях: хребет Нуратау.

Места обитания. Произрастает на сухих каменисто-щебнистых склонах среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко, спорадически, единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Вероятно, вид имеет низкую численность в силу естественных причин.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника. Требуется выявление и картирование локальных популяций вида, контроль за их состоянием и эколого-биологическое изучение вида в природе и в культуре.

Источники. [104, 320].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Rare endemic of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau mountains (Jizzakh and Samarkand regions). Inhabits stony slopes of the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



233. ВВЕДЕНСКИЙ БОЗУЛБАНГИ

Зайцегуб Введенского / *Lagochilus vevedenskyi* Kamelin et Zuckerw.

Мақоми 3. Фақат Қизилқумда учрайдиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см га етадиган ярым бута. Барглари пояда қарама-қарши жойлашган, кенг-тухумсимон, бўртиб чиққан йўғон томирли, пастки қисми оддий, шаффоф тукли. Пояси оқ, оддий тукли. Гули оч пушти рангли, узунлиги 25–28 мм, 2–4 тадан бўлиб поянинг юқори қисмидаги баргларининг қўлтиқларида жойлашган. Косачаси кўнғироқсимон, учи тиканли. Июнда гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тепаликлар (Қулжуктоғ, Қинғиртоғ, Бўкантоғ, Оқтоғ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Якка-якка ҳолда ўсади.

Сони. Кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари боқилиши ва ҳайдаб ўтилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [116, 320].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Статус 3. Узколокальный эндемик останцов Кызылкума.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 20–25 см. Листья супротивные, широкояйцевидные, с выдающимися жилками, опушенные (нижняя сторона) простыми, прозрачными волосками. Стебель белый, опушенный простыми волосками. Цветки беловато-розовые, длиной 25–28 мм, по 2–4 в пазухах верхних листьев. Чашечка колокольчатая, оканчивается колючими шипами. Цветёт в июне, плодоносит в июле–августе.



Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: останцовые возвышенности Кызылкума: Кульжуктау, Кингиртау, Букантау, Актау.

Места обитания. Эродированные склоны.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Скотопрогон и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [116, 320].

Ҳ.Ф. Шомуродов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kuldjuktai, the Kingirtai, the Bukantau, the Aktau (Bukhara and Navoi regions). Inhabits eroded slopes. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



234. САРХУШ БОЗУЛБАНГ

Зайцегуб опьяняющий / *Lagochilus inebrians* Bunge

Мақоми 3. Ғарбий Помир-Олой ва Жанубий Қизилқумнинг қолдиқ тоғларидаги камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см оралиғидаги поялари оддий ёки сершоҳ ярим бута. Барглари кенг-тухумсимон 3–5 бўлакли. Тожбарги оқиш. Гуллари пояларининг юқори қисмида 4–6 тадан бўлиб ўрнашган. Косачаси чўзиқ қўнғироқсимон. Ёнғоқчаси туксиз, сарғиш кулранг. Июнь–августда гуллаб, меваси июль–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий ва Бухоро вилоятлари: Нурота тоғи этаклари, Зирабулоқ, Зиёвуддин тоғи, Зарафшон ҳамда Туркистон тизмалари, шунингдек, Қизилқумдаги Қулжуктоғ, Кукчатоғ ва Томдитоғда тарқалган.

Ўсиш шароити. Денгиз сатҳидан 1200 м гача баландликдаги соз ҳамда шағалли соз тупроқларда шувоқ ва бошқа турлардан ҳосил бўлган ўсимлик гуруҳларида учрайди.

Сони. Табиатда онда-сонда ва кичик туплар ҳосил қилиб тарқалган. Энг зич туплари Нурота ва Оқтоғларда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди. Уруғи 5–7 йил мобайнида унувчанлигини йўқотмайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Намгарчиликнинг етишмаслиги, чорва моллари томонидан пайхон қилиниши ва кўп йиллар мобайнида катта миқдорларда йиғиб олиниши сони ва ареалига катта зарар етказган.

Маданийлаштирилиши. 1957–1960 йиллар мобайнида Самарқанд вилоятида 2 га ерда экиб ўстирилган. 1960 йилдан буён ЎзР ФА Ботаника боғида экилиб қилинади.



Муҳофаза чоралари. Нурота кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Уни йиғиб олишни қатъий чеклаш, табиий ҳолда тикланишига кўмаклашиш зарур.

Манбалар. [103, 116, 320].

Н.Ю. Бешко.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая и останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Прямостоячий полукустарник высотой 30–60 см. Стебли простые или ветвистые. Листья широкояйцевидные, 3–5-раздельные. Венчик белый, с грязноватым оттенком. Цветки расположены по 4–6 в верхней части стебля. Чашечка узкоколокольчатая. Орешки голые, желтовато-серые. Цветёт в июне–августе, плодоносит в июле–сентябре.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Бухарской областях: предгорья Нуратинских гор, Зирабулакские и Зиёвуддинские горы, Зеравшанский и Туркестанский хребты; Кызылкумы – Кульджуктау, Кокчатау и Тамдытау.

Места обитания. Глинистые, чаще глинисто-щебнистые почвы подгорных равнин и предгорий до 1200 м над уровнем моря.

Численность. В природе встречается спорадически и небольшими группами. Наибольшая плотность популяций в Нуратау и Актау.

Размножение. Семенное. Семена сохраняют всхожесть на протяжении 5–7 лет.

Причины изменения численности и ареала. Аридный климат, вытаптывание скотом, усиленная заготовка.

Культивирование. В 1957–1960 гг. в Самаркандской области произведены опытные посевы на площади 2 га. С 1960 года успешно культивируется в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике. Необходимо строго ограничить сбор, содействовать восстановлению естественных запасов.

Источники. [103, 116, 320].

Н.Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay and Kyzylkum. It is spread at the Nuratau, the Zirabulak and Ziadin mountains, the Zeraвшan and Turkestan ranges; the Kyzylkum: the Kuldjuktau (Jizzakh, Samarkand, Navoi and Bukhara regions). Inhabits clay and gravelly soils of foothills up to 1200 m. Small populations can be found sporadically. The most dense populations are in the Nuratau and Aktau. Limiting factors: arid climate, cattle trampling down, intensive gathering. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve. It is necessary to limit collection, to promote the reestablishment of natural populations.

235. АЖОЙИБ БЎЗБОШ

Змееголовник прекрасный / *Dracocephalum formosum* Gontsch.

Мақоми 3. Ҳисор тизмасидаги кам учрайдиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см келадиган кўп йиллик ўт. Барглари юмалоқ ёки тухумсимон, четлари текис ёки кунгурали, ёпирма барглари рақиб банди япроғидан уч баробар узун. Пояси камбаргли. Гули пушти-бинафша рангли, устки томони (сирти) сертук. Гуллари поянинг учида зич тўпгул ҳосил қилади. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмаси (Қизилсув дарёси ҳавзаси – Қизилгаза довони, Чўлбайир тоғи ва Тўпаланг дарёси ҳавзаси)да тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғлардаги дарё ва ирмоқларнинг ёқаларида ҳамда булоқларнинг атрофларида ўсади.

Сони. Кам тарқалган, фақат еттига жойда борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг булоқ атрофларида ва дарё бўйларида кўпайиб боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади. Ўсимликни

юлиш ёки қазиб олишни тақиқлаш ҳамда маданийлаштириш мақсадида унинг биологик хусусиятларини ўрганиш зарур.

Манбалар. [8, 159].

И.И. Мальцев.

Статус 3. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 15–40 см. Листья округлые или яйцевидные, цельнокрайние, городчатые, прикорневые, на длинных (в 3 раза длиннее листьев) черешках. Стебли рыхлооблиственные. Цветки розово-лиловые, снаружи пушистые, в плотных головчатых соцветиях на верхушках стеблей. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет – бассейн реки Кызылсу – около перевала Кызылгаза, горы Чулбайир, бассейн реки Тупаланг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Берега горных ручьев, родников и речек в верхнем поясе гор.

Численность. Немногочислен, отмечен в 7 местах.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Вытаптывание берегов родников и рек, чрезмерный выпас скота. Высокодекоративное растение.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике. Необходимы: запрещение сбора и выкопки растений; изучение биологических особенностей с целью введения в культуру.

Источники. [8, 159].

И.И. Мальцев.

Rare endemic species of the Hissar range.

It is spread at the Hissar range: the Kyzylsu river basin: near the Kyzylgaza pass, the Chulbair Mountains, the Tupalang river basin (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits watersides of mountains streams, springs and rivers in the mountain belt. Population is not numerous, found in 7 points. Limiting factors: overgrazing, trampling down of watersides of springs and rivers. Very ornamental plant. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve. It is necessary to forbid collection and digging up of plants, to study biological characteristic features for the purpose of their introduction into cultivation.



236. КОМАРОВ БЎЗБОШИ

Змееголовник Комарова / *Dracosephalum komarovii* Lipsky

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шань ва Помир Олойдаги ареали бўлинган, камайиб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–20 см оралигидаги кўп йиллик ўт. Барги учбурчак-тухумсимон, учи ўткир, асоси юраксимон, четлари текис, қалин, қисқа тукли, қисқа бандли, юқоридагилари бандсиз. Пояси кўп, пастки қисми егочланувчан, тик ёки бироз қийшайган. Гули поянинг юқори қисмидаги барглarning қўлтигида биттадан қисқа бандларда ўрнашган. Тожбарги сариқ. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Чотқол тизмаси (Қизилнура тоғи, Майдонтол ва Қорабулоқ дарелари воҳалари ҳамда Орашон довоғи), Қурама тизмаси (Лашкарак, Гушсой)да тарқалган. Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмида, тошшағалли тунроқларда ўсади.

Сони. Табiiий захиралари кам бўлиб, бир-биридан ажралган тўплар ҳосил қилган ҳолда ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли гуллаб турган пайтида доривор ўсимлик сифатида кўплаб йиғиб олади. Ёз фаслида эса бу ерларда чорва моллари боқилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик тарқалган майдонларнинг бир қисми Чотқол биосфера қўриқхонаси, Уғам-Чотқол биосфера резервати ва Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида бўлиб, муҳофаза остига олинган.

Манбалар. [8, 159].

И.И. Мальцев.

Статус 2. Эндемик Западного Тянь-Шаня и Памиро-Алая с сокращающимся разорванным ареалом.

Краткое описание. Многолетнее травянистое

растение высотой 10–20 см. Листья треугольно-яйцевидные, острые: при основании слабосердцевидные, цельнокрайные, очень коротко-густопушистые, короткочерешковые, верхние – сидячие. Стебли многочисленные, при основании древеснеющие, прямые или слегка восходящие. Цветки по 1 в пазухах верхних листьев на очень коротких цветоножках. Венчик желтоватый. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Чаткальский и Кураминский хребты – горы Кызылнура, верховья рек Майдантал, Карабулак и перевал Арашан, бассейны рек Лашкерек и Гушсай. За пределами Узбекистана: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.



Места обитания. Каменисто-щебнистые почвы в верхнем поясе гор.

Численность. Природные запасы незначительны. Встречается небольшими, изолированными друг от друга группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный сбор населением надземной части растений во время цветения в качестве лекарственного средства. Усиленное использование территории под отгонное пастбище.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть площадей, занятых этим растением, расположена на территории Чаткальского биосферного заповедника, Угам-Чаткальского биосферного резервата и Угам-Чаткальского национального парка и находится под охраной.

Источники. [8, 159].

И.И. Мальцев.

Endemic species of the western Tien-Shan and Pamir-Alay with the reducing area. It is spread at the Chatkal and Kurama ranges (Tashkent, Namangan regions). Inhabits stony soils in the upper belt of mountains. Natural stock is insignificant. Can be met in small, isolated from each other groups. Limiting factors: the intensive gathering of the above ground parts of plants by local people during its flowering as medicinal plant. The intensive use of lands under summer pastures. Measures of protection: protected in the Chatkal and Ugam-Chatkal biosphere reserves, the Ugam-Chatkal national park.



237. ТИКАНЛИ БЎЗБОШ

Змееголовник колючий / *Dracocephalum spinulosum* Popov

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шанда кичик майдонларда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган кўп йиллик ўт. Барглари тухумсимон, пасткилари барвақт сўлийди, қаттиқ, ғадир-будур, тукли, барг банди қисқа. Пояси тўрт қиррали. Гуллари 2-6 тадан пояда ҳалқа шаклида жойлашган, оқиш ёки оч қизғиш рангли. Июль-август ойида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Ғарбий Тянь-Шаннинг Угом, Писком, Чотқол тизмаларида тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли ва нураган шағалли тоғ ёнбағирларда, сийрак арчазорлар орасида, кўпроқ очиқ жойларда ўсади.

Сони. Якка-якка, туплари бир-биридан ажралган ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бошқа ўсимликлар билан рақобатга бардош бера олмаслиги ва чорва моллари томонидан пайҳон қилиниши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида, Угом-Чотқол биосфера резерватида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза этилади.

Манбалар. [8, 159].

И.И. Мальцев.



Статус 3. Редкий узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 25 см. Листья яйцевидные, нижние рано увядающие, жесткие, шероховато-опушенные, на очень коротких черешках. Стебли четырехгранные. Цветки (2-6) собраны в мутовки, беловатые или бледно-кирпично-красноватые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань: Угамский, Чаткальский, Пскемский хребты. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые, сильно эродированные щебенные склоны гор, среди разреженных арчовников, преимущественно открытые места.



Численность. Встречается единично, спорадически, изолированно друг от друга.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Низкая конкурентоспособность, вытаптывание скотом.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском биосферном заповеднике, Угам-Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [8, 159].

И.И. Мальцев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam, the Chatkal and Pskem ranges (Tashkent region). Inhabits stony, strongly eroded slopes on mountains, among sparse juniper stands, mainly opened places. Solitary specimens can be found sporadically. Limiting factors: low competition capacity, cattle trampling down. Measures of protection: protected the Chatkal and Ugam-Chatkal biosphere reserves, the Ugam-Chatkal national park. Control of number and introduction into cultivation are required.

238. ИПАКСИМОН КЎКАМАРОН

Шлемник шелковистейший / *Scutellaria holosericea* Gontsch. ex Juz.

Мақоми 1. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45 см гача етадиган кўп пояли, қалин туклар билан қопланган ярим-бута. Барглари йирик, узунлиги 4 см, учбурчак тухумсимон, четлари тишсимон ўйилган, майин тукли. Тўпгули узун, шохланган. Гуллари қисқа бандли, биттадан гулолди барглариининг қўлтиғига ўрнашган. Тожи оч ҳаворанг, пастки лабида бинафша рангли доғлари бор. Июнь-июлда гуллаб, июль-август ойларида меваси етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тўпаланг дарёсининг Хурватан ва Шатрут irmoқларининг ўнг қирғоқлари ҳамда Қултепасойнинг жануби-ғарбий ёнбағирлари)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмида гранитли қояларда ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий узкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 45 см, стебли многочисленные, густоопушенные. Листья крупные, длиной до 4 см, треугольно-яйцевидные, городчато-зубчатые, бархатистоопушенные. Соцветие удлиненное, ветвистое. Цветки на очень коротких цветоножках, по 1 в пазухах прицветных листьев. Венчик голубовато-сиреневый, покрытой фиолетовыми пятнышками нижней губой. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг – правобережье её притоков (Хурватан, Шатрут), юго-западный склон Культепасая.

Места обитания. Гранитные скалы в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф.О. Ҳасанов.



Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Tupalang river basin - right-bank of its tributaries (Khurvatан, Shatrut), the south-western slope of the Kultepasay (Surkhандarya region). Inhabits granite rocks in the upper belt of mountains. Specimens rarely can be found. Measures of protection: not protected.



239. МОМИҚ КЎКАМАРОН

Шлемник мохнатеиший / *Scutellaria villosissima* Gontsch. et Juz.

Мақоми 2. Фарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, ингичка, узун бўғимли, ёпишқоқ, эгри-бугри туклар билан қопланган. Барглари деярли юмалоқ, четлари йирик тишли, ҳар икки томони узун тукли. Гуллари қисқа бандли, гулолди баргчалар кўлтиғида биттадан ўрнашган. Тожбарглари оч кўк рангли, узунлиги 25 см. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Сангардак дарё ҳавзасидаги Боғча қишлоғидан Қизилсой гача, Оксуд дарёсининг ўрта оқими) да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги ёнбағирларида ўсади.

Сони. Маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.



Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебли многочисленные, тонкие, густо покрыты длинными, членистыми, извилистыми, клейкими волосками. Листья почти округлые, по краю крупнозубчатые, с обеих сторон покрыты длинными волосками. Цветки на коротких цветоножках, по 1 в пазухах прицветных листьев. Венчик светло-синий, дли-

ной до 25 мм. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Сангардак от кишлака Бахча до Кизилсая, правый берег реки Аксу в среднем течении.

Места обитания. Склоны в верхнем поясе гор.

Численность. Сведений нет.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф.О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Sangardak river basin nearby the villages Bakhcha to Kizilsay, the right bank of the Aksu river in the middle reaches (Surkhandarya region). Inhabits slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



240. ТОМЧИ КЎКАМАРОН

Шлемник капельный / *Scutellaria guttata* Nevski ex Juz.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Кўп пояли, қалин тукли, ғовак ёстиқ шаклидаги ярим бута. Бир йиллик шохлари ингичка, узунлиги 10 см, сербарг, пастки қисми пахмоқ тукли. Барглари кенг тухумсимон, деярли текис қиррали, ҳар икки томони сийрак тукли. Гуллари биттадан барг қўлтиғида ўрнашган. Тожбарглари сариқ рангли, узунлиги 28 мм. Июнь-августда гуллаб, меваси июль-сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси – Тўпаланг дарёси ҳавзаси – Хурватан, Зевар, Қўштут қишлоқлари, Шатрут ва Тамшуш дарёларининг қўйилиши ҳамда Сангардак дарёси воҳасидаги Сангардак ва Боғча қишлоқлари атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисми енбағирларида ва очик қумтошларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши унга салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Редкий узкий эндемик западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарник рыхлоподошскообразный, многостебельный, густоволосистый. Годичные побеги тонкие (до 10 см), густолиственные, в нижней части мохнатые. Листья широкояйцевидные, почти цельнокрайные, с обеих сторон негустоволосистые. Цветки по 1 в пазухах листьев. Венчик желтый, длиной до 28 мм. Цветёт в июне-августе, плодоносит в июле-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг – окрестности кишлака Хурватан, между кишлаками Зевар и Куштут, у слияния рек Шатрут и Тамшуш, бассейн реки Сангардак – окрестности кишлаков Сангардак и Бахча.

Места обитания. Обнажения песчаников и склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас скота.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф.О. Хасанов.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range: the Tupalang river basin – nearby the villages Khurvatan, Zevar and Kshtut, the Shatrut and Tamshush rivers, the Sangardak: nearby the villages Sangardak and Bakhcha (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of sandstones and slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



241. ФЕДЧЕНКО КЎКАМАРОНИ

Шлемник Федченко / *Scutellaria fedtschenkoi* Borum.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олой тоғларидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, ингичка. Барглари кўкимтир, деярли юмалоқ, тўмтоқ, туксиз. Гуллари қисқа бандли, поя ва шохларининг учларида бир томонлама сийрак тўпгул ҳосил қилади. Тожбарги тўқ ҳаворанг. Июнь-июлда гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида (Ғузор ва Шеробод шаҳарлари оралиғи, Шўроб ва Дарбанд қишлоқлари атрофи, Бўзгалахона дараси, Тўпаланг дарёси воҳаси, Бойсунтоғ) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида оҳактош қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.


Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [4, 159, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли многочисленные, тонкие. Листья сизоватые, почти округлые, тупые, голые. Цветки на коротких цветоножках, образуют рыхлые однобокие соцветия на верхушке стеблей и ветвей; венчик тёмно-голубой. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.



Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет; между городами Гузар и Шерабад, окрестности кишлаков Шураб и Дербент, ущелье Бузгалахана; долина реки Тупаланг, Байсунтау.

Места обитания. Трещины известняковых скал в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [4, 159, 355].

Ф.О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range; between Guzar and Sherabad, the surroundings of the villages Shurab and Derbent, the Buzgalakhana gorge; the Tupalang valley, the Baysuntau (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits clefts of limestone rocks in the middle belt of mountains. Specimens very rarely can be found. Measures of protection: not protected.



242. ҚАЙРИЛГАН КЎКАМАРОН

Шлемник изогнутый / *Scutellaria colpodea* Nevski

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Хивчинсимон, кулранг пояли ярим бутача, баландлиги 30–60 см. Барглари ажинли, тухумсимон, тўмтоқ, бутун, узунлиги 1,5–2 см.

Гуллари биттадан гуллоди баргларининг қўлтиғида ўрнашган, сийрак тўпгул ҳосил қилади. Косачаси 2–3,5 мм узунликда, 2 паллали бўртмаси бор. Гултожи сариқ, қалин тукли, узунлиги 18–23 мм, ташқи томони кўнғир-тўқ қизил рангли. Енғоқчаси тукли.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқлари, Бойсун тоғлари, Кўхитанг ва Боботоғда тарқалган.

Ўсиш шароити. Ола жинсларда ўсади.

Сони. Кўхитангда 500 га яқин тупи борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ола жинсли ерларнинг қисқариши ва кўп миқдорда чорва боқилиши туфайли қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [4, 159, 310, 355].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.


Краткое описание. Полукустарничек с серыми прутьевидными стеблями 30–60 см высоты. Листья от вдавленных жилок морщинистые яйцевидные, тупые, цельнокрайние 1,5–2 см длины. Цветы по одному в пазухах прицветных листьев образуют рыхлое соцветие. Чашечка 2–3,5 мм длины с двулопастным придатком. Венчик желтый густо пушистый 18–23 мм длины, снаружи с коричнево-пурпурным оттенком. Орешки пушистые. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы, Кугитанг и Бабатаг.

Места обитания. Пестроцветные толщи.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано около 500 растений в Кугитанге.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади пестроцветов и выпас.


Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [4, 159, 310, 355].

Ф.О. Ҳасанов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the western branches of the His-sar range, the Baysun mountains, the Kughitang and Babatag (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous slopes. 500 plants were registered in Kughitang in 2009. Limiting factors: decreasing of natural habitats and pasturing. Measures of protection: not protected.



243. ЗЕБО МАРМАРАК

Шалфей замечательный / *Salvia insignis* Kudr.

Мақоми 1. Жанубий Ўзбекистонда ўсадиган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган тик пояли кўп йиллик ўт. Барглари, асосан, илдиз бўғизида жойлашган, тухумсимон, четлари икки қарра тишсимон бўлинган, узун бандли. Гуллари пушти рангли, узунлиги 30-35 мм. Меваси 4 та ёнқоқчага ажралади. Ёнқоқчаси эллипсимон, яшилроқ рангли, уч қиррали, узунлиги 3 мм. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғ тизмаси ва Бешарча тоғларида (Гармбулоқ ва Қашқақудук атрофлари) тарқалган. Жанубий Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки қисмидаги ола жинсларда, оҳактошли ҳамда гипсли ёнбағирларда ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Бу тур табиатда жуда кам сақланиб қолган бўлиб, умумий сони 1000 тупдан ошмайди. Йўқолиб кетиш хавфи остида.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик тарқалган ерларда чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли унинг сони қисқариб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Боботоғ ўрмон хўжалиги ҳудудида (Бешарча тоғлар) буюртмахона ташкил қилиш ва ўсимликни маданийлаштириш лозим.

Манбалар. [111, 191-193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Южного Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебель прямой. Листья почти все прикорневые, яйцевидные, по краю дважды городчатые, длинночерешковые. Цветки розовые, длиной 30-35 мм. Плод дробный, распадающийся на 4 орешка. Орешки зеленоватые, эллипсоидальные, трёхгранные, длиной 3



мм. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг, горы Бешарча (Гармбулак и Кашқақудук). За пределами Узбекистана: Южный Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород, известняковые и гипсированные склоны и осыпи в нижнем поясе гор.

Численность. Вид малочислен, находится под угрозой исчезновения. Общее число особей не превышает 1000 экземпляров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Скотопрогон и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Необходима организация заказника на территории Бабатагского лесхоза (горы Бешарча), введение в культуру.

Источники. [111, 191-193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range, Besharcha mountains (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypsee rocks, limestone and gypsum slopes and mounds in the lower belt of mountains. Species are not numerous, endangered. Total number of plants does not exceed 1000 specimens. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: it is necessary to organize the state reserve in the territory of the Babatag forestry (the Besharcha mountains), to introduce into cultivation.



244. КОРОЛЬКОВ МАРМАРАГИ

Шалфей Королькова / *Salvia korolkovii* Regel et Schmalh.

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган, тик ўсувчи, оқ момиқ тукли ярим бута. Барглари, асосан, ёпирма барглاردан иборат, кенг наштарсимон поядагилари 2–3 жуфт, устки томони сийрак, остки томони эса оқ момиқ тукли. Гуллари 2–10 тадан мураккаб сохта ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Косачаси кенг кўнғироқсимон, икки лабли, пардасимон, йўғон томирли. Тожбарглари сариқ, узунлиги 25–33 мм. Меваси 4 та ёнгоқчага ажралади. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтов, Угом ва Кўксув тизмаларида ҳамда Чотқол тизмасининг шимоли-ғарбида тарқалган.

Ўсиш шаронти. Денгиз сатҳидан 1200–1500 м баландликда соз тупроқли нураган ёнбағирларда, тик қизил соғларда ўсади.

Сони. Тарқалиш майдонларининг чегараланганлиги сабабли, табиий захиралари кам. Умумий сони 20 000 тупдан иборат. 200 га яқин популяцияси мавжудлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши ва янги ерларнинг ўзлаштирилиши.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида экилган.

Муҳофаза чоралари. Угом-Чотқол миллий табиат боғида учрайди. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260, 293].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Прямоостоячий полукустарник высотой до 50 см. Стебли прямые, белопаутиноисто-войлочные. Листья преимущественно прикорневые, широколанцетные, стеблевых 2–3 пары, сверху рассеянно опушенные, снизу густо белопаутиноисто-войлочные. Соцветие ветвистое, цветки собраны по 2–10 в ложные мутовки. Чашечка двугубая, плёчатая, с выдающимися жилками, ширококолокольчатая. Венчик жёлтый, длиной 25–33 мм. Плод дробный, распадающийся на 4 орешка. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: хребты Каржантау, Угамский и Коксуйский; северо-западные отроги Чаткальского хребта.

Места обитания. Глинистые эродированные склоны и крутые обнажения красных глин, где образует самостоятельные ценозы, на высоте 1200–1500 м.

Численность. Из-за ограниченности площади распространения природные запасы незначительны. Известно около 200 локальных популяций общей численностью не более 20 000 особей.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Основной фактор изменения численности – антропогенный.

Культивирование. Успешно индуцирован в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Встречается на территории

Угам-Чаткальского национального парка. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [111, 191–193, 238, 260, 293].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam and Koxsu ranges; the Chatkal range (Tashkent region). Inhabits clayish eroded slopes and steep outcrops of red clays, where it forms the independent cenoses (700–1500 m), about 200 populations are known. Total number is about 20000 plants. Limiting factors: anthropogenic factor is the main factor of decreasing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



245. МАРГАРИТА МАРМАРАГИ

Шалфей Маргариты / *Salvia margaritae* Betsch.

Мақоми 2. Олой тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган ярим бута. Поялари кўп, асосидан шохланган. Барглари майда, наштарсимон, бандсиз. Косача баргларининг узунлиги 18 мм, бинафша рангли, безчасимон тукли. Тожбарглари тўқ бинафша рангли, безчасимон тукли, узунлиги 30–40 мм. Июнда гуллаб, меваси июль ойида етилади. Манзарали ҳамда доривор ўсимлик.

Тарқалиши. Фарғона вилояти: Олой тизмасидаги Шохимардон дарёси воҳасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида

шенная, железистоволосистая. Венчик тёмно-фиолетовый, железистоволоситый, длиной 30–40 мм. Цветёт в июне, плодоносит в июле. Декоративное и лекарственное растение.

Распространение. Ферганская область: Алайский хребет – бассейн реки Шохимардан.

Места обитания. Каменистые и мелкоземисто-каменистые открытые склоны и скалы среднего пояса гор.

Численность. В бассейне реки Шохимардан насчитывалось 10–15 популяций. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Слабое семенное возобновление, скотопогон и выпас, а также освоение территории под зоны отдыха.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны на разработаны. Необходимо изучение вида в культуре.

Источники. [111, 191–193, 238, 260]

К.Ш. Тожибаев.

тошли ва майда жинс-тошли очик ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Шохимардон дарёси ҳавзасида 10–15 та популяцияси борлиги аниқланган. Тупларининг сони номаълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Уруғидан яхши унмаслиги, чорва моллари боқилиши, дам олиш уйлари қурилиши унинг қисқариб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Бу турни маданий шароитда экиб ўрганиш лозим.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий узкий эндемик Алайского хребта.

Краткое описание. Полукустарник высотой до 50 см. Стеблей несколько, от основания ветвистые. Листья сравнительно мелкие, ланцетные, сидячие. Чашечка длиной 18 мм, фиолетово-окра-

Rare endemic species of the Alay range. It is spread at the Alay range: the Shakhimardan river basin (Fergana region). Inhabits stony and fine earth-stony open slopes and rocks in the middle belt of mountains. 10–15 populations are counted in the Shakhimardan river basin. Total number is unknown. Limiting factors: weak seed reproduction, pasturing and also reclamation of lands under for resorts. Measures of protection: not protected.



246. ТЯНЬ-ШАНЬ МАРМАРАГИ

Шалфей тыньшанский / *Salvia tianschanica* Makhm.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шанга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–40 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари 1–3 та, тик ўсувчи, тўпгулига яқин қисмида қарама-қарши шохланган, қалин безчасимон ва узун юмшоқ оддий туклар билан қопланган. Барглари чўзиқ наштарсимон, узунлиги 7–9 см, эни 3–4 см, ўткир учли, четлари патсимон бўлинган. Ёпирма барглари узун бандли, япроғининг узунлиги бандига тенг, поядагилари кичикроқ, бандсиз. Тўпгуллари 4–6 та (ҳар бири 2–3 гулли) сохта ҳалқадан ташкил топган. Гулбандининг узунлиги 12–14 мм. Гуллари пушти рангли, узунлиги 35–40 мм. Ёнғоқчаси уч қиррали, тескари тухумсимон, узунлиги 6 мм, силлик. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом тизмасида (Хумсон), Чотқол тизмаси (жануби-ғарбий қисми), Қурама тизмасининг шимолий ёнбағирлари, Олмалик шаҳри атрофларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги қуруқ майда жинс шағалли тупроқларда ўсади.

Сони. Якка-якка ёки ажралган кичик тўплар ташкил қилган ҳолда ўсади. Алоҳида тўп ҳосил қилмайди. Угом-Чотқол биосфера резервати ҳудудида кўпроқ учрайди.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Техноген омиллар таъсири ва чорва молларининг кўп боқилиши.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ареалининг бир қисми Угом-Чотқол биосфера резерватида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.


Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев.



Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–40 см. Листья продолговато-ланцетные, длиной 7–9 см, шириной 3–4 см, с заостренными, глубоко перистораздельными лопастями; прикорневые на черешках, равных по длине пластинкам; стеблевые слегка уменьшенные, сидячие. Соцветия из 4–6 расставленных немногочетковых (2–3) ложных мутовок. Цветоножки длиной 12–14 мм. Цветки розоватые, длиной 35–40 мм. Орешки трехгранно-обратнояйцевидные, длиной 6 мм, гладкие. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июле.



Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет (Хумсан), Чаткальский хребет, северные склоны Кураминского хребта, окрестности города Алмалык.

Места обитания. Сухие мелкощебнистые и щебнисто-мелкоземистые склоны в нижнем поясе гор.

Численность. Единично и небольшими группами, популяции разобщены. Самостоятельных ценозов не образует. Наиболее часто встречается на территории Угам-Чаткальского биосферного резервата.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Техногенные факторы и перевыпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Угам-Чаткальском биосферном резервате и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [111, 191–193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam, the Chatkal ranges, the Akhangaran river basin, the northern slopes of the Kurama range, nearby Almalyk (Tashkent region). Inhabits dry gravelly and fine earth slopes in the lower belt of mountains. Solitary specimens and small groups can be found sporadically. Does not form the independent cenoses. It is most frequently found in the territory of the Ugam-Chatkal biosphere reserve. Limiting factors: economic human activities, mining operations. Measures of protection: several populations are protected in the Ugam-Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.

247. ТЎМТОҚ МАРМАРАК Шалфей туповатый / *Salvia submutica* Botsch. et Vved.

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги камёб, реликт, эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–40 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси битта, тик, қалин безчасимон туқли. Ёпирма барглари кўп, бандли, чўзиқ, наштарсимон, патсимон бўлинган, бўлаклари, ўз навбатида, чуқур патсимон қисмларга ажралган. Поясининг пастки қисмидаги бир жуфт барг қисқа бандли, четларининг учи ўткир бўлакларга ажралган, поянинг ўрта ва юқори қисмидагилари эса бандсиз, бутун ва майдароқ. Гуллари узун (10–12 мм), гул бандда 4 тадан халқа ҳосил қилади. Косачаси кенг кўнғироқсимон, бироз шишган, узунлиги 22–23 мм, деярли икки лабли, косачабарглари тўмтоқ. Тожи сарғиш. Июнь–июлда гуллаб, меваси июль–август ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги сурималар, қояларда, шағалли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида тарқалган. Кўпроқ Нурота давлат қўриқхонасида ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши турнинг камайиб кетишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстирилмоқда.

Муҳофаза чоралари. Бу тур ўсадиган ерларнинг бир қисми Нурота қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [111, 191–193, 238, 260].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий узкий реликтовый эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 15–40 см. Стебель прямой, густо железисто-волосистый. Прикорневые листья многочисленные, черешковые, продолговато-ланцетные, перисторассеченные, с глубоко заостренными перисто-лопастными сегментами; стеблевые в нижней паре более коротко черешковые, с более заостренными лопастями; средние и верхние сильно уменьшенные, цельные, сидячие. Цветки на длинных (10–12 мм) ножках в 4-цветковых мутовках. Чашечка ширококолокольчатая, слегка вздутая, длиной 22–23 мм, неясно-двугубая, все зубцы туповатые. Венчик кремовый. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: Нуратинский хребет.

Места обитания. Осыпи, скалы, щебнистые и каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами и небольшими популяциями, наиболее часто – на территории Нуратинского заповедника.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Скотопрогон и выпас.


Культивирование. Успешно индуцирован в Ботаническом саду АН РУз.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [111, 191–193, 238, 260]

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits mounds, rocks, skeleton and stony slopes in the middle belt of mountains. Single specimens and small populations most frequently can be found in the Nuratau nature reserve. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: some of populations are protected in the Nuratau state reserve.



248. ҲАВОРАНГ МАРМАРАК

Шалфей лиловоголубой / *Salvia lilacinocaerulea* Nevski

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Пояси 1–3 та, тик, безчали туклар билан қопланган, баландлиги 30–60 см. Барглари лира кўринишли патсимон қирқилган, иккала томони оқиш тукли. Гуллари 1–2 тадан 1 см узунликдаги гулбандларда гулолди баргчаларнинг қўлтиғида ўрнашган. Косачаси кенг кўнгироқсимон, қабарикли, узунлиги 15–20 мм, туклари безчали. Гултожи оч пуштиранг, 35–45 мм узунликдаги қорамтир қайтақили. Ёнғоқчаси ясси – эллипсимон, узунлиги 5 мм.

Тарқалиши. Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмида, Кўхитанг тизмасида, Сувсизтоғ ва Бойсунтоғда тарқалган (Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қояларда ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. 3000 тупи борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Молларнинг боқилиши ва пичан ўрилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [111, 192–193, 238, 260, 310].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Стебли 1–3, прямые, железисто-опушенные, 30–60 см высоты. Листья лировидно-перисто-раздельные с обеих сторон беловолосистые. Цветы на цветоножках 1 см длины, по 1–2 в пазухах прицветных листьев. Чашечка широко-колокольчатая, вздутая 15–20 мм длины железисто-опушенная. Венчик бледно-сиреневый с темным отгибом 35–45 мм длины, голый. Орешки сплюснута-эллиптические 5 мм длины. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области: западные отроги Гиссарского хребта, Кугитанг, Сусызтау и Байсунтау.

Места обитания. Каменистые склоны и скалы в среднем поясе гор.

Численность. Около 3000 растений.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Выпас и сенокос.

Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [111, 192–193, 238, 260, 310].

К.Ш. Тожибаев.



Rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at western spurs of the Hissar range, the Kughitang, Susyztau and Baysuntau ranges. Inhabits rocks and stony slopes of the middle mountainous zone. 3000 plants can be found. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.

249. МАЙДА ГУЛЛИ ТОШБОСТИ

Зопниковник мелкоцветный / *Phlomidoschema parviflorum* (Benth.) Vved.

Мақоми 0. Шимоли-ғарбий Помир-Олойдаги камёб тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт, ҳалқасимон шохланган тукли, гулёнбаргчасиз. Пояси бир нечта, энг пастки қисми ёғочланувчи, тубидан шохланган, баландлиги 30–50 см. Барглари чўзиқ ёки юқоридагилари наштарсимон, учи ўткирлашган, бутун, бандсиз. Гуллари бандсиз, 2–4 тадан юқори баргларнинг қўлтиғида жойлашган, косачасининг узунлиги 4 мм, учбурчак, юшоқ тишчали, найчасидан 3 марта қисқа. Гултожи оқиш, косачасидан сал узун. Ёнғоқчаси деярли шарсимон. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд вилояти: Зарафшон тизмаси (Тошбоши, Ургут)да тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Афғонистон ва Шимоли-ғарбий Ҳиндистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда ва кичик гуруҳлар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Кўп миқдорда чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 300].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 0. Редкий вид Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее растение, войлочно-опушенное повторно мутовчатоветвистыми волосками. Стебли в числе нескольких при самом основании деревенеющие, от основания ветвистые, 30–50 см высоты. Листья продолговатые или верхние ланцетные, островатые, цельнокрайние, сидячие. Цветы сидячие по 2–4 в пазухах верхних листьев. Чашечка 4 мм длины, с треугольными неколючими зубцами, в 3 раза более короткими, чем трубка. Венчик беловатый, едва длиннее чашечки. Орешки почти шаровидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.



Распространение. Самаркандская область: Зеравшанский хребет (Ташбаши, Ургут). За пределами Узбекистана – Афганистан, Северо-западная Индия.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически единичными особями и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 300].

К.Ш. Тожибаев.



Rare species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Samarkand region: the Zeravshan range, Toshboshi, Urgut. Inhabits stony slopes of the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: special measures of preservation are not developed.

250. БУХОРО ОТОСТЕГИЯСИ

Отостегия бухарская / *Otostegia bucharica* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг жуда кам сақланиб қолган, йўқолиш арафасида турган камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 120 см га етадиган кулранг пояси юқори қисмигача ёғочланадиган ярим бута. Бир йиллик новдалари ноаниқ тўрт қиррали, сарғиш-оқ рангли, тукли. Барглари кенг тухумсимон, бандсиз, тўмтоқ, кўкимтир-яшил рангли, хурпайган қалин тукли. Гуллари бандсиз, барг қўлтигида 5-8 тадан ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулолди баргчалари кураксимон. Тожбарглари 10-14 мм узунликда, оқ рангли. Июнь-август ойларига гуллаб, меваси сентябрь-октябрда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Шўроб, Дарбанд ва Гўрхожи қишлоқлари атрофларида бир-бирдан ажралган иккита популяцияси маълум.

Ўсиш шароити. Тоғ олди ва тоғ этакларида гипсли тепаликларда, гипсли қояларда, баъзан гипсли оҳақтошларда ўсади.

Сони. Шўроб ва Дарбанд атрофларидаги популяцияда тулпар сони 1800 дан ошмайди. Гўрхожидаги популяцияда 3000 атрофидаги тулпар ўсиши аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди. Аммо кейинги тадқиқотлар давомида уруғидан кўпайган ёш тулпар қайд этилмаган.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ҳамда ўсимлик уруғига турли ҳашаротларнинг зарар келтириши ўсимликнинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида ўстириш ишлари натижа бермади.

Муҳофаза чоралари. У ўсиб турган жойларда буюртмахона ташкил қилиш лозим.

Манбалар. [14, 15, 80, 159].

И.В. Белолипов.

Статус 1. Редчайший, находящийся на грани исчезновения эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Полукустарники высотой до 120 см, с высоко древеснеющими побегами серого цвета. Годичные побеги округло-четырёхгранные, желтовато-белые, опушенные. Листья сизовато-зеленые, густооттопыренно-опушенные, широкояйцевидные, тупые, сидячие. Цветки в мутовках по 5-8, сидячие в пазухах верхних листьев, с лопатчатыми прицветниками. Венчик белый, длиной 10-14 мм. Цветёт в июне-августе, плодоносит в сентябре-октябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: существует две популяции вида в окрестностях кишлаков Шуроб, Дарбанд и Гурхожи. Площадь распространения примерно 2 км².

Места обитания. Склоны гипсовых холмов, гипсовые скалы, реже сильно-гипсированные известняки в предгорьях и нижней части гор.

Численность. Популяция в окрестностях кишлаков Шуроб и Дарбанд насчитывает не более 1800 особей. Популяция в окрестностях кишлака Гурхожи насчитывает около 3000 особей.

Размножение. Семенное. Во время последних обследований семенное возобновление не зафиксировано.

Причины изменения численности и ареала. Неумеренный выпас, скотопрогон, повреждение семян насекомыми.


Культивирование. Многочисленные попытки вырастить в Ботаническом саду АН РУз результатов не дали.

Меры охраны. Необходима организация заказника.

Источники. [14, 15, 80, 159].

И.В. Белолипов.

Rare, endemic, relict species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at only 2 locations: the surroundings of the villages Shurab, Derbend and Gurkhozhi, the distribution area is about 2 sq. km. (Surkhandarya region). Inhabits slopes of gypsum hills, gypsum rocks, rarely, highly gypseous lime-stones in the foothills and lower belt of mountains. 1 population consists of 1800 plants. 2 population (Gurkhozhi) – about 3000 plants. Limiting factors: overpasturing, seed damage by insects. Measures of protection: it is necessary to organize a state reserve.



251. АМУДАРЁ ОҚТЎШАСИ

Фломондес заамударьинский / *Phlomoïdes transoxana* (Bunge) Salmaki

Мақоми 2. Қизилкумда учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–40 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизи тугунаксимон йўғонлашган. Пояси туксиз, юқори қисми шохланган. Ёпирма барглари узун бандли, патсимон бўлинган, қалами бўлакчалардан иборат, устки томони тукли, пастки томони туксиз. Поясидаги барглари нисбатан кичикроқ, камроқ, бўлинган ва қисқа бандли. Гуллари биттадан, узунлиги 5 см га етадиган гулбандларда гулолди баргчалари қўлтиғида ўрнашган. Гулолди баргчалари қалами, косачадан 1,5–2 марта қисқа. Косачаси тор кўнғироқсимон, узунлиги 17–20 мм, деярли туксиз. Тожбарглари узунлиги 23–25 мм, пастки лабининг ўрта қисми тўқ сариқ рангли. Май ойда гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро ва Навоий вилоятлари: Марказий ва Жанубий Қизилкумда тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғлар атрофларида унча мустақамланмаган кумларда ўсади.

Сони. Тўртта жойда (Ойтим, Жирик, Ўғиз, Себетти кудуқлари атрофлари) да маълум. Бу ерда улар кичик-кичик майдонларда тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тугунаги маҳаллий аҳоли томонидан доривор ашё сифатида ишлатилади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [7–9, 159].

Т.А. Одилов.



Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–40 см. Корни с клубневидными утолщениями. Стебель голый, вверху ветвистый. Прикорневые листья на длинных черешках, перисто-рассеченные на почти линейные сегменты, сверху опушенные, снизу голые, длинночерешковые, стеблевые листья уменьшенные, менее рассеченные, короткочерешковые. Цветки по 1 на длинных (до 5 см) цветоножках, в пазухах расставленных прицветных листьев. Прицветники линейные, в 1,5–2 раза короче чашечки. Чашечка длиной 17–20 мм, узкоколокольчатая, почти голая. Венчик длиной 23–25 мм, с оранжево-желтой средней лопастью нижней губы. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Центральные и Южные Кызылкумы.

Места обитания. Полуразбитые пески у подножия останцовых гор.

Численность. Известно четыре местонахождения в окрестностях колодцев Айтим, Джирик, Огуз, Себетти, где он образует разреженные заросли.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Клубни этого растения используются местным населением как лекарственное средство.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т.А. Адылов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum (Bukhara and Navoi regions). Inhabits sands at foothills of the remnant mountains. 4 locations are known in the surroundings of Aitim, Djirik, Oguz, Segetti. Limiting factors: local people use tubers of this plant as medicine. Measures of protection: not protected.



252. УЧПОЯЛИ ОҚТЎША

Фломондес неравногубый / *Phlomoides anisochila* (Pazij et Vved.) Salmaki

Мақоми 2. Нурота тизмасидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган кўп йиллик, қалин тукли ўт. Поялари учта, пастки қисмидан тарвақайлаб шохланган, қалин туклар билан қопланган. Ёпирма барглари банди қиска, қалин ва узун тукли. Поядаги барглари ромб-тухумсимон, четлари тишли, қалин тукли, томирлари йўғон, поянинг юқори қисмидаги барглари эса бандсиз. Гуллари гулолди баргчаларининг кўлтиқларида ҳалқасимон шаклда ўрнашган. Гулолди баргчалари бигизсимон, пахмоқ тукли. Косачаси кўнғироқсимон, узунлиги 20 мм атрофида, найчаси қалин тукли. Тожи сариқ рангли, узунлиги 4 мм, найчасининг узунлиги 15 мм, туксиз, қайтақиси қиска, қалин тукли, тожининг пастки

Статус 2. Чрезвычайно редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой около 20 см. Стебли в количестве 3, от основания отклонённо-ветвистые, густошерстистые. Прикорневые листья на коротких, густошерстистых от длинных волосков черешках; стеблевые ромбически-яйцевидные, зубчатые, с выступающими жилками, густоволосистые, самые верхние листья сидячие. Цветки в многоцветковых сближенных мутовках в пазухах прицветных листьев. Прицветники шиловидные, сильношерстистые. Чашечка длиной около 20 мм, колокольчатая, по трубке густошерстистая. Венчик длиной 4 мм, жёлтый, с голой трубкой длиной 15 мм, снаружи с густо-коротковолосистым отгибом. Нижняя губа венчика в 2 раза длиннее верхней. Цветёт в июне-июле, плодоносит в августе.

Распространение. Джизакская область. В центральной части хребта Нуратау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны.

Численность. Общая численность до 1000 растений, общая площадь распространения около 2 тыс. га.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [7–9, 18, 159, 289].

Т.О. Одилов.



лаби устки лабидан икки марта узун. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Нурота тизмасининг марказий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмида шағал-тошли қуруқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка ҳолда ва кичик тўплар ҳолида учрайди. Тўплар умумий сони 1000 дан ошмайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Сонининг ўзгариш сабаблари аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқ-хонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [7–9, 18, 159, 289].

Т.О. Одилов.

Extremely rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the central part of the Nuratau range (Jizzakh region). Inhabits dry stony slopes. About 1000 plants can be found. The distribution area is about 2000 hectares. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



254. БОБУР ФЛОМОИДЕСИ

Фломоидес Бабура / *Phlomooides baburii* (Adylov) Adylov

Мақоми 1. Жанубий Ўзбекистондаги ғоят камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи.

Бўйи 40–50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси бақувват, туксиз, пастки қисмидан тарвақайлаб шохланган. Епирма барглари чўзиқ, асоси кенг понасимон, қисқа бандли, туксиз; поядаги барглари кичикроқ, деярли бандсиз, ўткир тишли. Гуллари бандсиз, гулолди баргчаларининг қўлтиғида камгулли ярим халқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гулолди барглари бигизсимон, туксиз, косачадан 4 марта қисқа. Косачаси 16–20 мм узунликда, най-қўнғироқсимон, туксиз. Косачасининг четлари кириксимон. Тожининг узунлиги 30 мм, оқиш ёки қуритилганда оч сариқ рангда бўлса керак. Тожининг найи косачадан салгина чиқиб туради.

Май ойида гуллаб, меваси май–июнда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Келиф-Шеробод тепаликлариди тарқалган.

Ўсиш шароити. Очиқ қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. 2009 йили 200 тупи қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [6–9, 159].

Т.О. Одилов.

Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебель крепкий, от основания отклонённо-ветвистый, голый. Прикорневые листья продолговатые, при основании ширококлиновидные, короткочерешковые, голые; стеблевые уменьшенные, почти сидячие, с острыми зубцами. Цветки почти сидячие, в не-



многочетковых, слегка расставленных полумутовках в пазухах прицветных листьев. Прицветники шиловидные, голые, в 4 раза короче чашечки. Чашечка длиной 16–20 мм, трубчатого-колокольчатая, голая. Зубцы чашечки по краю снабжены густыми ресничками. Венчик длиной около 30 мм, видимо, белый или бледно-жёлтый (в сухом виде); трубка венчика едва выступает из чашечки. Цветёт в мае, плодоносит в мае–июне.

Распространение. Сурхандарьинская область: Келиф-Шерабадская гряда (окрестности кишлака Акташ).

Места обитания. Серые глины.

Численность. В 2009 г. зарегистрировано 200 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Поедается скотом.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [6–9, 159].

Т.О. Одилов.

Very rare endemic species of the southern Pamir-Alay. It is spread at the Kelif-Sherabad range: nearby the Aktash village (Surkhandarya region). Inhabits grey clays. In 2009, 200 plants were registered. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



255. ГИПСЛИ ФЛОМОИДЕС

Фломоидес гипсовый / *Phlomoides gypsacea* (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 1. Ғарбий Ҳисор тизмаларидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 100 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси шохланган, туксиз. Ёпирма барглари узун бандли, йирик, чўзиқ-эллипссимон, четлари йирик тишсимон ўйилган, ҳар икки томони сийрак-юлдузсимон туклар билан қопланган. Поядаги барглари қисқа бандли, энг юқори қисмидагилари эса деярли бандсиз. Косачасининг узунлиги 16–18 мм, кўнғироқсимон, сийрак тукли. Тожининг узунлиги 25–30 мм, оқ рангли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ғузор шаҳрининг жануби-шарқидagi паст тоғларда тарқалган.

Ўсиш шароити. Очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Жуда камёб ўсимлик. Фақат бир марта 1935 йилда Ғузор шаҳрининг жануби-шарқи (Қоракамар атрофи)дан терилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [7–9, 159].

Т.О. Одилов.

Статус 1. Чрезвычайно редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой около 100 см. Стебель ветвистый, голый. Прикорневые листья длинночерешковые, крупные, продолговато-эллиптические, крупнозубчато-городчатые, с обеих сторон рассеянными звездчатыми волосками; стеблевые короткочерешковые; прицветные почти сидячие. Чашечка длиной 16–18 мм, трубчато-колокольчатая, с немногочисленными волосками. Венчик длиной 25–30 мм, белый. Цветёт в мае, плодоносит в июне.



Распространение. Кашкадарьинская область: пестроцветные низкогорья к юго-востоку от города Гузар.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород.

Численность. Очень редкий. Собран только один раз в 1935 г. к юго-востоку от города Гузар, в окрестностях зимовки Кара-Камар. Многократные попытки найти растение успехом не увенчались. Вероятно вид исчез.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т.О. Одилов.

Extremely rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the gypseous low mountains to the south-east of Guzar (Kashkadarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks. It was collected only once, in 1935 to the south-east of Guzar, in the surroundings of the Kara-Kamar. Several attempts to find the species had no success. Probably disappeared. Measures of protection: not protected.



256. СИЛЛИҚ КОСАЧАЛИ ФЛОМОИДЕС

Фломоидес гладкочашечный / *Phlomooides leiocalyx* (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 1. Қарши чўлидаги ниҳоятда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50–60 см га етадиган пояси шохлаган, туксиз кўп йиллик ўт. Ёпирма барглари қисқа бандли, чўзиқ, четлари йирик тишсимон ўйилган, ҳар икки томони сийрак, юлдузсимон тукли. Поядаги барглари деярли бандсиз. Гуллари ярим ҳалқалар ҳосил қилиб, гулолди баргларининг қўлтиқларида жойлашган. Гулолди баргчалари бигизсимон, косачасидан 3 марта қисқа. Косачаси найсимон, туксиз, узунлиги 17–18 мм. Тожининг узунлиги 33–35 мм, оқ рангли, пастки лаби дастлаб бинафша, кейинроқ эса қўнғир ранга ўтувчи доғларга эга. Апрельда гуллаб, меваси май ойида стилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қарши чўлларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғолди тепаликларидаги соз тупроқларда ўсади.

Сони. 1958 йил 22 апрелда Гузор-Қарши темир йўли четларидан бир марта терилган. Бу тур қайта учрамаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариши сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [7–9, 159].

Т.О. Одилов.



Статус 1. Очень редкий узкий эндемик Каршинской степи.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50–60 см с голым ветвящимся стеблем. Прикорневые листья короткочерешковые, продолговатые, городчато-лопастные с рассеянными звездчатыми волосками с обеих сторон; стеблевые почти сидячие. Цветки в полумутовках в пазухах прицветных листьев. При-



цветники шилевидные, в 3 раза короче чашечки. Чашечка голая, трубчатая, длиной 17–18 мм. Венчик длиной 33–35 мм, белый, сначала с фиолетовым, затем с коричневым пятном на нижней губе. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: Каршинская степь.

Места обитания. Глинистые холмы в предгорьях.

Численность. Растение собрано 22 апреля 1958 года у полотна железной дороги между городами Гузар и Карши. Повторные сборы не известны.

Размножение. Возможно семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159].

Т.О. Одилов.

Very rare endemic species of the Karshi Steppe.

It is spread at the Karshi Steppe (Kashkadarya region). Inhabits clayish hills. In April 22, 1958, the plant was collected at the permanent way between Guzardarya and Karshi. Another collections are unknown. Measures of protection: not protected.

257. ЧИМЁН ФЛОМОИДЕСИ

Фломоидес чимганский / *Phlomoides tschimganica* (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.

Мақоми 1. Чотқол тизмасидаги деярли йўқолган тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси иккита, оддий. Ёпирма барглари кўп, кенг тухумсимондан то наштарсимонгача, четлари йирик тишсимон ўйилган. Поядаги барглари 1 жуфт, чўзиқ наштарсимон. Гуллари бандсиз, кўп гулли ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган. Гулолди баргчалари бигизсимон-қалами, косачасига тенг. Косачасининг узунлиги 12 мм, қалин юлдузсимон туклар билан қопланган. Косачасидаги тишларининг узунлиги 4–5 мм. Тожининг узунлиги 20 мм, бинафша рангли. Июлда гуллаб, меваси август ойида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Катта Чимён тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ ёнбағирларида ўсади.

Сони. Бу тур 1926 йили Катта Чимён тоғидан терилган. Ягона нусха асосида тавсифланган.

Кўпайиши. Маълумотлар йўқ.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [7–9, 159, 293].

Т.О. Одилов.

Статус 1. Возможно, исчезнувший вид Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебли в количестве 2, простые. Листья прикорневые, в густой розетке, от широкояйцевидных до ланцетных, крупногородчато-зубчатые; стеблевые в количестве 1 пары, продолговато-ланцетные. Цветки сидячие, в многоцветковых расставленных мутовках. Прицветники шиловидно-линейные, равные чашечке. Чашечка длиной 12 мм, густо покрыта звездчатыми волосками. Зубцы чашечки длиной 4–5 мм. Венчик длиной около 20 мм, лиловый. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Ташкентская область: горы Большого Чимгана.

Места обитания. Склоны среднего пояса гор.

Численность. Единственный экземпляр, по которому описан вид, найден в 1926 г. на Большом Чимгане. Больше растение никем не собиралось. Вид вероятно исчез.

Размножение. Сведений нет.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [7–9, 159, 293].

Т.О. Одилов.

Rare endemic probably disappeared species of the Chatkal range. It is spread at the Great Chimgan (Tashkent region). Inhabits slopes in the middle belt of mountains. Only one specimen was found in 1926, in the Great Chimgan. No one collected the species any more. Probably disappeared. Measures of protection: not protected.



258. БЎҒИЗТУКЛИ ЭРЕМОСТАХИС

Пустынноколосник опушенноглоточный / *Eremostachys eriolarynx* Pazij et Vved.

Мақоми 1. Қизилқумдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган кўп йиллик ўт. Илдизи шолғомсимон. Пояси қалин, оддий хурпайган туклар билан қопланган. Ёпирма барглари кенг тухумсимон, қисқа бандли, япрогининг четлари тишсимон ўйилган, оддий тукли. Поядаги барглари ёпирма баргларга ўхшаш, лекин майдароқ. Гуллари майда, ярим ҳалқа бўлиб гулолди баргчалари қўлтиғида ўрнашган. Косачанинг узунлиги 20–25 мм, карнайсимон, қайтақиси кенг, оддий ва сийрак безчасимон туклар билан қопланган. Тожининг узунлиги 28–31 мм, оқ рангли, пастки лаби сариқ. Тож найининг ташқи томони туксиз, ичи эса тукли ҳалқага эга. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Бухоро вилояти: Қизилқумда тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Текисликлардаги сур-қўнғир тусли тупроқларда ўсади.

Сони. Биринчи марта 1871 йил 5 майда Карак чулидан ва шу йил Карак тоғининг шарқий этакларидан терилган (Чимкент вилояти). 1956 йилда Гиждувон туманига қарашли Янгиқудук яқинидан топилган (Бухоро вилояти). 2016 йилда Бухоро вилояти Гиждувон тумани Қорабоғ қишлоғи атрофида топилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши унинг ўсишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [6, 61, 115].

Т.А. Одилов.

Статус 1. Очень редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой 20–30 см с реповидным корнем. Стебель густо-опушенный длинными утолщенными про-

стыми волосками. Прикорневые листья широко-яйцевидные, зубчато-городчатые, опушенные простыми волосками, короткочерешковые; стеблевые сходны с прикорневыми, но более мелкие. Цветки в полумутовках в пазухах прицветных листьев. Чашечка длиной 20–25 мм, воронковидная, с очень расширенным отгибом, опушенная простыми волосками с примесью одиночных, железистых. Венчик длиной 28–31 мм, белый, с жёлтой нижней губой. Трубка венчика снаружи голая, внутри снабжена волосистым кольцом. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. Бухарская область: Кызылкумы. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Серо-бурые почвы равнин.

Численность. Впервые собран 5 мая 1871 г. в Каракской степи (Чимкентская область). В 1956 году в Гиждуванском районе в окрестностях колодца Янги-Кудук (Бухарская область). В 2016 году найден в Гиждуванском районе Бухарской области, в окрестностях кишлака Карабаг.



Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [6, 61, 115].

Т.А. Адылов

Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum (Bukhara region). Inhabits grey-brown desert soils. For the first time, it was collected in May 5, 1871, in the Karak Steppe (the Chimkent region). In 1956, it was collected near the well Yangi-Kuduk (Bukhara region). In 2016, the species was found near the village Karabag (Bukhara region). Subsequent repeated searches were unsuccessful. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



259. КЎРИМСИЗ ҚЎЗИҚУЛОҚ

Зопник мрачный / *Phlomis nubilans* Zakirov

Мақоми 3. Нурота тизмасидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см оралиғидаги кўп йиллик ўт. Пояси бир нечта. Барги тухумсимон, четлари текис ёки ноаниқ аррасимон, устки томони юлдузсимон ва оддий туклар билан қопланган, пастки томони эса қалин юлдузсимон тукли ва йўғон томирли. Гуллари бандсиз, поянинг юқори қисмидаги барглар қўлтиғида 2–6 тадан сийрак ҳалқа ҳосил қилиб жойлашган. Гулларди баргчалари бигизсимон, косача найидан 1,5 баробар узун. Косачаси 10–13 мм узунликда, қалин юлдузсимон туклар билан қопланган. Тожи пушти, узунлиги 23–27 мм. Июлда гуллаб, меваси август ойида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмаси ва Оқтоғда тарқалган.



Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмида майда жинс тупроқли, шағалли ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ва бир-бирдан ажралган тўплари учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Қишлоқ хўжалик экинлари учун ерларнинг ўзлаштирилиши ва чорва молларининг боқилиши туфайли камайган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Популяциясининг бир қисми Нурота давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [94, 194, 195].

Р.У. Қодиров.

Статус 3. Редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 30–40 см. Стеблей несколько.

Листья яйцевидные, цельнокрайные или неяснопильчатые, сверху с рассечёнными звёздчатыми или простыми волосками, снизу с выступающими жилками и звёздчато-войлочные. Цветки сидячие, в немногочетковых (2–6) расставленных мутовках в пазухах верхних листьев. Прицветники шиловидные, в 1,5 раза длиннее трубки чашечки. Чашечка длиной 10–13 мм, густо-звёздчато-опушенная. Венчик розовый, длиной 23–27 мм. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребет Нуратау и горы Актау.

Места обитания. Мелкоземистые, щебнистые, каменистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается единично и группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение мест естественного произрастания под сельхозугодья и выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [94, 194, 195].

Р.У. Кодиров.

Rare endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau and Aktau mountains (Jizzakh, Samarkand, Navoi regions). Inhabits fine earth and stony slopes in the lower and middle belt of mountains. Single specimens and populations occur sporadically. Limiting factors: reclamation of natural habitats under farming and pasturing. Measures of protection: some populations are protected in the Nuratau state reserve.



260. КУДРЯШЕВ АРСЛОНҚУЙРУҒИ

Пустырник Кудряшева / *Leonurus kudrjaschevii* Kamelin et Tulyag.

Мақоми 2. Ҳисор тизмасидаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 35–55 см га етадиган, тўғри ўсувчи, оддий, баъзида бироз шохланган кўп йиллик ўт. Пояси қалин, кулранг туклар билан қопланган. Баргининг икки томони тукли, узунлиги 3–6 см, эни 2,5–4 см. Гул бандидаги барги кенг ромбсимон, асоси понасимон. Гуллари халқасимон ўрнашган, узунлиги 3,5–9 см. Гул-ёнбаргчаси қалами-наштарсимон, баъзида учи қайрилган, қалин туклар билан қопланган, гул косача баргидан бироз қисқа. Гулкоса баргининг узунлиги 6–6,5 мм, қалин тукли. Гултож барги майда, узунлиги 10–12 мм, рангли. Ёнғоқчаси оқиш-жигарранг, уч қиррали, учига томон қийшиқ, ўткирлашган, узунлиги 2 мм гача, июнда гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Фарбий Ҳисорнинг (Бешнов ва Майданак тоғлари) шимолий ёнбағирларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги шимолий тошлоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўп боқилиши туфайли камайиб кетган.



Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [159, 298, 299].

М. Тўлаганова.



Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение до 35–55 см высоты. Все растение густо паутинисто-войлочно опушенное. Листья с обеих сторон опущенные в очертании широкоромбические, 3–6 см длины, 2,5–4 см ширины. Соцветии расставленные, 3,5–9 см длины. Чашечка 6–6,5 мм длины, густоволосисто-опущенные с зубцами. Венчик мелкий, сиреневый около 10–12 мм длины. Орешки светло-коричневые, опушенные около 2 мм длины. Цветет в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: Западный Гиссар – бассейн реки Кашкадарья, горы Бешнау и Майданак.

Места обитания. На северных каменистых склонах в субальпийском поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас

Культивирование. Сведений нет

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [159, 298, 299].

М. Туляганова.

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the western part of the Hissar range: the Kashkadarya river basin, Mt. Beshnau and Mt. Mайданак (Kashkadarya region). Inhabits subalpine slopes. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.

ҚОВОҚДОШЛАР ОИЛАСИ - СЕМЕЙСТВО ТЫКВЕННЫЕ - CUCURBITACEAE

261. ҚОРА СИРТТАН

Переступень черноплодный / *Bryonia melanocarpa* Nabiev



Мақоми 3. Жануби-шарқий Қизилқумда кичик майдонда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Чирмашиб ўсувчи кўп йиллик ўт. Илдизи йўғон, узунлиги 75 см гача, йўғонлиги 15–30 см, оғирлиги 27 кг гача. Илдиз бўғизидан (25 гача) 2–4 м узунликдаги чирмашиб ўсувчи поялар ўсиб чиқади. Пастки барглари йирик, этли, кенг юраксимон, чуқур беш бўлакли; юқоридаги барглари майда, наштарсимон учбурчакли, 2–5 бўлакли. Пастки шингиллари чангчили. Шингилининг ўрта қисмидаги гуллари аралаш (чангчи ва уруғчили); юқоридаги гуллари эса уруғчили. Тожи яшил-сарик рангли. Меваси яшил-қора рангли, юмалоқ, силлиқ, диаметри 6–8 мм. Апрель-май ойларида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Сирдарё, Жиззах ва Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қадимий Чордара шаҳри харобалари яқинида ва Айдарқул атрофида тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Мустақамланган кичик кум уюмларида ўсади.

Сони. Кичик-кичик тўплар ҳосил қилиб ёки якка-якка ҳолда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг боқилиши, чўл бутазорлари деградацияси туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. 1958–1960 йиллар мобайнида ЎзР ФА Ботаника боғи тажриба даласида ўстирилган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 199].

М.М. Набиев.

Статус 3. Редкий узкий эндемик Юго-восточного Кызылкума.

Краткое описание. Лиановидный травянистый многолетник. Корень толстый, длиной до 75

см, толщиной 15–30 см (масса до 27 кг). От корневой шейки отходят многочисленные (до 25) цепляющиеся стебли длиной 2–4 м. Нижние листья крупные, широкосердцевидные, глубоко-пятираздельные; верхние – мелкие, копьевидно-треугольные, 5-лопастные. Нижние кисти мужские; верхние смужскими и женскими цветками на коротких цветоносах; самые верхние – с женскими цветками. Венчики зеленовато-желтые. Плоды зеленовато-черные, шаровидные, гладкие, 6–8 мм в диаметре. Цветет апреле-мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Сырдарьинской, Навоийской и Джизакской областях: Кызылкумы близ руин города Чардара, пески около озера Айдаркуль. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Закрепленные мелкобугристые пески.

Численность. Встречается единично и небольшими популяциями вокруг Айдаркуля.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Страдает от деградации пустынных экосистем, выпаса и выкапывания корней в качестве лекарства.

Культивирование. С 1958 по 1960 гг. успешно культивировался на экспериментальном участке Ботанического сада АН РУз.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 199].

М.М. Набиев.

Rare endemic species of the south-eastern Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum; near the ruins of the Chardara, around the Aydarkul Lake (Syrdarya, Navoi and Jizzakh regions). Inhabits fixed small-hilly sands. Single specimens and small populations occur around of the Aydar Lake. Limiting factors: degradation of desert ecosystems, pasturing and digging the roots for medicinal purposes. Measures of protection: not protected.



**ҚОРАҚАТДОШЛАР (ТОШЁРДОШЛАР) ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КРЫЖОВНИКОВЫЕ
(КАМНЕЛОМКОВЫЕ) – GROSSULARIACEAE (SAXIFRAGACEAE)**

262. ГУЛХАЙРИБАРГ ҚОРАҚАТ

Смородина мальволистная / *Ribes malvifolium* Pojark.



Краткое описание. Кустарник высотой до 1 м. Всё растение, кроме листьев, покрыто стебельчатыми железками. Листья с 5 лопастями, шириной 1,5–4 см. Цветки в многоцветковых кистях, беловатые. Плод – многосеменная ягода. Цветёт в июле, плодоносит в августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Каменистые склоны, россыпи и трещины скал в нижнем и среднем поясе гор.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган бута. Ўсимликнинг барча қисми (баргларидан ташқари) безчали туклар билан қопланган. Барглари 5 бўлакли. Бўлаklarининг эни 1,5–4 см. Гуллари кўпгулли шингил ҳосил қилиб ўрнашган, оқиш рангли. Меваси кўп уруғли, резавор. Июль ойида гуллаб, меваси август ойида пишади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмларидаги тошли ёнбағирлар, сурилмалар ва қояларнинг ёриқларида ўсади.

Сони. Табиатда яқка-яқка бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Меваси дориворлик хусусиятига эга бўлганлиги учун кўплаб териб олинади.

Маданийлаштирилиши. Манзарали ва доривор ўсимлик сифатида оз бўлса ҳам боғларда ва ҳовлиларда экилади.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор кўрикхонасида муҳофаза қилинади. Мавжуд тўплари устидан назорат ўрнатиш ва биологик хусусиятларини ўрганиш лозим.

Манбалар. [159, 188].

О.Т. Тургинов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Численность. Не установлена, встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор плодов как лекарственного сырья.

Культивирование. Изредка культивируется в частных садах как декоративное и лекарственное растение.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [159, 188].

О.Т. Тургинов.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (Surkhondarya and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes, gorges in the lower and middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: harvesting of fruits as medicinal raw material. Measures of protection: protected in the Hissar nature reserve.



ҚОҚИЎТДОШЛАР (МУРАККАБГУЛДОШЛАР) ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО АСТРОВЫЕ (СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ) – ASTERACEAE (COMPOSITAE)

263. ЯШИЛ АНУРА

Анура бледнозелёная / *Anura pallidivirens* (Kult.) Tscherneva

Мақоми 2. Нурота тоғларида ўсвчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40–50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси чалкаш туклар билан қопланган, жўякли, асосидан шохланган. Барглари чармсимон, устки томони туксиз, пастки томони қалин оқ туклар билан қопланган. Илдизолди барглари бандли, тухумсимон, четлари текис ёки майда тикан тишли. Поядаги барглари пастдан юқорига қараб майдалашиб боради, бандсиз ёки пояни қамраб туради, пастки қисмининг икки томони йирик тикан тишли ёки текис. Саватчаси кўп, қисқа бандли, майда. Гуллари кўп, оқ. Уруғи майда, чўзиқ-овал шаклда. Июнь–июль ойида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота, Кўйтош, Оқтоғ, ва Молгузар тизмалари (Темур дарвозаси атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмида, тош шағалли, баъзан майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Якка-якка ҳолда, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва моллари учун яхши озуқа бўлганлиги туфайли уруғидан кўпайиши анча чекланган.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофазат чоралари. Нурота кўриқхонасида кўриқланади.

Манбалар. [18, 156–159, 289, 326].

Н.Ю. Бешко.

Статус 2. Редкий эндемичный вид и род Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 40–50 см. Стебель опушен паутиными волосками, бороздчатый, от основания ветвистый. Листья кожистые, сверху – голые, снизу – седоватойлочные, прикорневые листья черешковые,

яйцевидные, по краю – почти цельнокрайные или очень мелкоколючезубчатые, стеблевые к верхушке очень быстро уменьшающиеся, сидячие, полустеблеобъемлющие, при основании с обеих сторон крупноколючезубчатые или цельнокрайные. Корзинки многочисленные, на коротких ножках, мелкие. Цветки многочисленные, с белыми венчиками. Семянки мелкие, продолговато-овальные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.



Распространение. В Навоийской, Самаркандской и Джизакской областях: Нуратау – Койташ, Мальгузарские горы (около Тамерлановых ворот), Актау.

Места обитания. Каменисто-щебнистые, мелкоземистые склоны нижнего и среднего пояса гор.

Численность. Встречается спорадически, как единично и небольшими группами, так и довольно многочисленными популяциями (до нескольких сотен растений). Площадь локальных популяций составляет от 0,01 га до нескольких гектаров.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас. Хорошо поедается всеми видами животных, что препятствует семенному размножению.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского заповедника.

Источники. [18, 156–159, 289, 326].

Н.Ю. Бешко.

Rare endemic species and genus of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau, the Koytash, the Aktau, the Malguzar mountains (nearby the Tamerlan's Gate gorge), (Navoi, Samarkand, Jizzakh regions). Inhabits stony, fine earth slopes in the lower and middle belt of mountains. It occurs sporadically, by single specimens, small groups, sometimes, large populations (up to several hundred plants). Limiting factors: pasturing. Well eaten by all kinds of animals that prevents seed reproduction. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.

264. АЛЛОЛЕПИС КАРРАК

Кузиния инакочешуйная / Cousinia allolepis Tscherneva et Vved.

Мақоми 2. Ҳисор тизмаси ғарбий қисмига хос жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 55 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси кўп, чалкаш тукли, асоси қалин тукли, ўрта қисмидан шохланувчан. Шохчалари якка саватчали. Баргларининг устки томони безчали тукли, пастки томони кулранг қалин тукли. Ташқи ёпирма баргларининг банди новсимон кенгайган, ичкилариники бандли, наштарсимон, патсимон бўлинган, асосига қараб пардасимон қанотчалар ҳосил қилади. Поядаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, бандсиз. Саватчаси кенг цилиндрсимон, безчали ҳамда оддий туклар билан қопланган. Урама барглари 35 тага яқин. Тожи сариқ рангли. Уруғи узун тескари тухумсимон, майда тишли. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмида Қашқадарё хавзасида тарқалган (Оқсув, Гилондарё ва Танхоздарё хавзаларининг юқори қисми).

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумот йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 55 см. Стебли (их несколько), паутинистые, у основания войлочные, от середины ветвистые. Веточки несут по 1 корзинке. Листья сверху железистоволосистые, снизу – серовойлочные; наружные прикорневые – с влагалищно-расширенными черешками; внутренние прикорневые с черешками, к основанию плёнчато крылатыми, ланцетные, перисторассечённые; стеблевые сверху постепенно уменьшающиеся, сидячие. Корзинки широкоцилиндрические, опушенные железистыми и простыми волосками. Листочки обёртки в количестве 30–35. Венчики жёлтые. Семянки продолговато-обратнойцевидные, мелкозубчатые. Цветёт в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Кашкадарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта, бассейн реки Кашкадарья, верховья Аксу, Гиландарья и Танхаздарья.

Места обитания. Каменистые склоны в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала.

Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов.

Very rare endemic species of the western part of the Hissar range. It is spread at the western outskirts of the Hissar range, the Kashkadarya river basin, the upper reach of the Aksu, the Gilandarya and Tankhazdarya rivers (the Kashkadarya region). Inhabits stony slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



265. БЕЗЧАТУКЛИ КАРРАК

Кузиния железистая / *Cousinia adenophora* Juz.

Мақоми 2. Зарафшон тизмаси ғарбий қисмига мансуб жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тарвақайлаган, туксиз, юқори қисми безчасимон тукли. Шохчалари якка каллакли. Тўпгуллари сийрак. Баргларининг устки томони безчасимон тукли, пастки томони кулранг, қалин тукли, патсимон қирқилган. Поядаги барглари бандсиз, юқорига қараб кичрайиб боради. Саватчалари чўзиқ тухумсимон, безчасимон тукларга эга. Ўрама баргчалари 30–40 та, яссироқ-чармсимон, безчасимон тукли. Гули сариқ рангли. Уруғи тескари тухумсимон, деярли уч қиррали, ингичка қанотчали, юқори қисми 2–3 тишли. Июль–август ойларида гуллаб, уруғи август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиий ҳолда кам тарқалган.



Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумот йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў. Ҳасанов.



Статус 2. Очень редкий эндемик западной части Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 50 см. Стеблей несколько, они голые, в верхней половине железистоопушенные, оттопыренноветвистые, веточки одноголовчатые. Соцветие рыхлое. Листья сверху железистоволосистые, снизу – серовойлочные, перисторассеченные, стеблевые листья к вершине стебля постепенно уменьшающиеся, сидячие. Корзинки узкояйцевидные, железистые. Листочки обёртки в количестве 30–40, плосковатые, кожистые, железистоволосистые. Венчик желтый. Семянки обратнойцевидные, почти трёхгранные, узкокрылатые, наверху 2–3-зубчатые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет.

Места обитания. Каменистые склоны в верхнем поясе гор.

Численность. В естественных условиях встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов.

Very rare endemic species of the western part of the Zeravshan range. It is spread at the Zeravshan range (Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits stony slopes in the upper belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.

266. БУТКОВ КАРРАГИ

Кузиния Буткова / *Cousinia butkovii* Tscherneva et Vved.

Мақоми 1. Зарафшон тизмасига мансуб камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган пояси йўл-йўл чизикли (жўякли), қалин тукли, сербарг, асосидан шохланувчан, якка каллакли, икки йиллик ўт. Барглари яшил рангли, устки ва пастки томони чалкаш тукли, қирраси тикансимон тишли. Ёпирма ҳамда поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, патсимон бўлинган. Поянинг ўрта қисмидаги барглари чўзиқ, четлари бўлакли, юқори қисмидагилари эса юмалоқ, пояни ярим қамраб туради, учи қаттиқ, тиканли. Саватчаси ясси-юмалоқ (диаметри 2,5–3,5 см), кўп гулли. Ўрама барглари кўп, дағал. Тожги пушти рангли. Уруғи чўзиқ тухумсимон. Май–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августларда етилади.

Тарқалиши. Самарқанд ва Қашқадарё вилоятлари: Зарафшон тизмаси (Ургут қишлоғи атрофлари, Самарқанд тоғлари, Оқсой қишлоғи атрофи)да тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларидаги жарликлар, сурилмалар ҳамда шағалли енбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши ва хашак учун ўриб олинishi сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Аниқ маълумот йўқ. расбросанными

Муҳофаза чоралари. Китоб давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий вид Зеравшанского хребта.

Краткое описание. Двулетнее травянистое растение высотой до 40 см. Стебель полосатобороздчатый, войлочный, облиственный, от основания ветвистый, одноголовчатый. Листья светло-зелёные, сверху и снизу паутинистые, по краю – колючезубчатые; прикорневые и нижние – короткочерешковые, перисто-раздельные; средние стеблевые – продолговатые, лопастные; верхние – округлые, полустеблеобъемлющие, кончаются крепкой колючкой. Корзинки сплюснут ошаровидные (2,5–3,5 см в диаметре), многоцветковые. Листочки обёртки многочисленные, грубые. Венчик розовый. Семянки продолговато-яйцевидные. Цветёт в мае–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Самаркандской и Кашкадарьинской областях: Зеравшанский хребет, окрестности кишлака Ургут; Самаркандские горы, окраина кишлака Аксай. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Щелнистые склоны, осыпи и обрывы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.


Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас, заготовки на сено.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Китабском заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов.



Rare species of the Zerafshan range. It is spread at the Zerafshan range, nearby Urgut; the Samarkand mountains, nearby the village Aksay (the Samarkand and Kashkadarya regions). Inhabits slopes, mounds and cliffs in the lower and middle belts of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing, hay-mowings. Measures of protection: protected in the Kitab state reserve.



267. ВВЕДЕНСКИЙ КАРРАГИ

Кузинья Введенского / *Cousinia vvedenskyi* Tscherneva

Мақоми 2. Ҳисор тизмаси жануби-ғарбий тармоқларининг эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизиқли (жўякли), чалкаш тукли, шоҳлари 1 ёки 2 та каллакли. Баргларининг пастки томони қалин оқиш тукли, устки томони сийрак чалкаш тукли, четлари тишсимон майда тиканли. Ёпирма барглари бандли, лирасимон. Поянинг пастки қисмидаги барглари ёпирма баргларга ўхшаш, банд-

сиз ёки қисқа бандли. Поянинг ўрта қисмидаги барглари ҳам бандсиз. Энг юқоридагилари эса қисқариб тиканга айланган. Саватчаси чўзиқ тухумсимон, юқори қисми сиқилган, сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари яшил, қиррали, ўткир учли, ўрта қисми

қисилган. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, тўқ қудранг. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Помир-Олойда Чўлбайир, Бойсун тоғларида, Ҳисор тизмаси жанубий ёнбағридаги Сангардак сув ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги йирик тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Фақат ўзига хос тупроқда ўсишга мослашганлиги унинг қисқаришига сабаб бўлган.

Маданийлаштирилиши. Аниқ маълумот йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Эндемик юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 20 см. Стебель полосатобороздчатый, паутинистый, ветви одно-реже двуголовчатые. Листья снизу беловатощерстистые, сверху умеренно-паутинистые, по краю – мелко-колючезубчатые; прикорневые листья черешковые, лировидные; нижние – стеблевые, подобны прикорневым, но сидячие или короткочерешковые; средние – стеблевые, сидячие; самые верхние иногда редуцированные до колёчки. Корзинки продолговато-яйцевидные, наверху сжатые, умеренно-паутинистые. Листочки обёртки зелёные, килеватые, короткозаострённые, в средней части сжатые. Венчик розовый. Семянки обратнойцевидные, тёмно-серые. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Памиро-Алай: горы Чулбаир и Байсунтау, бассейн реки Сангардак на южном склоне Гиссарского хребта.

Места обитания. Каменистые и щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к определенным местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов.



Endemic species of the south-western branches of the Hissar range. It is spread at the Pamir-Alay; the Chulbair and Baysuntau mountains, the Sangardak river basin (Surkhandarya region). Inhabits stony and slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



268. ЁПИРМА КАРРАК

Кузиния широкообертчная / *Cousinia platystegia* Tscherneva

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубида ўсувчи жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тик, чалкаш тукли, юқори қисмидан шохланувчи, қисқа шохларнинг учида саватчалари 2-3 тадан бўлиб, зич жойлаш-



ган. Ёпирма барглари кенг бандли, поядаги барглари бандсиз, чўзиқ ёки наштарсимон, четлари тишсимон тиканли, юқори томони ингичка чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Саватчалари цилиндрсимон. Гултожи сариқ, ўрама баргларида қисқа. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқлари, Кўхитангнинг жанубий тоғ этаклари, Шеробод водийсида тарқалган.

Ўсиш шароити. Паст тоғлардаги ола жинсларда ўсади.

Сони. 2013 йилда 120 туп ўсимлик қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 2. Очень редкий эндемик Южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стеблей несколько, прямостоячие, паутинистые, на верхушке слегка ветвистые, с укороченными ветвями, несущими на концах скученные по 2-3 корзинки. Прикорневые листья с расширенными черешками; все стеблевые-сидячие, продолговатые или ланцетные, по краю колючезубчатые, сверху м тонкопаутинистые, снизу – беловойлочные. Корзинки цилиндрические. Венчики жёлтые, не выдающиеся из листочков обертки. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта, южные предгорья Кугитанга, Шерабадская долина.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в низкогорьях.

Численность. В 2013 г. было зарегистрировано около 120 растений.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площадей пестроцветов.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ф.О. Хасанов.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the western outskirts of the Hissar range, the southern foothills of the Kughitang range, the Sherabad valley (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in low mountains. In 2013, about 120 plants were found. Limiting factors: decreasing of gypseous habitats. Measures of protection: not protected.



269. ЖИЗЗАХ КАРРАГИ

Кузиния джизакская / *Cousinia dshisakensis* Kult.

Мақоми 3. Шимоли-ғарбий Помир-Олойга хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–40 см га етадиган, ўқ илдизли, икки йиллик ўт. Пояси якка каллакчи шохчалардан иборат. Ёпирма барглари лирасимон, кенг бандли. Поядаги барглари чўзиқ, четлари йирик тишсимон тиканли, учи ҳам йирик тиканли, устки томони чалкаш тукли, пастки томони қалин кулранг тукли. Саватчаси йирик, диаметри 2–2,5 см. Тожи ўрама баргчалардан бироз узун, пушти рангли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий, Самарқанд ва Жиззах вилоятлари: Нурота, Туркистон ва Молғузар тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва пастки қисмларида тошли ва шағалли ёнбағирларда ҳамда қояларда ўсади.

Сони. Тўплари кам тупли (1 га да 20 тупгача), олис-олис жойлашган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши кўпайишига салбий таъсир қилмоқда. Камёблигининг табиий сабаблари ҳам бўлса керак.

Маданийлаштирилиши. ЎзР ФА Ботаника боғида 1962 йилдан бошлаб экиб келинади.

Муҳофаза чоралари. Айрим популяциялари Зомин миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [289, 321, 324, 325, 327].

Г.У. Кодиров.

Статус 3. Редкий эндемик Северо-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Стержнекорневой травянистый двулетник высотой 20–40 см.

Стебель с одностолбчатыми ветвями.

Прикорневые листья лировидные, широко черешковые, стеблевые – продолговатые, по краю – крупноколючезубчатые, оканчиваются крупной колючкой, сверху – паутинистые, снизу – сероволочные. Корзинки крупные, 2–2,5 см в диаметре, венчики слегка выдающиеся из листочков обертки, розовые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской и Навоийской областях: хребты Нуратау, Туркестанский и Мальгузарский.

Места обитания. Щебнистые склоны и скальные выходы в нижнем и среднем поясах гор.

Численность. Популяции малочисленные, с единично разбросанными растениями (до 20 особей на 1 га).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас. Вероятно, имеются и естественные причины снижения численности.

Культивирование. С 1962 г. успешно выращивается в Ботаническом саду АН РУз.


Меры охраны. Часть популяций находится на территории Зааминского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Г.У. Кодиров.



Rare endemic species of the north-western Pamir-Alay. It is spread at the Nuratau, the Turkestan and Malguzar ranges (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits slopes and rock outcrops in the lower and middle belts of mountains. Populations are not numerous with single sparse plants (up to 20 specimens per 1 hectare). Measures of protection: some populations protected in the Zaamin national park.



270. КИНДИКЧАЛИ КАРРАК

Кузиния пупочковая / *Cousinia umbilicata* Juz.

Мақоми 2. Қизилқумга мансуб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Поясининг бўйи 60 см гача етадиган, деярли асосидан шохланувчи, шохчалари якка бошчали, тўп гуллари ёйиқ, кўп йиллик ўт. Барглрининг устки томони яшил рангли, чалкаш тукли, йўғон томирли, пастки томони кулранг, қалин тукли. Ёпирма барглари чўзиқ наштарсимон, патсимон бўлинган, бандли, бандининг асоси бироз кенгайган, оқиш, қалин тукли. Поядаги барглари бандсиз, кенг наштарсимон, сийрак, тишсимон тиканли. Саватчаси кенг цилиндрсимон. Тожи сариқ. Уруғи деярли тўрт қиррали, кулранг. Июнь-август ойларида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Бухоро, Навоий вилоятлари: Қизилқумдаги қолдиқ тепаликлар (Кўнғиртоғ, Етимтоғ ва Оқтоғлар)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тепаликлардаги тошли, тошли-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Статус 2. Эндемик Қызылкума.

Краткое описание. Многолетнее растение высотой до 60 см. Стебель почти от основания обильно ветвистый, веточки одноголовчатые, собраны в раскидистое соцветие. Листья сверху – зелёные, паутинистые, с выступающими жилками, снизу – серовойлочные. Прикорневые листья черешковые, с беловойлочными, у основания слегка расширенными черешками, продолговато-ланцетные, перистолопастные. Стеблевые листья сидячие, широколанцетные, расставленно-колючезубчатые. Корзинки широкоцилиндрические. Венчики желтые. Семянки почти четырехгранные, серые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. В Бухарской и Навоийской областях: Кызылкумы – останцевые возвышенности Кингиртау, Джетымтау и Актау.

Места обитания. Каменистые, каменисто-щебнистые склоны останцевых возвышенностей.

Численность. Встречается единичными экземплярами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. В 1964 г. был высеян в коллекционном питомнике Кызылкумской пустынной станции АН РУз. Всходы выпали в том же году.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

К.Ш. Тожибаев.

Endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Kingirtau, the Dzhetymtau and Aktau (Bukhara and Navoi regions). Inhabits stony and gravelly slopes of remnant low mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: not protected.



Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу тур алоҳида тупроқ шароитига мослашганлиги учун камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. 1964 йили ЎзР ФА Қизилқум чўл станцияси тажриба майдонида экиб ўстирилган. Ўсиб чиққан ниҳоллар шу йилнинг ўзидаёқ қуриб қолган.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

К.Ш. Тожибаев.



271. НОЗИКБОШ КАРРАК

Кузиния изящноголовая / *Cousinia glaphyrocephala* Juz. et Tscherneva

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубида кичик майдонларда ўсадиган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 1. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20 см. Стебли (их несколько) тонковолочные, от середины ветвистые. Ветви тонкие, укороченные, одноголовчатые. Листья сверху паутинистые, снизу - бело-войлочные; прикорневые - короткочерешковые, перисторассеченные; стеблевые - постепенно уменьшающиеся кверху, сидячие, ланцетные, у основания с 1-2 парами зубцов. Корзинки яйцевидные, паутинистые. Листочки обёртки (около 40) килеватые. Венчики выдающиеся, розовые. Семянки обратно-яйцевидные, гладкие. Цветёт в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта - Сусызтау (Наво-Булак).

Места обитания. Каменистые горные склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.



Қисқача тавсифи. Бўйи 20 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, қалин тукли, ўрта қисмидан шохланувчи, шохлари ингичка, қисқа, якка каллакчи. Барглари устки томони чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Ёпирма барглари қисқа бандли, патсимон бўлинган. Поядаги барглари юқорига қараб кичиклашиб боради, бандсиз, наштарсимон, асоси 1-2 жуфт тишли. Саватчаси тухумсимон, чалкаш тукли. Ўрама барглари 40 та атрофида, қиррали. Тожи ўрама баргчаларидан узун, пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, силлиқ. Июнь-июль ойларида гуллаб, меваси июль-августда етилади.


Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқлари (Сувсизтоғ, Навобулоқ)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Умумий сони ҳақида маълумотлар йўқ.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range: the Susyztau (Navo-Bulak), (Surkhandarya region). Inhabits stony mountain slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



272. ОҚИШ КАРРАК

Кузиния белесоватая / *Cousinia candicans* Juz.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубий қисмига хос жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси ётиқ-чалкаш тукли, асосидан шохланувчи, якка каллакчи. Барглари чармсимон, ҳар икки томони кулранг қалин тукли, учи қаттиқ тиканли. Ёпирма барглари қисқа бандли, чўзиқ, япроғининг четлари йирик тишли ёки бўлакчи. Саватчаси тухумсимон, диаметри 2 см гача, чалкаш, қалин тукли. Ўрама баргчалари тарвақайлаган, қаттиқ, учи уч қиррали, тиканли. Тожи тўқ қизил рангли. Уруғлари доғли, деярли



Статус 2. Очень редкий вид южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебель прижатопутинистый, от основания ветвистый, одностоловчатый. Листья кожистые, с обеих сторон сероватые, оканчивающиеся крепкими колючками. Прикорневые – короткочерешковые, продолговатые, по краю – крупнозубчатые или лопастные. Корзинки яйцевидные, до 2 см в диаметре, густопутинистые. Листочки обёртки оттопыренно-торчащие, крепкие, оканчиваются трехгранной колючкой. Венчики пурпурные. Семянки пятнистые, почти трёхгранные. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребт Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Известняки в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (Surkhandarya region). Inhabits limestones in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.

уч қиррали. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғ тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги оҳақтошларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.



273. ПАТТАНГАЧАЛИ КАРРАК

Кузния перисточешуйчатая / *Cousinia pterolepida* Kult.

Мақоми 3. Ғарбий Тянь-Шанга мансуб камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи ёғочланувчи, кўп бошчали, пояси кўп, бўйи 35–45 см га етадиган, чалкаш қалин тукли, якка каллакли кўп йиллик ўт. Барглари чармсимон, устки томони кулранг-яшил, чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Ёпирма барглари ва поянинг пастки қисмидаги барглари узулиги 14–25 см, энг юқоридаги барглари тиканли бўлакларга ажралган. Саватчаси цилиндрсимон, туксиз. Ўрама баргчалари кўп. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари



тухумсимон, туксиз, силлик. Август ойида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Угом тизмасидаги Курушйўл довонида, Тепарсойда тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмида майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши сабабли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғида жойлашган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Корень деревянистый, многоглавный. Стебли (их несколько) высотой 35–45 см, паутинисто-войлочные, одноголовчатые. Листья кожистые, сверху – серовато-зеленые, тонкопаутинистые, снизу – бело-войлочные; прикорневые и нижние стеблевые листья длиной около 14–25 см и самые верхние почти колюче-лопастные. Корзинки цилиндрические, голые. Листочки обертки многочисленные. Венчики розовые. Семянки обратнойцевидные, голые, гладкие. Цветёт в августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Угамский хребет, перевал Курушюл, верховья Тепарсая. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Мелкоземистые склоны в субальпийском поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Ugam range, the Kurushyul passage, the Teparsay (Tashkent region). Inhabits the northern slopes in the subalpine mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



274. СИЛЛИҚТУКЛИ КАРРАК

Кузиния гладкощетинковая / Cousinia glabriseta Kult.

Мақоми 3. Жануби-ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см гача етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизиқли баргли, асосидан шохланувчи, шохлари якка каллакчи. Барглари чармсимон, юқори қисми чалкаш тукли, пастки томони оқиш-қалин тукли, четлари йирик тишли. Поясининг ўрта ва юқори қисмидаги барглари бандсиз, юмалоқ, пояни ярим қамраб

Муҳофаза чоралари. Сурхон кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327]

Ғ.М. Шерматов.

Статус 3. Редкий эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стебель полосатобороздчатый, облиственный, от основания ветвистый, ветви одноголовчатые. Листья кожистые, сверху – тонкопаутиновые, снизу-беловолочные, по краю-крупнозубчатые; верхние – стеблевые, средние – сидячие, округлые, полустеблеобъемлющие. Корзинки яйцевидно-шаровидные, слабопаутиновые. Листочки обёртки, сравнительно, немногочисленные, оттопыренно торчащие, слегка паутиновые. Венчик розовый, выдающийся. Семянки обратнойцевидные. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Кугитанг. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны верхнего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется Сурханским заповедником.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.



туради. Саватчаси тухумсимон-юмалоқ, сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари нисбатан кам, тарвақайлаган, сийрак чалкаш тукли. Тожи пушти рангли, ўрама баргчалардан узунроқ. Уруғи тескари тухумсимон. Июнь ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмасида тарқалган. Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги шағалли ва майда жинс тупроқли ёнбағирларда учрайди.


Сони. Табиатда бу тур кичик тўплар ҳосил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Rare endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes in subalpine zone. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



275. СОХТАТУКЛИ КАРРАК

Кузиния ложношерстная / *Cousinia pseudolanata* Popov ex Tscherneva

Мақоми 1. Оқтоғ тизмасининг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси битта, тик ўсувчи, баргли, йўғон, қалин тукли. Ёпирма барглари патсимон бўлинган, бандсиз, остки томони туксиз, устки томони безчасимон тукли, ёки ҳар икки томони қалин тукли. Тўпгуллари ингичка бошоқсимон. Саватчаси қисқа бандли, йирик, тукли. Ўрама баргчалари кўп, силлиқ. Тожи сариқ. Уруғи тескари-тухумсимон, деярли уч қиррали. Июль ойида гуллаб, меваси июль-августларда етилади.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Нурота тоғларида Оқтоғ (Лангар қишлоғи атрофи)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тош-шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка, баъзан кичик тўплар ҳосил қилиб учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [18, 289, 321, 324, 325, 327].

И.В. Белолипов.

Статус 1. Очень редкий эндемик хребта Актау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебли одиночные, прямостоячие, толстые, войлочнопушенные, облиственные. Листья розеток перисторассечённые, сидячие, снизу-голые, сверху-железистые, или с обеих сторон густопушенные. Соцветия узкоколосовидные. Корзинки на коротких цветоножках, крупные, опушенные. Листочки обертки многочисленные, гладкие. Венчики жёлтые. Семянки обратнойцевидные, почти трёхгранные. Цветёт в июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. Навоийская область: Нуратинские горы, хребет Актау, окрестности кишлака Лангар.



Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единичными экземплярами, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [18, 289, 321, 324, 325, 327]

И.В. Белолипов.

Very rare endemic species of the Aktau range. It is spread at the Nurata mountains, the Aktau range, nearby the Langar village (Navoi region). Inhabits stony slopes in the middle mountainous zone. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.

276. ТИК КАРРАК

Кузиния торчащая / *Cousinia stricta* Tscherneva

Мақоми 2. Ўзбекистон жанубига хос жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 70 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари бандсиз безчали, юқори қисми сийрак шохли, шохчалари кўп саватчали. Тўпгули рўваксимон. Барглари чармсимон, ҳар икки томони яшил, устки томони бандсиз безчали, пастки томони жуда сийрак чалкаш тукли. Ёпирма барглари бандли, чўзиқ наштарсимон,



патсимон бўлакли. Поядаги барглари бандсиз, наштарсимон, патсимон бўлинган. Саватчаси чўзиқ цилиндрсимон. Тожи сариқ рангда. Уруғи очкулранг, қора доғли, уч қиррали, учи уч тишли. Июль-август ойларида гуллаб, меваси август-сентябрда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғда тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди, фақат бир жойда маълум.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайса керак.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Тур маълум тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Алоҳида муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 2. Очень редкий вид южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 70 см. Стебель с сидячими желёзками, в верхней половинке рыхловетвистый; ветви несут многочисленные корзинки, собранные в метельчатое соцветие. Листья кожистые, с обеих сторон зелёные, сверху – с сидячими железками, снизу – очень незначительно-паутиновые; прикорневые листья черешковые, продолговато-ланцетные, перистораздельные; стеблевые-сидячие, ланцетные, перисто-лопастные. Корзинки продолговато-цилиндрические. Венчики жёлтые. Семянки светло-серые с черными точечными пятнами, почти трёхгранные, наверху трёхзубчатые. Цветёт в июле-августе, плодоносит в августе-сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в среднем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко, отмечен в 1 пункте.

Размножение. Видимо, семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in the middle belt of mountains. Collected only once. Measures of protection: not protected.



277. УЗУНБАРГ КАРРАК

Кузиния длиннолистная / *Cousinia dolichophylla* Kult.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 90 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси ноаниқ йўл-йўл чизикли, чалкаш тукли, юқори қисми эса момик тукли. Ёпирма барглари узун бандли, чўзиқ наштарсимон, кўпинча йирик, узунлиги 25–30 см, кенлиги 5–8 см, чармсимон, устки томони сийрак чалкаш тукли, яшил, пастки томони оқиш қалин тукли, патсимон бўлакли, четлари тикан тишли. Поянинг пастки қисмидаги барглари ёпирма баргларга ўхшаш, ўрта қисмидаги барглари бандсиз, энг юқоридаги барглари майда, маълум ораликда жойлашган, бандсиз, четлари бўлинган, тиканли. Саватчалари кўп, кўп гулли, қисқа бандли. Тожи оч сарғиш, ўрама баргчаларидан узун. Уруғи тескари пирамидасимон, йирик, узунлиги 7 мм гача етади. Июль–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Қоржонтов, Угом ва Писком тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги майда жинс тупроқли, шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда якка-якка ҳолда, баъзан тўп бўлиб тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликларни пичанга ўриб олиш оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угом-Чотқол миллий табиат боғида жойлашган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327]

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 90 см. Стебель неясно-полосато-бороздчатый, паутинистый, наверху почти войлочный. Прикорневые листья длинночерешковые, продолговато-ланцетные, обычно крупные, длиной 25–30 см и шириной 5–8 см, кожистые, сверху – очень незначительно-паутинистые, зелёные, снизу – беловойлочные, перистораздельные, по краю колючезубчатые; нижние стеблевые – подобны прикорневым; средние такие же, но сидячие; самые верхние-расставленные, сидячие, колючелопастные, мелкие. Корзинки многочисленные и многоцветковые, на укороченных ножках. Венчики бледно-желтоватые, выдающиеся. Семянки обратнопирамидальные, крупные, длиной до 7 мм. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Каржантау, Угамский и Пскемский хребты.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается единично, реже образует небольшие группы.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Семенокошение.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны. Места произрастания расположены на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [321, 324, 325, 327].

К.Ш. Тожибаев.



Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Karzhantau, the Ugam and Pskem ranges (Tashkent region). Inhabits fine earth and gravelly slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



278. ХУРПАЙГАН КАРРАК

Кузиния вооруженнолистная / *Cousinia hoplophylla* Tscherneva

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида тарқалган камёб эндемик ўсимлик.


Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.



Статус 2. Редкий эндемик юго-западных отрогов Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебель сероватойлочный, в средней части обильно ветвистый, одностолбчатый. Листья кожистые, с обеих сторон серовато-зелёные, войлочные; стеблевые листья кверху постепенно уменьшаются; нижние – сидячие или коротко-черешковые, обратноланцетные, по краю курчавые, перистораздельные. Корзинки шаровидные, 18–20 мм в диаметре, паутинистые. Листочки обёртки многочисленные, оттопыренно вверх торчащие, по спинке килеватые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: горы Чульбаир.

Места обитания. Каменистые склоны у верхней границы среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси кулранг қалин тукли, ўрта қисми қалин шохли, якка каллакли. Барглари чармсимон, ҳар икки томони кулранг-яшил, қалин тукли. Поядаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, пастки қисмидаги барглари бандсиз ёки қисқа бандли, тескари наштарсимон, патсимон қирқилган, четлари жингалаксимон. Саватчаси юмалоқ, диаметри 18–20 мм, чалкаш тукли. Ўрама баргчалари кўп, хурпайган, қиррали. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси августда етилади.


Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Чўлбайир тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта ва юқори қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Rare endemic species of south-western branches of the Hissar range. It is spread at the Chulbair mountains (Surkhandarya region). Inhabits stony slopes at the subalpine zone of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



279. ШУБҲАЛИ КАРРАК

Кузиния сомнительная / Cousinia haesitabunda Juz.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойда тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси унча чуқур бўлмаган чизикли, чалкаш тукли, сийрак баргли. Ёпирма барглари кам, чўзиқ наштарсимон, пастки томони оқиш қалин тукли, патсимон қирқилган, четлари тикансимон тишли. Поядаги барглари майда, бандсиз, пояни ярим қамраб туради. Саватчаси тухумсимон, диаметри 10–12 мм, туксиз. Ўрама баргчалари кўп, қаттиқ чармсимон. Тожи сариқ. Уруғи тескари тухумсимон, деярли тўрт қиррали. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах вилояти: Молгузар, Нурота тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли, майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсиб турган ерларининг ўзлаштирилиши ва чорва молларининг кўплаб боқилиши унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 2. Очень редкий эндемик западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебель неглубокобороздчатый, тонкопаутиновый, очень рыхлооблиственный. Листья в прикорневой розетке, немногочисленные, продолговатоланцетные, снизу-беловойлочные, перисторасчещенные, по краю колючезубчатые; стеблевые мелкие, сидячие, полустеблеобъемлющие. Корзинки яйцевидные, 10–12 мм в диаметре, голые. Листочки обёртки многочисленные, твердокожистые. Венчик жёлтый. Семянки обратнойяйцевидные, почти четырёхгранные. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. В Джизакской области: Мальгузарский и Нуратинский хребты.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Освоение территорий под сельхозугодья, чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны

не разработаны.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Nuratau ranges (Jizzakh regions). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: not protected.



280. ЭГРИТИКАН КАРРАК

Кузиния согнутоколючковая / *Cousinia campyloraphis* Tscherneva

Мақоми 2. Ҳисор тизмасининг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–50 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси тик, йўл-йўл чизиқли, қалин чалкаш тукли, ўрта қисмидан шохланувчи. Барглари чармсимон, ҳар икки томони қалин тукли. Ёпирма барглари бандли, чўзиқ эллипссимон, деярли бўлинган, тикан тишчали. Саватчаси кенг тухумсимон, диаметри 15–17 мм, тукли. Ўрама баргчалари кўп, қиррали, сиртидагилари пастга қараб эгилган. Тожи пушти. Уруғи кулранг. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор ва Китоб кўриқ-хоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 2. Редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли прямостоячие, полосатобороздчатые, паутинистоволоочные, высотой 30–50 см, от середины ветвистые. Листья кожистые, с обеих сторон войлочные; прикорневые – черешковые, продолговато-эллиптические, почти лопастные, колючезубчатые. Корзинки широкояйцевидные, 15–17 мм в диаметре, опушенные. Листочки обёртки многочисленные, килеватые, наружные – отогнутые. Венчик розовый. Семянки серые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.



Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кашкадарья.

Места обитания. Мелкоземистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском и Китабском государственных заповедниках.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Kashkadarya river basin (Kashkadarya region). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar and Kitab state reserves.




281. ҚИЗИЛГУЛЛИ КАРРАК

Кузиния красноцветная / *Cousinia rhodantha* Kult.

Мақоми 1. Ўзбекистоннинг жанубидаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25 см га етадиган икки йиллик ўт. Пояси йўл-йўл чизиқли, қисман чалкаш тукли, ўрта қисмидан шохланувчи, баргли шохчалари якка каллакчи. Барглари оч яшил, устки томони туксиз, пастки томони қалин тукли, четлари йирик



тикан тишли. Ёпирма барглари бандли, патсимон бўлинган. Поядаги барглари патсимон ўйилган, бандсиз. Саватчалари тухумсимон-юмалоқ, чалкаш тукли, диаметри 3 см. Ўрама баргчалари кўп, қиррали. Тожи пушти, ўрама баргчаларидан қисқа. Уруғи тескари тухумсимон, оч кулранг. Июнда гуллаб, меваси июнь-июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида, Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидаги қумлоқ ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълум тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмақда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 1. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 25 см. Стебель полосатобороздчатый, частично паутинистый, от середины

ветвистый, ветви одностолбчатые, облиственные. Листья светло-зелёные, сверху-голые, снизу войлочные, по краю крупноколючезубчатые; прикорневые листья черешковые, перистораздельные, стеблевые – перисторассечённые, сидячие. Корзинки яйцевидно-шаровидные, паутинистые, до 3 см в диаметре. Листочки обёртки многочисленны, килеватые. Венчики розовые, не выдающиеся. Семянки обратнойцевидные, светло-серые. Цветёт в июне, плодоносит в июне-июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы.

Места обитания. Суглинистые склоны в предгорьях.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к определенным местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.


Меры охраны. Специ-

альные меры охраны не разработаны.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range, the Baysun mountains (Surkhandarya region). Inhabits loamy slopes in foothills. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



232. СПРИГИН КАРРАГИ

Кузиния Спрыгина / Cousinia spryginii Kult.

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Икки йиллик ўсимлик. Пояси 20–40 см баландликда, тик, тўғри, қалин тукли, йўл-йўл, жўякли, шохлари баргли. Баргларининг устки томони ингичка, тўрсимон, пастки томони кулранг, қалин тукли, четлари тикансимон тишли, тескари тухумсимон. Саватчаси шарсимон диаметри 2,5–3,5 см (учи тўмтоқ) қалин тўрсимон тукли. Ҷрама баргчалари ўткир, узун, учбурчаксимон, узунлиги 4 см, тиканли. Гул ўрнининг дағал туклари силлиқ. Гултожи оқиш-сарик. Данакчаси тескари тухумсимон, қанотчаси қорамтир доғли. Май–июнда гуллаб, меваси августда етилади.

Тарқалиши. Ҳисор тизмасининг жануби-гарбий тармоқларида, Кўхитанг тизмасида ва Келиф-Шеробод тепаликларида тарқалган (Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари). Туркменистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Кулранг соз тупроқларда ўсади.

Сони. Оқтош қишлоғи атрофида 70 тупдан иборат 2 та популяцияси аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Табиий ерларнинг бузилиши ва молларнинг кўплаб боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [310, 321, 324, 325, 327].

Н.Т. Очилова.

Статус 1. Редкий узлокальный эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двулетник. Стебель 20–40 см высоты, прямой, паутинистый, полосато бороздчатый, ветви одноголовчатые, облиственные. Листья сверху тонко паутинистые, снизу серо войлочные, по краю колюче зубчатые, обратно яйцевидные. Корзинки шаровидные, 2,5–3,5 см диаметре (без остроконечий),

густо паутинистые. Листочки обертки заострены в длинные, трехгранные до 4 см длины колючки. Щетинки цветоложа гладкие. Венчики бледно желтые. Семянки обратно яйцевидные, крылатые с темными точками. Цветет в мае-июне, плодоносит в августе.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Кугитанг, Келиф-Шерабадская гряда. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Места обитания. Серые глины.

Численность. 2 популяции в окрестностях к. Акташ (70 растений).

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний и выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [310, 321, 324, 325, 327].

Н.Т. Очилова.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western branches of the Hissar range, the Kughitang, the Kelif-Sherabad range (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits grey clays. 2 populations nearby the village Aktash (about 70 plants) were found. Measures of protection: not protected.



283. ҒУЖТУҚ ҚАРПАК

Кузиния превосходная / Cousinia praestans Tscherneva et Vved.

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойда тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 1 м гача етадиган икки йиллик ўт. Пояси ғуж-ғуж тукли, йўл-йўл чизиқли, баргли, асосидан тарвақайлаб шохланган. Барглари нисбатан юмшоқ тиканли, устки томони чалкаш тукли, пастки томони кулранг қалин тукли. Поянинг пастки қисмидаги барглари бандсиз, пояни ярим қамраб туради, патсимон бўлакли, четлари нотекис тикансимон тишли; ўрта қисмидаги барглари бандсиз, бўлакли, четлари майда тикансимон тишли; юқоридагилари бандсиз, юмалоқроқ, четлари тикансимон тишли. Саватчалари юмалоқ, йирик, узунлиги 4 см, диаметри 3–3,5 см, қалин чалкаш тукли. Ўрама баргчалари қаттиқ. Тожи пушти рангли. Уруғи тескари тухумсимон, силлиқ, ялтироқ. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Қашқадарё сув ҳавзаси – Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмида, Зарафшон тизмасининг жанубий ёнбағридаги Оёқчи дарё водийсида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда кам тарқалган.

Қўпайиши. Уруғидан қўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Бу турнинг маълум ўсиш шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Двухлетнее травянистое растение высотой до 1 м. Стебель клочковатойлочный, полосатобороздчатый, облиственный, от самого основания раскидисто ветвистый. Листья сравнительно мягкие, умеренно колючие, сверху-тонкопаутиновые, снизу-серовойлочные; нижние стеблевые – сидячие, полустеблеобъемлющие, перистолопастные, по краю неравномерноколочезубчатые; средние – сидячие, лопастные, по краю мелкоколочезубчатые; верхние – сидячие, почти округлые, по краю колочезубчатые. Корзинки шаровидные, крупные, длиной около 4 см и 3–3,5 см в диаметре, густопаутиновые. Листочки обёртки жёсткие. Венчики розовые. Семянки обратнойцевидные, гладкие, блестящие. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Кашкадарьинская область: бассейн реки Кашкадарья – западные отроги Гиссарского хребта, долина реки Аякчи на южном склоне Зеравшанского хребта.

Места обитания. Каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлена.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [321, 324, 325, 327].

Ғ.М. Шерматов.

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Kashkadarya river basin: the western outskirts of the Hissar range, the Ayakchi river valley on the southern slopes of the Zeravshan range (Kashkadarya region). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



284. ҚОЯ КСИЛАНТЕМУМИ

Ксилантемум скальный / *Xylanthemum rupestre* (Popov ex Nevski) Tzvelev

Мақоми 1. Кўхитанг тизмасининг камёб, стенобионт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. 10–20 см баландликдаги ярымбутача, шохлари қўнғир тусли туклар билан қопланган. Барглари қўнғир-яшил, тукланган, 1–1,5 см узунликда, патсимон қирқилган. Саватчалари якка-якка, гуллари кам сонли, узунлиги 5–6 мм, эни 4–5 мм, цилиндр шаклида. Ўрама барглари тукланган, эллипс шаклида, учи тўмтоқ. Гуллари сарик, без тукли. Уруғлари 2,5 мм узунликда. Попуклари 1,2 мм узунликда. Июлда гуллайди, августда мевалайди

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Кўхитанг тизмаси.

Ўсиш жойи. 2600–3000 м баландликдаги қояларда ўсади.

Сони. 2001 йилда 50 тупи қайд этилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпайди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Реликт, петрофит эндемик.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза этилади.

Манбалар. [128, 310].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Статус 1. Редкий стенобионтный эндемик Кугитанга.

Краткое описание. Полукустарничек 10–20 см высоты, с бурыми опушенными веточками. Листья серо-зеленые, опушенные, 1–1,5 см длины, перисто-рассеченные. Корзинки одиночные, малоцветковые, 5–6 мм длины, 4–5 мм ширины, цилиндрические. Листочки обертки опушенные,

эллиптические, тупые. Цветы желтые, железистые. Семянки 2,5 мм длины. Хохолок 1,2 мм длины. Цветет в июле, плодоносит в августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: эндемик хребта Кугитанг.

Места обитания. Скалы (2600–3000 м).

Численность. Зарегистрировано 50 растений в 2001 году.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Реликтовый петрофильный эндемик.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [128, 310].

Ф.О. Хасанов.

Very rare endemic species of the Kughitang range. It is spread at the Kughitang range (Surkhandarya region). Inhabits rocks. 50 plants were found in 2001. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



285. БОБОТОҒ КЎКБОШИ

Мордовник бабатагский / *Echinops babatagensis Tschernowa*

Мақоми 3. Ўзбекистоннинг жанубидаги кичик майдонларда тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см гача етдиган кўп йиллик ўт. Пояси тик, жўякли, безчали ва момиқ тукли, шохланган, якка бошчали. Баргларининг устки томони безчали, пастки томони кулранг қалин тукли, йўғон томирли. Ёпирма барглари бандли, патсимон бўлинган, майда тишсимон тиканли. Поянинг пастки ва ўрта қисмидаги барглари ёпирма баргларига ўхшаш, аммо бандсиз. Саватчаларининг узунлиги 10–20 мм. Ўрама баргчалари 28–30 та, хаворанг. Уруғи чўзиқ, қалин сариқ тукли. Июль–август ойларида гуллаб, меваси август–сентябр да етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғ тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги оҳактошларда ва гипсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмокда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [332, 333].

И.И. Мальцев.

Статус 3. Очень редкий эндемик южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20–30 см. Стебли прямостоячие, бороздчатые, железистые, с войлочным опушением, ветвистые, одностолбчатые. Листья сверху густо-железистые, снизу – с резко выдающейся средней жилкой, тонкосеровойлочные. Прикорневые черешковые, перистораздельные, мелкоколючезубчатые. Нижние и средние стеблевые подобны прикорневым, носидячие. Корзинки длиной 10–20 мм. Обёртка состоит из 28–30 голубоватых листочков. Семянки густо-жёлтоволосястые, продолговатые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Известняки и гипсы среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.



Меры охраны. Не разработаны.

Источники. [332, 333].

И.И. Мальцев.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (the Surkhandarya region). Inhabits lime stones and gypses in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



286. ҚИСҚАМУЎЙ КЎКБОШ

Мордовник короткокисточковый / *Echinops brevipenicillatus* Tscherneva

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубий минтақасига хос жуда камёб тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–60 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси тик, баргли, юқори қисми шохланган, юза жўякли, оқиш қалин тукли. Барглари чармсимон, устки томони яшил, сийрак безчали, чалкаш тукли, пастки томони оқиш қалин тукли. Ёпирма барглари йирик, четлари бутун,

лиственный, в верхней части ветвистый. Листья кожистые, сверху – зелёные, рассеянно железистые, тонкопаутиновые, снизу – беловойлочные; прикорневые – крупные, цельнокрайные, длинночерешковые, кожистые; стеблевые – постепенно кверху уменьшающиеся, сидячие. Нижние стеблевые листья с маленькими ушками, продолговато-ланцетные. Корзинки шаровидные, около 5 см в диаметре. Обертка состоит из 16–19 гладких листочков. Венчик беловатый, глубокорассечённый, с железистой трубкой. Семянки густоволосистые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение.

Сурхандарьинская область: хребет Бабатаг. За пределами Узбекистана: Таджикистан.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород в предгорьях и нижнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала.

Приуроченность к выходам пестроцветных пород.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [332, 333].

И.И. Мальцев.

узун бандли, чармсимон. Поядаги барглари юқорига қараб кичрайиб боради, бандсиз. Поянинг пастки қисмидаги барглари кичик ўсимтали, чўзиқ наштарсимон. Саватчаси юмалоқ, диаметри 5 см атрофида. Ўрама баргчалари 16–19 та, силлиқ. Тожи оқиш, чуқур кесилган, найчаси безчали. Уруғи қалин тукли. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Боботоғ тизмасида тарқалган. Тожикистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки қисмидаги ва тоғ этакларидаги очик ола жинсларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Очиқ қолган ола жинсларда ўсанлиги учун улар чекланган майдонлардагина сақланиб қолган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [332, 333].

И.И. Мальцев.

Статус 2. Очень редкий вид южной части Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 30–60 см. Стебель прямостоячий, неглубокобороздчатый, беловойлочный, об-



Very rare species of the southern Uzbekistan. It is spread at the Babatag range (Surkhandarya region). Inhabits outcrops of gypseous rocks in foothills and the lower belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: stenobiont species. Measures of protection: not protected.



287. НУРОТА ЛЕПИДОЛОФАСИ

Лепидолофа нуратинская / *Lepidolopha nuratavica* Krasch.

Мақоми 3. Ғарбий Помир-Олойга хос ареали бўлинган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80–100 см га етадиган асосидан шохланувчи ярим бута. Йиллик шохчалари тўғри, қалин тукли, пастки қисми баргли, якка саватчали. Барглари кўкимтир-яшил, қисқа ётиқ тукли, нуқтасимон безчали, поянинг пастки қисмидаги ҳамда мевасиз шохларидаги барглари қисқа бандли, уч бўлакли, поянинг юқори қисмидаги барглари эса бандсиз. Саватчалари майда. Урама баргчалари цилиндрсимон, қисқа, ётиқ тукли. Гуллари сариқ, безчали. Уруғи ҳам безчали. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси август–сентябрда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд, Навоий, Сурхондарё вилоятлари: Нурота ва Кўхитанг тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмидаги тошли ва шағалли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Тўп-тўп бўлиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маҳаллий аҳоли томонидан ўтин сифатида кўп миқдорда кесиб олиниши ва чорва молларининг боқилиши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон ва Нурота кўриқхоналарида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [12, 117, 127].

Н.Ю. Бешко.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая с разорванным ареалом.

Краткое описание. Полукустарник, ветвящийся от основания, высотой 80–100 см. Годовые побеги прямые, прижато опушенные, в нижней части облиственные, с одиночными корзинками. Листья сизовато-зелёные, коротко прижато опушенные, точечно железистые, нижние стеблевые и листья стерильных побегов коротко черешковые, трёхрассечённые, выше по стеблю сидячие. Корзинки мелкие. Обертка цилиндрическая, коротко прижато опушенная. Цветки жёлтые, железистые. Семянки железистые. Цветёт в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Джизакской, Самаркандской, Навоийской и Сурхандарьинской областях: Кугитанг и Нуратинский хребет.



Места обитания. Каменистые и щебнистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается небольшими группами.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленная заготовка на топливо, выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском и Сурханском заповедниках.

Источники. [12, 117, 127].

Н.Ю. Бешко.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay with reducing area. It is spread at the Kughitang and Nuratau ranges (Jizzakh, Samarkand, Navoi and Surkhandarja regions). Inhabits stony slopes in the lower and middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive feedstock as firing, pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau and Surkhan state reserves.



288. ФЕДЧЕНКО ЛЕПИДОЛОФАСИ

Лепидолофа Федченко / *Lepidolopha fedtschenkoana* Knorring

Мақоми 3. Ғарбий Ҳисор ва Кўхитанг тизмаларида ўсувчи камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп пояли ярим бута. Барглари қалами, бутун, тукли. Саватчалари узун бандли. Гуллари сариқ, безчали. Уруғи майда. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси, Сурхондарё ҳавзаси (Токчиён), Кўхитанг тизмаси (Тангидевор қишлоғи атрофи, Тарамхо булоғи атрофи ва Боғлидара)да тарқалган. Туркманистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қоя ёриқларида, тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда яқка ҳолда ва тўп-тўп бўлиб тарқалган, 100 м² майдонга 15–20 та ўсимлик тўғри келади. Умумий сони аниқланмаган.

Места обитания. Расщелины скал, каменистые склоны в среднем поясе гор.

Численность. В природе встречается единичными экземплярами и популяциями, в которых на 100 м² насчитывается 15–20 растений. Общая численность не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены. Территория используется под интенсивный выпас.

Культивирование. С 1971г. культивируется в Ботаническом саду АН РУз. Продолжительность жизни в культуре 3–4 года.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [12, 117, 127].

И.В. Белолипов.



Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ. Ўсимлик тарқалган жойларда кўплаб чорва моллари боқилади.

Маданийлаштирилиши. 1971 йилдан буён ЎЗР ФА Ботаника боғида экиб ўстирилмоқда. Маданий шароитда у фақат 3–4 йил ўсади.

Муҳофаза чоралари. Сурхон кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [12, 117, 127].


И.В. Белолипов.

Статус 3. Редкий эндемик Западного Гиссара и Кугитанга.

Краткое описание. Многостебельный полукустарник высотой до 50 см. Листья линейные, цельные, опушенные. Корзинки сидят на длинных цветоносах. Цветки жёлтые, железистые. Семянки мелкие. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Сурхандарья (Такчиан); хребет Кугитанг – окрестности кишлака Тангидувал, родника Тарамхо и Бағлидара. За пределами Узбекистана: Туркменистан.

Rare endemic species of the western the Hissar and Kughitang ranges. It is spread at the Hissar range: the Surkhandarya river basin (Takchiyan); the Kughitang range: nearby the village Tangiduvall and the Taramkho spring (Surkhandarya region). Inhabits clefts of rocks, stony slopes in the middle belt of mountains. In nature, met with single specimens and populations (15–20 plants per 100 m²). Total number is unknown. Limiting factors: The territory is used for intensive pasturing. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



289. ВВЕДЕНСКИЙ ОЛИГОХЕТАСИ

Олигохета Введенского / *Oligochaeta vvedenskyi* (Popov) Tscherneva

Мақоми 3. Қизилкум ва Ўзбекистоннинг жанубий минтақасига хос камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Поялари жуда қисқа, асосидан шохланган, бир ёки бир нечта саватчали, бир йиллик ўт. Шохлари 7–15 см узунликда, ер бағирлаб ўсади, ётиқ жингалак-чалкаш тукли. Барглари кулранг, яшил, устки қисми ётиқ жингалак тукли. Илдизолди барглари бандли, чўзиқ тухумсимон, четлари ўйилган тишли, тиканли. Саватчаси битта ёки бир нечта, чўзиқ. Ўрама баргчалари наштарсимон, устки қисми жингалак тукли. Тожи оқиш. Уруғи 3 мм узунликда, ялтироқ. Апрель–май ойларида гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Бухоро вилоятлари, шунингдек, Қорақалпоғистонда учрайди. Помир-Олойда – Шеробод водийси (Учқизил тепалиги) ва Жанубий Қизилкумда тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларда ва тоғ этакларида, очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ортиқ боқирилиши, пичан сифатида ўрилиши ва махсус тупроқ шароитига мослашганлиги унинг камайишига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [329].

М. Тўлаганова.

Статус 3. Редкий эндемик юга Узбекистана и Кызылкума.

Краткое описание. Однолетнее травянистое растение. Стебель очень короткий, от основания ветвистый, с одной или несколькими корзинками. Ветви удлиненные, длиной 7–15 см, облиственные, стелющиеся, ребристые, прижатокурчавопаутиновые. Листья серо-зелёные, сверху-рассеянно-прижато-курчаво-волосистые. Прикорневые листья черешковые, продолговато-яйцевидные, по краю выемчатозубчатые. Корзинки одиночные или несколько, продолговатые. Листочки обёртки ланцетные, по спинке курчаво-волосистые. Венчики беловатые. Семянки длиной 3 мм, блестящие. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в мае.

Распространение. В Кашкадарьинской и Бухарской областях, Каракалпакстан: Памиро-Алай



– Шерабадская долина, горки Учкызыл, Южные Кызылкумы.

Места обитания. Останцы и подгорные пустыни, выходы пестроцветных пород.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Усиленный выпас, заготовка кормов, приуроченность к определённым местам обитания.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [329].

М. Туляганова.

Rare endemic species of the southern Uzbekistan and Kyzylkum. It is spread at the Pamir-Alay: the Sherabad Valley, the Uchkyzyl hills, the southern Kyzylkum (Kashkadarya and Bukhara regions, Karakalpakstan). Inhabits low mountains and submountane deserts, outcrops of gypseous rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: the intensive pasturing, feedstock. Measures of protection: not protected.



290. ТАРОҚСИМОН ОЛЬГЕЯ

Ольгея гребенчатая / *Olgaea pectinata* Iljin

Мақоми 2. Фарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 – 70 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари биттадан, йўғон. Барглари чармсимон, устки томони оч яшил, туксиз, пастки томони қалин тукли, узунчоқ ёки наштарсимон. Ёппирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари аста-секин барг бандига айланади. Қолган барглари бандсиз. Саватчасининг узунлиги 6–7 см, эни 4–5 см. Ўрама барглари кўп. Тожи тўқ қизил, узунлиги 35–50 мм. Уруғлари узунчоқ, қалами. Август ойида гуллаб, меваси сентябрда етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Фарбий Тянь-Шаннинг Угом тизмасида тарқалган. Қозоғистон ва Қирғизистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги тошли-шағалли ерларда, бутазорларда ва даштларда ўсади.



Сони. Угом тизмасидан бир марта йиғилган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Асосан, чорва молларининг боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Бироқ, Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудидаги популяциялари муҳофаза этилади.

Манбалар. [328].

М. Тўлаганова.

Статус 2. Редчайший эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Травянистый многолетник 30–70 см высоты. Стебли обычно одиночные толстые. Листья кожистые, сверху – светло-зеленые, голые, снизу – беловолочные, продолговатые или ланцетные. Прикорневые и нижние стеблевые листья постепенно переходят в черешок. Остальные листья сидячие. Корзинки 6–7 см длиной, 4–5 см шириной. Листочки обертки многочисленные. Венчик 35–50 мм длиной, темно-красный. Семянки продолговато-линейные. Цветет в августе, плодоносит в сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Западный Тянь-Шань: Угамский хребет. За пределами Узбекистана: Казахстан и Кыргызстан.

Места обитания. По каменисто-щебнистым склонам гор в кустарниковом поясе и сухих степях.

Численность. Собран один раз на Угамском хребте.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Основным фактором является интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [328]

М. Туляганова.

Rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the western Tien-Shan: the Ugam range (Tashkent region). Inhabits stony- slopes of mountains in in the belt of shrubs and dry steppes. Once it was collected in the Ugam range. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



291. НАШТАРСИМОН СЕРРАТУЛА

Серпуха ланцетолстная / *Serratula lancifolia* Zakirov

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойдаги жуда кам-ёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–30 см га етадиган кўп йиллик ўт. Пояси кўп, баргли, ингичка, туксиз, саватчасининг остигина бироз тукли, якка саватчали. Барги чармсимон, иккала томони ҳам яшил, туксиз, четлари бутун, ўйилган ёки тишли. Илдизолди ва поядаги барглари бандли, наштарсимон,



қолган барглари поя бўйлаб юқори кўтарилган сари кичиклаша боради, ингичка наштарсимон, бандсиз. Ўрама баргчалари кўп, чармсимон, учи юмалоқ. Тожи пушти. Етилмаган уруғлари туксиз. Июль–августда гуллаб, август ойида мева беради.

Тарқалиши. Самарқанд ва Жиззах вилоятлари: Молгузар ва Зарафшон тизмаларидаги тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги майда жинс тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариши сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 221, 330].

М.Б. Тиркашева.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 20–30 см. Стебли многочисленные, тонкие, голые, слегка опушенные под корзинкой, облиственные, одностоловые. Листья тонкокожистые, с обеих сторон зелёные, голые, цельные или реже выемчатые, зубчатые. Прикорневые и нижние стеблевые листья черешковые, ланцетные; остальные – к вершине стебля постепенно уменьшающиеся, узколанцетные, сидячие. Корзинки длиной до 20 см, продолговатые. Листочки обертки многочисленные, кожистые, наверху-округлые. Венчики розовые. Молодые семянки голые. Цветёт в июле–августе, плодоносит в августе.

Распространение. В Самаркандской и Джизакской областях: Мальгузарский и Зеравшанский хребты.

Места обитания. Каменистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [159, 221, 330].

М.Б. Тиркашева.

Very rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the Malguzar and Zeravshan ranges (Samarkand and Jizzakh regions). Inhabits stony slopes in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: not protected.



292. БУНГЕ ТАКАСОҚОЛИ

Козелец Бунге / *Scorzonera bungei* Krasch. et Lipsch.

Мақоми 2. Қизилқумдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи тугунаксимон йўғонлашган кўп йиллик ўт. Илдиз бўғизи қалин, малла тукли. Пояси 2–3 та, баъзан битта, шохланган, шохчалари якка саватчали, тукли. Барглари юмшоқ, ҳар икки томони ётиқ тукли, четлари текис ёки эгри-бугри. Илдизолди барглари кенг наштарсимон, эни 1,5–2 см, бандли. Поядаги барглари қалами, наштарсимон, бандсиз, пояни ярим қамраб олган. Саватчаси дастлаб цилиндрсимон бўлади, кейинчалик эса тескари чўққисимон шаклга киради. Мева тукканда саватчаси пастга қараб эгилади. Ҳама баргчалари кумушранг туклар билан қопланган. Гуллари сарғиш. Уруғи 6–7 мм узунликда, оқ момиқ тукли. Апрельда гуллаб, уруғи май ойида етилади.



Тарқалиши. Қорақалпоғистон: Қизилқумда Султон Увайс тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларнинг қояларида ва тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан ва вегетатив йўл билан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Муайян тупроқ шароитига мослашганлиги сабабли кам тарқалган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [164, 186, 189].

Г.А. Серакеева.

Статус 2. Редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Корень клубневидно-утолщенный. Корневая шейка рыжевато-серошерстистая. Стебли в количестве 2–3, реже одиночные, ветвистые, ветви с одиночными корзинками, опушенные. Листья мягкие, с обеих сторон прижатоопушенные, по краю плоские и слегка волнистые. Прикорневые листья широколанцетные, шириной 1,5–2 см, с черешками; стеблевые линейно-ланцетные, сидячие, слегка стеблеобъемлющие. Корзинки в молодом состоянии цилиндрические, позже обратноконические, в период плодоношения – поникающие. Листочки обёртки серебристо-опушенные. Цветки лимонно-жёлтые. Семянки длиной 6–7 мм, белошерстистые. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: Кызылкумы: останцовые горы Султан-Увайсдаг.

Места обитания. Каменистые склоны и скалы останцовых гор.

Численность. В 2009 г. отмечено всего 2 растения.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к гипсам.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [164, 186, 189]

Г.А. Серакеева.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Sultan-Uveysdag remnant hills (Karakalpakstan). Inhabits stony slopes and rocks of remnant hills. In 2009, 2 plants were found. Limiting factors: growing on gypseous slopes. Measures of protection: not protected.

293. БОЧАНЦЕВ ТАНАЦЕТОПСИСИ

Танацетопсис Бочанцева / *Tanacetopsis botschantzevii* (Kovalevsk.) Kovalevsk.

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубида жуда кичик майдонларда сақланиб қолган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 25–45 см орасидаги илдиз пояси йўғон, кўпбошчали кўп йиллик ўсимлик. Пояси кўп, пастки қисми сертук, камбарг. Илдизолди баргларининг узунлиги 10 см, эни 2 см, узун бандли, икки қарра патсимон бўлинган. Поядаги барглари кичрайган ва камроқ бўлинган. Ҳар бир пояда 3–8 тагача саватча жойлашган. Саватчалар узун ва ингичка бандларда ўрнашиб, ёйиқ шингилсимон тўпгул ҳосил қилади. Ўрама баргчалари сарғиш яшил рангли, қалин ётиқ тукли. Гули сариқ, қалин тукли. Июль ойида гуллаб, мева беради.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқлари (Бойсунтоғ, Яккабоғ дарёсининг юқори қисми)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги ёнбағир ва сурилмаларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [125, 310].

Ғ.М. Шерматов.

Статус 2. Очень редкий эндемик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 25–45 см, с утолщённым многоглавым корневищем. Стебли многочисленные, у основания шерстистоволочные, слабооблиственные. Прикорневые листья длиной до 10 см и шириной 2 см, на довольно длинных черешках, дважды перисторассеченные. Стеблевые листья уменьшающиеся и менее рассечённые. Корзинки в количестве 3–8 на одном стебле, собранные на очень длинных тонких ножках в рыхлое кистевидное соцветие. Листочки обёртки светло-жёлто-зеленоватые, густоприжато-войлочно-опушенные. Цветки жёлтые, густоопушенные. Цветёт и плодоносит в июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта, Байсунтау, верховья реки Яккабагдарья.

Места обитания. Склоны и осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сведений нет.




Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.


Источники. [125, 310].

Ғ.М. Шерматов.

Very rare endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the south-western outskirts of the Hissar range, the Baysuntau, the Yakkabagdarya river basin (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits slopes and mounds in the upper belt of mountains. Population is very rare. Measures of protection: protected in Hissar state reserve.



294. БУТКОВ ТРИХАНТЕМИСИ

Трихантемис Буткова / *Trichanthemis butkovii* Kovalevsk.

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 40 см га етадиган, йўғон, кўп бошчали, ёғочланган каудексли кўп йиллик ўт. Пояси кўп, камбаргли. Барглари қаттиқ, туксиз ёки якка-якка тукли, асосидан икки ёки уч қарра патсимон бўлинган, бандсиз. Саватчасидаги гуллари икки хил. Тилсимон уруғчи гуллари оқ, саватча ўртасидаги гуллари эса икки жинсли, сариқ. Ўрама баргчалари узун сийрак тукли. Уруғи узун оқ тукли. Июнда гуллаб, меваси июлда етилади.



Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмаси (Оқбулоқ дарёсининг ҳавзаси)да тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта ва пастки қисмларидаги қояларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Пичан тайёрлашда бу турнинг кўшиб ўрилиши унинг қисқариб боришига сабаб бўлмоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол давлат кўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [123, 315].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 40 см с толстым деревянистым многоглавым каудексом. Стебли довольно многочисленные, слабооблиственные. Листья жесткие, голые или с единичными волосками, от самого основания дважды или почти трижды перисторассеченные, сидячие. Корзинки гетерогамные. Язычковые цветки женские, белые. Дискосые цветки обоеполые, желтые. Листочки обёртки с длинными редкими волосками. Семянки опушены длинными редкими волосками. Цветёт в июне, плодоносит в июле.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет, бассейн реки Акбулак.

Места обитания. Скалы в среднем и нижнем поясах гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сенокосение.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Чаткальском заповеднике и Угам-Чаткальском национальном парке.

Источники. [123, 315].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range, the Akbulak river basin (Tashkent region). Inhabits rocks in the middle and lower belts of mountains. Population is very rare. Limiting factors: hay-mowing. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.

295. АНГРЕН УГАМИЯСИ

Угамия ангренская / *Ugamia angrenica* (Krasch.) Tzvelev

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 2–8 см га етадиган яримбутача. Кўп сонли поялари зич жойлашиб, гиламсимон чим ҳосил қилади. Барглари кўп, узунлиги 1,2 см, эни 0,6 мм гача бўлиб, зич жойлашган туклари кулранг-яшил тусга киради. Саватчалари якка-якка, жуда калта ва эгилган гулбандларда жойлашган. Гул баргчаларининг чети кўнғир, тўқ кўнғир хошияли. Най гулларининг тожбарги 4–5,5 мм узунликда. Уруғчалари 4–5,5 мм, кўндаланг жойлашган 10–15 та қовурғали бўлиб, улардан 5 таси сертук, алоҳида ажралиб туради. Июль–августда гуллаб, меваси август–сентябрда пишади.

Тарқалиши. Тошкент ва Наманган вилоятлари: Курама (Арашан, Жардан довони), Чотқол (Чотқол биосфера қўриқхонаси), Пскем (Оқсарсой) тизмаларида тарқалган. Ўзбекистондан ташқарида: Қозоғистон (Талас Олатоғи, Угом-Бахмалқўл тизмалари) ва Қирғизистонда (Санталаш тизмаси) тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг юқори қисмидаги тошли, шағалли ёнбағирликларда, гранит бўлақлари орасида, тўкилмалар атрофида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Чотқол биосфера қўриқхонасида ва Угом-Чотқол миллий табиат боғида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [138].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкое эндемичное растение Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Полукустарничек 2–8 см высоты, с толстым корнем. Стебли многочисленные. Листья серовато-зеленые от обильного опушения, многочисленные, до 1,2 см длины и 0,6 мм ширины, на коротких черешках, продолговатые, перисто-рассеченные. Корзинки одиночные, расположенные на коротких, изогнутых ножках. Листочки их по краю с буроватой, перепончатой каймой. Венчик трубчатых цветков 4–5,5 мм длины. Семянки 4–5,5 мм длины, с 10–15 продольными ребрами, из которых 5 выдаются обычно сильнее других, обильно волосистые. Цветет в июне–июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. В Ташкентской и Наманганской областях: Кураминский (Арашан, перевал Джардан), Чаткальский (Чаткальский биосферный заповедник), Пскемский хребты (Аксарсай). За пределами Узбекистана – Кыргызстан (Санталашский хребет), Казахстан (Таласский Алатау, Угамский хребет – Бахмаль-Куль).

Места обитания. На каменистых и щебнистых склонах, среди обломков гранитов, на осыпях сланцев в верхнем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Нет данных.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Чаткальского биосферного заповедника и Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [138].

К.Ш. Тожибаев.



Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Tashkent and Namangan regions: the Chatkal (Akbulak), the Kurama (Arashan), the Pskem (Aksarsay) ranges. Inhabits rocks and stony slopes in the upper belt of the mountains. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Chatkal biosphere reserve and the Ugam-Chatkal national park.



296. БЕЖИРИМ ЮРИНЕЯ

Наголоватка стройная / *Jurinea gracilis* Iljin

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг жанубига хос эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см атрофидаги кўп йиллик ўт. Поялари кўп, асоси оқиш, пахмоқ тукли, пастки қисми чалкаш ва сийрак безчали туклар билан қопланган, тик чизиқли (жўякли),



шоҳчалари якка каллакли. Барглари чўзиқроқдан нашитарсимонгача, четлари текис ёки сийрак тишли, ўткир, туксиз, безчали, устки томони ғадирбудур. Ёпирма барглариининг япроқлари бандига қараб торайиб боради. Поядаги барглари бандсиз, поя бўйлаб пастга қараб ёпишган. Саватчаси косачасимон, туксиз ёки сийрак чалкаш тукли. Ўрама баргчалари 4–5 қаторли, яшил, ички томонидагилари қирмизи рангли. Тожи пушти рангли, саватчанинг четидаги гуллари пастга қараб осилган, қалин безчали. Уруғи силлиқ. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасининг ғарбий тармоқларида, Бойсунтоғ ва Кўхитангда тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғнинг пастки ва ўрта қисмларида тошли ёнбағирларда ва очилиб қолган ола жинсларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўзига хос тупроқ шароитида ўсишга мослашганлиги учун кичик майдонларда сақланиб қолган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Сурхон давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Эндемик юга Узбекистана.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Стебли многочисленные, у основания шерстисто-беловолючные, в нижней половине паутинистые, рассеяножелезистые, продольно-бороздчатые, высотой до 50 см. Ветви одностолчатые. Листья от продолговатых до ланцетных, цельнокрайные или с расставленными зубцами, заострённые, голые, железистые, сверху-шероховатые; прикорневые – постепенно оттянутые в расширенный у основания черешок; стеблевые – сидячие, длинно и широко низбегающие. Корзинки чашевидные, голые или с отдельными паутинками. Листочки обёртки, 4–5-рядные, зелёные, внутренние – пурпурноокрашенные. Венчики розовые, краевые повислые, густо железистые. Семянки гладкие. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкардарьинской областях: Западные отроги Гиссарского хребта, Байсунские горы, Кугитанг.

Места обитания. Выходы пестроцветных пород, каменистые склоны в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Приуроченность к специфическим местам обитания.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Сурханском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Endemic species of the southern Uzbekistan. It is spread at the western Hissar, Baysun mountains, the Kughitang (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits outcrops of gypseous rocks, stony slopes in the lower and middle belt of mountains. Population is very rare. Limiting factors: stenobiont species. Measures of protection: protected in the Surkhan state reserve.



297. ДАҒАЛБАРГ ЮРИНЕЯ

Наголоватка шероховатоллистная / *Jurinea asperifolia* Ijlin

Мақоми 2. Ғарбий Помир-Олойнинг камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см га етадиган кўп йиллик ўт. Поялари кўп, тик, оддий, юпка қиррали, безчасимон тукли. Барглари яшил, устки томони бироз буришган ғадир-будур, пастки томони ингичка чалкаш тукли. Илдизолди ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, лирасимон. Поянинг ўрта қисмидаги барглари пасткидаги баргларига ўхшаш, лекин бандсиз, поянинг юқорисидаги барглари майдарок, деярли бутун, қалами. Саватчаси якка, кўп гулли. Сиртки ва ўртадаги ўрама барглари наштарсимон, устки томонидагилари тўқ яшил. Тожи пушти-қирмизи, ташқи томони безчали. Уруғи тескари пирамида-



симон, силлиқ. Июнь–июль ойларида гуллаб, меваси июль–августда етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор ва Зарафшон тизмасининг ғарбий қисмида тарқалган (Қизилсув, Эгрисув, Тўпаланг сув ҳавзалари, Тахта-Қорача довони).

Ўсиш шароити. Тоғнинг ўрта қисмидаги оҳақтошли ва тошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 80 см. Стебли (их несколько) прямостоячие, простые, тонкопродольноробристые, железистоволосистые. Листья зелёные, сверху морщинистые, шероховатые; снизу тонкопаутинистые; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, лировидные; средние стеблевые – подобны нижним, но сидячие; верхние – уменьшенные, почти цельные, линейные. Корзинки одиночные, многоцветковые. Листочки обёртки наружные и средние ланцетные, в верхней части темно-зелёные. Венчики розово-пурпурные, снаружи обычно с железками. Семянки обратнопирамидальные, гладкие. Цветёт в июне–июле, плодоносит в июле–августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейны рек Кызылсу, Игрису, Тупаланг; Зеравшанский хребет (около перевала Тахта-Карача).

Места обитания. Известняки и каменные осыпи в среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Rare endemic species of the western Pamir-Alay. It is spread at the western part of the Hissar and Zerafshan ranges: the Kyzylsu, the Igrisu, the Tupalang river basins, the Takhtakaracha pass (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits limestones and stony mounds in the middle belt of mountains. Population is very rare. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



298. ЗОКИРОВ ЮРИНЕЯСИ

Наголоватка Закирова / *Jurinea zakirovii* Iljin

Мақоми 1. Нурота тоғларида тарқалган жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи ёғочланувчи, кўп бошчали, кўп йиллик ўт. Поялари кам, узунлиги 50 см, оддий, тик чизиқли (жўякли), безчали, ярмидан юқориси баргсиз. Баргларининг устки томони ғадир-будур, пастки томони қалин безчали, йўгон томирли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, чўзиқ, патсимон бўлинган ёки патсимон тишли. Поянинг ўрта ва юқори қисмидаги барглари бандсиз, япроғининг пастки қисми поя бўйлаб (пастга қараб) ёнишган, четлари текис. Саватчаси кўп гулли. Ўрама баргчалари тўрт қиррали, сарғиш-яшил рангли. Тожи пушти рангли, ташқи томони безчали. Уруги тескари пирамидасимон, туксиз, силлиқ. Май ойида гуллаб, меваси июлда етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги шағалли, майда жинс тупроқли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уругидан ва бачкисидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ташқари кўп боқилиши туфайли камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат қўриқхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Нуратинских гор.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение. Корень деревянистый, многоглавый. Стебли малочисленные, высотой до 50 см,

простые, продольнобороздчатые, железистые, в верхней части безлистные. Листья сверху – шершавые, снизу – с сильно выдающейся центральной жилкой, густо железистые; прикорневые и нижние стеблевые – короткочерешковые, продолговатые, перистолопастные или перистозубчатые; средние и верхние стеблевые – сидячие, низбегающие, цельнокрайные. Корзинки много-



цветковые. Листочки обёртки четырёхгранные, желтовато-зелёные. Венчик розовый, снаружи железистый. Семянки обратнопирамидальные, голые, гладкие. Цветёт в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Джизакской и Навоийской областях: хребты Нуратау, Актау.

Места обитания. Мелкоземисто-щебнистые склоны среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное и вегетативное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the Nuratau mountains. It is spread at the Nuratau and Aktau ranges (Jizzakh and Navoi regions). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains. Population is very rare. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



299. МАРИЯ ЮРИНЕЯСИ

Наголоватка Марии / *Jurinea mariae* Pavlov

Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг жуда камёб эндемик ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 45 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси кам, тик қиррали, ғуж-ғуж чалкаш тукли. Барглари буришган, майда безчали, сийрак чалкаш тукли, пастки томони кулранг,



ингичка, чалкаш тукли ва безчали. Ёпирма барглари ва поянинг пастки қисмидаги барглари қисқа бандли, япроқлари ярмигача йирик тишли ёки бўлакли. Поянинг ўрта қисмидаги барглари ёпирма баргларга ўхшаш, бандсиз, юқоридагилари майдароқ. Ўрама баргчалари саватчага ёпишган, наштарсимон, қирмизи рангли. Тожи қирмизипушти рангли. Уруғи тескари пирамидасимон, силлик. Июль-август ойларида гуллаб, уруғ беради.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Писком тизмаси (Нанай қишлоғи атрофи)да тарқалган. Қозоғистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг юқори қисмидаги тошли сурилмаларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсиш жойи Уғам-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудига тўғри келади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 2. Очень редкий эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 45 см. Стебли многочисленые, продольнорребристые, клочковатопаутиновые, облиственные. Листья морщинистые, мелкожелезистые, рассеянопаутиновые, снизу сероватые, тонкопаутиновые, железистые; прикорневые и нижние стеблевые – короткочерешковые, в нижней половине-крупнозубчатые или лопастные; средние – стеблевые подобны прикорневым, но сидячие; верхние – уменьшенные. Листочки-обёртки прижатые, ланцетные, обычно все пурпурно окрашенные. Венчики пурпурно-розовые. Семянки обратнопирамидальные, гладкие. Цветёт и плодоносит в июле-августе.

Распространение. Ташкентская область: Пскемский хребет, посёлок Нанай. За пределами Узбекистана: Казахстан.

Места обитания. Каменистые осыпи в верхнем поясе гор.

Численность. Встречается редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Pskem range, nearby Nanai (Tashkent region). Inhabits stony slopes in the subalpine zone. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



300. САНГАРДАК ЮРИНЕЯСИ

Наголоватка сангардакская / *Jurinea sangardensis* Iljin

Мақоми 1. Ҳисор тизмасидаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 80 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Поялари камроқ, тик, якка бошчали, тик чизиқли (жўякли), сийрак безчали. Барглари устки томони яшил, бироз ғадир-будур, пастки томони кулранг, чалкаш тукли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, қолганлари бандсиз, япроғининг пастки қисми пояга ёпишган, тоқ патсимон, энг юқоридаги барглари ипсимон. Саватчаси цилиндрсимон. Ўрама баргчалари саватчага ёпишган, йўғон томирли. Тожи қирмизи-пушти рангли. Уруғи тескари пирамидасимон, туксиз, силлиқ. Июнда гуллаб, меваси июль-августда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё ва Қашқадарё вилоятлари: Ҳисор тизмасидаги Қизилсув, Сангардак ва Тўпаланг дарёлари ҳавзаларида ҳамда Бойсун тоғларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги ёнбағирларда майда жинс тупроқларда, арчазорларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўрикхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 1. Очень редкий эндемик Гиссарского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 80 см. Стебли немногочисленные, прямостоячие, одноголовчатые, продольно полосатобороздчатые, рассеянножелезистые. Листья сверху зелёные, слегка шероховатые, снизу – сероватые, тонкопаутиновые; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, остальные стеблевые – сидячие, низбегающие, непарно перисторассеченные, самые верхние – нитевидные. Корзинки цилиндрические. Листочки обертки прижатые, с выступающими жилками. Венчики пурпурно-розовые. Семянки обратнопирамидальные, голые, гладкие. Цветёт в июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях: Гиссарский хребет, бассейн рек Кызылсу, Сангардак и Тупаланг, Байсунские горы.

Места обитания. Мелкоземистые склоны среднего пояса гор, арчовники.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском заповеднике.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the Hissar range. It is spread at the Hissar range, the Kyzylsu, the Sangardak and Tupalang river basins, the Baysun mountains (Surkhandarya and Kashkadarya regions). Inhabits fine earth slopes in the middle belt of mountains, juniper stands. The quantity is unknown. Measures of protection: protected in the Hissar state nature reserve.



301. ҚУМЧИЛ ЮРИНЕЯ

Наголоватка песколюбивая / *Juginea psammophila* Iljin

Мақоми 3. Қизилқумдаги жуда камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 50 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси тик, кўп, кулранг чалкаш тукли, йўл-йўл жўякли, новдалари якка бошчали. Баргларининг ҳар икки томони кулранг-яшил, тукли, пастки томони қалин чалкаш тукли. Ёпирма ва поянинг пастки қисмидаги барглари бандли, патсимон бўлинган ёки патсимон ажралган. Поядаги бошқа барглари бандсиз, асоси пояга ёпишган, энг юқоридаги барглари қалами, бандсиз, четлари бутун, учи ўткир. Саватчаси қалин кулранг ётиқ тукли. Ўрама баргчалари саватчага ёпишган, наштарсимон четлари ғадир-будур. Тожи қирмизи пушти рангли, ташқи томони безчали. Уруғи тик жўякли. Май ойида гуллаб, меваси июнда етилади.

Тарқалиши. Навоий ва Бухоро вилоятлари: Қизилқумда Оқтоғ, Олтинтоғ, Қулжуктоғ этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қолдиқ тоғларнинг пастки қисмидаги тошли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг кўплаб боқилиши ва ўтларнинг ўриб олиниши оқибатида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Статус 3. Очень редкий эндемик Кызылкума.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 50 см. Стебли прямостоячие, многочисленные, сероватопаутиновые, полосатобороздчатые, одноголовчатые. Листья серо-зелёные с обеих сторон (но снизу гуще), паутинистоопушенные; прикорневые и нижние стеблевые – черешковые, обычно перистораздельные или даже перисторассеченные; стеблевые – сидячие, низбегающие; самые верхние линейные,

сидячие, цельные, заостренные. Корзинки прижато-серовойлочные. Листочки-обёртки плотно прижатые, ланцетные, по краю мелкошероховатые. Венчики пурпурно-розовые, снаружи железистые. Семянки продольно-бороздчатые. Цветёт в мае, плодоносит в июне.



Распространение. В Навоийской и Бухарской областях: Кызылкумы – подножия гор Актау, Алтынтау, Кульджуктау.

Места обитания. Каменистые склоны подножия останцовых гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас и заготовка кормов.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [105, 159, 331].

К.Ш. Тожибаев.

Very rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the Aktau, the Altyntau, the Kuljuktai mountains (Navoi and Bukhara regions). Inhabits stony slopes of foothills of remnant mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive overpasturing and feedstock. Measures of protection: not protected.



302. МАЙДАГУЛТОЖБАРГЛИ ЭРИГЕРАН

Мелколенестник триморфообразный / *Erigeron trimorphopsis* Botsch.

Мақоми 2. Чотқол тизмасидаги ғоят камёб ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 15–35 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси кўп. Ёпирма барглари-нинг узунлиги 2,5–11,5 см, эни 6–9 мм, тескари наштарсимон. Ҳрама баргчалари қалами, наштарсимон. Саватчасининг узунлиги 0,9–1,3 см. Гули пушти ёки бинафша рангли. Уруғи узунчоқ наштарсимон, дағал, тукли. Июль ойида гуллаб, меваси август–сентябрь ойларида етилади.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида – Кўксувда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари Қирғизистонда учрайди.

Ўсиш шароити. Тоғ минтақасининг юқори қисмидаги ўтлоқларда ўсади.

Сони. Табиатда жуда кам тарқалган, фақат бир худуддагина аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ортиқ боқилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган. Ўсиш жойлари Угам-Чотқол миллий табиат боғи худудида жойлашган.
Манбалар. [159, 295].

М. Тўлаганова.

Статус 2. Редчайший эндемик Чаткальского хребта.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение 15–35 см высотой. Корневище короткое, разветвленное. Стебли (их несколько) прямые, облиственные. Прикорневые листья 2,5–11,5 см длиной, 6–9 мм шириной, обратнoланцетные, на длинных черешках. Корзинка длиной 0,9–1,3 см, листочки-обертки линейно-ланцетные. Цветки лиловые или розовые. Семянки продолговато-ланцетные, опушены жестковатыми волосками. Цветет в июле, плодоносит в августе–сентябре.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет – Куксу. За пределами Узбекистана: Кыргызстан.

Места обитания. На субальпийских лугах в верхнем поясе гор.

Численность. Известен из одного пункта.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.



Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Места произрастания находятся на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [159, 295].

М. Туляганова.

Rare species of the Chatkal range. It is spread at the Chatkal range: Kuxsu (Tashkent region). Inhabits subalpine meadows in the upper belt of mountains. Collected in one location. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Ugam-Chatkal national park.



303. КРАШЕНИННИКОВ ВИКОАСИ

Викоа Крашенинникова / *Vicoa krasheninnikovii* Kamelin

Мақоми 3. Помир-Олой, Нурота тоғлари, Оқтоғ тизмасининг камайиб бораётган эндемик ўсимлиги.

Кисқача тавсифи. Бўйи 5 – 8 см бўлган, пояларининг асоси сертук, бир бошчали, кўп йиллик сербарг ўсимлик. Барглари бандсиз, эллипссимон, узунлиги 9–11 мм. Саватчасининг узунлиги 8–10 мм, диаметри 8 мм гача. Ўрама барглари кўп қаторли, баргчалари ингичка, эллипс шаклида,

ромчатые. Все цветки трубчатые, светло-желтые, голые. Семянки около 2 мм длины, густо прижато волосистые, хохолок 6–7 мм длины. Щетинок 20–25. Цветёт и плодоносит в июне–августе.

Распространение. Навоийская область: горы Актау.

Места обитания. Трещины скал.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.



ташқи баргларининг чети қалинроқ (терисимон), ичкиларининг чети эса қалин, пардасимон, попукли. Гуллари найсимон, очсариқ тусли, туксиз. Пистасининг узунлиги 2 мм, қалин ётиқ тукли. Июнь–август ойларида гуллаб, уруғ ҳосил қилади.

Тарқалиши. Навоий вилоятининг Оқтоғ тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қояларнинг ораларида, ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқ маълумотлар йўқ.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар.[110, 159].

Н.Ф. Русанов.

Статус 3. Узкий эндемик Нуратинских гор, хребет Актау.

Краткое описание. Многолетнее, 5–8 см высоты, с одноголовыми стеблями. Листья эллиптические, 9–11 мм длины. Корзинки 8–10 мм длины, до 8 мм в диаметре. Обвертки многорядные, листочки околоцветника узкоэллиптические, бах-

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [110, 159].

Н.Ф. Русанов.

Rare endemic species of the Aktau range. It is spread at the Aktau range (Navoi region). Inhabits rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: unknown. Measures of protection: not protected.



304. ТУКСИЗ ҚАРҒАТИРНОҚ

Коелпиния голоплодная / *Koelpinia leiocarpa* Popov

Мақоми 2. Ғарбий Ҳисордаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–25 см оралиғидаги бир йиллик ўт. Пояси пастки қисмидан шохланган, ғуборли ёки туксиз, баргли. Барглари ипсимон. Саватчалари узун, ингичка гулпояларда ўрнашган. Гуллари сариқ. Ташқи ўрама барглари қалами-бигизсимон. Уруғи сал эгилган, учига қараб торайиб боради, узунлиги 12–13 мм. Апрельда гуллаб, меваси май ойида етилади.

Тарқалиши. Қашқадарё вилояти: Ҳисор тизмасининг ғарбий қисмидаги Яккабоғ дарёсининг юқори қисмида, Тошқўрғон қишлоғи теварақларида ҳамда Гузор тоғи этакларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларидан то ўрта қисмигача бўлган гипсли ёнбағирларда ўсади.

Сони. Жуда кам тарқалган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг ҳаддан ортиқ боқилиши натижасида камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ҳисор давлат кўрикхонасида муҳофаза қилинади.

Манбалар. [126, 159].

Н.Ф. Русанов.

Статус 2. Редкий эндемик Западного Гиссара.

Краткое описание. Однолетник высотой 15–25 см. Стебель от самого основания разветвленный, с тонким налётом или голый, облиственный. Листья нитевидные. Корзинка на длинных тонких цветоносах. Цветки жёлтые. Наружные листочки обёртки линейно-шиловидные. Семянки слегка согнутые, к верхушке сужающиеся, длиной 12–13 мм. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Кашкадарьинская область: западные отроги Гиссарского хребта – верховья реки Яккабагдарья, окрестности кишлака Ташкуртан, предгорья горы Гузар.

Места обитания. Гипсированные склоны от предгорий до среднего пояса гор.

Численность. Встречается очень редко.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Чрезмерный выпас.


Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Гиссарском государственном заповеднике.

Источники. [126, 159].

Н.Ф. Русанов.

Rare endemic species of the western Hissar range. It is spread at the western outskirts of the Hissar range: the Yakkabagdarya, nearby the villages Tashkurgan and Guzar (Kashkadarya region). Inhabits gypseous slopes from foothills to the middle belt of the mountains. Population is very rare. Limiting factors: overpasturing. Measures of protection: protected in the Hissar state reserve.



305. НУРОТА ЎЛМАСЎТИ

Бессмертник нуратавский / *Helichrysum nuratavicum* Krasch.

Мақоми 2. Нурота тоғларида ўсувчи камёб эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Кўп йиллик ўт ўсимлик, бўйи 10–20 см, наштарсимон тукли. Мевасиз поялари билан чим ҳосил қилади. Поялари кўп эмас, оддий, тик ёки ёнбошлаб ўсади. Барглари бандсиз, навбат билан ўрнашган, қалами, узунлиги 1,5–2,5 см, эни 1–2 мм. Саватчасимон ёки ингичка кўнғироқсимон, 2–6 тадан тиғиз бошчасимон қалқон тўпгулда ўрнашган. Ўрама барглари 5–8 қатор, кетма-кет ва тиғиз ўрнашган, ташқари қаватдагилари қалин тукли. Гуллари сариқ. Июнь-июлда гуллаб, меваси июль-август ойларида етилади.

Тарқалиши. Жиззах, Навоий ва Самарқанд вилоятлари: Нурота ва Оқтоғ тизмаларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг 1200–2000 м баландликдаги пастки ва ўрта қисмидаги тошли-чақиртошли ёнбағирлардаги ҳар хил ўтли шувоқзорлар ва шувоқгаллалари жамоаларда ўсади.

Сони. Сийрак ҳолда учрайди. Якка-якка ҳолда ва кичик гуруҳлар ташкил қилиб ўсади.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимликнинг йиғиб олиниши ва чорва боқилиши туфайли камайиб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Нурота давлат кўриқхонасида муҳофаза қилинади. Популяцияларини назорат қилиш керак.

Манбалар. [18, 113, 203, 289].

Н.Ф. Русанов.

Статус 2. Редкий эндемик Нуратау.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой 10–25 см, покрытое густым войлочным опушением. Листья сидячие, очередные, линейные, 1,5–2,5 см длиной и 1–2 мм шириной. Корзинки мелкие, 4–5 мм длиной и 3–4 мм шириной, обратноконические или узко-колокольчатые, в числе 2–6, собраны в плотный головчатый щиток. Листочки оберки 5–8-рядные, плотно черепитчато расположенные, наружные по спинке, густо-паутинисто опушенные. Цветки желтые. Цветет в июне-июле, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Джизакской, Навоийской и Самаркандской областях: хребты Нуратау и Актау.

Места обитания. Произрастает на каменисто-щебнистых склонах (1200–2000 м).

Численность. Встречается спорадически, не большими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сбор растений и чрезмерный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется на территории Нуратинского государственного заповедника.

Источники. [18, 113, 203, 289].

Н.Ф. Русанов.

Rare endemic species of the Nuratau mountains. It is



spread at the Nuratau and Aktau ranges (Jizzakh, Navoi and Samarkand regions). Inhabits stony slopes (1200–2000 m). The quantity is unknown. Limiting factors: collecting of plants and pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



ҚўНҒИРОҚГУЛДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ – CAMPANULACEAE

306. УЛУҒВОР КЎЗАГУЛ

Островския величественная / *Ostrowskia magnifica* Regel

Мақоми 1. Марказий Осиёнинг камёб, реликт ўсимлиги.

Қисқача тавсифи. Бўйи 170 см гача етадиган кўп йиллик ўт. Пояси ғовак, тик. Барглари ҳалқа ҳосил қилиб ўрнашган, тухумсимон, чўзиқроқ, йирик тишли, кўкимтир. Косачалари ингичка қалами-наштарсимон бўлакли, узунлиги 5 см гача. Тожи оч бинафша рангли, баъзан оқ, узунлиги 8–10 см, бўлаклари тухумсимон, найчасидан қисқа. Меваси кўсакчасимон. Уруғи чўзиқ тухумсимон. Май–июнь ойларида гуллаб, меваси июнь–июлда етилади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти: Ҳисор тизмаси (Тўпаланг ва Шарғун дарёларининг ҳавзалари)да тарқалган. Тожикистонда, Қозоғистонда ва Шимолий Афғонистонда ҳам учрайди.

Ўсиш шаронти. Тоғларнинг ўрта қисмидаги йирик тошли сурилмаларда, қояларнинг сояларида ҳамда зарангзорларнинг чеккаларида ўсади.

Сони. Табиатда тўп-тўп (50 туп атрофида) бўлиб тарқалган. Умумий сони 30 000 тупдан ошмайди.

Кўпайиши. Уругидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Гуллари ва илдизларининг йиғиб олиниши ҳамда уруғ маҳсулдорлигининг пастлиги натижасида камайиб бормоқда.

Маданийлаштирилиши. Марказий Осиё республикалари ва чет эл ботаника боғларида муваффақиятли ўстирилмоқда. Уругидан экилганда, 4–5 йилли гуллайди.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [156–159, 303].

У.Х. Қодиров.

Статус 1. Редкий реликт Центральной Азии.

Краткое описание. Многолетнее травянистое растение высотой до 170 см. Стебель голый, прямой. Листья в мутовках, яйцевидные, продолговатые, крупно-зубчатые, сизоватые. Чашечка с узколинейно-ланцетными долями, длиной до 5 см. Венчик грязновато-сиреневый, реже – белый, длиной 8–10 см с яйцевидными лопастями, намного короче трубки венчика. Плод – коробочка. Семена яйцевидно-продолговатые. Цветёт в мае–июне, плодоносит в июне–июле.

Распространение. Сурхандарьинская область: Гиссарский хребет – бассейн реки Тупаланг и Шарғунь. За пределами Узбекистана: Таджикистан, Казахстан, Северный Афганистан.

Места обитания. Крупнообломочные осыпи, в тени скал, опушки кленовых лесов в среднем поясе гор.

Численность. Встречается спорадически небольшими (не более 50 экземпляров) группами. Общая численность не превышает 30 тысяч особей.

Размножение. Семенное.



Причины изменения численности и ареала. Сбор цветов, выкапывание клубней и низкая семенная продуктивность.

Культивирование. Успешно культивируется в ботанических садах Центральной Азии и за рубежом. При выращивании из семян зацветает на 4–5 году жизни.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [156–159, 303].

У.Х. Қодиров.

Rare relict species of Middle Asia. It is spread at the His-sar range: the Tupalang and Shargun rivers basins (Surkhandarya regions). Inhabits large-disintegrated rock mounds, in the shadow of trees, edges of maple forests in the middle of mountainous zone. Small groups can be found sporadically (up to 50 plants). Total number does not exceed 30 thousand specimens. Limiting factors: picking of flowers, digging up of bulbs and low seed productivity. Measures of protection: not protected.



307. ЖУНҒОР ҚУМСЎТАСИ, ЦИНОМОРИЙСИ

Циноморий джунгарский / *Synomorium songaricum* Rupr.

Мақоми 2. Ўзбекистон учун камёб тур.

Қисқача тавсифи. Қизил-бинафша рангли текинхўр ўсимлик. Бўйи 7–20 см, йўғонлиги 1,5–3 см, учбурчак тангачалар билан қопланган, узунлиги 3–5 мм. Тўпгули жуда тиғиз, тўғнағичсимон, цилиндрсимон. Гуллари зич жойлашган. Гулқўрғон бўлаklarининг узунлиги 2–4 мм. Чангчисининг чангдони билан узунлиги 2,5 мм, уруғчисиники 2–3 мм. Меваси шарсимон, эни 1,25–1,5 мм. Май-июнда гуллайти ва мева тугади.

Тарқалиши. Сурхондарё вилояти, Қорақалпоғистон: Кўхитангнинг тоғолди қисмлари ва Устюртда тарқалган. Ўзбекистондан ташқари, Туркменистон, Тожикистон, Эрон, Афғонистон ва Мўғулистонда ҳам ўсади.

Ўсиш шароити. Қумли ва ола жинсли тупроқларда ўсади.

Сони. 2009 йили Шўроб атрофида 10 туп, Келиф-Шеробод тепаликлариди 12 туп борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Аниқланмаган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [134, 159].

Ф.Ў. Ҳасанов.

Распространение. Сурхандарьинская область: предгорья Кугитанга; Каракалпакстан: плато Устюрт. За пределами Узбекистана – Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан, Иран, Афганистан, Монголия.

Места обитания. Песчаные почвы и пестрорастения.

Численность. В 2009 году зарегистрировано 10 растений в окрестности кишлака Шуроб, 12 – на Келиф-Шерабадской гряде.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Не установлены.


Культивирование. Нет сведений.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [134, 159].

Ф.О. Хасанов

Rare species in Uzbekistan. It is spread at the Kughitang range, the Ustyurt Plateau (Surkhandarya region, Karakalpakstan). Inhabits sands and gypseous slopes. 10 plants were found in 2009, nearby the village Shurob, 12 – on the Kelif-Sherabad range. Measures of protection: not protected.



Статус 2. Редкий для Узбекистана вид.

Краткое описание. Пурпурно-фиолетовое паразитическое растение (на корнях *Salsola dendroides*). Стебель 7–20 см высоты, 1,5–3 см толщины, покрытый прижатыми треугольными чешуйками 3–5 мм длины. Соцветие очень плотное, булабовидное, цилиндрическое. Цветы тесно расположенные, не выдающиеся. Листочки околоцветника 2–4 мм длины. Тычинки с пыльниками 2,5 мм длины. Пестик 2–3 мм длины. Плод шаровидный 1,25–1,5 мм в диаметре. Цветет и плодоносит в мае–июне.



ҒОВЗАБОНДОШЛАР ОИЛАСИ – СЕМЕЙСТВО БУРАЧНИКОВЫЕ – BORAGINACEAE

308. МАЙДА МОВИЙГУЛ

Липучка мелкая / *Lappula parvula* Nabiev et Zakirov

Мақоми 2. Ўзбекистоннинг шимолида тарқалган, ареали қисқариб бораётган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 10–15 см, пояси оддий ёки бироз шохланган бир йиллик ўт. Барглари учли наштарсимон ёки чўзиқроқ нишли, дағал туклар билан қопланган, асосан, поясининг пастки қисмида жойлашган. Тўпгули сийрак мевали, 2–3 см узунликда, мева банди узунроқ (пасткилари 1,5 см гача боради), асосан, пастга қайрилган. Косачаси 1–2 мм узунликда. Тожбарги кўк, 2–3 мм узунликда, эгилган қисми нозик кўнғироқсимон. Меваси пирамида шаклидаги 2,5–3 мм ли ёнғоқчалардан иборат. Ёнғоқчаларидан 1 мм кўтарниб турувчи устунчалари бор. Апрельда гуллаб, май ойида мевалайди

Тарқалиши. Қорақалпоғистондаги Султон Увайс тоғида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғ этакларида, қумлоқ тупроқларда ўсади.

Сони. Жуда камёб, кичик-кичик тўплари онда-сонда учрайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик кўпайишига салбий таъсир кўрсатмоқда.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [24, 201. 209, 246].

О.Қ. Ҳожиматов.

Статус 2. Эндемик Северного Узбекистана с сокращающимся ареалом.

Краткое описание. Однолетнее растение с простым или слабоветвистым стеблем, высотой до 10–15 см. Ланцетные или продолговато-ланцетные волосисто-щетиновые листья сосредоточены в основном в нижней части стебля. Плодущие завитки рыхлоплодные, длиной 2–3 см, плодоножки удлинённые (нижние достигают 1,5 см), отклонённые, часто дуговато вниз отогнутые. Чашечка длиной 1–2 мм. Венчик синий, длиной 2–3 мм, с узким колокольчатым отгибом. Плоды – орешки пирамидальные, длиной 2,5–3 мм, яйцевидно-продолговатые, с продолговатым диском. Столбик поднимается на 1 мм над верхушками орешков. Цветёт в апреле, плодоносит в мае.

Распространение. Каракалпакстан: горы Султан-Увайс.

Места обитания. Супесчаные почвы в предгорьях останцовых гор.

Численность. Очень редок, встречается спорадически небольшими популяциями.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [24, 201. 209, 246].

О.К. Ҳожиматов.

Endemic species of the northern Uzbekistan with the reducing area. It is spread at the Sultan-Uizdag mountains (Karakalpakstan). Inhabits sandy loam in foothills of remnant mountains. Very rare, small populations can be found sporadically. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: not protected.



309. НУРОТА МОВИЙГУЛИ

Липучка нуратинская / *Lappula nurativica* Nabiev et Zakirov

Мақоми 2. Нурота тоғида учрайдиган камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30–40 см, бир йиллик ўт. Илдизолди барглари кўп ва қалин, кенг наштарсимон, узунлиги 3–6 см, эни 3–5 мм, чизиқли поясининг узунлиги 1,5 см, кулранг тукли. Мевалаётган гажак тўпгули 10–15 см узунликда, рўваксимон зич жойлашган. Мева банди тўғри ёки бироз орқага қайрилган, 2–3 мм узунликда. Мевалардаги тўмтоқ косача бўлаклари мева асосига ёпишган. Гултожи ҳаворанг. Ёнғоқчаси тез тўкилувчан, чўзиқроқ, гардишида майда тиканли бўртмачалари бор. Устунчаси пишиб етилган ёнғоқчалар орасида бутунлай кўринмайди. Июнь–июль ойларида гуллайди ва мевалайди.



Тарқалиши. Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятлари: Нурота тизмасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг пастки ва ўрта қисмида тошли-шағалли ёнбағирларда ва қояларда ўсади.

Сони. Жуда кам миқдордаги тўплари биридан узоқ бўлган кичик майдонларни эгаллайди.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик кўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.
Муҳофазачоралари. Нурота давлат кўриқхонасида ўсади.

Манбалар. [24, 201. 209, 246].

Н.Ю. Бешко.

Статус 2. Узкий эндемик хребта Нуратау.

Краткое описание. Однолетнее растение, высотой 30–40 см. Листья прикорневые в густой розетке, широколанцетные, длиной 3–6 см, шириной 3–5 мм, стеблевые линейные, длиной 1,5 см, сероволосистые. Плодущие завитки длиной 10–15 см, густые, метельчато расположенные. Плодоножка длиной 2–3 мм, прямая или слегка отогнутая. Доли чашечки на плодах прижаты к основанию плода, тупые, венчик голубой. Орешки быстро опадающие, продолговатые. Диск усеян мелкими шиповатыми бугорками. Столбик скрыт между свободными верхушками орешков. Цветёт и плодоносит в июне–июле.

Распространение. Хребет Нуратау (Джизакская, Самаркандская и Навоийская области).

Места обитания. Каменисто-щебнистые склоны и скалы в нижнем и среднем поясе гор.

Численность. Встречается редко, спорадически, единичными экземплярами или небольшими группами по несколько растений. Локальные популяции занимают очень малую площадь и удалены друг от друга.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Охраняется в Нуратинском государственном заповеднике.

Источники. [24, 201. 209, 246].

Н.Ю. Бешко.

Endemic species of the Nuratau range. It is spread at the Nuratau range (Jizzakh, Samarkand and Navoi regions). Inhabits stony and gravelly slopes and rocks in the lower and middle belts of mountains. Single specimens or small populations occur sporadically. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: protected in the Nuratau state reserve.



310. ОҚТОҒ МОВИЙГУЛИ

Липучка актуаская / *Lappula aktaviensis* Popov et Zakirov

Мақоми 1. Қизилқумдаги қолдиқ тоғларда ўсадиган эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бўйи 30 см, тик ўсувчи, поясининг юқори қисми рўваксимон шохланган икки йиллик ўт. Илдизолди барглари кенг кураксимон, уруғлаш вақтида қуриб қолади. Поядаги барглари кенг чизиқли, пояси каби кулранг дағал туклар билан қопланган. Мевалаётган гажак тўпгули зич рўваксимон, 3–5 см узунликда, мева банди ва косачаси кулранг. Гули хаворанг, қайрилма қисми ясси. Ёнғоқчаси чўзиқ, 2,5–3 мм узунликда, усти майда тиканли бўртмалар билан қопланган. Устунчаси деярли кўринмайди. Гинофори (уруғдони) очиқ ҳолда кўриниб туради. Апрель ва май ойларида гуллаб мева беради.

Тарқалиши. Навоий вилояти: Қизилқумдаги Оқтоғ ва Бўкантоғ қолдиқ тоғларида учрайди.

Ўсиш шароити. Тошли-шағалли ёнбағирлардаги қоятошлар орасида ва ола тусли асосий тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимлик сонининг кўпайишига салбий таъсир кўрсатади.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [24, 201, 209, 246].

О.Қ. Ҳожиматов.

Статус 1. Узколокальный эндемик останцовых гор Кызылкума.

Краткое описание. Двулетнее растение с прямостоячим, вверху метельчатоветвистым стеблем, высотой до 30 см. Прикорневые листья широколопатчатые, к плодоношению засыхающие, стеблевые широколинейные, серые, как и стебель, от щетинистого опушения. Плодушие завитки метельчатые, густые, длиной 3–5 см, плодоножка и чашечка серопушистые. Венчик голубой с плоским отгибом. Орешки длиной 2,5–3 мм, продолговатые, усеяны мелкими шиповатыми бугорками. Столбик еле заметен, гинофор открытый. Цветёт и плодоносит в апреле–мае.

Распространение. Навоийская область: Кызылкум – останцовые горы Актау и Букантау.

Места обитания. Каменисто-щелнистые склоны, скалистые и пестроцветные выходы коренных пород.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Интенсивный выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [24, 201, 209, 246].

О.К. Хожиматов.

Rare endemic species of the Kyzylkum. It is spread at the Kyzylkum: the low mountains Aktau and Bukantau (Navoi region). Inhabits stony slopes, gypsaceous outcrops of bed-rocks. The quantity is unknown. Limiting factors: intensive pasturing. Measures of protection: not protected.



Мақоми 2. Ғарбий Тянь-Шаннинг ўта камёб эндемик тури.

Қисқача тавсифи. Бўйи 60 см, поясининг юқори қисми тарвақайлаб шохланган кўп йиллик ўт. Поядаги барглари бандсиз, 4–9 мм узунликда, четлари ва уч қисми сийрак киприксимон тукли. Тўпгули ғовак-рўваксимон, гулли шохчалари қисқа, юқори қисмидаги зич гажак гули сертук, гулбанди 5–7 мм узунликда. Косачаси чалкаш тукли, қиррали пирпираклари тожнайчасидан калта. Гули сарғиш-ҳаворанг, 13–16 мм узунликда, найчаси сарғиш 7–10 мм узунликда, тож бўлаклари тўғри, чўзиқ чизиқли. Устунчаси узун, сершоҳ. Ёнғоқчаси тухумсимон, гардиши силлиқ, туксиз. Ён қирралари майда тишли, учида лангарсимон тиканчалари бор. Май–июнь ойларида гуллайди ва мевалайди.

Тарқалиши. Тошкент вилояти: Чотқол тизмасида Сўқоқ дарёси водийсида (Мискансой); Қурама тизмасида Тўқмоқ довони, Абжас сойининг юқори қисмида; Угом тизмасида, Майдонтол дарёси ҳавзасида тарқалган.

Ўсиш шароити. Тоғларнинг ўрта қисмидаги қоятош ёриқларида ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Чорва молларининг муттасил боқилиши ўсимликнинг кўпайишига салбий таъсир этган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Ўсимлик ўсаётган жойлар Угом-Чотқол миллий табиат боғи ҳудудида кўриқланади.

Манбалар. [175, 211].

О.Қ. Ҳожиматов.

Статус 2. Узколокальный эндемик Западного Тянь-Шаня.

Краткое описание. Многолетнее, в верхней части растопыренно-ветвящееся растение, высотой 60 см. Стеблевые листья сидячие, длиной 4–9 мм, по краю и на вершине рыхлореснитчатые. Соцветие рыхлометельчатое. Цветущие ветви короткие, в верхней части с густыми завитками, паутинистоопушенные. Цветоножка длиной 5–7 мм. Чашечка паутинистоволоочная, с ланцетными лопастями, короче трубки венчика. Венчик желтовато-голубоватый, длиной 13–16 мм с желтоватой трубкой длиной 7–10 мм, лопасти венчика прямые, продолговато-линейные. Столбик длинноветвящийся. Орешки яйцевидные: диск голый, гладкий; крыло по краю мелкозубчатое с якорными шипиками на зубчиках. Цветёт и плодоносит в мае-июне.

Распространение. Ташкентская область: Чаткальский хребет – долина реки Сукок (Мискансай); Кураминский хребет – перевал Токмак, верховья реки Абжасай; Угамский хребет – выше устья реки Майдантал.

Места обитания. Расщелины скал в среднем поясе гор.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Выпас.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Часть популяций произрастает на территории Угам-Чаткальского национального парка.

Источники. [175, 211].

О.К. Ҳожиматов.



Endemic species of the western Tien-Shan. It is spread at the Chatkal range: the Sukok river valley (Miskansay); the Kurama range: the Tokmak pass, Abdzhasay, the Ugam Range: Maidantal (Tashkent region). Inhabits clefts of rocks in the middle belt of mountains. The quantity is unknown. Limiting factors: pasturing. Measures of protection: some populations protected in the Ugam-Chatkal national park.



312. БУХОРО ҒИЧМОЛАСИ

Гелиотроп бухарский / *Heliotropium bucharicum* B. Fedtsch.

Мақоми 1. Жануби-ғарбий Помир-Олойга хос, сони қисқариб бораётган, эндемик тур.

Қисқача тавсифи. Бўйи 20–50 см, бир йиллик ўсимлик. Пояси тик, қалин оқ тукли. Барглари бандсиз ёки қисқа бандли, юмалоқ-тухумсимон, узунлиги ва эни 3–5 см атрофида, оқ момиқ тукли, асоси юмалоқ ёки юраксимон. Гажак тўпгули бир томонга қайрилган, гуллари жуфт ёки 3–4 тадан иборат, икки уяли, 2–6 см узунликда, мевалаганда яна ҳам узаяди, оқ қалин туклар билан қопланган. Гулкочаси қалин тукли, узунлиги 3 мм атрофида, косача бўлаклари тўмтоқ. Гули сариқ. Устунчаси қисқа ва туксиз. Тумшукчаси конус-бигизсимон, устунчадан 2–3 марта узун. Ёнғоқчаси силлиқ, туксиз, чўзиқ, 1–5 мм узунликда. Май-июнда гуллаб, июль-августда мевалайди.

и почти такой же ширины, белошерстистые, при основании округлые или сердцевидные. Завитки односторонние, парные или по 3–4, густые, двугнёздые, длиной 2–6 см, при плодах удлинённые, белошерстистые. Чашечка войлочная, длиной около 3 мм, с тупыми линейными долями. Венчик жёлтый. Столбик голый, короткий. Рыльце коническо-шиловидное, в 2–3 раза длиннее столбика. Орешки гладкие, голые, продолговатые, длиной 1–5 мм длины. Цветёт в мае-июне, плодоносит в июле-августе.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Места обитания. Коренные породы, пестроцветы и гипсоносные почвы.

Численность. Не установлена.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Сокращение площади гипсоносных толщ и выпас скота.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [265, 310].

О.К. Хожиматов.



Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари: Ҳисор тоғларининг жануби-ғарбий қисмида тарқалган.

Ўсиш шароити. Туб жинсли, ола тусли ҳамда гипсли тупроқларда ўсади.

Сони. Аниқланмаган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Асосан туб жинсли ва ола тусли тупроқ қатламларидагина ўсиши бу ўсимлик турининг тарқалишини чеклайди.

Маданийлаштирилиши. Бу ҳақда маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза йўллари ишлаб чиқилмаган.


Манбалар. [265, 310].

О.К. Хожиматов.

Статус 1. Сокращающийся эндемик Юго-западного Памиро-Алая.

Краткое описание. Однолетнее растение высотой 20–50 см. Стебель прямостоячий, густо-белошерстистый. Листья сидячие или короткочерешковые, округло-яйцевидные, длиной 3–5 см

Endemic species of the south-western Pamir-Alay. It is spread at the Hissar range (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits bed-rocks, gypseous and gypsum-bearing soils. The quantity is unknown. Limiting factors: degradation of gypseous slopes and overgrazing. Measures of protection: not protected.



313. ЙИРИК ИЛДИЗЛИ МЕҲРИГИЁХ

Оносма крупнокорневая / *Onosma macrorhiza* Popov

Мақоми 1. Жанубий Помир-Олойдаги камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Илдизи кўп бошчали. Серпоя, баландлиги 30–50 см. Дағал туклари оқиш. Барглари қиррали, узунлиги 2–4 см, эни 5–10 мм, учи ўткирроқ, баркутсимон. Тўпгули чўзиқроқ гажакли. Косачаси оқиш дағал тукли, узунлиги 7–10 мм. Гултожи сариқ, узунлиги 10–12 мм, кейинроқ қизил, қора-кўкиш тусга киради. Ёнғоқчаси қорамтир-кулранг, товланувчи, тумшуқчали.

Тарқалиши. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида: Ҳисор тизмасининг жануби-ғарбий тармоқларида тарқалган.

Ўсиш шароити. Қизғиш қумлоқларда, қумтошларда ўсади.

Сони. Шўроб қишлоғи атрофида 2000 тупи борлиги аниқланган.

Кўпайиши. Уруғидан кўпаяди.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ўсимлик ўсиб турган ерларнинг ўзлаштирилиши туфайли камайиб кетган.

Мададийлаштирилиши. Ўсимликни ўстириш бўйича олиб борилган ишлар натижасиз тугаган.

Муҳофаза чоралари. Муҳофаза қилинмайди.

Манбалар. [265, 310].

О.К. Ҳожиматов.

Статус 1. Редкий эндемик Южного Памиро-Алая.

Краткое описание. Корень многоглавый. Стебли многочисленные 30–50 см высоты, беловатые от щетинистого опушения. Листья ланцетно-лопатчатые 2–4 см длины, 5–10 мм ширины, островатые, бархатистые. Соцветие – удлиняющийся завиток. Чашечка бело щетинистая 7–10 мм длины. Венчик 10–12 мм длины, желтый (позже краснеющий и черно-синеющий). Орешки 3 мм длины, темно-серые, блестящие с носиком. Цветет в мае, плодоносит в июне.

Распространение. В Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях: юго-западные отроги Гиссарского хребта.

Места обитания. Краснопесчанники.

Численность. 2000 растений в окрестностях кишлака Шуроб.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Разрушение естественных местообитаний.

Культивирование. Многочисленные попытки культивирования не увенчались успехом.


Меры охраны. Не охраняется.

Источники. [265, 310].

О.К. Ҳожиматов.



Rare endemic species of Uzbekistan. It is spread at the south-western Hissar range (Kashkadarya and Surkhandarya regions). Inhabits gypseous slopes. The quantity is unknown. Limiting factors: decreasing of natural habitats and overgrazing. Measures of protection: not protected.



314. БОШМОҚСИМОН НОНЕЯ

Nonea calceolaris Nikif. & Pazij

Мақоми 1. Ўзбекистон учун камёб эндемик ўсимлик.

Қисқача тавсифи. Бир йиллик ўтсимон ўсимлик, хурпайган қалин безчали ва узун, дағал, сийрак тукли, баландлиги 30 см. Поялари бир нечта, асосидан шохланган. Барглари бутун ёки билинар-билинемас тишчали, қиррали-нишли, кенг ва тор қиррали, учи ўткир, узунлиги 2,5–4,5 см, эни 5–10 мм. Мева туғувчи гажаги 10–14 см узунликда, зич жойлашган, говакроқ. Мевабанди 1–2 мм узунликда. Косачаси гуллаганда кўнғироқсимон шаклга киради, узунлиги 7–8 мм, гултожи найчасидан деярли 2 баробар узун ва қиррадор ўткир тишчалари бор. Гултожи сарғиш, узунлиги 7–8 мм, найчасининг узунлиги 4 мм. Мева-ёнғоқчаси 3–4 мм узунликда, текис жойлашган, тукли, ён томонлари тиришган. Март-апрель ойларида гуллаб, меваси апрель-май ойларида етилади.

Тарқалиши. Мирзачўл ва Ҳисор тизмаси (Жоилма)да тарқалган (Сирдарё ва Қашқадарё вилоятлари).

Ўсиш шароити. Соз тупроқли чўлларда ва адирларда ўсганлиги аниқланган.

Сони. Узоқ давом этган қидирув ишлари натижасиз тугаган. Бу тур бутунлай йўқолган бўлса керак.

Кўлайиши. Уруғидан кўпайган бўлиши мумкин.

Ўсимлик сони ва ареалининг ўзгариш сабаблари. Ерларнинг хўжалик мақсадида ўзлаштирилиши, хўжалик фаолияти оқибатида сони кескин қисқариб кетган.

Маданийлаштирилиши. Маълумотлар йўқ.

Муҳофаза чоралари. Махсус муҳофаза чоралари ишлаб чиқилмаган.

Манбалар. [159, 209].

О.Қ. Ҳожиматов.

Статус 1. Редкий эндемик Узбекистана.

Краткое описание. Однолетнее растение с густо оттопырено коротко-железисто волосистыми, с рассеянными длинными щетинками, высотой до 30 см. Стеблей несколько, простертых, восходящих от основания. Листья цельнокрайние или неясно зубчатые; лопатчато-ланцетные, широко- или узколанцетные, острые, 2,5–4,5 см длины, 5–10 мм ширины. Плодушие завитки 10–14 см длины, густые и рыхловатые. Плодоножки 1–2 мм длины. Чашечка при цветах колокольчатая, 7–8 мм длины, почти в 2 раза длиннее трубки венчика с ланцетными длинно заостренными зубцами. Венчик желтоватый, 7–8 мм длины, с трубкой 4 мм длины. Плод-орешек 3–4 мм длины, почти горизонтальный, пушистый по бокам грубо морщинистый. Цветёт в марте-апреле, плодоносит в апреле-мае.



Распространение. В Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях: Мирзачуль и Гиссарский хребет (Джаильма).

Места обитания. Глинистые пустыни и предгорья.

Численность. В ходе многочисленных поисков не обнаружен. Вид вероятно исчез.

Размножение. Семенное.

Причины изменения численности и ареала. Хозяйственная деятельность человека, распахивание земель.

Культивирование. Сведений нет.

Меры охраны. Специальные меры охраны не разработаны.

Источники. [159, 209].

О.К. Ҳожиматов.

Rare endemic species of Uzbekistan. It is spread at the Syrdarya and Kashkadarya regions. Inhabits argillaceous deserts and foothills. The quantity is unknown. Limiting factors: economic human activities. Measures of protection: not protected.



1. *Абдуллаева М. Н.* Род *Eremosparton* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 51.
2. *Абдуллаева М. Н.* Секция *Tropidolobus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 228–229.
3. *Абдуллаева М. Н.* Секция *Tamias* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. 1981. – С. 235.
4. *Абдуллаева М. Н.* Род *Scutellaria* L. // Определитель растений Средней Азии, т. 9, 1987. – С. 22.
5. *Абдухамидов Н. А.* Горлицев золотистый // Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУГК, 1976. – С.150, 225.
6. *Адылов Т. А.* Род *Eremostachys* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: ФАН, 1987, С. 78–82.
7. *Адылов Т. А.* Род *Paraeremostachys* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 59–66.
8. *Адылов Т. А.* Род *Draacoscephalum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 78–82.
9. *Адылов Т. А., Махмедов А. М.* Род *Phlomodoides* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 82–110.
10. *Байтенов М. С.* Род *Oxytropis* // Флора Казахстана. Т. 5. Алма-Ата: АН Каз ССР. 1961. – С. 330–410.
11. *Белолипов И. В.* Интродукция видов рода *Acantholimon* в условиях Ташкента // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 11. Ташкент: Фан, 1974. – С. 51–63.
12. *Белолипов И. В.* Интродукция видов рода *Lepidolopha* в условиях Ботанического сада АН УзССР // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 15. Ташкент: Фан, 1978. – С. 54–61.
13. *Белолипов И. В.* Современное состояние редчайшего вида флоры Средней Азии *Otostegia бухарской*. // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 17. Ташкент: Фан Узб. ССР, 1980. – С. 90–100.
14. *Белолипов И. В.* Интродукция травянистых растений природной флоры Средней Азии. Ташкент: Фан Узб. ССР, 1989. – С. 80
15. *Белолипов И. В.* *Otostegia bucharica* V. Fedtsch. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 256.
16. *Белоусова Л. С., Денисова Л. В., Никитина С. В.* Редкие растения СССР. М. 1979. – С. 161, 216.
17. *Бешко Н. Ю.* Редкие и эндемичные виды флоры Нуратинского заповедника // Труды заповедников Узбекистана. Ташкент: Мехнат, 1997. Вып. 2. – С. 18–24.
18. *Бешко Н. Ю.* Новые сведения о редких видах флоры Нуратинского заповедника // Сохранение биоразнообразия на особо охраняемых территориях Узбекистана. Ташкент: Chinor ENK, 2000. – С. 17–20.
19. *Благовещенская Н. С., Деревецкая Е. А.* Род *Bergenia* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 242.
20. *Бондаренко О. Н.* Сем. *Caprifoliaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 559–577.
21. *Бондаренко О. Н.* Род *Acanthophyllum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 297.
22. *Бондаренко О. Н.* Род *Silene* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 260, 266, 267, 269.
23. *Бондаренко О. Н., Виноградова Р. М.* Род *Dianthus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 301–310.
24. *Бондаренко О. Н., Закиров К. З.* Род *Lappula* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 229.
25. *Бондаренко О. Н.* Семейство *Vignoniaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 498–499.
26. *Борисова А. Г.* Новые бобовые флоры СССР // Бот. мат. Герб. Ин-та бот. АН СССР. Т. 10. Л., 1947. – С. 43–57.
27. *Борисова А. Г.* О видах рода *Bergenia* Moench в Средней Азии // Бот. мат. Герб. бот. Ин-та АН СССР. Т. 16. М.-Л., 1954. – С. 97–103.
28. *Борисова А. Г.* Род *Tragacantha* // Бот. мат. Герб. Бот. Ин-та АН СССР. Т. 10. М.-Л. 1947. – С. 57–79.
29. *Борисова А. Г.* Род *Tragacantha* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 672–686.
30. *Борисова А. Г.* Род *Zygophyllum* // Флора СССР. Т. 14. М.-Л.: АН СССР, 1949. – С. 152–193.
31. *Борисова А. Г.* Секция *Myobroma* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: АН СССР, 1946. – С. 142–230.
32. *Борисова А. Г.* Секция *Laguroopsis* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 839–868.

33. *Борисова А. Г.* Секция *Polyanthos* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 357–380.
34. *Борисова А. Г.* Секция *Proselius* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 594–642.
35. *Бочанцев В. П.* Сем. *Chenopodiaceae* // Флора Узбекистана. Т. 2. Ташкент: АН УзССР, 1953. – С. 280, 288, 292, 322.
36. *Бочанцев В. П., Введенский А. И.* Новости систематики Гербария Института ботаники АН УзССР, Вып. 14. Ташкент, 1954. – С. 11.
37. *Бочанцев В. П., Введенский А. И.* Род *Clausia* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 121–122.
38. *Бочанцев В. П.* Род *Spryginia* Popov // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 191.
39. *Бочанцева З. П.* Новый вид тюльпана из Западного Тянь-Шаня // Бот. Матер. Герб. Инст. Ботаники АН УзССР, 1954, вып. XVI. – С. 8–11
40. *Бочанцева З. П.* Тюльпаны. Ташкент: Фан, 1962. – С. 408.
41. *Бочанцева З. П., Шарипов А. Х.* *Tulipa uzbekistanica* Z. Botsch. et Scharipov // Новости систематики высших растений. Т. 8. Л., Наука, 1971. – С. 109–111.
42. *Бутков А. Я.* Новые виды семейства *Ranunculaceae* // Бот.мат. Герб. Бот. ин-та Уз ФАН СССР. Вып. 3. Ташкент, 1941. – С. 21.
43. *Бутков А. Я.* Новые виды из Средней Азии // Бот. мат. Герб ин-та бот. Уз ФАН СССР. Вып. 6. Ташкент: 1941. – С. 6–8.
44. *Бутков А. Я.* Значение и пути охраны реликтовой флоры юга Средней Азии // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 165–170.
45. *Бутков А. Я.* О платановых лесах на территории Узбекистана // Узб. биол. журн., 1976, №3. – С. 42.
46. *Буш Н. А.* Род *Iskandera* // Флора СССР. Т. 8. М.-Л.: АН СССР, 1939. – С. 320.
47. *Васильченко И. Т.* Новые виды рода *Oxytropis* // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР, Т. 20. Л., 1960. – С. 231–250.
48. *Васильченко И. Т., Васильева Л. И.* Охрана реликтов среднеазиатской флоры в Западном Гиссаре // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 154–165.
49. *Введенский А. И.* Род *Allium* L. // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1971. Т. 2. – С. 81.
50. *Введенский А. И.* Род *Tulipa* // Флора СССР. Т. 4. Л.: 1935. – С. 329–364.
51. *Введенский А. И.* Сем. *Amarylidaceae* // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1941. – С. 495–502.
52. *Введенский А. И.* Род *Juno*. // Флора Узбекистана. Т.1, 1941. – С. 519.
53. *Введенский А. И.* Сем. *Iridaceae* // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1941. – С. 502–522.
54. *Введенский А. И.* Новые бобовые из Средней Азии // Бот. мат. Герб, ин-та бот. АН УзССР. Вып. 13. Ташкент, 1952. – С. 19–25.
55. *Введенский А. И.* Новые виды из Средней Азии // Бот. мат. Герб., ин-та Бот. АН УзССР, Вып. 14. Ташкент, 1954. – С. 7–12.
56. *Введенский А. И.* Род *Calisperla* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955. – С. 412–413.
57. *Введенский А. И.* Новая секция рода *Astragalus* // Бот. мат. Герб, ин-та бот. АН УзССР, Вып. 15. Ташкент, 1959. – С. 10–12.
58. *Введенский А. И.* Род *Alliit* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971 а. – С. 39–89.
59. *Введенский А. И.* Род *Juno* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 132–140.
60. *Введенский А. И., Ковалевская С. С.* Род *Tulipa* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 94–109.
61. *Введенский А. И., Пазий В. К.* Заметки о среднеазиатских видах рода *Eremostachys* // Бот. мат. Герб, ин-та АН УзССР. Вып. 18. Ташкент: Фан, 1967. – С. 8–29.
62. *Введенский А. И., Пазий В. К.* Род *Eremostachys* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1967. – С. 319–345.
63. *Введенский А. И., Пучкова Е. Г.* Сем. *Polypodiaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 1. Ташкент: Фан, 1968. – С. 14.
64. *Виноградова Р. И.* Род *Lepidium* // Определитель растений Средней Азии Т. 4. Ташкент: Фан, 1971. – С. 197.
65. *Виноградова Р. М.* Секция *Aureophora* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 212–213.

66. *Виноградова Р. М.* Секция *Leptopis* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 274.
67. *Виноградова Р. М.* Секция *Xiphidium* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 185–188.
68. *Голоскоков В. П.* Сем. *Santalaceae* // Флора Казахстана. Т. 4. Алма-Ата: АН КазССР, 1960. – С. 83–88.
69. *Гончаров Н. Ф.* Новые виды рода *Astragalus* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН СССР. Т. 7. Л. 1938. – С. 145.
70. *Гончаров Н. Ф.* Новые астрагалы и остролодки // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН СССР. Т. 9. Вып. 1. Л., 1941. – С. 85–105.
71. *Гончаров Н. Ф.* Новые и критические астрагалы // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН СССР. Т. 9. Вып. 4. Л., 1946. – С. 113–151.
72. *Гончаров Н. Ф.* Секция *Astenolobium* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 382–383.
73. *Гончаров Н. Ф.* Секция *Halicacabus* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 415–423.
74. *Гончаров Н. Ф.* Секция *Stipitella* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 1 М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1946. – С. 21–22
75. *Гончаров Н. Ф.* Род *Astragalus* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955а. – С. 488–671.
76. *Гончаров Н. Ф.* Род *Oxytropis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1955б. – С. 686–715.
77. *Гончаров Н. Ф., Борисова А. Г.* Секция *Pendulina* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: АН СССР, 1946. – С. 136–231.
78. *Гончаров Н. Ф., Борисова А. Г.* Секция *Tropidolobus* рода *Astragalus* // Флора СССР. Т. 12. М.-Л.: АН СССР, 1946. – С. 566–569.
79. *Горшкова С. Г.* Род *Sternbergia* // Флора СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1935. – С. 485–489.
80. *Горшкова С. Г.* Род *Otostegia* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 182–187.
81. *Горшкова С. Г.* Род *Pentanema* // Флора СССР. Т. 25. М.-Л.: АН СССР, 1959. – С. 483.
82. *Грубов В. И.* Сем. *Ebenaceae* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1957. – С. 475–483.
83. *Грубов В. И.* Сем. *Rhamnaceae* // Деревья и кустарники СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1958. – С. 526–607.
84. *Джалалов А.* О произрастании семян горичвета золотистого в естественных условиях и в культуре // Тез. докл. 8-й профессорско-преподавательской конференции. Андижан, 1966. – С. 179.
85. *Джалалов А.* Горичвет золотистый (*Adonis chrysocyathus* Hook. f. et Thorns.) – перспективное лекарственное растение // Исследование естественных ресурсов Ферганской долины. Труды Андижанского гос. лед. ин-та. Ташкент, 1966. – С. 21–23.
86. *Джалалов А.* Горичвет золотистый (*Adonis chrysocyathus*) и его биология // Автореф. канд. дисс. ... Ташкент, 1968. – С. 39.
87. *Джалалов А.* Об охране горичвета золотистого (*Adonis chrysocyathus*) // Мат. совещ. по охране объектов растительного мира республик Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1971. – С. 288–289.
88. *Джангуразов Ф. Х.* Новые местонахождения Дионисии гиссарской (*Dionysia hissarica* Lipsky) в бассейне р. Сангардак (Западный Гиссар) // Изв. Акад. Наук Таджикской ССР. Душанбе. 1965. 1 (18). – С. 43–45.
89. *Дробов В. П.* Род *Cercis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: во АН УзССР, 1955. – С. 390.
90. *Дробов В. П.* Род *Sorbaria* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 263–264.
91. *Дробов В. П.* Сем. *Vitaceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР. 1959а. – С. 157–158.
92. *Дробов В. П.* Сем. *Celastraceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959б. – С. 132–134.
93. *Дробов В. П.* Сем. *Ebenaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: Изд-во АН УзССР, 1961. – С. 85–87.
94. *Закиров К. З.* Новые виды рода *Phlomis* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР, Т. 9. Ташкент, 1947. – С. 3.
95. *Закиров К. З.* *Acatolimon nuratavicum* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 334, 536.
96. *Закиров К. З.* Сем. *Boagiriaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 218.
97. *Закиров К. З.* Флора и растительность бассейна р. Зеравшан. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 448.
98. *Залевская Е. М.* Сравнительное морфологическое изучение проростков видов родов *Anemone* L., *Pulsatilla* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 6. Ташкент: Фан, 1970. – С. 164–169.
99. *Залевская Е. М.* К биологии прорастания семян некоторых интродуцированных ветрениц и прострелов // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 4. Ташкент: Фан, 1970. – С. 113–120.

100. Запрыгаева В. И. Дикорастущие плодовые Таджикистана М.-Л.: Наука, 1964. – С. 695.
101. Иванина Л. И. Род *Spirostegia* // Флора СССР. Т. 22. М.-Л.: АН СССР, 1955. – С. 512–514.
102. Иващенко А. А. Тюльпаны и другие луковичные растения Казахстана. Алматы, 2005. 192 с.
103. Икрамов М. И. Зайцегуб опьяняющий, его распространение и запасы в Узбекистане // Ресурсы дикорастущих растений СССР. М., 1968. – С. 123.
104. Икрамов М. И. Род *Lagochilus* Средней Азии // Ташкент: Фан, 1976. – С. 184.
105. Ильин М. М. Род *Jurinea* // Флора СССР Т. 27. М.-Л.: АН СССР, 1962. – С. 609–814, 631–635, 641–642, 702–703.
106. Камелин Р. В. Флорогенетический анализ естественной флоры горной Средней Азии. Л.: Наука, 1973. – С. 356.
107. Камелин Р. В. К познанию флоры Нуратинских гор // Ботан. журн., 1973. Т. 58. № 5. – С. 625–637.
108. Камелин Р. В. Новый вид рода *Vicoa* Cass. и другие новинки флоры Нуратинских гор // Нов. сист. высш. раст. 1976. Т. 13. – С. 244–245.
109. Камелин Р. В. *Astragalus*. Род *Astragalus* L. // Определитель растений Средней Азии, т.6. – С.158.
110. Камелин Р. В. Род *Vicoa* Cass. – Викоа // Определитель растений Средней Азии. Т. X. Ташкент: Фан, 1993. – С. 461–463.
111. Камелин Р. В., Махмедов А. М. О систематическом положении среднеазиатских видов *Salvia* из секции *Physosphace* // Бот. журн. 1980. Т. 65. №4. – С. 580–582.
112. Камелин Р. В., Цукерваник Т. И. *Lagochilus vvedenskyi* R.Kam. et Zuckerw. // Новости систематики. Вып. 20. Л.: Наука, 1983. – С. 167.
113. Кирпичников М. Э. Род *Helichrysum* // Флора СССР. Т. 25. М.-Л.: АН СССР, 1959. – С. 417–418.
114. Ключков Е. М., Пименов М. Г. *Bunium* L. – Буниум. // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 228–335.
115. Кнорринг О. Э. Род *Eremostachys* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954а. – С. 1–56.
116. Кнорринг О. Э. Род *Lagochilus* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 160–181.
117. Кнорринг О. Э. Материалы по систематике рода *Lepidolopha* // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР. Т. 10. Л., 1959. – С. 380–384.
118. Кнорринг О. Э. Род *Lepidolopha* // Флора СССР. Т. 26. М.-Л.: АН СССР, 1961. – С. 288–291.
119. Ковалевская С. С. *Dionysia Fenzl* - Дионисия. Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1986. Т.VIII. – С. 19–20.
120. Ковалевская С. С. Заметки о некоторых среднеазиатских видах *Anthemidea* // Бот. мат. Герб. Ин-та Бот. АН УзССР, Вып. 16. Ташкент, 1961, – С. 32–38.
121. Ковалевская С. С. Сем. *Primulaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 31–50.
122. Ковалевская С. С. Сем. *Solanaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 416–445.
123. Ковалевская С. С. Род *Trichanthemis* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 194.
124. Ковалевская С. С. Род *Scorzonera* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 444–445.
125. Ковалевская С. С. Род *Tanacetopsis* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 146.
126. Ковалевская С. С. Род *Koelipinia* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 419.
127. Ковалевская С. С. Род *Lepidolopha* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 195–197.
128. Ковалевская С. С. Род *Xylanthemum* // Флора Узбекистана. Т.6. 1961. – С.136.
129. Ковалевская С. С. Род *Anemone* // Определитель растений Средней Азии Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 189–193.
130. Ковалевская С. С. Род *Adonis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 228–231.
131. Ковалевская С. С. Род *Crambe* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 183–186.
132. Ковалевская С. С. Секция *Astenolobium* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 139.
133. Ковалевская С. С. Секция *Astragalus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 121–123.
134. Ковалевская С. С. Супомотиасеае // Определитель растений Средней Азии. Т. 7. Ташкент: Фан, 1983. – С. 167–168.
135. Ковалевская С. С. Секция *Myobroma* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т.6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 142–164.

136. Ковалевская С. С. Секция *Pendulina* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 164–167.
137. Ковалевская С. С. Род *Hedysarum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 286–311.
138. Ковалевская С. С. Род *Ugamia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 596–596.
139. Ковалевская С. С. Род *Rhus* L. // Определитель растений Средней Азии, 1983. Т.7. – С.18.
140. Коровин Е. П. Новые виды семейства зонтичных флоры Узбекистана // Бот. мат. Герб, ин-та бот. и зоол. АН УзССР, Вып. 8. Ташкент, 1947. – С. 3–24.
141. Коровин Е. П. Иллюстрированная монография рода *Ferula*. Ташкент: АН УзССР, 1947. – С. 33, 43, 64.
142. Коровин Е. П. Новые виды семейства зонтичных флоры Узбекистана // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР, Вып. 12. Ташкент, 1948. – С. 13–32.
143. Коровин Е. П. Род *Ferula* // Флора СССР. Т. 17. М.-Л.: АН СССР, 1951. – С. 62–142.
144. Коровин Е. П. *Addenda XVII* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 735.
145. Коровин Е. П. *Bunium* L. – Буниум, зира. // Флора Узбекистана. Т. III. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 340–348.
146. Коровин Е. П. *Ferula* L. – Ферула. Флора Узбекистана. Т. III. Ташкент: АН УзССР. – С. 399–439, 426, 490.
147. Коровин Е. П. Род *Oenanthe* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 378.
148. Коровин Е. П. Род *Seseli* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 372.
149. Коровин Е. П., Попов М. Г. *Euphorbia sclerocyathiflora* // Гербарий флоры Средней Азии. Т. 11-13. № 304. Ташкент, 1927. – С. 41.
150. Короткова Е. Е. Новые виды рода *Hedysarum* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР. Ташкент, 1947. – С. 6–14.
151. Короткова Е. Е. Новые виды рода *Cicer* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. и зоол. АН УзССР. Вып. 10. Ташкент, 1948. – С. 17–19.
152. Короткова Е. Е. Род *Hedysarum* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 222–736.
153. Короткова Е. Е. Род *Onobrychis* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 737–744.
154. Короткова Е. Е. Род *Cicer* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 750–756.
155. Короткова Е. Е., Хамидходжаева С.А. Унгерния Виктора // Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. М.: ГУПС 1976. – С. 154, 317.
156. Красная книга Узбекской ССР. Ч. 2. Растения. Ташкент: Фан, 1984. – С. 150.
157. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения. Ташкент: Chinor ENK, 1998.
158. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения и грибы. Ташкент: "Chinor ENK", 2006.
159. Красная Книга Республики Узбекистан: Редкие и исчезающие виды растений и животных: (в 2-х томах): Т.1. Растения и грибы. Ташкент: "Chinor ENK", 2009.
160. Красовская Л. С., Левичев И. Г. Флора Чаткальского заповедника. Ташкент: Фан, 1986. – С. 168–169.
161. Крашенинников И. М. Новые сложноцветные // Бот. мат. Герб. Бот ин-та им. Комарова АН СССР. Т. 9. Вып. 4–12. М.-Л., 1946. – С. 152–184.
162. Крашенинников И. М., Липшиц С. Ю. *Scorzonera bungei* N. Krasch. et Lipsch. // Бюл. Моск. общ. исп. прир. Отд. биол. Вып. 43. № 1. М.: 1934. – С. 144.
163. Кудряшев С. Н. Материалы к изучению шалфеев Средней Азии. Ташкент: 1937. – С. 35.
164. Кудряшев С. Н. Род *Rugus* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 271–275.
165. Кудряшев С. Н. Сем. *Sarparidaceae* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 58–64.
166. Культиасов М. В. Материалы к познанию Туркестанских видов рода *Cousinia* // Тр. Средне-аз. Гос. унив. Сер. 8. Вып. VI. Ташкент, 1929. – С. 7, 22, 26, 27.
167. Лазьков Г. А. Кенжабаева Н. О новых и редких видах флоры Киргизии. // Новости систематики высших растений, 2002. Т. 34. – С. 252–254.
168. Левичев И. Г., Красовская Л. Е. Пскемский лук в южной части своего ареала // Бюлл. МОИП, отд. биол. 86. 1982, №6. – С. 105–111.
169. Левичев И. Г. *Calisrepla aegacanthoides* Vved. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, ENK "Chinor", 1996. – С. 67.

170. Левичев И. Г. *Iridodictyum winklerii* (Regel) Rodionenko. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 81.
171. Ли А. Д. Секция *Halicacabus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 171.
172. Ли А. Д. Секция *Alopecioides* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 120.
173. Ли А. Д. Род *Rochelia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 150.
174. Ли А. Д. Род *Onosma* L. // Определитель растений Средней Азии, 1986. Т. 8. – С. 110.
175. Ли А. Д. Род *Rindera* Pall. // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1986. Т. VIII. – С. 151–155.
176. Ли А. Д. Род *Pedicularis* // Определитель растений Средней Азии, т. 9, 1987. – С. 266.
177. Линчевский И. А. *Acantholimon* Boiss. – Акантолимон // Флора Узбекистана. Т. 5. – Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 63.
178. Линчевский И. А. *Acantholimon* Boiss. – Акантолимон // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 19.
179. Линчевский И. А. *Serphalorhizum* Popov et Korošin – Корнеглав // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 74.
180. Линчевский И. А. *Serphalorhizum* Popov et Korošin – Корнеглав // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 32.
181. Линчевский И. А. Род *Cicer* // Флора СССР. Т. 13. М.-Л.: АН СССР, 1948. – С. 386–406.
182. Линчевский И. А. Сем. *Plumbaginaceae* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 226–474.
183. Линчевский И. А. Сем. *Plumbaginaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 52–63.
184. Линчевский И. А. Род *Cicer* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 323–331.
185. Липский В. И. Материалы для флоры Средней Азии // Труды Императорского С.-Пб. Ботанического сада. 1901. Т. XVIII. – С. 83–85.
186. Липшиц С. Ю. Род *Scorzonera* // Флора СССР. Т. 29. М.-Л.: АН СССР, 1964. – С. 107–108.
187. Лозина-Лозинская А. С. Род *Fritillaria* // Флора СССР. Т. 4. Л.: АН СССР, 1935. – С. 302–320.
188. Лозина-Лозинская А. С. Род *Ribes* // Деревья и кустарники СССР. Т. 3. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1954. – С. 177–215.
189. Малеев В. П. Род *Rugus* // Флора СССР. Т. 9. М.-Л.: АН СССР, 1939. – С. 33–357.
190. Мальцев И. И. Дионисия гиссарская – *Dionysia hissarica* Lipsky. Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: Chinor ENK, 2009. – С. 168–169.
191. Махмедов А. М. Новый вид шалфея (*Salvia*) с Западного Тянь-Шаня // Новости систематики высших растений. Т. 17. М.-Л.: Наука, 1980. – С. 215–218.
192. Махмедов А. М. Распространение видов рода *Salvia* в Средней Азии и Южном Казахстане // Узб. биол. журн. 1982. №2. – С. 41–43.
193. Махмедов А. М. Шалфеи Средней Азии и Казахстана. Ташкент: Фан, 1984. – С. 50–56.
194. Махмедов А. М. Ботанико-географический анализ рода *Phlomis* L. флоры Средней Азии // Узб. биол. журн. 1986, №4. – С. 40–42.
195. Махмедов А. М. Роды *Phlomis* и *Salvia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 107–113, 139–151.
196. Мурзаев Р. М. Мягкоплодный рассеченнолистный и возможности введения его в культуру. Ташкент, 1985. – С. 45.
197. Мухамеджанова Ф. И., Тожобаев К. Ш. Новые сведения о двух редких и эндемичных растениях Чаткальского заповедника // Труды Чаткальского Государственного Биосферного заповедника. Вып. V. Ташкент, 2004. – С. 138–142.
198. Набиев М. М. Новое алкалоидоносное растение Узбекистана // Юбилейный выпуск Трудов ТашГУ. Ташкент, 1961. – С. 24–27.
199. Набиев М. М. Сем. *Cucurbitaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 600–618.
200. Набиев М. М., Закиров К. З. *Lappula purgatorica* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 631–218.
201. Набиев М. М., Закиров К. З. Сем. *Boraginaceae* // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 632, 222.
202. Набиев М. М., Левичев И. Г., Белоусова Л. С. Дионисия гиссарская – *Dionysia hissarica* Lipsky. // Красная книга СССР. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений. М.: Лесная промышленность, 1984. – С. 334.
203. Набиев М. М. Род *Helichrysum* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 80.
204. Набиев М. М. Род *Calligonum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 191–199.
205. Набиев М. М., Казакбаев Р. Ю. // Определитель деревьев и кустарников Узбекистана. Ташкент: Фан, 1975. – С. 116.

206. *Набиев М. М.* Секция *Oxyglottis* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т.6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 101–104.
207. *Набиев М. М.* *Astragalus terrae rubra* Butkov // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 2006. – С.62.
208. *Набиев М. М.* *Hedysarum magnificum* Kudr. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 2006. – С.87.
209. *Набиев М. М.* Сем. *Boeraginaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 130–135.
210. *Набиев М. М.* Семейство *Vignoniaceae* // Определитель растений Средней Азии, т.9. Ташкент: Фан УзССР, 1987. – С. 270.
211. *Набиев М. М.* *Rindera fornicata* Pazij // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 94.
212. *Насимова Т.* *Euphorbiaceae* // Определитель растений Средней Азии, т.7. Ташкент: Фан УзССР, 1983. – С. 48.
213. *Невский С. А.* Род *Delphinium* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 99–183.
214. *Нигматуллаев А., Тайжанов К.* К биологии некоторых среднеазиатских видов *Aconitum* L. // Биологические особенности перспективных лекарственных растений Узбекистана // Ташкент: Фан, 1981. – С. 4–28.
215. *Нигматуллаев А., Тайжанов К.* К биологии прорастания семян некоторых среднеазиатских представителей *Ranunculaceae* // Узб. биол. журн. 1983. №2. – С. 35–38.
216. *Пазий В. К.* Новые виды сем. *Euphorbiaceae* // Бот. мат. Герб. ин-та ботаники и зоологии АН УзССР. Вып. 11. Ташкент: АН УзССР, 1948. – С. 20–28.
217. *Пазий В. К.* Сем. *Paraveraceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 33–58.
218. *Пазий В. К.* Сем. *Euphorbiaceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 82–123.
219. *Пазий В. К.* Род *Stipa* // Определитель растений Средней Азии. Т. 1. Ташкент: Фан, 1968. – С. 74.
220. *Пазий В. К.* Сем. *Amaryllidaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 119–122.
221. *Пазий В. К.* Род *Colchicum* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 13–14.
222. *Пазий В. К.* Род *Petilium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 92.
223. *Пазий В. К.* Род *Dipsadi* // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1977. – С. 110.
224. *Пазий В. К.* Сем. *Paraveraceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 6–30.
225. *Пахомова М. Г.* Род *Ficus* // Определитель Растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 151.
226. *Пахомова М. Г.* Род *Paeonia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 142.
227. *Пахомова М. Г.* Род *Delphinium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 156–181.
228. *Пахомова М. Г.* Род *Pseudoclausia* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 103–108.
229. *Пахомова М. Г.* Секция *Erionotus* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 123–129.
230. *Пименов М. Г.* К систематике рода *Seseli* L. Конспект видов флоры СССР // Новости систематики высших растений. 15. Л.: Наука, 1978. – С. 193.
231. *Пименов М. Г.* *Fergania* - новый род семейства зонтичных (*Ariaceae*) // Новости систематики высших растений. Т. 19. Л.: Наука, 1982. – С. 119.
232. *Пименов М. Г.* Род *Lipskya* // Определитель растений Средней Азии. 1983, Т.7. – С. 192.
233. *Пименов М. Г.* *Astomaea* Reichenb. – Астомея // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 194.
234. *Пименов М. Г.* *Sphaenolobium* Pimenov – Клинолопастик // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 264–265.
235. *Пименов М. Г.* *Dimorphosciadium* Pimenov – Диморфосциадий // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 267.
236. *Пименов М. Г.* *Lomatocarpa* Pimenov – Окаймленноплодик // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. С. 268.
237. *Пименов М. Г.* *Ferula* L. – Ферула, шаир // Определитель растений Средней Азии. Т. VII. Ташкент: Фан, 1983. – С. 276–313.
238. *Победимова Е. Г.* Род *Salvia* // Флора СССР. Т. 21. М.-Л.: АН СССР, 1954. – С. 284–278.
239. *Победимова Е. Г.* Род *Restella* // Флора СССР. Т. 15. М.-Л.: АН СССР, 1949. – С. 515.

240. Попов М. Г. Дикие плодовые Средней Азии // Тр. по прикладной ботанике, генетике и селекции. Т. 22. Вып. 3. Л., 1929. – С. 241–483.
241. Попов М. Г., Андросов Н. В. Растительность заповедника Гуралаш и Зааминской лесной дачи. Ташкент, 1937. – С. 39.
242. Попов М. Г. Род *Fumariola* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 716–717.
243. Попов М. Г. Новые виды бобовых из Средней Азии // Мат. Герб. ин-та бот. АН СССР, Л., 1937. – С. 15.
244. Попов М. Г. Сем. Сложноцветных // Материалы к флоре Зеравшанской долины. Тр. Узб. Гос. Унив. Н.С. 27. Биолог. Вып. 14. Ташкент, 1941. – С. 88–89.
245. Попов М. Г. Новые виды рода *Астрагал* // Бот. мат. Герб. бот. ин-та АН СССР, Т. 10. М.-Л., 1947. – С. 3–29.
246. Попов М. Г., Закиров К. З. *Lappula aktaviensis* // Флора СССР. Т. 19. М.-Л.: АН СССР, 1953. – С. 712.
247. Пошкурлат А. П. О видовой самостоятельности *Adonis leiosepala* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН УзССР. Вып. 19. Ташкент: Фан, 1974. – С. 50–55.
248. Пояркова А. И. Новый вид жимолости для Средней Азии // Бот. мат. Герб. бот. ин-та АН СССР, Т. 9. Вып. 4–12. М.-Л., 1946. – С. 210–212.
249. Пратов У. П. Сем. *Chenopodiaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 3. Ташкент: Фан, 1972. – С. 92, 94, 133.
250. Пратов У. П. Второй вид рода *Nanophyton* (*Chenopodiaceae*) // Бот. журн. 1975. Т. 60. № 8. – С. 1164.
251. Пратов У. П. О систематике и филогении рода *Nanophyton* (*Chenopodiaceae*) // Материалы совещания по филогении центросеменных. М.: МГУ, 1977. – С. 44–46.
252. Пратов У. П. Секция *Leptophysa* и *Stipitella* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 86–89.
253. Пратов У. П. Род *Climacoptera* // Систематика, география, филогения и вопросы охраны. Ташкент: Фан, 1986. – С. 26.
254. Пратов У. П. Род *Pseudosedum* (Boiss.) Berger. – Ложноочиток. Определитель растений Средней Азии. Т. IV. Ташкент, 1974. – С. 226–228.
255. Пратов У. П. и др. Тюльпаны Западного Тянь-Шаня. Ташкент, "Chinog ENK", 2006. – С. 47–48.
256. Пратов У. П., Шерматов Г. М. Дикие яблоки и груши Узбекистана. Ташкент: Фан, 1972. – С. 16–19.
257. Проханов Я. И. Систематический сбор молочаев Средней Азии. М.-Л.: Госхимтехиздат, 1933. – С. 241.
258. Рожановская М. И. Островския величественная // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 4. Ташкент: Фан, 1965. – С. 137–143.
259. Рожевиц Р.Ю. Триба *Agrostidae* из сем. *Gramineae* // Флора СССР. Т. 2. Л.: АН СССР, 1934. – С. 63–234.
260. Романова А. С. и др. Хиноны *Salvia bucharica*, *S. dracoscephaloides*, *S. korolkowii* // ХПС. 1980. № 4. – С. 564.
261. Рябова Т. И. Род *Eremurus* // Дикорастущие растения. Т. 2. Л., 1977. – С. 51–83.
262. Саркисова С. А. Сем. *Capparidaceae* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 30–34.
263. Саркисова С. А. Род *Iskandera* // Определитель растений Средней Азии. Т. 4. Ташкент: Фан, 1974. – С. 151.
264. Саркисова С. А. Род *Ewersmannia* // Определитель растений Средней Азии, т.6, 1981. – С. 358.
265. Саркисова С. А. Род *Heliotropium* // Определитель растений Средней Азии. Т. 8. Ташкент: Фан, 1986. – С. 95.
266. Сарыбаева Ш. У. *Astragalus centralis* Sheld.-редкий эндемик Юго-Западного Кызылкума // 10-я Пушкинская школа-конференция молодых ученых, посвященная 50-летию Пушкинского центра РАН. 17–21 апреля 2006 года. Сборник тезисов. Пушино, 2006. – С. 310.
267. Сарыбаева Ш. У. Оценка состояния популяций *Astragalus centralis* Sheld. // Вестник Каракалпакского отделения АН РУз. Нукус, 2008. № 3. – С. 34–35.
268. Семистрочева П. Л. Сем. *Santalaceae* // Иллюстрированный определитель растений Казахстана. Т. 1. Алма-Ата: Наука, 1969. – С. 235.
269. Смольянинова Л. А. Род *Dionysia* // Флора СССР. Т. 18. М.-Л.: АН СССР, 1952. – С. 208–217.
270. Сосков Ю. Д. Род *Calligonum* // Флора Таджикистана. Т. 3. Л.: Изд-во АН СССР, 1968. – С. 225, 230, 234.
271. Сосновский Д. И. Сем. *Vitaceae* // Флора СССР. Т. 14. М.-Л.: АН СССР, АН УзССР, 1949. – С. 674–704.
272. Сумневич Г. П. Род *Eremosparton* // Флора Узбекистана. Т.3. Ташкент: АН УзССР, 1955. – С. 452.
273. Сумневич Г. П. Род *Calophaca* // Флора Узбекистана. Т. 3. Ташкент, 1955. – С. 468–469.
274. Сумневич Г. П. Сем. *Punicaceae* // Флора Узбекистана. Т. 4. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 239–240.

275. *Тажетдинова Д. М.* Краснокнижные виды *Capparis rosanowiana* B.Fedtsch. и *Synomorium songaricum* Rupr. во флоре плато Устюрт / Узбекский биологический журнал. №5. Ташкент, 2013. – С. 30–31.

276. *Тайжанов К., Короткова Е. Е.* Ядовитые алколоидоносные растения Алая // Растительные ресурсы. 1969. Т. 5. Вып. 1. – С. 23–31.

277. *Тайжанов К.* Алколоидоносная флора горной Средней Азии. Автореф. дисс. ... докт. биол. наук. Ташкент. 1994. – 50 с.

278. *Терехов В. И.* Эндемичные и редкие растения флоры Чимкентской области // Охрана растительного мира Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1979. – С. 106–109.

279. *Титова О. А.* Изучение морфологии и биологии видов рода *Eremurus* Vieb. в условиях Ташкента // Автореф. канд. дисс. ... Ташкент, 1970. – С. 20.

280. *Титова О. А.* Влияние температурных условий на эремурусы в период летнего покоя и зимы // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 8. Ташкент: Фан, 1971. – С. 116–129.

281. *Титова О. А.* Спонтанные гибриды видов рода *Eremurus* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 9. Ташкент: Фан, 1977. – С. 139–145.

282. *Титова О. А.* Результаты воздействия весеннего заморозка на некоторые однодольные растения природной флоры Средней Азии, интродуцированные в условиях Ташкента // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 10. Ташкент: Фан, 1973. – С. 116–118.

283. *Титова О. А.* К морфологии семян видов рода *Juno* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 16. Ташкент: Фан, 1979 а. – С. 98–101.

284. *Титова О. А.* К семенному размножению видов рода *Juno* // Интродукция и акклиматизация растений. Вып. 16. Ташкент: Фан, 1979. – С. 98–101.

285. *Титова О. А.* *Eremurus alberti* Regel. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 218.

286. *Титова О. А.* *Eremurus lactiflorus* O. Fedtsch. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 218.

287. *Тожибаев К. Ш.* Дополнение к флоре Чаткальского Биосферного заповедника. / Труды Чаткальского Государственного Биосферного заповедника. Вып. V. Ташкент, 2004. – С. 143–146.

288. *Тожибаев К. Ш.* *Tulipa vvedenskyi* Z. Botsch. на классическом местонахождении / Матер.

межд. конф. "Развитие ботанической науки в Центральной Азии и ее интеграция в производство. Ташкент, 2004. – С. 66–67.

289. *Тожибаев К. Ш., Бешко Н. Ю.* Кадастр редких и эндемичных растений Джизакского и Навоийского вилоятов Республики Узбекистан // Биоразнообразии Узбекистана – мониторинг и использование. – Ташкент, 2007. – С. 200–208.

290. *Тожибаев К. Ш., Тургинов О. Т.* Новые и редкие виды флоры Узбекистана из Байсунтау (Гиссарский хребет) // Бот. журн. 2012. Т. 97. № 7. – С. 966–971.

291. *Тожибаев К. Ш.* Тюльпаны (*Tulipa* L.) в растительном покрове Западного Тянь-Шаня. Сборник Биоразнообразии Узбекистана – мониторинг и использование. Ташкент, 2007. – С. 194–200.

292. *Тожибаев К. Ш.* Лилейные (Liliaceae) Юго-Западного Тянь-Шаня (в пределах Узбекистана). // Узб. биол. журн., 2008. №6. – С. 26–30.

293. *Тожибаев К. Ш., Мухамеджанова Ф. И.* Новые сведения о некоторых редких видах Угам-Чаткальского Национального Парка // Вестник. "Тинбо". №1. Ташкент "Истиклол", 2005. – С.19–21.

294. *Туляганова М.* Род *Calispepla* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 19.

295. *Туляганова М.* Род *Erigeron* // Определитель растений Средней Азии. Т. 10. Ташкент: Фан, 1993. – С. 494–512.

296. *Туляганова М.* Секция *Macrothrix* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 180–184.

297. *Туляганова М.* Род *Cercis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 12.

298. *Туляганова М.* Новый вид рода *Leonurus* из Средней Азии // Бот. журн. 1987. т. 72. №6. – С. 213–214.

299. *Туляганова М.* Род *Leonurus* // Опр. раст. Средней Азии т. 9, Ташкент: Фан, 1987. – С.119.

300. *Туляганова М.* Род *Phlomidioschema* // Определитель растений Средней Азии. Т. IX. Ташкент: Фан, 1987. – С. 137.

301. *Федченко Б. А.* Заметки о географическом распространении рода *Eremurus* // Изв. Петерб. Бот. Сада, т. 7, вып. 2, 1907, с. 65–68

302. *Федченко Б. А.* Новый вид *Thesium* из Ташкентского региона // Бот. мат. Герб. Глав. бот. сада РСФСР. Т. 4, 1923. – С. 113–114.

303. *Федоров А. А.* Сем. *Campanulaceae* // Флора СССР. Т. 24. М.-Л.: АН СССР. 1957. – С. 126–449.

304. Филимонова З. Н. Новый вид из рода *Oxytropis* // Бот. мат. Герб. ин-та бот. АН УзССР, Т. 20, Ташкент: Фан, 1982. – С. 43.
305. Филимонова З. Н. Род *Oxytropis* // Определитель растений Средней Азии. Т. 7. Ташкент: Фан, 1983. – С. 323–367.
306. Фисюн В. В. Род *Juginea* // Флора Казахстана. Т. 9. Алма-Ата: АН КазССР, 1966. – С. 299–316.
307. Хамидходжаев С. А., Короткова Е. Е. Естественные запасы унгернии Виктора // ДАН УзССР, 1966. № 7. – С. 39–40.
308. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый вид рода *Ferula* L. из Гиссарского хребта. ДАН УзССР, 1990. – С. 48–49.
309. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый вид рода *Silene* L. из Кугитанга. Узб. биол. журн., 1991, № 3. – С. 66–67.
310. Хасанов Ф. О. Эндемичные растения юго-западных отрогов Гиссарского хребта // Узб. биол. журн., 1991, № 2. – С. 41–45.
311. Хасанов Ф. О., Мальцев И. И. Новый род *Kamelinia* (Ariaceae) из Средней Азии. // Узб. Биол. журн. 1992, № 2. – С. 49–53.
312. Хасанов Ф. О., Сулейманов Н. А. Новые виды растений из северного Памиро-Алая. ДАН РУз.
313. Хасанов Ф., Эргашев Э., Кадыров Г. Новый вид рода *Astragalus* L. из Кызылкума. Узб. Биол. журн. М.: 1965. – С. 127.
315. Цвелев Н. Н. Род *Trichanthesis* // Флора СССР. Т. 26. М.-Л.: АН СССР, 1961. – С. 282–283.
316. Цвелев Н. Н. Злаки СССР: Л.: Наука, 1976. – С. 594.
317. Цукерваник Т. Н., Грачев Г. Ф. Исследование *Salvia korolkovii* // Тр. ин-та химии АН УзССР, Вып. 1. Ташкент: 1948. – С. 41–43.
318. Цукерваник Т. И. Секция *Cytisodes* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981 а. – С. 216–219, 240–249.
319. Цукерваник Т. И. Секция *Eriopodus* // Определитель растений Средней Азии, 1981, т. 6. – С. 219.
320. Цукерваник Т. И. Род *Lagochilus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 9. Ташкент: Фан, 1987. – С. 130.
321. Чернева О. В. Памироалайские кузинии секции *Homalochaetae* // Бот. мат. Герб., ин-та бот. АН УзССР, Вып. 15. Ташкент: АН УзССР, 1959. – С. 33–52.
322. Чернева О. В. Новые виды *Synagaeae* (Compositae) // Бот. мат. Герб., ин-та бот. АН УзССР, Вып. 16. Ташкент: АН УзССР, 1961. – С. 51–63.
323. Чернева О. В. Сем. Rubiaceae // Флора Узбекистана. Т. 5. Ташкент, 1961. – С. 530–559.
324. Чернева О. В. Род *Cousinia* // Флора СССР. Т. 27. М.-Л., 1962. – С. 108–357.
325. Чернева О. В. Опыт систематики рода *Cousinia* флоры СССР // Бот. мат. ин-та бот. АН УзССР, Вып. 17. Ташкент, 1962. – С. 77–108.
326. Чернева О. В. Род *Апига* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 334.
327. Чернева О. В. Род *Cousinia* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 246, 331, 510.
328. Чернева О. В. Род *Olgaea* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 380–381.
329. Чернева О. В. Род *Oligochaeta* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 412.
330. Чернева О. В. Род *Serratula* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 388.
331. Чернева О. В. Род *Juginea* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 359–367.
332. Чернева О. В. Род *Echinops* // Флора Узбекистана. Т. 6. Ташкент: АН УзССР, 1962. – С. 213–223.
333. Чернева О. В. Род *Echinops* // Флора СССР. Т. 27. М.-Л.: АН СССР, 1967. – С. 12.
334. Чернева О. В. Сем. Iridaceae // Определитель растений Средней Азии. Т. 2. Ташкент: Фан, 1971. – С. 122–141.
335. Черняковская Е. Г. Род *Gladiolus* // Флора СССР. Т. 4. М.-Л.: АН СССР, 1935. – С. 578–581.
336. Черняковская Е. Г. Род *Crambe* // Флора СССР. Т. 8 М.-Л.: АН СССР, 1939. – С. 474–491.
337. Черняковская Е. Г. Сем. Orchidaceae // Флора Узбекистана. Т. 1. Ташкент: АН УзССР, 1941. – С. 522–532.
338. Шарипов А. Х. *Tulipa vvedenskyi* Z. Botsch. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 141.
339. Шарипов А. Х. *Tulipa micheliana* Hoog. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 142.
340. Шарипов А. Х. *Tulipa ferganica* Vved. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 143.
341. Шарипов А. Х. *Tulipa korolkowii* Regel. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент, "Chinor ENK", 1996. – С. 145.
342. Шерматов Г. М. Секция *Bucharica* рода *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 220–222.
343. Шерматов Г. М. Секция *Macrocystis* *Astragalus* // Определитель растений Средней Азии. Т. 6. Ташкент: Фан, 1981. – С. 249–251.

344. Шерматов Г. М. Секция *Proselius* // Определитель растений Средней Азии. Ташкент: Фан, 1981. Т. VI. – С.211.
345. Шерматов Г. М. *Astragalus abolinii* Popov. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 29.
346. Шерматов Г. М. *Astragalus baranovii* Popov. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 31.
347. Шерматов Г. М. *Acanthophyllum albidum* Schischk. // Красная книга Республики Узбекистан. Ташкент: "Chinor ENK", 1996. – С. 209.
348. Шишкин В. К. Род *Oenanthe* // Флора СССР. Т. 16. М.-Л.: АН СССР, 1950. – С. 533. 357.
349. Шишкин В. К. Род *Zeravschania* // Флора СССР. Т. 16. М.-Л.: АН СССР, 1950. – С. 412.
350. Шомуродов Х. Ф., Сарыбаева Ш. У. *Astragalus centralis* Sheld. нинг морфогенези хусусида // Ўзбекистонда чўлланишнинг экологик муаммолари: халқаро илмий конференция материаллари. Тошкент, 2008. – Б. 146–149.
351. Шомуродов Х. Ф., Сарыбаева Ш., Ахмедов А., Абдураимов О. Распространение и современное состояние редких видов растений Устюрта. Материалы международной конференции "Биоразнообразие, сохранение и рациональное использование генофонда растительного и животного мира". Ташкент, 2014. – С.150–155.
352. Штейнберг Е. И. Род *Aconitum* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 183–236.
353. Шульгина В. В. Сем. *Vitaceae* // Деревья и кустарники СССР. Т. 4. М.-Л., 1958. – С. 607–645.
354. Юзепчук С. В. Род *Anemone* // Флора СССР. Т. 7. М.-Л.: АН СССР, 1937. – С. 236–280.
355. Юзепчук С. В. Шестьдесят новых шлемников // Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР. Т. 14. М.-Л., 1951. – С. 356–435.
356. Backlund M. & Thulin. Revision of genus *Plocama* // *Taxon* 56, 2007, 2:323.
357. Beshko N. Y., Tojibaev K. Sh. & Batoshov A. R. Tulips of the Nuratau Mountains and South-Eastern Kuzylkum (Uzbekistan) // *Stapfia: reports*. - Linz (Austria), 2013.- Vol. 99.- Pp. 198–204.
358. Fedtschenko O. Trois especes nouvelles du Genre *Eremurus* Extrait du Bulletin de l'herbier Boissier, 2-me Serie. Т. 4. 8, 1904.
359. Fritsch, R. M. & Abbasi, M. A Taxonomic Review of *Allium* subg. *Melanocrommyum* in Iran. *Gatersleben*, 2013. 240 pp.
360. Gregory M., Fritsch R., Friesen N., Khassanov F. O. & D. Mc Neal *Nomenclator Alliorum: Allium names and synonyms-a world guide*.- Royal Botanical Gardens, Kew, 1998. –83 p.
361. Jamzad Z. *Primulaceae*. Flora of Iran, 1999. – P. 19–58.
362. Khassanov F. O. A revision of the genus *Allium* L. in the flora of Uzbekistan.- In: Hanelt P., Hammer K., & Knapfner H. (Eds.): *The genus Allium -taxonomical problems and genetic resources*. *Gatersleben*, 1992. – P.153–159.
363. Khassanov F. O. & R. M. Fritsch. New taxa in *Allium* L. subg. *Melanocrommyum* (Webb & Berth.) Rouy from Central Asia. *Linzer biol. Beitr.* 1994, 26/1, - pp. 965–990.
364. Khassanov F. O. *Conspectus of the wild growing Allium species of Middle Asia*. - In: Ozturk M., Secmen O. and G. Gork (Eds.) *Plant Life in South West Asia*. *Ege Univ. Press, Izmir*, 1997. - pp.141–159.
365. Khassanov F. O., Shomuradov H. & Kadyrov G. Taxonomic revision of *Allium* L. sect *Allium* s. l. in Central Asia. // *Stapfia: reports*. - Linz (Austria), 2011. - Vol. 95. - pp. 171–173.
366. Khassanov F. O., Rakhimova N. Taxonomic revision of the genus *Iris* L. (*Iridaceae* Juss.) for the flora of Central Asia. // *Stapfia: reports*. - Linz (Austria), 2012. - Vol. 97. - pp. 121–126.
367. Khassanov F. O. et al. A new species from genus *Plocama* L. (*Rubiaceae* Juss.) from Middle Asia. // *Stapfia: reports*. - Linz (Austria), 2014. - Vol. 101. - pp. 23–26.
368. Liden M. The genus *Dionysia* (*Primulaceae*), a synopsis and five new species. *Willdenowia* 37: 2007. - pp.37–61.
369. Tojibaev K. Sh. A new *Tulipa* species from Fergan valley. *Linz. biol. beitr.*, 2009. 49/2.
370. Tojibaev K. Sh., Beshko N. Y. Reassessment of diversity and analysis of distribution in *Tulipa* (*Liliaceae*) in Uzbekistan // *Nordic Journal of Botany*. – 2014.
371. Tojibaev K. Sh., Turginov O. & Karimov F. A new species and new records of *Allium* (*Amarylloidaceae*) for Uzbekistan (Central Asia) // *Phytotaxa* 2014. 177 (5): 291–297.

Ўсимликларнинг латинча номлари Латинские названия растений

Amaryllidaceae

Allium praemixtum Vved.
 Allium aflatunense B. Fedtsch.
 Allium pskemense B. Fedtsch.
 Allium alaicum Vved.
 Allium botschantzevii Kamelin
 Allium bakhousianum Regel
 Allium majus Vved.
 Allium giganteum Regel
 Allium isakulii R.M. Fritsch et F.O. Khass.
 Allium rhodanthum Vved.
 Allium ravenii F.O. Khass. et al.
 Allium decoratum Turginov et Tojibaev
 Allium eremoprasum Vved.
 Allium viridiflorum Pobed.
 Ungernia victoris Vved. ex Artjuschenko
 Sternbergia lutea (L.) Spreng.
 Sternbergia fischeriana (Herb.) M. Roem.

Anacardiaceae

Rhus coriaria L.

Apiaceae (Umbelliferae)

Dorema microcarpum Korovin
 Sphaerosciadium denaëense (Schischk.)
 Pimenov et Kljuykov
 Aulacospermum popovii (Korov.) Kljuykov,
 Pimenov et V.N. Tikhom.
 Kamelinia tianschanica F.O. Khass. et I.I. Mal-
 zev
 Ferula helenae Rakhm. et Melibaev
 Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.
 Ferula tuberifera Korovin
 Ferula kyzylkumica Korovin
 Ferula pratovii F.O.Khass. et I.I. Maltzev
 Ferula fedtschenkoana Koso-Pol.
 Ferula korshinskyi Korovin
 Ferula vicaria Korovin
 Ferula helena Rakhm. et Melib.
 Mogoltavia sewerzowii (Regel) Korovin
 Oenanthe fedtschenkoana Koso-Pol.
 Oenanthe heterococca Korovin
 Komarovia anisosperma Korovin
 Cephalopodium hissaricum Pimenov

Zeravschania regeliana Korovin
 Fergania polyantha (Korovin) Pimenov
 Seseli turbinatum Korovin
 Paulita ovczinnikovii (Korovin) Sojak
 Autumnalia inopinata Pimenov
 Astomatopsis galiocarpa Korovin
 Lipskya insignis (Koso-Pol.) Nevski
 Bunium angreni Korovin
 Bunium vaginatum Korovin
 Dimorphosciadium gayoides (Regel & Schmalh.) Pimenov
 Lomatocarpa korovinii Pimenov
 Sphaenolobium tenuisectum (Korovin)
 Pimenov

Aspleniaceae

Phyllitis scolopendrum (L.) Newman

Asteraceae (Compositae)

Anura pallidivirens (Kult.) Tscherneva
 Cousinia allolepis Tscherneva et Vved.
 Cousinia adenophora Juz.
 Cousinia butkovii Tscherneva et Vved.
 Cousinia vvedenskyi Tscherneva
 Cousinia platystegia Tscherneva
 Cousinia dshisakensis Kult.
 Cousinia umbilicata Juz.
 Cousinia glaphyrocephala Juz. et Tscherneva
 Cousinia candicans Juz.
 Cousinia pterolepida Kult.
 Cousinia glabriseta Kult.
 Cousinia pseudolanata Popov ex Tscherneva
 Cousinia stricta Tscherneva
 Cousinia dolichophylla Kult.
 Cousinia hoplophylla Tscherneva
 Cousinia haesitabunda Juz.
 Cousinia campyloraphis Tscherneva
 Cousinia rhodantha Kult.
 Cousinia spryginii Kult.
 Cousinia praestans Tscherneva et Vved.
 Xylanthemum rupestre (Popov ex Nevski)
 Tzvelev.
 Echinops babatagensis Tscherneva
 Echinops brevipenicillatus Tscherneva
 Lepidolopha nuratavica Krasch.

Lepidolopha fedtschenkoana Knorring
Oligochaeta vvedenskyi (Popov) Tscherneva
Olgae pectinata Iljin.

Serratula lancifolia Zakirov

Scorzonera bungei Krasch. et Lipsch.

Tanacetopsis botschantzevii (Kovalevsk.)

Kovalevsk.

Trichanthemis butkovii Kovalevsk.

Ugamia angrenica (Krasch.) Tzvelev.

Jurinea gracilis Iljin.

Jurinea asperifolia Iljin.

Jurinea zakirovii Iljin.

Jurinea mariae Pavlov.

Jurinea sangardensis Iljin.

Jurinea psammophila Iljin.

Erigeron trimorphopsis Botsch.

Vicoa krasheninnikovii Kamelin

Koelpinia leiocarpa Popov.

Helichrysum nuratavicum Krasch.

Bignoniaceae

Incarvillea olgae Regel.

Boraginaceae

Lappula parvula Nabiev et Zakirov.

Lappula nurativica Nabiev et Zakirov.

Lappula aktaviensis Popov et Zakirov

Rindera fornicata Pazij

Heliotropium bucharicum B. Fedtsch.

Onosma macrorrhiza Popov.

Nonea calceolaris Nikif. & Pazij

Brassicaceae (Cruciferae)

Iskandera hissarica N. Busch

Parrya saxifraga Botsch. et Vved.

Parrya kuramensis Botsch.

Pseudoclausia sarawschanica (Regel et Schmalh.) Botsch.

Pseudoclausia olgae (Regel et Schmalh.) Botsch.

Pseudoclausia tschimganica (Popov ex Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.

Lepidium subcordatum Botsch. et Vved.

Lepidium olgae (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.

Crambe gordjagunii Sprygin et Popov

Spryginia winklerii (Regel) Popov

Campanulaceae

Ostrowskia magnifica Regel

Capparaceae

Capparis rosanowiana B. Fedtsch.

Cleome gordjagunii Popov

Caprifoliaceae

Lonicera paradoxa Pojark.

Caryophyllaceae

Allochrysa gypsophiloides (Regel) Schischk.

Silene michelsonii Preobr.

Silene tomentella Schischk.

Silene popovii Schischk.

Silene oreina Schischk.

Silene nataliae F.O. Khass.

Silena paranadena Bondarenko et Vved.

Acanthophyllum albidum Schischk.

Acanthophyllum cyrtostegium Vved.

Dianthus uzbekistanicus Lincz.

Chenopodiaceae

Climacoptera oxyphylla U.P. Pratov

Climacoptera malyginii (Korovin ex Botsch.) Botsch.

Climacoptera pjataevae U.P. Pratov

Climacoptera amblyostegia (Botsch.) Botsch.

Climacoptera merkulowiczii (Zakirov) Botsch.

Climacoptera ptiloptera U.P. Pratov

Halimocnemis lasiantha Iljin

Nanophyton botschantzevii U.P. Pratov

Salsola drobovii Botsch.

Salsola titovii Botsch.

Salsola chiwensis Popov

Anthochlamis tianschanica Iljin

Gamanthus ferganicus Iljin

Colchicaceae (Melanthiaceae)

Colchicum kesselringii Regel

Crassulaceae

Pseudosedum campanuliflorum Boriss.

Cucurbitaceae

Bryonia melanocarpa Nabiev

Cynomoriaceae

Cynomorium songaricum Rupr.

Ebenaceae

Diospyros lotus L.

Euphorbiaceae

Andrachne vvedenskyi Pazij
Euphorbia densiuscula Popov
Euphorbia kudrjashevii (Pazij) Prokh.
Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.
Euphorbia triodonta Prokh.
Euphorbia sclerocyathium Korovin et Popov

Fabaceae (Leguminosae)

Cercis griffithii Boiss.
Astragalus abolinii Popov
Astragalus baranovii Popov
Astragalus centralis E.Sheld.
Astragalus borissianus Gontsch.
Astragalus butkovii Popov
Astragalus bucharicus Regel
Astragalus willisii Popov
Astragalus nucleosus Popov
Astragalus auratus Gontsch.
Astragalus dianthoides Boriss.
Astragalus knorringianus Boriss.
Astragalus komarovii Lipsky.
Astragalus massagetovii B. Fedtsch.
Astragalus michaelis Boriss.
Astragalus nuratensis Popov
Astragalus plumatus Boriss.
Astragalus pseudanthylloides Gontsch.
Astragalus pskemensis Popov
Astragalus leptophysus Vved.
Astragalus pseudoeremophysa Popov
Astragalus holargyreus Bunge
Astragalus lasiocalyx Gontsch.
Astragalus tupalangi Gontsch.
Astragalus rhacodes Bunge
Astragalus subschachimardanus Popov
Astragalus rubrivenosus Gontsch.
Astragalus terrae-rubrae Butkov
Astragalus rubellus Gontsch.
Astragalus plumbeus (Nevski) Gontsch.
Astragalus adylovii F.O. Khass., Ergashev et Kadyrov
Astragalus alexeji Gontsch.
Astragalus belolipovii Kamelin ex F.O. Khass. et N. Sulejm.

Astragalus austroferganicus Kamelin et R.M.

Vinogr.

Astragalus rubri-galli Popov
Onobrychis tavernierifolia Stocks ex Boiss.
Calispepla aegacanthoides Vved.
Calophaca reticulata Sumnev.
Cicer grande (Popov) Korotkova
Cicer incanum Korotkova
Oxytropis vvedenskyi Filim.
Oxytropis tyttantha Gonsch.
Oxytropis maidantalensis B. Fedtsch.
Oxytropis pseudorosea Filim.
Oxytropis fedtschenkoana Vassilcz.
Oxytropis pseudoleptophysa Boriss.
Hedysarum angrenicum Korotkova
Hedysarum bucharicum B. Fedtsch.
Hedysarum drobovii Korotkova
Hedysarum amankutanicum B. Fedtsch.
Hedysarum magnificum Kudr.
Chesneya tribuloides Nevski.
Eversmannia botschantzevii Sarkisova
Eremosparton flaccidum Litv.

Fumariaceae

Fumariola turkestanica Korsh.

Grossulariaceae (Saxifragaceae)

Ribes malvifolium Pojark.

Hyacinthaceae (Liliaceae)

Dipcadi turkestanicum Vved.

Iridaceae

Gladiolus italicus Mill.
Iris winkleri Regel.
Iris magnifica (Vved.) F.O. Khass. et Rakhi-mova
Iris orchioides Carrière
Iris hippolyti (Vved.) Kamelin
Iris svetlanae (Vved.) F.O. Khass.
Iris victoris F.O. Khass. et al.

Lamiaceae (Labiatae)

Lagochilus olgae Kamelin
Lagochilus proskorjakovii Ikramov
Lagochilus vvedenskyi Kamelin et Zuckerw.
Lagochilus inebrians Bunge
Dracocephalum formosum Gontsch.
Dracocephalum komarovii Lipsky

Dracocephalum spinulosum Popov
Scutellaria holosericea Gontsch. ex Juz.
Scutellaria villosissima Gontsch. et Juz.
Scutellaria guttata Nevski ex Juz.
Scutellaria fedtschenkoi Bornm.
Scutellaria colpodea Nevski
Salvia insignis Kudr.
Salvia korolkowii Regel et Schmalh.
Salvia margaritae Botsch.
Salvia tianschanica Makhm.
Salvia submutica Botsch. et Vved.
Salvia lilacinocaerulea Nevski
Phlomidioschema parviflorum (Benth.) Vved.
Otostegia bucharica B. Fedtsch.
Paraeremostachys transoxana (Bunge) Adylov, Kamelin et Makhm.
Paraeremostachys anisochila (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.
Paraeremostachys aralensis (Bunge) Adylov, Kamelin et Makhm.
Phlomoides baburii (Adylov) Adylov
Phlomoides gypsacea (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.
Phlomoides leiocalyx (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.
Phlomoides tschimganica (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.
Eremostachys eriolarynx Pazij et Vved.
Phlomis nubilans Zakirov.
Leonurus kudrjashevii Kamelin et Tulyag.

Liliaceae

Gagea ludmilae Levichev
Fritillaria eduardii Regel
Tulipa vvedenskyi Botschantz.
Tulipa micheliana T.M. Hoog
Tulipa ferganica Vved.
Tulipa lehmaniana Merckl.
Tulipa korolkowii Regel
Tulipa affinis Botschantz.
Tulipa fosteriana Irving
Tulipa orithyioides Vved.
Tulipa dasystemon (Regel) Regel
Tulipa lanata Regel
Tulipa kaufmanniana Regel
Tulipa tubergeniana T.M. Hoog
Tulipa ingens T.M. Hoog
Tulipa dubia Vved.
Tulipa carinata Vved.

Tulipa uzbekistanica Botschantz. et Sharipov
Tulipa greigi Regel
Tulipa scharipovii Tojibaev
Tulipa intermedia Tojibaev et J. de Groot

Limoniaceae (Plumbaginaceae)

Acantholimon annae Lincz.
Acantholimon ekatherinae (B. Fedtsch.) Czerniak.
Acantholimon margaritae Korovin et Lincz.
Acantholimon nuratavicum Zakirov
Acantholimon subavenaceum Lincz.
Cephalorhizum oopodum Popov et Korovin

Moraceae

Ficus carica L.

Orchidaceae

Eulophia turkestanica (Litv.) Schlecht.

Paeonaceae

Paeonia hybrida Pall.

Peganaceae (Zygophyllaceae)

Malacocarpus crithmifolius (Retz.) C.A.Mey.

Platanaceae

Platanus orientalis L.

Poaceae (Gramineae)

Stipa aktauensis Roshev.
Stipa karataviensis Roshev.
Stipa gnezdilloi Pazij.

Polygonaceae

Calligonum molle Litv.
Calligonum matteianum Drobow
Calligonum elegans Drobow
Calligonum calcareum Pavlov
Calligonum paletzianum Litv.
Calligonum zakirovii (Khalk.) F.O. Khass.

Primulaceae

Dionysia hissarica Lipsky

Punicaceae

Punica granatum L.

Ranunculaceae

Delphinium knorringianum B. Fedtsch.
 Aconitum talassicum Popov
 Anemone baissunensis Juz.
 Anemone bucharica Regel
 Adonathe leiosepala (Butkov) Chrtak et
 Slaviková

Eremurus robustus Regel
 Eremurus nuratavicus A.P. Khokhr.
 Eremurus lactiflorus O. Fedtsch.
 Eremurus luteus Baker
 Eremurus suworowii Regel
 Eremurus chloranthus Popov
 Eremurus aitchisonii Baker

Rhamnaceae

Ziziphus jujuba Mill.

Zygophyllaceae

Zygophyllum bucharicum B Fedtsch.

Rosaceae

Pyrus asia-mediae (Popov) Maleev

Rubiaceae

Rubia laevissima Tschernova.
 Plocama botschantzevii (Lincz.) M. Backlund
 et Thulin
 Plocama alshehbazii F.O. Khass. et al.

Rutaceae

Haplophyllum bucharicum Litv.

Santalaceae

Thesium minkwitzianum B. Fedtsch.

Saxifragaceae

Bergenia ugamica V.N. Pavlov
 Bergenia hissarica Boriss.

Scrophulariaceae

Spirostegia bucharica (B. Fedtsch.) Ivanina.
 Pedicularis grandis Popov ex Vved.

Solanaceae

Physochlaina alaica Korotkova ex Kovalevsk.

Thymelaeaceae

Wikstroemia alberti (Regel) Domke

Vitaceae

Vitis vinifera L.

Xanthorrhoeaceae (= Asphodelaceae)

Eremurus alberti Regel
 Eremurus iae Vved.
 Eremurus baissunensis O. Fedtsch.
 Eremurus korovinii B. Fedtsch.
 Eremurus pubescens Vved.

"ҚИЗИЛ КИТОБ" ГА КИРИТИЛГАН ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ЎЗБЕКЧА, РУСЧА ВА ЛОТИНЧА НОМЛАРИ

Т/р	ЎСИМЛИКЛАР	РАСТЕНИЯ	PLANTAE	БЕТ
Айиқтовондошлар оиласи – Семейство Лютиковые – Ranunculaceae				
1.	Кнорринг исфараги	Живокость Кнорринга	<i>Delphinium knorringianum</i> B. Fedtsch.	8
2.	Оқ парпи	Аконит таласский	<i>Aconitum talassicum</i> Popov	9
3.	Бойсун пўфанаги	Ветреница байсунская	<i>Anemone baissunensis</i> Juz.	10
4.	Бухоро пўфанаги	Ветреница бухарская	<i>Anemone bucharica</i> Regel	11
5.	Туксиз суғурўт	Горицвет голочашечный	<i>Adonanthe leiosepala</i> (Butkov) Chrtak et Slaviková	12
Анордошлар оиласи – Семейство Гранатовые – Punicaceae				
6.	Ёввойи анор	Гранат обыкновенный	<i>Punica granatum</i> L.	13
Бигнониядошлар оиласи – Семейство Бигнониевые – Bignoniaceae				
7.	Ольга инкарвиллеяси	Инкарвиллея Ольги	<i>Incarvillea olgae</i> Regel	14
Бурчоқдошлар оиласи – Семейство Мотыльковые (Бобовые) – Fabaceae (Leguminosae)				
8.	Бинафшагулли аргувон	Багрянник Гриффита	<i>Cercis griffithii</i> Boiss.	15
9.	Аболин астрагали	Астрагал Аболина	<i>Astragalus abolinii</i> Popov	16
10.	Баранов астрагали	Астрагал Баранова	<i>Astragalus baranovii</i> Popov	17
11.	Бинафшаранг астрагал	Астрагал центральный	<i>Astragalus centralis</i> E. Sheld.	18
12.	Борис астрагали	Астрагал Бориса	<i>Astragalus borissianus</i> Gontsch.	19
13.	Бутков астрагали	Астрагал Буткова	<i>Astragalus butkovii</i> Popov	20
14.	Бухоро астрагали	Астрагал бухарский	<i>Astragalus bucharicus</i> Regel	21
15.	Виллис астрагали	Астрагал Виллиса	<i>Astragalus willisii</i> Popov	22
16.	Ёнғоқсимон астрагал	Астрагал ореховый	<i>Astragalus nucleosus</i> Popov	23
17.	Зарҳал астрагал	Астрагал позолоченный	<i>Astragalus auratus</i> Gontsch.	24
18.	Икки рангли астрагал	Астрагал двухцветковидный	<i>Astragalus dianthoides</i> Boriss.	25
19.	Кнорринг астрагали	Астрагал Кнорринга	<i>Astragalus knorringianus</i> Boriss.	26
20.	Комаров астрагали	Астрагал Комарова	<i>Astragalus komarovii</i> Lipsky	27
21.	Массагетов астрагали	Астрагал Массагетова	<i>Astragalus massagetovii</i> B. Fedtsch.	28
22.	Михаил астрагали	Астрагал Михаила	<i>Astragalus michaelis</i> Boriss.	29
23.	Нурота астрагали	Астрагал нуратинский	<i>Astragalus nuratensis</i> Popov	30
24.	Патсимон астрагал	Астрагал перистый	<i>Astragalus plumatus</i> Boriss.	31
25.	Пахмоқтукли астрагал	Астрагал ложноязвенниковый	<i>Astragalus pseudanthylloides</i> Gontsch.	32

26.	Писком астрагали	Астрагал пскемский	<i>Astragalus pskemensis</i> Popov	33
27.	Пуфак астрагал	Астрагал тонкопузырчатый	<i>Astragalus leptophysus</i> Vved.	34
28.	Сохта чўл астрагали	Астрагал ложноэремофиза	<i>Astragalus pseudoeremophysa</i> Popov	35
29.	Сур астрагал	Астрагал сплошь серебристый	<i>Astragalus holargyreus</i> Bunge	36
30.	Тук косачали астрагал	Астрагал волосисточашечный	<i>Astragalus lasiocalyx</i> Gontsch.	37
31.	Туполон астрагали	Астрагал тупаланский	<i>Astragalus tupalangi</i> Gontsch.	38
32.	Юлинган астрагал	Астрагал оборванный	<i>Astragalus rhacodes</i> Bunge	39
33.	Юмалоқ тўлгулли астрагал	Астрагал почти шахимарданский	<i>Astragalus</i> <i>subschachimardanus</i> Popov	40
34.	Қизилтомир астрагал	Астрагал красножилковый	<i>Astragalus rubrivenosus</i> Gontsch.	41
35.	Қизилтупроқ астрагали	Астрагал красноземный	<i>Astragalus terrae-rubrae</i> Butkov	42
36.	Қизғиш астрагал	Астрагал красноватый	<i>Astragalus rubellus</i> Gontsch.	44
37.	Қўргошин астрагал	Астрагал свинцовый	<i>Astragalus plumbeus</i> (Nevski) Gontsch.	45
38.	Одилов астрагали	Астрагал Адылова	<i>Astragalus adylovii</i> F.O. Khass., Ergashev et Kadyrov	46
39.	Алексей астрагали	Астрагал Алексея	<i>Astragalus alexeji</i> Gontsch.	47
40.	Белоплипов астрагали	Астрагал Белоплипова	<i>Astragalus belolipovii</i> Kamelin ex F.O. Khass. et N. Sulejm.	48
41.	Жанубий Фаргона астрагали	Астрагал южноферганский	<i>Astragalus austroferganicus</i> Kamelin et R. M. Vinogr.	49
42.	Қизил хўроз астрагали	Астрагал кызыл-хуразский	<i>Astragalus rubri-galli</i> Popov	50
43.	Шуълали зирақўт	Эспарцет таверниерелистный	<i>Onobrychis tavernierifolia</i> Stocks ex Boiss.	51
44.	Бурчоқсимон калиспепла	Калиспепла эгакантовая	<i>Calispepla aegacanthoides</i> Vved.	52
45.	Қорапоя мойқорагон	Майкараган сетчатый	<i>Calophaca reticulata</i> Sumnev.	53
46.	Йирик нўхат	Нут большой	<i>Cicer grande</i> (Popov) Korotkova	54
47.	Қудройи нўхат	Нут седой	<i>Cicer incanum</i> Korotkova	55
48.	Введенский окситрописи	Остролодочник Введенского	<i>Oxytropis vvedenskyi</i> Filim.	56
49.	Майда гулли окситропис	Остролодочник мелкоцветный	<i>Oxytropis tyttantha</i> Gonsch.	57
50.	Майдонтол окситрописи	Остролодочник майдантальский	<i>Oxytropis maidantalensis</i> B. Fedtsch.	58
51.	Ним пушти ранг окситропис	Остролодочник ложнорозовый	<i>Oxytropis pseudorosea</i> Filim.	59
52.	Федченко окситрописи	Остролодочник Федченко	<i>Oxytropis fedtschenkoana</i> Vassilcz.	60
53.	Юпқа пардали окситропис	Остролодочник ложнотонкопузырчатый	<i>Oxytropis pseudoleptophysa</i> Boriss.	61
54.	Ангрен тангаўти	Копеечник ангрениский	<i>Hedysarum angrenicum</i> Korotkova	62

55.	Бухоро тангаўти	Копеечник бухарский	Hedysarum bucharicum B. Fedtsch.	63
56.	Дробов тангаўти	Копеечник Дробова	Hedysarum drobovii Korotkova	64
57.	Омонқўтон тангаўти	Копеечник аманкутанский	Hedysarum amankutanicum B. Fedtsch.	65
58.	Тизма тангаўт	Копеечник великолепный	Hedysarum magnificum Kudr.	66
59.	Лангарсимон чезнея	Чезнея якорцевидная	Chesneya tribuloides Nevski	68
60.	Бочанцев эверсманнияси	Эверсманния Бочанцева	Eversmannia botschantzevii Sarkisova	69
61.	Осилувчан (эгилувчан) қулонқуйруқ	Эremosпартон обвислый	Eremosparton flaccidum Litv.	70
Бугдойдошлар оиласи – Семейство Мятликовые (Злаковые) – Poaceae (Graminea)				
62.	Оқтоғ чалови	Ковыль актавский	Stipa aktauensis Roshev.	71
63.	Қоратоғ чалови	Ковыль каратавский	Stipa karataviensis Roshev.	72
64.	Гнездилло чалови	Ковыль Гнездилло	Stipa gnezdilloi Pazij	73
Гиацинтдошлар оиласи – Семейство Гиацинтовые (Лилейные) – Hyacinthaceae (Liliaceae)				
65.	Туркистон дипкадийси	Дипкади туркестанский	Dipcadi turkestanicum Vved.	74
Гулсафсардошлар оиласи – Семейство Ирисовые – Iridaceae				
66.	Италия гладиолуси	Шпажник посевной	Gladiolus italicus Mill.	75
67.	Винклер гулсафсари	Ирис Винклера	Iris winkleri Regel	77
68.	Антиқа гулсафсар	Ирис великолепный	Iris magnifica (Vved.) Vved. F. O. Khass.& Rakhimova	78
69.	Орхидеянамо гулсафсар	Ирис орхидный	Iris orchioides Carrière	79
70.	Ипполит гулсафсари	Ирис Ипполита	Iris hippolyti (Vved.) Kamelin	80
71.	Светлана гулсафсари	Ирис Светланы	Iris svetlanæ (Vved.) F.O. Khass.	81
72.	Виктор гулсафсари	Ирис Виктора	Iris victoris F.O. Khass. et al.	82
Зирадошлар (Соябонгулдошлар) оиласи – Семейство Сельдерейные (Зонтичные) – Apiaceae (Umbelliferae)				
73.	Майда мевали дорема	Дорема мелкоплодная	Dorema microcarpum Korovin	83
74.	Денов жуфтуруғи	Шарозонтичник денауский	Sphaerosciadium denaense (Schischk.) Pimenov et Kljuykov	84
75.	Попов жўякмеваси	Бороздоплодник Попова	Aulacospermum popovii (Korov.) Kljuykov, Pimenov et V.N. Tikhom.	85
76.	Тянь-Шань камелинияси	Камелиния тяньшанская	Kamelinia tianschanica F.O.Khass. et I. I. Malzev	86
77.	Сумбул коврак	Ферула мускатная	Ferula sumbul (Kauffm.) Hook. f.	87
78.	Туганакли коврак	Ферула клубненосная	Ferula tuberifera Korovin	88
79.	Қизилқум коврағи	Ферула кызылқумская	Ferula kyzylkumica Korovin	89
80.	Пратов коврағи	Ферула Пратова	Ferula pratovii F.O. Khass. et I.I. Malzev	90

81.	Федченко ковраги	Ферула федченковская	<i>Ferula fedtschenkoana</i> Koso-Pol.	91
82.	Коржинский ковраги	Ферула Коржинского	<i>Ferula korshinskiyi</i> Korovin	92
83.	Ўринбосар коврак	Ферула замещающая	<i>Ferula vicaria</i> Korovin	93
84.	Елена ковраги	Ферула Елены	<i>Ferula helenae</i> Rakhm. et Melibaev	94
85.	Тожик ковраги	Ферула таджиков	<i>Ferula tadshikororum</i> Pimenov	95
86.	Федченко пилдиروقмеваси	Омежник федченковский	<i>Oenanthe fedtschenkoana</i> Koso- Pol.	97
87.	Чизиқпояли пилдиروقмева	Омежник разноплодный	<i>Oenanthe heterococca</i> Korovin	98
88.	Шаширсимон пуфакбўғим	Комаровия нервносемянная	<i>Komarovia anisosperma</i> Korovin	99
89.	Ҳисор сарпояси	Головоног гиссарский	<i>Cephalopodium hissaricum</i> Pimenov	100
90.	Регел қирқбоши	Зеравшания Регеля	<i>Zeravschania regeliana</i> Korovin	101
91.	Сариқ қирқгул	Фергания многоцветковая	<i>Fergania polyantha</i> (Korovin) Pimenov	102
92.	Пилдиروق кўшшоҳ	Жабрица кубарчатая	<i>Seseli turbinatum</i> Korovin	103
93.	Овчинников паулияси	Паулия Овчинникова	<i>Paulita ovczinnikovii</i> (Korovin) Sojak	104
94.	Фаройиб кузаки	Осенница неожиданная	<i>Autumnalia inopinata</i> Pimenov	105
95.	Чакамиғмевасимон астоматопсис	Астомотопсис подмареннико- плодный	<i>Astomotopsis galiocarpa</i> Korovin	106
96.	Ангрен зираси	Буниум ангрениский	<i>Bunium angreni</i> Korovin	107
97.	Новбаргли зира	Буниум влагалищный	<i>Bunium vaginatum</i> Korovin	108
98.	Гайсимон диморфосциадий	Диморфосциадий гайевидный	<i>Dimorphosciadium. gayoides</i> (Regel & Schmalh.) Pimenov.	109
99.	Коровин ломатокарпаси	Окаймленноплодный Коровина	<i>Lomatocarpa korovinii</i> Pimenov.	110
100.	Ингичка баргли понапанжа	Клинолопасть тонкорассеченный	<i>Sphaenolobium tenuisectum</i> (Korovin) Pimenov.	111
Исирикдошлар оиласи – Семейство Могильниковые (Парнолистниковые) – Ranunculaceae (Zygophyllaceae)				
101.	Кўнғир қумузум	Мягкоплодный критмолистный	<i>Malacocarpus crithmifolius</i> (Retz.) C.A. Mey.	112
Итузумдошлар оиласи – Семейство Пасленовые – Solanaceae				
102.	Олой хиёли	Пузырница алайская	<i>Physochlaina alaica</i> Korotkova ex Kovalevsk.	113
Карамдошлар оиласи – Семейство Капустные (Крестоцветные) – Brassicaceae (Cruciferae)				
103.	Ҳисор исқандараси	Искандера гиссарская	<i>Iskandera hissarica</i> N. Busch.	114
104.	Тошбузар паррияси	Паррия камнеломка	<i>Parrya saxifraga</i> Botsch. et Vved.	115
105.	Қурама паррияси	Паррия кураминская	<i>Parrya kuramensis</i> Botsch.	116
106.	Зарафшон сохта клаусияси	Ложноклаусия зеравшанская	<i>Pseudoclausia zerawschanica</i> (Regel et Schmalh.) Botsch.	117

107.	Чимён сохта клаусияси	Ложноклаусия чимганская	<i>Pseudoclausia tschimganica</i> (Popov ex Botsch. et Vved.) A.V.Vassil.	118
108.	Юраксимон торол	Клоповник почтисердцевидный	<i>Lepidium subcordatum</i> Botsch. et Vved.	119
109.	Ольга лепидиуми	Клоповник Ольги	<i>Lepidium olgae</i> (R.M. Vinogr.) Al-Shehbaz et Mumm.	120
110.	Гордягин қатрони	Катран Гордягина	<i>Crambe gordjaginii</i> Sprygin et Popov.	121
111.	Винклер спригинияси	Спрыгиния Винклера	<i>Spryginia winklerii</i> (Regel) Popov.	122
Кармақдошлар оиласи – Семейство Кермековые – Limoniaceae (Plumbaginaceae)				
112.	Анна кирпиўти	Акантолимон Анны	<i>Acantholimon annae</i> Lincz.	123
113.	Екатерина кирпиўти	Акантолимон Екатерины	<i>Acantholimon ekatherinae</i> (B. Fedtsch.) Czerniak.	124
114.	Маргарита кирпиўти	Акантолимон Маргариты	<i>Acantholimon margaritae</i> Korovin et Lincz.	125
115.	Нурота кирпиўти	Акантолимон нуратинский	<i>Acantholimon nuratavicum</i> Zakirov	126
116.	Деярли сулисимон кирпиўт	Акантолимон почтивовсовый	<i>Acantholimon subavenaceum</i> Lincz	127
117.	Тухумоёқ илдизбош, цефалоризум	Корнеглав яйцепогий	<i>Cephalorhizum oopodum</i> Popov et Korovin	128
Келинсупургидошлар – Семейство Тимелеевые – Thymelaeaceae				
118	Альберт қисрони	Викстремя Альберта (рестелла Альберта)	<i>Wikstroemia alberti</i> (Regel) Domke	129
Ковулдошлар оиласи – Семейство Каперцевые – Capparaceae				
119.	Розанов ковули	Каперцы Розанова	<i>Capparis rosanowiana</i> B. Fedtsch.	130
120.	Гордягин клеомаси	Клеоме Гордягина	<i>Cleome gordjaginii</i> Popov	131
Лоладошлар оиласи – Семейство Лилейные – Liliaceae				
121.	Людмила бойчечаги	Гусиный лук Людмилы	<i>Gagea ludmilae</i> Levichev	132
122.	Холмон исирғагули	Рябчик Эдуарда	<i>Fritillaria eduardii</i> Regel	133
123.	Введенский лоласи	Тюльпан Введенского	<i>Tulipa vvedenskyi</i> Botschantz.	134
124.	Михел лоласи, дилбанд лола	Тюльпан Михели	<i>Tulipa micheliana</i> T. M. Hoog	135
125.	Фарғона лоласи, Жавғаз лола	Тюльпан ферганский	<i>Tulipa ferganica</i> Vved.	136
126.	Леманн лоласи, Жовқосин лола	Тюльпан Леманна	<i>Tulipa lehmaniana</i> Merckl.	137
127.	Корольков лоласи	Тюльпан Королькова	<i>Tulipa korolkowii</i> Regel	139
128.	Қардош лола, Нурота лоласи	Тюльпан родственный	<i>Tulipa affinis</i> Botschantz.	141
129.	Фостер лоласи	Тюльпан Фостера	<i>Tulipa fosteriana</i> Irving	142
130.	Оқ лола	Тюльпан оритиевидный	<i>Tulipa orithyoides</i> Vved.	143

131.	Сарғиш лола	Тюльпан волосистотычиночный	<i>Tulipa dasystemon</i> (Regel) Regel	144
132.	Тукли лола, Сурхон лоласи	Тюльпан шерстистый	<i>Tulipa lanata</i> Regel	145
133.	Кауфман лоласи, Тарғил лола	Тюльпан Кауфмана	<i>Tulipa kaufmanniana</i> Regel	146
134.	Туберген лоласи	Тюльпан Тубергена	<i>Tulipa tubergeniana</i> T. M. Hoog	147
135.	Улуғвор лола	Тюльпан великий	<i>Tulipa ingens</i> T. M. Hoog	148
136.	Шубҳали лола, Чипор лола	Тюльпан сомнительный	<i>Tulipa dubia</i> Vved.	149
137.	Чўлбайир лоласи	Тюльпан килеватый	<i>Tulipa carinata</i> Vved.	150
138.	Ўзбекистон лоласи	Тюльпан узбекистанский	<i>Tulipa uzbekistanica</i> Botschantz. et Sharipov	151
139.	Қизил лола (Грейг лоласи)	Тюльпан Грейга	<i>Tulipa greigi</i> Regel	152
140.	Шарипов лоласи, гулбарра	Тюльпан Шарипова	<i>Tulipa scharipovii</i> Tojibaev	153
141.	Оралиқ лола	Тюльпан промежуточный	<i>Tulipa intermedia</i> Tojibaev et J. de Groot	154
Наврўзгулдошлар оиласи – Семейство Первоцветные – Primulaceae				
142.	Ҳисор дионисияси	Дионисия гиссарская	<i>Dionysia hissarica</i> Lipsky	156
Пистадошлар оиласи – Семейство Сумаховые – Anacardiaceae				
143.	Ошловчи тотим (Сирка дарахти)	Сумах дубильный	<i>Rhus coriaria</i> L.	157
Раъногулдошлар оиласи – Семейство Розоцветные – Rosaceae				
144.	Ўрта Осиё ноки	Груша среднеазиатская	<i>Pyrus asia-mediae</i> (Popov) Maleev	158
Рўяндошлар оиласи – Семейство Мареновые – Rubiaceae				
145.	Силлиқ рўян	Марена гладкая	<i>Rubia laevissima</i> Tscherneva	159
146.	Бочанцев плокамаси	Плокама Бочанцева	<i>Plocama botschantzevii</i> (Lincz.) M. Backlund et Thulin	160
147.	Ал-Шаҳбоз плокамаси	Плокама Аль-Шехбаза	<i>Plocama alshehbazii</i> F.O. Khass. et al.	161
Савринжондошлар оиласи – Семейство Безвременниковые (Мелантовые) – Colchicaceae (Melanthiaceae)				
148.	Кесселринг савринжони	Безвременник Кесселринга	<i>Colchicum kesselringii</i> Regel	162
Салабдошлар оиласи – Семейство Орхидные – Orchidaceae				
149.	Туркистон зулофияси	Зулофия туркестанская	<i>Eulophia turkestanica</i> (Litv.) Schlecht.	163
Саллагулдошлар оиласи – Семейство Пионовые (Лютиковые) – Paeonaceae (Ranunculaceae)				
150.	Ёввойи саллагул	Пион степной	<i>Paeonia hybrida</i> Pall.	164
Санталдошлар оиласи – Семейство Санталовые – Santalaceae				
151.	Минквиц тезиуми	Ленец Минквица	<i>Thesium minkwitzianum</i> B. Fedtsch.	165

Семизакдошлар оиласи – Семейство Толстянковые – Crassulaceae				
152.	Қўнғироқгулли сохтасемизак	Ложноочиток колокольчикоцветный	Pseudosedum campanuliflorum Boriss.	166
Сигирқуйруқдошлар оиласи – Семейство Норичниковые – Scrophulariaceae				
153.	Бухоро спиростегияси	Спиростегия бухарская	Spirostegia bucharica (B. Fedtsch.) Ivanina	167
154.	Йирик шеролчин	Мытник большой	Pedicularis grandis Popov ex Vved.	168
Сутламадошлар оиласи – Семейство Молочайные – Euphorbiaceae				
155.	Введенский андрахнаси	Андрохна Введенского	Andrachne vvedenskyi Pazij	169
156.	Айришоҳ сутлама	Молочай густоватый	Euphorbia densiuscula Popov	170
157.	Кудряшев сутламаси	Молочай Кудряшева	Euphorbia kudrjashevii (Pazij) Prokh.	171
158.	Тигиз сутлама	Молочай ложногустоватый	Euphorbia densiusculiformis (Pazij) Botsch.	172
159.	Учтишли сутлама	Молочай трёхзубчатый	Euphorbia triodonta Prokh.	173
160.	Қадахсимон сутлама	Молочай твёрдобокальчатый	Euphorbia sclerocyathium Korovin et Popov	174
Талоқдоридошлар оиласи – Семейство Настоящие папоротники – Aspleniaceae				
161.	Қоя ғорўти	Листовик сколопендровый	Phyllitis scolopendrum (L.) Newman	175
Торондошлар оиласи – Семейство Гречишные – Polygonaceae				
162.	Майин тукли қандим	Кандым мягкий	Calligonum molle Litv.	176
163.	Маттей қандими	Кандым Маттея	Calligonum matteianum Drobow	177
164.	Нозик қандим	Кандым изящный	Calligonum elegans Drobow	178
165.	Оҳактош қандими	Кандым известковый	Calligonum calcareum Pavlov	179
166.	Палецкий қандими	Кандым Палецкого	Calligonum paletzianum Litv.	180
167.	Зокиров қандими	Кандым Закирова	Calligonum zakirovii (Khalk.) F.O. Khass.	181
Тошбақатолдошлар оиласи – Семейство Рутовые – Rutaceae				
168.	Бухоро тошбақатоли	Цельнолистник бухарский	Haplophyllum bucharicum Litv.	182
Тошёрардошлар оиласи – Семейство Толстянковые – Crassulaceae				
169.	Угом бадани	Бадан угамский	Bergenia ugamica V.N. Pavlov	183
170.	Ҳисор бадани	Бадан гиссарский	Bergenia hissarica Boriss.	184
Тутдошлар оиласи – Семейство Тутовые – Moraceae				
171.	Ёввойи анжир	Инжир дикий	Ficus carica L.	185

Туятовондошлар оиласи – Семейство Парнолистниковые – Zygophyllaceae				
172.	Бухоро туятовони	Парнолистник бухарский	Zygophyllum bucharicum B Fedtsch.	186
Узумдошлар оиласи – Семейство Виноградные – Vitaceae				
173.	Ёввойи ток (узум)	Виноград винный (дикий)	Vitis vinifera L.	187
Хурмодошлар оиласи – Семейство Эбеновые – Ebenaceae				
174.	Сафсан хурмо	Хурма кавказская	Diospyros lotus L.	188
Чилонжийдадошлар оиласи – Семейство Крушиновые – Rhamnaceae				
175.	Ёввойи чилонжийда	Унаби обыкновенная	Ziziphus jujuba Mill.	189
Чиннигулдошлар оиласи – Семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae				
176.	Качимсимон етмак (бех)	Аллохруза качимовидная	Allochrusa gypsophiloides (Regel) Schischk.	190
177.	Михельсон зўрчаси	Смолевка Михельсона	Silene michelsonii Preobr.	191
178.	Момиқ зўрча	Смолевка пушистая	Silene tomentella Schischk.	192
179.	Попов зўрчаси	Смолевка Попова	Silene popovii Schischk.	193
180.	Тоғ зўрчаси	Смолевка горная	Silene oreina Schischk.	194
181.	Наталья зўрчаси	Смолевка Наталии	Silene nataliae F.O.Khass.	195
182.	Безчали зўрча	Смолевка почтижелезистая	Silena paranadena Bondarenko et Vved.	196
183.	Бигизсимон оқтикан	Колючелистник беловатый	Acanthophyllum albidum Schischk.	197
184.	Нинасимон оқтикан	Колючелистник горбатопрцветниковый	Acanthophyllum cyrtostegium Vved.	198
185.	Ўзбекистон чиннигули	Гвоздика узбекистанская	Dianthus uzbekistanicus Lincz.	199
Чинордошлар оиласи – Семейство Платановые – Platanaceae				
186.	Шарқ чинори	Платан восточный	Platanus orientalis L.	200
Чучмомадошлар оиласи – Семейство Амариллисовые – Amaryllidaceae				
187.	Аралаш пиёз	Лук смешанный	Allium praemixtum Vved.	201

188.	Афлотун пиёзи	Лук афлатунский	<i>Allium aflatunense</i> B. Fedtsch.	202
189.	Писком пиёзи	Лук пскемский	<i>Allium pskemense</i> B. Fedtsch.	203
190.	Олой пиёзи	Лук алайский	<i>Allium alaicum</i> Vved.	204
191.	Бочанцев пиёзи	Лук Бочанцева	<i>Allium botschantzevii</i> Kamelin	205
192.	Баххауз пиёзи	Лук Баххауза	<i>Allium bakhousianum</i> Regel	206
193.	Катта пиёз	Лук большой	<i>Allium majus</i> Vved.	207
194.	Йирик пиёз	Лук гигантский	<i>Allium giganteum</i> Regel	208
195.	Исокул пиёзи	Лук Исакула	<i>Allium isakulii</i> R.M. Fritsch et F.O. Khass.	209
196.	Пушти гулли пиёз	Лук розовоцветный	<i>Allium rhodanthum</i> Vved.	210
197.	Равен пиёзи	Лук Равена	<i>Allium ravenii</i> F.O. Khass. et al.	211
198.	Манзарали пиёз	Лук декоративный	<i>Allium decoratum</i> Turginov et Tojibaev	212
199.	Сахро пиёзи, чўл пиёзи	Лук пустынный	<i>Allium eremoprasum</i> Vved.	213
200.	Яшил гулли пиёз	Лук зеленоватый	<i>Allium viridiflorum</i> Pobed.	214
201.	Виктор омонқораси	Унгерния Виктора	<i>Ungernia victoris</i> Vved. ex Artjuschenko	215
202.	Сариқ штернбергия	Штернбергия жёлтая	<i>Sternbergia lutea</i> (L.) Spreng.	216
203.	Фишер штернбергияси	Штернбергия Фишера	<i>Sternbergia fischeriana</i> (Herb.) M. Roem.	217

Шилвидошлар оиласи – Семейство Жимолостные – Caprifoliaceae

204.	Ғалати учқат	Жимолость странная	<i>Lonicera paradoxa</i> Pojark.	218
------	--------------	--------------------	----------------------------------	-----

Ширачдошлар оиласи – Семейство Асфodelевые –

205.	Альберт ширачи	Ширач Альберта	<i>Eremurus alberti</i> Regel	219
206.	Бештомир ширач	Ширач Ии	<i>Eremurus iae</i> Vved.	220
207.	Бойсун ширачи	Ширач байсунский	<i>Eremurus baissunensis</i> O. Fedtsch.	221
208.	Коровин ширачи	Ширач Коровина	<i>Eremurus korovinii</i> B. Fedtsch.	222

209.	Момиқ ширач	Ширач пушистый	<i>Eremurus pubescens</i> Vved.	223
210.	Нор ширач (хулка бола)	Ширач мощный	<i>Eremurus robustus</i> Regel	224
211.	Нурота ширачи	Ширач нуратинский	<i>Eremurus nuratavicus</i> A.P. Khokhr.	225
212.	Оқгулли ширач	Ширач молочнокветковый	<i>Eremurus lactiflorus</i> O. Fedtsch.	226
213.	Сариқ ширач	Ширач жёлтый	<i>Eremurus luteus</i> Baker	228
214.	Суворов ширачи	Ширач Суворова	<i>Eremurus suworowii</i> Regel	229
215.	Яшилгулли ширач	Ширач зеленоцветный	<i>Eremurus chloranthus</i> Popov	230
216.	Эчисон ширачи	Ширач Эчисона	<i>Eremurus aitchisonii</i> Baker	231

Шотарадошлар оиласи – Семейство Дымянковые – Fumariaceae

217.	Туркистон шотарачаси	Дымяночка туркестанская	<i>Fumariola turkestanica</i> Korsh.	232
------	----------------------	-------------------------	--------------------------------------	-----

Шўрадошлар оиласи – Семейство Маревые – Chenopodiaceae

218.	Ўткирбарг балиққўз	Климакоптера остролистная	<i>Climacoptera oxyphylla</i> U.P. Pratov	233
219.	Малигин балиққўзи	Климакоптера Малигина	<i>Climacoptera malyginii</i> (Korovin ex Botsch.) Botsch.	234
220.	Пятаева балиққўзи	Климакоптера Пятаевой	<i>Climacoptera pjataevae</i> U.P.Pratov	235
221.	Тўмтоқ гулёнбаргчали балиққўз	Климакоптера тупопрцветничковая	<i>Climacoptera amblyostegia</i> (Botsch.) Botsch.	236
222.	Меркулович балиққўзи	Климакоптера Меркуловича	<i>Climacoptera merkulowiczii</i> (Zakirov) Botsch.	237
223.	Қаноти тукли балиққўз	Климакоптера птилоптера	<i>Climacoptera ptiloptera</i> U.P.Pratov	238
224.	Сертук бузоқбош	Галимокнемис войлочнокветковый	<i>Halimocnemis lasiantha</i> Iljin	239
225.	Бочанцев тошбиюргуни	Нанофитон Бочанцева	<i>Nanophyton botschantzevii</i> U.P.Pratov	240
226.	Дробов шўраги	Солянка Дробова	<i>Salsola drobovii</i> Botsch.	241
227.	Титов шўраги	Солянка Титова	<i>Salsola titovii</i> Botsch.	242
228.	Хива шўраги	Солянка хивинская	<i>Salsola chiwensis</i> Popov	243
229.	Тянь-Шань антохламиси	Антохламис тяньшанский	<i>Anthochlamis tianschanica</i> Iljin	244

230.	Фарғона донашўри	Спайноцветник Ферганский	<i>Gamanthus ferganicus</i> Iljin	245
Ялпиздошлар (Лабгулдошлар) оиласи – Семейство Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae (Labiatae)				
231.	Ольга бозулбанги	Зайцегуб Ольги	<i>Lagochilus olgae</i> Kamelin	246
232.	Проскоряков бозулбанги	Зайцегуб Проскорякова	<i>Lagochilus proskorjakovii</i> Ikramov	247
233.	Введенский бозулбанги	Зайцегуб Введенского	<i>Lagochilus vevedenskyi</i> Kamelin et Zuckerw.	248
234.	Сархуш бозулбанг	Зайцегуб опьяняющий	<i>Lagochilus inebrians</i> Bunge	249
235.	Ажойиб бўзбош	Змееголовник прекрасный	<i>Dracocephalum formosum</i> Gontsch.	250
236.	Комаров бўзбоши	Змееголовник Комарова	<i>Dracocephalum komarovii</i> Lipsky	251
237.	Тиканли бўзбош	Змееголовник колючий	<i>Dracocephalum spinulosum</i> Popov	252
238.	Ипаксимон кўкамарон	Шлемник шелковистейший	<i>Scutellaria holosericea</i> Gontsch. ex Juz.	253
239.	Момиқ кўкамарон	Шлемник мохнатейший	<i>Scutellaria villosissima</i> Gontsch. et Juz.	254
240.	Томчи кўкамарон	Шлемник капельный	<i>Scutellaria guttata</i> Nevski ex Juz.	255
241.	Федченко кўкамарони	Шлемник Федченко	<i>Scutellaria fedtschenkoi</i> Bornm.	256
242.	Қайрилган кўкамарон	Шлемник изогнутый	<i>Scutellaria colpodea</i> Nevski	257
243.	Зебо мармарак	Шалфей замечательный	<i>Salvia insignis</i> Kudr.	258
244.	Корольков мармараги	Шалфей Королькова	<i>Salvia korolkowii</i> Regel et Schmalh.	259
245.	Маргарита мармараги	Шалфей Маргариты	<i>Salvia margaritae</i> Botsch.	260
246.	Тянь-Шань мармараги	Шалфей тяньшанский	<i>Salvia tianschanica</i> Makhm.	261
247.	Тўмтоқ мармарак	Шалфей туповатый	<i>Salvia submutica</i> Botsch. et Vved.	262
248.	Ҳаворанг мармарак	Шалфей лиловоголубой	<i>Salvia lilacinocaerulea</i> Nevski	263
249.	Майда гулли тошбости	Зопниковник мелкоцветный	<i>Phlomidioschema parviflorum</i> (Benth.) Vved.	264
250.	Бухоро отостегияси	Отостегия бухарская	<i>Otostegia bucharica</i> B. Fedtsch.	265
251.	Амударё оқтўшаси	Фломоидес заамударьинский	<i>Phlomooides transoxana</i> (Bunge) Salmaki	266

252.	Учпояли оқтўша	Фломоидес неравногубый	<i>Phlomoides anisochila</i> (Pazij et Vved.) Salmaki	267
253.	Орол фломоидеси	Фломоидес аральский	<i>Phlomoides aralensis</i> (Bunge) Salmaki	268
254.	Бобур фломоидеси	Фломоидес Бабура	<i>Phlomoides baburii</i> (Adylov) Adylov	269
255.	Гипсли фломоидес	Фломоидес гипсовый	<i>Phlomoides gypsacea</i> (Popov) Adylov, Kamelin et Makhm.	270
256.	Силлиқ косачали фломоидес	Фломоидес гладкочашечный	<i>Phlomoides leiocalyx</i> (Pazij et Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.	271
257.	Чимён фломоидеси	Фломоидес чимганский	<i>Phlomoides tschimganica</i> (Vved.) Adylov, Kamelin et Makhm.	272
258.	Бўғизтукли эремостахис	Пустынноколосник опушонноглоточный	<i>Eremostachys eriolarynx</i> Pazij et Vved.	273
259.	Кўримсиз кўзикулоқ	Зопник мрачный	<i>Phlomis nubilans</i> Zakirov	274
260.	Кудряшев арслонқуйруғи	Пустырник Кудряшева	<i>Leonurus kudrjashevii</i> Kamelin et Tulyag.	275
Қовоқдошлар оиласи – Семейство Тыквенные – Cucurbitaceae				
261.	Қора сирттан	Переступень черноплодный	<i>Bryonia melanocarpa</i> Nabiev	276
Қорақатдошлар (Тошёрдошлар) оиласи – Семейство Смородиновые (Камнеломковые) – Grossulariaceae (Saxifragaceae)				
262.	Гулхайрибарг қорақат	Смородина мальволистная	<i>Ribes malvifolium</i> Pojark.	277
Қоқиўтдошлар (Мураккабгулдошлар) оиласи – Семейство Астровые (Сложноцветные) – Asteraceae (Compositae)				
263.	Яшил анура	Анура бледнозелёная	<i>Anura pallidivirens</i> (Kult.) Tscherneva	278
264.	Аллолепис каррак	Кузиния инакочешуйная	<i>Cousinia allolepis</i> Tscherneva et Vved.	279
265.	Безчатукли каррак	Кузиния железистая	<i>Cousinia adenophora</i> Juz.	280
266.	Бутков карраги	Кузиния Буткова	<i>Cousinia butkovii</i> Tscherneva et Vved.	281
267.	Введенский карраги	Кузиния Введенского	<i>Cousinia vvedenskyi</i> Tscherneva	282
268.	Ёпирма каррак	Кузиния широкооберточная	<i>Cousinia platystegia</i> Tscherneva	283
269.	Жиззах карраги	Кузиния джизакская	<i>Cousinia dshisakensis</i> Kult.	284
270.	Киндикчали каррак	Кузиния пупочковая	<i>Cousinia umbilicata</i> Juz.	285
271.	Нозикбош каррак	Кузиния изящноголовая	<i>Cousinia glaphyrocephala</i> Juz. et Tscherneva	286

272.	Оқиш каррак	Кузиния белесоватая	<i>Cousinia candicans</i> Juz.	287
273.	Паттангачали каррак	Кузиния перисточешуйчатая	<i>Cousinia pterolepida</i> Kult.	288
274.	Силлиқтукли каррак	Кузиния гладкощетиноквая	<i>Cousinia glabriseta</i> Kult.	289
275.	Сохтатукли каррак	Кузиния ложношерстная	<i>Cousinia pseudolanata</i> Popov ex Tscherneva	290
276.	Тик каррак	Кузиния торчащая	<i>Cousinia stricta</i> Tscherneva	291
277.	Узунбарг каррак	Кузиния длиннолистная	<i>Cousinia dolichophylla</i> Kult.	292
278.	Хурпайган каррак	Кузиния вооруженнолистная	<i>Cousinia haplophylla</i> Tscherneva	293
279.	Шубхали каррак	Кузиния сомнительная	<i>Cousinia haesitabunda</i> Juz.	294
280.	Эгритикан каррак	Кузиния согнутоколючковая	<i>Cousinia campyloraphis</i> Tscherneva	295
281.	Қизилгулли каррак	Кузиния красноцветная	<i>Cousinia rhodantha</i> Kult.	296
282.	Спригин карраги	Кузиния Спрыгина	<i>Cousinia spryginii</i> Kult.	297
283.	Ғужтук каррак	Кузиния превосходная	<i>Cousinia praestans</i> Tscherneva et Vved.	298
284.	Қоя ксилантемуми	Ксилантемум скальный	<i>Xylanthemum rupestre</i> (Popov ex Nevski) Tzvelev	299
285.	Боботоғ кўкбоши	Мордовник бабатагский	<i>Echinops babatagensis</i> Tscherneva	300
286.	Қисқамўй кўкбош	Мордовник короткокисточковый	<i>Echinops brevipenicillatus</i> Tscherneva	301
287.	Нурота лепидолофаси	Лепидолофа нуратинская	<i>Lepidolopha nuratavica</i> Krasch.	302
288.	Федченко лепидолофаси	Лепидолофа Федченко	<i>Lepidolopha fedtschenkoana</i> Knorring	303
289.	Введенский олигохетаси	Олигохета Введенского	<i>Oligochaeta vvedenskyi</i> (Popov) Tscherneva	304
290.	Тароқсимон ольгея	Ольгея гребенчатая	<i>Olgaea pectinata</i> Iljin	305
291.	Наштарсимон сerratула	Серпуха ланцетолистная	<i>Serratula lancifolia</i> Zakirov	306
292.	Бунге такасоқоли	Козелец Бунге	<i>Scorzonera bungei</i> Krasch. et Lipsch.	307
293.	Бочанцев танацетопсиси	Танацетопсис Бочанцева	<i>Tanacetopsis botschantzevii</i> (Kovalevsk.) Kovalevsk.	308
294.	Бутков трихантемиси	Трихантемис Буткова	<i>Trichanthemis butkovii</i> Kovalevsk.	309

295.	Ангрен угамияси	Угамия ангренская	Ugamia angrenica (Krasch.) Tzvelev	310
296.	Бежирим юринея	Наголоватка стройная	Jurinea gracilis Iljin	311
297.	Дағалбарг юринея	Наголоватка шероховатоллистная	Jurinea asperifolia Iljin	312
298.	Зокиров юринеяси	Наголоватка Закирова	Jurinea zakirovii Iljin	313
299.	Мария юринеяси	Наголоватка Марии	Jurinea mariae Pavlov	314
300.	Сангардак юринеяси	Наголоватка сангардакская	Jurinea sangardensis Iljin	315
301.	Кумчил юринея	Наголоватка песколюбивая	Jurinea psammophila Iljin	316
302.	Майдагултожбаргли эригеран	Мелколепестник триморфообразный	Erigeron trimorphopsis Botsch.	317
303.	Крашениников викоаси	Викоа крашениникова	Vicoa krasheninnikovii Kamelin	318
304.	Туксиз қарғатирноқ	Коелпиния голоплодная	Koelpinia leiocarpa Popov	319
305.	Нурота ўлмасўти	Бессмертник нуратавский	Helichrysum nuratavicum Krasch.	320

Қўнғироқгулдошлар оиласи – Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae

306.	Улуғвор кўзагул	Островския величественная	Ostrowskia magnifica Regel	321
------	-----------------	---------------------------	----------------------------	-----

Қумсўтадошлар оиласи – Семейство Цинномориевые – Cynomoriaceae

307.	Жунғор қумсўтаси, цинноморийси	Цинноморий джунгарский	Cynomorium songaricum Rupr.	322
------	--------------------------------	------------------------	-----------------------------	-----

Ғовзабондошлар оиласи – Семейство Бурачниковые – Boraginaceae

308	Майда мовийгул	Липучка мелкая	Lappula parvula Nabiev et Zakirov	323
309	Нурота мовийгули	Липучка нуратинская	Lappula nurativica Nabiev et Zakirov	324
310	Оқтоғ мовийгули	Липучка актавская	Lappula aktaviensis Popov et Zakirov	325
311	Йирик ҳалқагулли тангабарг	Риндера крупновидковая	Rindera fornicata Pazij	326
312	Бухоро ғичмоласи	Гелиотроп Бухарский	Heliotropium bucharicum B. Fedtsch.	327
313	Йирик илдизли меҳригиёҳ	Оносма крупнокорневая	Onosma macrorhiza Popov	328
314	Бошмоқсимон нонея	Нонея башмачковидная	Nonea calceolaris Nikif. & Pazij	329

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚИЗИЛ КИТОБИ

2 жилдли

I жилд

ЎСИМЛИКЛАР

Илмий-оммабон нашр

Муҳаррирлар Нодира Абдуллаева, Негина Кисель

Дизайнер Ўткир Тожибоев

Компьютерда саҳифаловчи Темуржон Бўрибоев

Техник муҳаррир Хумоюнхон Анвархонов

Мусаҳҳиҳ Гулсара Менгзияева

Нашриёт лицензияси № АІ 269, 15. 07. 2015 й.
100185, Тошкент шаҳри, Бунёдкор кўчаси, 7а-уй.

Босишга рухсат этилди 02.12.2019 й. Нашр бичими 60x84^{1/8} *
Cambria гарнитураси. Офсет босма усули.
Босма табағи 45. Адади 5000 нусха.
Буюртма 420/С. Баҳоси келишилган нарҳда.

«TERRA PRINT KLASTER» МЧЖ босмахонасида
офсет усулида чоп этилди.



9 789943 313866