

559
7-60

Н. Ж. ТҮЙЧИЕВ

БИЗНЕСДА ИҚТИСОДИЙ МАТЕМАТИКА УСУЛЛАРИ



Н. Ж. ТҮЙЧИЕВ

БИЗНЕСДА ИҚТИСОДИЙ МАТЕМАТИКА УСУЛЛАРИ

*Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта маҳсус таълим
вазирлиги олий ўқув юртлари талабалари учун ўқув
қўлланма сифатида тавсия этган*

ТОШКЕНТ
«УЗБЕКИСТОН» НАШРИЁТ-МАТБАА ИЖОДИЙ УЙИ
2004

Мазкур китобчада ҳалқ ҳужалигига, хусусан бозор иқтиисодига утган гизимда ҳар хиз соҳасардаги масалаларининг энг оптималь, энг самарадор, энг арzon, энг даромадли ва энг яхши вариантини математик усулда тониш мумкинлиги амалий мисоллар, ҳикоялар ва воқеалар асосида соддатлантириб курсатилган.

Китоб олий ва ўрта маҳсус уқув юртлари талабаларига, қолаверса тадбиркорлик фаолиятини юритувчи барча китобхонларга мұлжалланған.

Мұхаррир: **Ю. Музаффархұжаев**



T 0605010404-92 2004
354(05)2004

ISBN 5-640-02957-9

© «ЎЗБЕКИСТОН» ИМИУ, 2004

I. ҮМУМИЙ МАЪЛУМОТ

1. Кирин

Қарангки, математика фанининг салоҳияти катта бўлиши ва унинг узоқ тарихга эга эканлигига қарамасдан оптимал (мақбул) ечим масалаларини еча оладиган усуллар бор-йўғи олтмиш йиллар муқаддам яратила бошланди.

Ушбу йўналиш иқтисодий математика усуллари номини олиб, унга академик Л. В. Кантарович асос солди. У биринчи бўлиб 1939 йилда чизиқли математик-дастурлаш усулини таклиф қилди.

Таклиф қилинаётган билимлар «Етти ўлчаб, бир кес» мақолига мос келади, китобчада асосан «етти ўлчасангда энг самарали кес» деган луқма бор.

Ўттизинчи йилларнинг охирларида собиқ иттифоқда саноат жадал ривожланиб, тараққий топган хорижий давлатлар даражасига кўтарилиган ва баъзи кўрсаткичлар бўйича рақобат қилишга қодир бўлиб қолган эди.

Бу даврда Ленинград мебел корхонаси шу шаҳарининг номдор Ленинград Давлат Университети олимларига турили хил мебеллар учун ишлатишда қиммат тушадиган Финляндия фанераси қандай бичилса чиқинди кам чиқади, деган масала билан мурожаат қилди. Бундай ва шу каби муаммолар илгари ҳам мавжуд бўлсада, бундай масалаларни ечадиган математик усуллар йўқ эди. Масала содда кўринисада, унинг шартлари муаммони мураккаблаштиради. Ҳақиқатан ҳам фанерани бичишида ҳар хил шартлар (техник имкониятлар, қирқиладиган юза ўлчамлари, фанеранинг ҳажми ва др.) қўйилган эди.

Бу антиқа масалани ўша университетнинг аспиранти, ёш олим Л. В. Кантарович мавжуд математик усуллар ёрдамида ечиб бўлмаслигини, унга ёрдамчи аппарат (Лагранж

кўпайтмаси)дан фойдаланиш кераклигини исботлади ва юқорида қўйилган (ва бошқа) масалаларни ечишнинг оптимал (мақбул) вариантини топишга муссар бўлди. Бу масалани олим кўпгина муҳим муаммоларни ечиш имконини берадиган «Корхона режаси ва уни ташкил қилишда математик усуllар» монографиясида келтиради.

Бу усуllар ҳозирги даврда кенг тарқалди ва катта аҳамиятга эга бўлиб қолди. Л.В. Кантарович 1965 йил В.С. Нимчинов, проф, В.В. Новожиловлар билан иқтисодий математика усуllарини яратганликлари учун давлат мукофотлари ва 1975 йил америкалик олим проф. Т. Купмансон билан бирга Нобел мукофотига сазовор бўлишиди.

Сўнгги 20 йил давомида жумҳуриятимизда иқтисодий математика фани тез ривожланди ва кенг тарқалди. Бу фаннинг ривожланишига Ўзбекистон Фанлар Академиясининг Кибернетика, Иқтисодиёт Университети, Миллий Университет, Тошкент архитектура қурилиш ва Тошкент Давлат Авиация Институтларининг олимлари катта ҳисса қўшдилар. Кейинги даврда бу фан олий ва ўрта маҳсус ўқув юртларининг дастурларига алоҳида фан сифатида киритилган.

Иқтисодий математик усуllар бозор иқтисодида жуда кўл келади, чунки бундай тизимда рақобатда энг самарадор, энг даромадли ва энг яхши ечим — оптимал (мақбул) ечим ютиб чиқишига асос бўлади.

Оптималлаштириш назарияси: Бошқарув — Кибернетика — Ечим қабул қилиш — Операцияларини тадқиқ қилиш фанларининг ташкилий қисми ҳамdir.

Республикамизning бозор иқтисоди тизимиға ўтиши муносабати билан оптималлаштириш, яъни иқтисодий математика фанидан чуқур, кенг ва самарали фойдаланиш зарурияти туғилди. Шунинг учун бу фан деярли ҳамма таълим йўналиши ва мутахассисликларга жорий қилиниши мақсадга мувофиқдир. Таълим тизимиға жорий қилинаётган иқтисодий математика фанида асосан унинг назарий қисми, усуllарининг моҳиятлари келтирилган бўлса, ушбу ўқув қўлланмада шу усуllарни қўллашдаги самарани кўрсатишига асос бўладиган мисол ва масалалар оммавий тарзда, қизиқарли ҳикоялар кўринишида келтирилган.

Бозор иқтисоди бўйича мавжуд адабиёт математик мурракаблиги билан фарқ қиласди. Ундан ташқари адабиётларининг асосий қисми рус тилида чиққанлиги ўзбек китобхонининг шу фанини ўрганишига ва ундан амалий фойдаланишига кенг имкон бермайди.

Мазкур ўқув қўлланмаси «минг бир бизнес» номи билан 2001 йилда чоп этилган китобча асосида, талабларнинг қизиқишиларини инобатга олган ҳолда Олий ва ўрта махсус таълим Вазирлиги режаси асосида қайта чоп этиляпти.

Мазкур китобнинг асосий мақсади кенг доирадаги китобхонлар, тадбиркорлар ва ишлаб чиқарувчиларнинг ўз фаолиятларида муваффақиятга эришишлари учун бизнесни режалаштиришда илмий ёндашувдан фойдаланиш, ишончили иқтисодий ва бошқарув йўлларини таилай билишлари ҳамда ҳар бир оиласда тадбиркорликка қизиқиш уйғотишдир.

Китобча маълум математик тайёргарликка эга бўлган иқтисод ва математика дарслари ўтиладиган ўрта махсус ва олий ўқув юртлари талabalariга мулжалланган бўлиб, унда турли масалаларни ечиш имкониятига эга бўлган содда математик усууллар кўрсатилган.

Фермерлар, коммерсантлар ва бошқа ишбилармонлар тажрибасининг ортиши ўзаро рақобатни кучайтиради, бу эса даромаднинг ортишига имконият туғдиради. Ўз навбатида бу аҳвол, умуман масала ечимининг самарадорлигини оширишига, хусусан товар сифатининг яхшиланишига сабабчи бўлади. Табиийки, бунда ишбилармонлар тажрибасининг ортишига, рақобатбардошликни оширишига, ҳамда ишлаб чиқаришдаги чиқимни камайтиришга олиб келадиган ҳол юзага келади.

Китобчада ёритилган муаммолар ва математик усууллар, ҳалқ хўжалигининг ҳамма тармоқларида: саноатда, қишлоқ хўжалигига, транспорт, оиласда ва бошқа соҳаларда кам харажат қилиб, катта даромад олиш йўлларини (оптималь ечим) қидираётган мутахассисларга, ишбилармонларга ва кенг оммага жуда қўл келади.

Китобни тайёрлашда бир қанча олим ва мутахассисларнинг (А. Я. Ҳалмайзэр, В. А. Абчук, А. А. Грешилов, Т. Шоди-

ев ва бошқалар) ишларидағи (1—10) мисол ва масалалардан көнг фойдаланилди.

Муаллиф дарсликни тайёрлашда катта ёрдам күрсатған физика-математика фанлари номзоди, доцент Ризаевга ва муҳандислар А. Усманов, Ш. Абдувахобов, А. Муратовларга үз миннэтдорчилитини билдиради.

2. Ютуқ нимада?

Хаёт муаммоларини ҳал қилишда күпинча әнг яхши ечимлар борлигини инобатта олмаймиз. Бу ортиқча харататта, имкониятни құлдан бой беришга сабаб бўлади. Буни қўйидаги мисолдан кўришимиз мумкин.

Фозивой дала ҳовлисининг бир чеккасига қўшини уйи деворидан фойдаланиб қўйхона қурмоқчи бўлиди ва унинг атрофини үрашта шаҳардан узунлиги 36 метрли сим тўр олиб келибди. Қуриш вақтида тўрни қандай үраш кераклигини оила аъзолари билан маслаҳат қилибди.


— Қўшини деворидан уч-тўрт метр масофада узун тўртбўрчак шаклида үралса, чиройлироқ бўлармили? — дебди хотини.

— Асосийси — ажрагиладиган майдон сатҳи әнг катта булиши лозим, далада унинг чиройли булиши шарт эмас, — дебди математик бўлмоқчи бўлган ўғли.


— Қандай үрасангда, майдон сатҳи бир хил бўлмайдими? — деб ўртага тушибди отаси, тўрга қараб.

— Йўқ адажон, мана қаранг, — деб ерга чизиб кетибди ўғил, агарда қўйхонанинг бир томони қўшини девори бўлиб, эни $a = 3$ м бўлса, унда иккала эни 6 м, бўйи эса $b = 36 - 6 = 30$ м га тенг бўлади, бу ҳолда үраладиган юза $S = a \cdot b = 3 \cdot 30 = 90 \text{ m}^2$, деб тушунтирибди (1-вариант). Агарда эни $a = 4$ м бўлсачи, унда иккита эни — 8 м, бўйи эса $b = 36 - 8 = 28$ м бўлиб, майдон сатҳи $S = 28 \cdot 4 = 112 \text{ m}^2$ бўлади. Кўрдингизми, шу тўрнинг ўзи билан ҳар хил майдонни ўраб олиш мумкин — деб завқланиб гапирди ўғил.

Буни эшитган сезгир она: «Балким бундан ҳам каттароқ майдон сатҳини ажратиш мумкиндир?» — деб ўғлига тикилди.



1 вариант



2 вариант

I-расм.

— Мана қаранг, деб ўғил яна бир вариантни тақлиф қилди, — бүйі 24 м, эни эса 6 м, бу ҳолда майдон $S = 144 \text{ м}^2$ (2-вариант), ундан ҳам яхши, — дели.

Отаси:

— Үелім энини узайткырган сари майдон сатқи кетта бұла-верса, жуда узун құйхона бұлар экан, у бутун ҳовлини тутиб кетади, — деса, ўғил,

— Йүқ, бунинг чегараси ҳам бор деб,— масаланиң математик ифодасини қофоз-қалам билан ишлаб чиқди.

Қандай ечим (түртбурчакнинг бүйі ва эни) берилған түрдан фойдаланиб қүшни девори орқасига әнг катта сатқ ажратади, яъни катта ютуққа олиб келади, деган саволга жавоб учун қуйидаги ифодаларни көлтирамиз:

Айтайлык, ўраб олинадиган майдон түртбурчак бўлиб, эни x метр десак, бу ҳолда, бүйі $36 - 2x$ дир, чунки турнинг узунлиги 36 м эди. Бу, қидирилаётган S юза-нинг қуйидаги математик ифодасини беради:

$$S = x(36 - 2x) \text{ м}^2 \quad (1)$$

Математикада узлуксиз тартибли функциядан ҳосила олиш асосида функцияның экстремал (катта ёки кичик) счимини топиш мумкин.

Шу боғланишдан хусусий ҳосила олсак (VIII бобга қаранг), қуйидаги қўринишга эга функцияни ҳосил қиласмиш:

$$S = x(36 - 2x) = (36x - 2x^2) = 36 - 4x.$$

S – ни нолга теңглесак, x^* – оптималь ечимни тоңса бұлади.

$$4x - 36 = 0 \text{ яғын } x^* = 9,0.$$

Демек, әнг катта $S = 162 \text{ м}^2$ үзага $x = 9$ булғанда әришни мүмкін экан. Яғни қидирилған түртбұрчакнинг эни $a = 9 \text{ м}$, узунлиги $b = 18 \text{ м}$ бұлса, сатқи әнг катта қүйхона қуриш мүмкін экан.

Қуриниб турибиди, мақбул ечим юқоридаги 1 ва 2 вариантындаға нисбатан $1,5 - 2,0$ барабар күп майдонни аниклашты имкон беради. Үғил шу ҳисобларни құралғанда дадаси билан онаси бир оғиздан: «Үқитувчинга балли үелім, мана буни ютуқ леса бұлади», деб миннатдор бұлиншити.

Маълумки, бундай масала ва муаммолар ҳаётда жуда күп учрайди ҳамда үларни мақсадға мувофиқ тарзда ечиш катта ютуқтарға олиб келади.

3. Алловсиз ютуқ

Илмий ёндашының асосида ҳар қандай масалада ютуққа әришни мүмкінлеги ҳаммага аён. Аксарият гаровда, лотереяда ва бошқа шу каби үйніларда катта ютуққа әришни мүмкін.

Албатта, ютуқ омадға, тасодиғға боелиқ бұлса-да, у маълум бир қонуниятта бүйсуннишини и себетлашты ҳаралат қылайлык.

Битта, иккита, учта тош ташлаб үйналадиган үйин (шошықол) Шарқ, Европа ва бошқа мамлакатларда кең тарқалған. Булар орасыда әнг күп учрайдиган үйин учтошлигидір, унинг шарти жуда қызық. Ҳикояни әшитинг:

— Ҳар бир үйновчи бир сүм қүйиб, үн сүм ютиши мүмкін, — деб ҳаммани үзига қаратарды бир йигитча бозорда, учта тошни ұртага ташлар экан. Иккінчиси үйин қоидасини тушунтиради:

— Ютмоқчи бұлсанғ бир сүм қүй ва уччала тошни дұмалат, шунда ютуқ сеники бұлиши мүмкін.

Хар бир кубсімден тошда олтита томон мавжуд: уларға тартиб билан 1, 2, ..., 6 рақамлари ёзиб қўйилған бўлади. Хар бир чиққан рақам очко деб ҳисобланған.

— Қаранглар, чиққан очколар йифиндиси 1,5 сўмдан 10 сўмгача ютуқ беради, — деб фанерага бўр билан ёзилған жадвални кўрсатарди, йигитча.

1-жадвал

Очколар йифиндиси	3	4	5	6	7	8, 9, 10, 11, 12	14	15	16	17	18
Ютуқ ҳажми, сўм	10	5	3	2	1,5	0	1,5	2	3	5	10

Бу ютуқли ўйинни кўрган ишқибозлар сўм тўлаб, кетма-кет тошларни думалатишар, атрофдаги мухлислар кулги ва ишқибозлик билан ўйинни томоша қилишар эди. Баъзилари 7 ёки 14 очко тўплаб, 50 тийинга бойишар, ҳар замонда 5, 6, 15, 16 очколар тушиб, бир ёки 2 сўм қўшимча ютишарди, аммо кўпчилик ишқибозлар ютуқсиз кетишарди.

Оқибатда ютмаганлар тошларни қайта ташлаб кўришар, ундан сонларни санашиарди. Афсуски, тошлар бир хил булиб, ҳамма талаб қонунларига мослигини кўришгач, қўл силтаб кетишар ёки яна ўйинни давом эттиришарди.

Хўш, бу ерда ютуқнинг сири нимада? Бунинг учун бу содда кўринган ўйиннинг арифметикасини кўриб чиқамиз. Масалан, фақат бир тошни ташлаб бир, икки уч, тўрт, беш ва олти очко олиш мумкин. Ҳар бир сон чиқиши бир хил эҳтимолликка эга, яъни олтита рақамнинг ҳар бири $1/6$ эҳтимоллик билан чиқади.

Агарда иккита тошни олсак, бу ҳолда $6 \cdot 6 = 36$ хил вариантга эга бўлинади ва умуман қўйидаги рақамлар қайд қилинади (2-жадвал).

Иккита тошдан очкодар сони

1 тош 2 тош	1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8
2	3	4	5	6	7	8	9
3	4	5	6	7	8	9	10
4	5	6	7	8	9	10	11
5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	8	9	10	11	12	

Күриниб турибдики, 2 очко фақат бир мартагина тушиши мумкин экан, 8 очко эса беш марта. Демак 8 очко 2 очкого нисбатан беш марта кўп тушади. Агар ҳар очконинг чиқиши эҳтимоллигини аниқласак, яъни 2 рақами $p(2) = 1/36$ ($6 \cdot 6 = 36$ вариантдан), бу ерда р французча — «эҳтимоллик» сўзининг биринчи ҳарфидан олинган. 2-жадвалдаги ҳадларнинг эҳтимолликлари қўйидагичадир.

$$p(3) = 2/36; p(4) = 3/36; p(5) = 4/36; p(6) = 5/36; p(7) = 5/36; \\ p(8) = 5/36; p(9) = 4/36; p(10) = 3/36; p(11) = 2/36 \text{ ва ниҳоят} \\ p(12) = 1/36;$$

Агарда 13 очко олмоқчи бўлсангиз, икки тош билан бу очкони олиш мумкин эмас албатта: $p(13) = 0$, бу деган сўз мумкин бўлмаган эҳтимоллик $p(\text{мб}) = 0$, аксинча, тескариси, аниқ бўлган воқеанинг эҳтимоллиги 1 га тенгdir.

Муҳокамани 3 тошлиқ ўйин ҳақида давом эттирасак, учта тош билан ўйин $6 \cdot 6 \cdot 6 = 216$ вариантдан иборатdir: яъни 3, 4,...,15, 16, 17, 18 бўлиб, 3 очко фақат бир марта ($1 + 1 + 1 = 3,5$ очко эса олти марта тушиши мумкин).

Күйіла 5 очко вариантын көлтирилған:

$$1 + 1 + 3 = 5$$

$$1 + 3 + 1 = 5$$

$$3 + 1 + 1 = 5$$

$$1 + 2 + 2 = 5$$

$$2 + 2 + 1 = 5$$

$$2 + 1 + 2 = 5$$

Агарда 10 (11) очко керак бўлса 27 вариантда, 9 (12) очко 50 вариантда чиқиши мумкин. Демак, энг кўп тушилган очколар: 8, 9, 10, 11, 12, 13 бўлиб, буларга ютуқ белгилаш фойдасизdir (1-жадвалга қарап).

Кўриниб турибдики, бу ўйинда фақат ўйин эгаси ютади. Шунинг учун яхшиси бу ўйинни ўйнамаган маъқул.

4. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотини консервалашдан даромад

Маълумки, қишлоқда йилнинг баъзи ойларида иш бошқа ойлардагига нисбатан анча кам бўлади. Аҳамият берсак, ишламаган вақтдаги оила харажатлари ишлаган вақтидагидан бир муича кўп ҳам экан.

Хўш, қандай қилиб қишлоқ аҳли шундай вақтда (айтайлик қиши даврида, борингки, хоҳлаган даврда) ишлани ва қўшимча даромад олиши мумкин?

Бу муаммони ҳал қилиш йўлларидан бири қишлоқ хўжалик маҳсулотини вақтида арzon нархларда сотишдан сақланни имконини беради. Маълумки, баъзи давлатлар, хусусан Болгария, шу йўлдан бориб, ўз деҳқонларини бойитди ва жаҳонга танилди.

Матғози ака бригада бошлиқларини йиғиб:

— Мен Болгарияда бўлиб, шунинг гувоҳи бўлдимки, улар умуман чиқинди чиқармай помидор дейсизми, гармдори ва бодринг дейсизми, кўкатлар ёки саримсоқ ниёз дейсизми, қўйипгки, ҳамма қишлоқ хўжалик маҳсулотларини банкаларга жойлаб консерва қилишар экан. — деди.

— Э, бу Болгарияда шунақа бўлса, бизда бундай шартшароит қани, бизда ҳамма яхши умидлар билан бошланган ҳаракат охирига етмай барбод бўлади. Қўйсанччи, узи-

мизнинг ота-бобомиз қилганини қиласверсакчи, — деб ат-рофдагиларга қараб қўйди Мустафо полвон.

Бу гапларнинг фойдали томонини кўзлаб, агроном Йўлчибой ўз раиси Матғози акани қўллаб:

— Бу жуда яхши, фойдали маслаҳат, менинг хабарим бор, қўшни вилоятда баъзи жамоа хўжаликларида бундай ишни аллақачон бошлишган. Фақат баъзи масалаларни олдиндан ҳал қилиш керак, хусусан консерва банкаси масаласи. Унга биз ўзимиз тунука топишимиз керак, чунки металл ҳозир энг муаммоли бир масала.

Шу фикрлар билан бригада аъзолари қишлоққа дам олишга келган олим Ҳошим акани шу ишга жалб қилишга келишдилар. Олим олдига қўйилган масаланинг шарти қуидагичадир: металл банканинг шакли, ўлчамлари қандай бўлса, тунукани энг кам сарфлаш мумкин?

Ҳошим ака масалани диққат билан эшитиб, мен-ку тушундим, аммо ўзингиз қандай ўйлайсизлар, масалан, консерва банкасининг шакли шарсимон бўлиши мумкин, бу ҳолда унинг сиртқи юзаси энг кичик, ҳажми эса энг катта бўлади деди. Йўлчибой кулиб юборди.

— Бизга оддий банка бўлса ҳам бўлаверади, — деб уқтиromoқчи бўлди.

Шунда Ҳошим ака кулгига қўшилиб, деди:

— Албатта, шар кўринишида банка ясаш ҳозирча техник томондан мураккаб масала, шунинг учун энг яхши вариантлардан бири сизлар учун цилиндрический банкадир, бу ерда банканинг баландлиги ва диаметри орасидаги нисбат энг кам тунука сарфланишни таъминлаши мумкин.

— Менинг тушунишимча, энг катта ҳажмли ва энг кам тунука сарфланадиган банкалар ўлчамларини аниқлаш керак. Шундайми? — деди агроном.

Ха, деган тасдиқни олгач, қофоз-қалам олиб қуидагиларни тушунтира кетди:

— Мактабда қуидаги ҳисоблашни ўргатишган эди, яъни банканинг сиртқи юзаси (S) ни:

$$S = 2\pi rh + 2\pi r^2 \quad (1)$$

деб белгилаймиз, айни пайтда бу металл сарфидир; бу ерда r — банка асосининг радиуси, h — банканинг баландлиги.

Банка ҳажмини эса $V = \pi r^2 h$ формула ёрдамида аниқланы мүмкін. Бундан банканинг баландлиги $h = V/\pi r^2$ ни аниқлаб банка юзасининг юқоридаги ифодасига қўйсак, банка сирти

$$S = 2\pi rV/\pi r^2 + 2\pi r^2 = 2V/r + 2\pi r^2 \quad (2)$$

ифода билан аниқланиши мүмкін экан.

Бундай масалаларниң энг катта (кичик) қийматлари-ни ҳосила орқали топиш мүмкинлиги мактабда ўргатилганлигини эсласак,

$$S'(r) = 4\pi r - 2V/r^2 = 2/r^2 (2\pi r^3 - V) = 0 \quad (3)$$

бўлади.

Бундан $2\pi r^3 = V$ чиқади, ёки $2\pi r^3 = V = \pi r^2 h$; бу ифодадан $h = 2r$ натижа келиб чиқади, деб холоса қилди Ҳошим ака.

Демак, шар ичига томонлари тирадан цилиндр энг кам тунука талаб қиласар экан, шунинг учун мен дастлаб шар сўзини айтгандим, дели у.

Шу-шу баландлиги асосининг диаметрига тенг банка жамоа хўжалиги консерваси учун асос бўлиб, кўпдан-кўп муаммоларни ҳал қилишга ёрдам берибди. Бир йилда бир неча тоинна тунукани тежашга эришганига хурсанд бўлиб, Матғози ака аҳён-аҳёнда бошқа корхонанинг банкаларини кўрсатиб мазах қилганлай, уларда тунука бемалол эканда, деб киноя ҳам қилиб қўярди.

5. Аҳмад юқ етказишин режалаштироқчи

Буни қарангки, Аҳмаджон акани шаҳардаги янги ташкил бўлган «Зарафшон ион» савдо корхонасининг транспорт бўлими бошлиги қилиб тайинлаши.

Унинг асосий иши ҳар куни шаҳардаги 3 та ион корхонасидан 5 та дўконга ион етказиб берилишини ташкил қилишдан иборат.

3-жадвалда бир суткала ҳар корхонада пишириладиган ион миқдори ва дўконларниң ион олиш имкониятлари келтирилган.

Жадвалда нон корхонасидан дўконгача бўлган масофа (км) ҳам кўрсатилган.

3-жадвал

Нон корхоналари	Нон миқдори. (тонна)	Нон дўконлари, уларнинг имкониятлари ва масофа				
		1 25 т	2 20 т	3 15 т	4 55 т	5 35 т
A	50 т	25 (4)	20 (5)	5 (2)	(2)	(3)
B	40 т	(3)	(6)	10 (5)	30 (4)	(2)
C	60 т	(2)	(5)	(3)	25 (2)	35 (4)

Масаланинг моҳияти: 3 та нон корхонасидан ҳар хил масофада жойлашган 5 та нон дўконига нонларни ҳар куни кам харажат билан етказиши.

Минг афсуски, Аҳмаджон ака бундай масалалар билан олдин шугулланмаган. Югуриб бош муҳандис олдига борди ва жадвални кўрсатди.

Бош муҳандис Юнус ака сўради: Менга қара, шу ҳам муаммоми, шу пайтгача нон қандай ташилар экан?

— Билмадим, — деб жавоб берди Аҳмаджон ака.

Бош муҳандис Аҳмаджон акани ўтқазиб маслаҳат бера бошилади.

— Мана, масалан, A дан 1-дўконга 25 тоннани, агар етса 20 т ни 2-дўконга, қолган 5 т ни эса 3-дўконга юборсак, шунинг нимаси қийин экан?

— Қолган дўконларчи? — деди ҳайрон бўлиб Аҳмаджон ака.

— Худди шу каби, 3-дўконга яна 10 т керак, 4 т ни 5-дан олиб борамиз. 4-дўконга қолганини, яъни 5-дан 30 т олиб борамиз. Кўрибсанки, В нинг нонини тақсимласак кифоя делида 4-дўконга 25 ва 5-га 35 деб ёзиб қўйди.

— Э дўстим, олий маълумот билан шундай оддий масалани еча олмадингми? — деб кулиб ҳам қўйди.

Аҳмаджон ака бош муҳандис хонасидан чиқиб кетаркан, ўйларди, қизиқ нега нон A дан 1-дўконга олиб бори-

лади, ахир A дан энг яқини 3 ва 4-дүконлар-ку, деган фикрда үз хонасига келди. Үтириб, бұлған харажатни күрсатдиган функция Φ ни (йүл масофасини «нон оғирлиги Q га күпайтириб $\Phi(x) = \Sigma QL$ йиғиндини) аниқлади:

$$\Phi = 4 \cdot 25 + 5 \cdot 20 + 2 \cdot 5 + 5 \cdot 10 + 4 \cdot 30 + 7 \cdot 25, \text{ ёки} \\ \Phi = 695 \text{ ткм, (бу ерда тонна, · километр ткм деб белгіланған).}$$

Бу күпми ё камми, яхши билолмади. Шундан сүнг үзиң-ча бошқа вариант қидира бошлади. Биринчи дүконга энг яқин заводдан олиб борадиган бұлды, B дан 25 т, A дан 4-дүконға 25 т мүлжаллади ва хурсанд бұлиб давом этди.

Бу ерда A , B , V лар нон корхоналари, L — заводлардан дүконгача масофа. Шунда

$$\Phi = 5 \cdot 20 + 2 \cdot 5 + 2 \cdot 25 + 5 \cdot 10 + \\ + 4 \cdot 30 + 2 \cdot 25 + 4 \cdot 35 = 520 \text{ ткм}$$

күрсаткычға әришибди.

Қаранг-а шунча ютуқ, агар мисол учун 1 ткм харажати 100 сүм бұлса, $(695 - 520) \cdot 10 = 1750$ ткм иқтисод қилиниши мумкін. Демак, бутун V корхонанинг нонини 1- ва 3-дүконларға ташиш деярли текинга тушади.

Аммо, Аҳмаджон ака ютуқни күргач яна бош қотира бошлади, ёмонми ҳар куни шунчадан тежам бұлса, бир йилда $365 \cdot 17500 = 6$ млн 377 минг сүм иқтисод қылса бўлади.

Аҳмаджон ака югуриб бош муҳандисга, сүнг директорга ҳисобини күрсатади, улар албатта дарров ишоништани йўқ.

Аҳмаджон ака үзига унчалик ишонмай Тошкент давлат авиация институти ҳисоблаш марказидаги дўсти билан учрашишга қарор қилди.

Дўсти унга бу ва шунга ўхшаш масалаларни кичик компьютерда ечиш мумкинligини, бу «транспорт масаласи» деб номланишини тушунтирди. Аҳмаджон аканинг олдида рақамларни ЭҲМ га киритиб ечимни 3—4 дақиқада олди. Машина ечими энг арzon вариантын булиб, қуйидагича тақсимланған эди:

$$A4(50)\text{т}, B4(5), B5(35) \\ B2(25) \text{ т}, B2(20), B3(15)$$

Шундай тузилган маршрутда умумий харажат:

$$\Phi = 2 \cdot 50 + 4 \cdot 50 + 2 \cdot 35 + 2 \cdot 25 + 5 \cdot 20 + 3 \cdot 15 = 385$$

ткм га тенг бўлди. Бу вариантдаги харажат, яъни биринчи вариантига иисбатан тежам $(695 - 385)^* = 310$ ткм эди. Агарда ҳар 100 км га 20 л бензин кетишини инобатга олсан, бир йилда $341 \cdot 20 \cdot 305 = 22630$ литр бензин иқтисод қилиниши мумкин эди.

Аҳмаджон ака институтдан қайтар экан, бош мұхандиснинг гапини ёслар, агарда ҳар бир транспорт масаласи шу усулда ҳисобланса, қанча бензин, қанча машина вақти тежалиши мумкинлигини, машиналар бошқа бир қанча фойдали ишларни бажариши мумкинлигини ўйларди. Эссиз қанча пул, бензин, одамлар иш куни бекорга қўчаларда қолиб кетишини куз олдига келтирди. Энг қизифи, ноң аҳоли қўлига тез, сифатли ва иссиқлигича етиб боришини айтмайсизми.

II. ТЎПЛАМ

Математикада умумлаштирувчи номлар қулланилади, масалан, команда (футболчи-спортчилар), оломон (одамлар), колонна (автомашиналар) ва ҳ. к. Бир нечта асосий хусусиятлари билан мужассамланувчи йиғиндига тўплам деб ном берилган. Аксарият сон, нуқта ва алгоритм белгилари математик тўплам дейилади.

Тўплам, агарда унинг элементлари аниқ бўлса берилган деб қабул қилинади. Масалан, 9 га бўлинадиган икки хонали сонлар тўплами топилсин, деган шарт қўйилган бўлса, бу ҳолда бу тўплам қўйидагича бўлади: 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, ёки шоирлар номи билан атала-диган шаҳар кўчалари тўғрисида А. Навоий, X. Олимжон, З. Фурқат... — тўпламни таҳлил қиласа бўлади.

Аммо, баъзан, ноаниқ тўплам тўғрисида сўз юритиш ҳам мумкин.

6. Мантиқиз буйруқ

Армияда командир Валижонни чақириб, — сен эши-тишимча, олдин сартарош бўлиб ишлаган экансан, эрта-

га бұладиган байрам олдиdan үз сафдошларнинг соқолини олиб қыйсанғ, фақат үзи ололмайдиган кишиларни кини, — деб құшиб қўйди.

Валижон кимлар тўғрисида гап кетаётганлигини аниқ тушунолмай, буйруқни қайта тушунтиришни сўради.

— Нимаси тушунарли эмас, деди командир койиб. Валижон эса, — үз соқолини үзи ололмайдиганларнинг соқолини ол деяпсиз-ку, аммо...

— Нима аммо?

— Мен, — деди Валижон, үзимнинг соқолимни нима қиласай, үз соқолимни сизнинг буйруғингиз билан үзим олишим керак, агарда үзимнинг соқолимни үзим олсам сизнинг буйруғингизга қарши чиқсан бўламан.

Командир гап нимада эканлигини энди тушуниб, буйруқни аниқ бермаганидан изза бўлибди.

Ҳақиқатдан, буйруқ услуги тўпламни аниқ белгилай олмади, яъни Валижоннинг соқол олиши шарт бўлган аскарлар сони ноаниқ бўлиб қолди.

Бундан холоса: Оптимал (мақбул) ечимни тошиш учун қўйилган масала аниқ, ойдин ва мантиқли бўлиши шарт.

7. Одам Ато ва Момо Ҳавонинг қўйлари

Қўйидаги ҳикоя асосида А.Я. Ҳалмаизернинг китоби [5] ётади. Унда «тўплам»га доир бир неча ҳикоялар киритилган, ўшалардан бирининг мазмунини келтирамиз.

Қадим Замонда Одам Ато ва Момо Ҳаво яшаган экан, уларнинг асосий фаолиятларидан бири қўй боқиши бўлган экан. Одам ҳар куни эрта билан қўйларни дала-қирларга ҳайдаб, куни билан боқиб, кечга томон ҳайдаб олиб келлар экан.

Йилдан йилга қўйлар сони сезиларли кўпайиб уларни бошқариш ва ҳисобини олиш мураккаблашиб кетибди. Аксарият Момо Ҳаво Одам даладан қўйларни кеч қайтариб келганда: «Қўйларнинг ҳаммасини қайтариб келдингми?» деган саволга тўлиқ жавоб ололмас экан. Бунга сабаб Одам Ато ҳам Момо Ҳаво ҳам ҳисобни билишмас экан.

Бир куни Одам қўйларни анҳордан кечиб ўтказганда ҳар бир ўттан қўйга қирғоқда битта тоцидан халтага тулдай

бошлабди, кечқурун қайта ўтганда тошларни биттадан халтадан олиб-олиб қўйларнинг ҳаммаси қайтдими, сувдан кечиб ўтдими назорат қилиб борар экан. Келгусида Момо Ҳавонинг маслаҳати билан халтачага қора ва оқ тошлар туша бошлабди, қораси қўчкорлар учун оқи эса урғочи қўйларнинг ҳисоби учун фойдаланилар экан.

Ой ва йиллар ўтиб қўйларнинг сони ошиб борибди, халтадаги тошлар сони кўпайиб уни кўтариб юриш қийинлашибди.

Одам ҳисоб ишини осонлаштириш учун бир катта тошга ҳар бир қўйни белгилаш мақсадида чизиқ чизиш амалиётини қўллабди. Бу амал ҳам иш бермабди, чунки бир неча кунга узоққа кетганида ўша ерда қўйларни санаш ва назорат қилишининг иложи бўлмабди.

Шунда Одам терига ҳар бир қўй учун чизиқча чизишни одат қилибди. Бир терига қўчкорлар сонини, иккинчи терига эса урғочи қўйлар рўйхати — белгисини чизиб қўядиган бўлибди ва уларни ўраб олиб юрадиган бўлишинти.

Кунлардан бир кун: — Кўчкорларнинг сони кўими? — деб сўрабди Одамнинг катта ўгли. Шунда Одам менда қўчкорлар кўпку-я, сенларда урғочилар қанчайкин, деб сўрабди. Улар ўргасида меники кўпроқ, деган баҳс кетибди. Шунда Момо Ҳаво, шошилманглар иккала теридаги белгиларни бирма бир санангларчи, деб таклиф қилибди.

Одам ва унинг ўғли: бири, яъни Одам эркак қўйлар рўйхатини, ўғли урғочи қўйлар рўйхатини ўқиб кетибди ва ҳар гал биттадан чизиқларини ўчира бошлабдилар.

Ниҳоят, Одам чизиқларни ўчириб бўлганда ўелининг қулидаги терида битта ортиқча чизиқ чиқибди.

Одам буни кўриб бироз жаҳди чиқсан бўлибди, чунки фарқи борлигини ҳаёлига келтирмаган экан.

III. ЭҲТИМОЛЛИК

8. Олчи ёки пукка?

Хар бир инсон ўзининг ёшлигини эъзозлаб, ҳаяжон билан эслайди, чунки ёшлиқ даври бу эркин ҳаёт, эркин фикр ва эркин вақт ўтказиш давридир.

— Бир бола әннеги тағида юқорига таңга отиб олчи (орел), ёки пукка (режка) үйнаётган экан, құшни йигит:

— Нима қилаяпсан? — деб қизиқипти.

— Таңгани олчи тушишта үргатаётібман, — дебди ва яна қайта отиб, — амаки мана уч марта кетма-кет отаман, таңганинг қайси томони күп түннади? — деб сұрабди.

Йигитча:

— Менку уч марта отганингда айтадиган гапим аник, аммо күп марта отсанг таңгани ҳар қайси томони қанча тушишини ҳам айтиб беришим мүмкін, — дебди.

— Қандай қилиб, сиз үзингизнинг хусусий таңгаларингиз билан тажриба үтказғанмисиз?

— Йүқ таңгаларда әмас гап, бунинг ҳисоб-китоби — математикасі бор. Агарда 10 марта отсанг, албатта пукка томони ёки түрт марта ёки беш марта тушади, балкім олти марта тушиши ҳам мүмкін.

— Қандай математика бу, агарда 10 марта чикка тушса-чи?

— Мүмкін, аммо бундай бұлишининг әхтимоллиги жуда кичик, у деярли бұлмайды, текшириб күришинг мүмкін.

— Қандай текширса бўлади?

— Жуда осон, масалан 10 марта, 20 марта ёки 100 марта отиб кўр, ҳар гал натижани бир йўла ёзиб борсанг ушанда кўрасан.

— Акажон буни сиз қаердан биласиз, нима сиз таңгани үргатғанмисиз?

— Йўқ, таңгани үргатиб бўлмайди-ку, аммо ҳар бир нарсанинг ҳаётда ҳисоб-китоби бор. Масалан, математикада әхтимоллик назарияси бор ва шу назария бўйича таңгани қанча күп отсанг, шунча күп 50 фоизга яқин пукка ва 50 фоизга яқин олчи тушади.

— Ие, қандай математика экан бу, олдиндан айтиб берадиган, менда ҳам, ўн марта отсан, ҳеч 10 та пукка тушадими?

— Албатта, бундай бўлиши қийин, — деб жавоб олди бола.

Әхтимоллик назарияси XVII асрда математиканинг энг қизиқ, энг мураккаб ва энг долзарб йўналиши сифатида

дунёга келди. Бу назария қимор (карта, ошиқ, кубик ва ҳоказо) күринишдаги ўйинларни ва асли ҳаётда кўп ва тез учрайдиган воқеаларни ўрганади ҳамда олдиндан на-тижаларини билишга имкон беради.

Эҳтимоллик назариясидан физик, химик, биолог, ме-дик, тарихчи, қадимшунос, археологлар, тилшунос, авиа-тор, қурувчи каби қасблар эгалари кенг фойдаланишади.

Бу фан айниқса ишлаб чиқариш соҳаларида кенг қўлла-нилади. Корхоналар ишлаб чиқарадиган маҳсулотнинг си-фатини ва техник асбоб-ускуналарнинг чидамлилигини аниқлашда фойдаланилади.

Хориждаги ривож топган (Франция, Япония каби) давлатларда эҳтимоллик назарияси фани мактабларда ўқитилади.

9. Мухлиса қайси қаватда яшайди?

Анвар анчадан бери Мухлиса кетидан кузатиб юрар, баъ-зida дугоналари билан кетаётган Мухлисанинг орқасидан уйигача кузатиб ҳам қўяр эди. Ниҳоят кунлардан бир куни мактабни тугатиш кечасидан қайтаётганда, Анвар Мухлиса-ни кузатиб уйигача бирга борди. Шунда Мухлиса:

— Бўлди, мен уйимга келдим, бизники лифт эшиги қаршисида деб 9 қаватли уйнинг йўлаги олдида тўхтади.

Албатта Анвар кўп нарсаларни, унинг телефонини, уй рақамини, қайси қаватда туришини билгиси келарди, чун-ки ўқиши тугагач Мухлисани йўқотиб қўйишдан ҳавотирда эди. Аммо Мухлиса унинг саволларига жавоб бергиси йўқ эди.

Шундай бўлса, ҳам қайси қаватда яшайсиз, деб сўради.

— Топингчи! — деди кулиб қиз.

Анвар ўзича юқори қаватларда яшаса керак деб ўйлади ва лифтда 2-қаватнинг тугмачаси йўқлигини кўриб, мате-матик таҳлил қила бошлади.

— Агарда топсам аниқлигини тасдиқлайсизми? — сўра-ди Анвар.

— Жавобим «ҳа» ва «йўқ» бўлади деб, шарт қўйди қиз:

— Ҳамма қаватларини биттадан сўрамайсиз, умуман учта саволгагина жавоб бераман деб, — кулиб қўйди у.

Йигит үйланиб қолди, чунки шарт анча мураккаб әди-да. Анвар әнди 3-қаватдами деб сұрамоқчи әди, үйланиб қолди, чунки бор-йүгі учта савол беришга ҳаққи бор әди. Агарла шу саволига йүқ жавобини олса, түғри жавобнинг әхтимоллігі 3/7 бўлиб, у қийин аҳволда қолар әди.

Шунинг учун үйланиб баъзи ҳисоб-китобдан сұнг:

- Сиз 6 қаватдан пастда яшайсиз! — деб қизга тикилди.
- Йүқ.

Демак, паст қаватларни инобатга олмаса ҳам бўлади деб, иккинчи саволни берди: — Сиз 8 қаватдан пастда яшай-сиз, тўғрими? — деди.

- Ҳа.

Бўлди топдим, демак 6 қаватда эканда, — деган әди.

- Йүқ — деб қизча йигитга қарали.

Шу тариқа Анвар қизнинг 7-қаватда яшашини аниқла-ди ва хурсанд бўлиб, иккаласи маминун хайрланишиди.

Анвар уйга келиб бўлган воқеани эслар, ўзича матема-тиқ талқин қиласар ва янгилишмаганилигидан суюнар әди. У ҳамма бўлиши мумкин бўлган вариантларни кўриб чиқиш ва баҳо бериш учун қўйидаги жадвалларни тузди (4-жад-вал).

4-жадвал

Керакли қаватни қидириш

Жавоб	Жавоб	Қават	Жавоб	Қават (натижа)
Ҳа	Ҳа, Ҳа	III	Йүқ, Ҳа, Ҳа	VII
Ҳа	Ҳа, Йүқ	IV	Йүқ, Ҳа, Йүқ	VIII
Ҳа	Йүқ, Ҳа	V	Йүқ, Йүқ, Ҳа	IX
Ҳа	Йүқ, Йүқ	VI		

У, агарда «Ҳа» сүзи «О», «йүқ» сўзи «I» деб — ифодала-ланса, яна бир жадвал тузиш ва 0 дан 7 гача ифодалаш мумкин эканлигига ишонч ҳосил қилди (5-жадвал).

Керакли қаватни қидириш						
000	001	010	011	101	110	111
0	1	2	3	5	6	7

Умуман «Ҳа» — (О), ва «Йўқ» — (1) деб белгилаш мурakkab масалаларни ЭҲМда хисоблаш имконини беради ва ҳисоблашда катта имкониятларга эришилади.

10. Математик Комилжон учрашувга шошилаяпти

Комилжон ўзининг шахсий юмушларининг, уйдаги хизматларнинг, боз устига бува ва бувиларининг топшириқларининг кўплигига қарамай мусиқага, санъатга ҳам жуда ишқибоз. Шу ишқибозлиги туфайли, у ёш, ўзига ўхшаган вақти тежоғлик Хуршида билан танишиб қолди. Қуйида уларнинг телефон орқали гаплашган сухбатлари, учрашувга шошилаётгандаги мулоқотлари келтирилган;

- Комилжон ака эртага консерваториядаги ижодий учрашувга борадиган бўляисизми?
- Ҳа албатта
- Мени олакета оласизми?
- Йўқ, лекциядан чиқиб марказга ўтаман, ундан сўнг стиб боришга ҳаракат қиласман.
- Ана кўрдингизми, яна вақтингиз йўқ. Дугоналарим устимдан қулишиади, келиб олиб кетмайдими, дейишади.
- Майли унда консерваториянинг олдида кўриша қолайлик.
- Қаерида?
- Консерваториянинг қаршисидаги китоб магазинида, деди Комилжон.
- Қаерда?! Эшигининг тагида бўзрайиб тургим йўқ.
- Бўзрайишга ҳожат йўқ. Ким олдин келса китоб магазини ичидаги китобларни кўриб туриши мумкин, деб жавоб берди Комилжон.

— Хүп, соат нечада? Тағын ҳамма китобларни ўқиб чи-
книңгэ түрги келмасин.

— Йүк, балким мен олдин борарман, мен машинада-
ман, адамлардан амаллаб олдим.

— Яхши, нечага бор дейсиз?

— Бир аниң вақтни айтишим қийин, аммо 18° даң 19° гача етиб бораман.

— Оббо, айтдимку китобларни анчасини ўқишимга түгри келмаса деб, бир соат кутишнинг ўзи буладими?

— Бұлмасам иккаламиз ҳам 17⁴⁰ билан 18⁴⁰ орасида келишігә ҳаракат қыламиз, шунда 20 минутча күтіш, бұлмаса консерваторияға кириб кетавериш.

— Түшүнмадым, мен 17⁴⁰ да келсам, сиз жаноблари 18⁴⁰ да, унда қандай қилиб мен фақатгина 20 минут күттеган бўламан ўртоқ математик?


— Мана эшитинг, математик ҳисоби қуидагыча булади, деб чап қулида телефон, үнг қулида чизма (2-расм) чиза бошлади ва күришганды күрсатаман деб гапни тутади.

Графикнинг горизонтал үқига қызиниң келиши вақтін, вертикал үқига үзининг келишінің вақтін белгиләди.

Масаланинг моҳияти қўйидагича, яъни $17^{40} - 18^{40}$ ичидан 20 минут кутишнинг ва учрашишнинг эҳтимоллик дарражасини аниқлашдир.

Штрихланган юза 20 минут орасида учрашиш даври, иккى чеккалаги штрихланмаган учбурчак юзалар 20 минутдан күп ёки ташқари вақтда учрашиши өткізу мүмкін.

Комилжоннинг вакти



3-DACM

рилир. Бу учбұрчак юзалар йиғиндиси $F = 40 \cdot 40 = 1600$, умумий юза эса $F = 60 \cdot 60 = 3600$.

Йигитнинг қызы билан 20 минут орасыда учрашиш әхти-моллиги

$$P = (3600 - 1600)/3600 = 5/9.$$

Бу қиймат анча юқори бұлғанлиги учун учрашиш со-дир бўлиши, яъни қызы билан йигитнинг консерваторияга бирга кириш әҳтимоллиги катталигини кўрсатади.

Қызы Комилжон билан агарда:

— қызы 17^{40} да кела олса, Комилжон эса 18^{00} гача келса (ABC);

— қызы 18^{20} да келса, йигит эса $17^{40} - 18^{20}$ гача келса (BDEF);

— қызы 18^{20} да келса ҳам, йигит эса 18^{00} дан 18^{40} гача келиши кифоядир.

Комилжоннинг учрашувга шошилганлигига қараб, Хуршида билан учрашуви аниқ деса бўлади.

11. Дала ҳовлида қурилиш — «Сюрприз»

Фарҳод билан Жамшид дала ҳовли олишганига анча булди, онаси «Чевар» фирмасида ишлаб, таниқли иқти-садчи-бухгалтер сифатида илғор ходимлар қаторида дала ҳовли олган эди. Аммо дала ҳовли 5—6 йил ўтса ҳамки, шундайлигича ётаверди. Чунки аввало уйдан узоқ, сув йўқ, ер тошлоқ ва айниқса бензин ниҳоятда қимматлик қилас-ди.

Кунлар, йиллар ўтиб (яхши кунлар келиб), дала ҳовлига эътибор бериб қолишиди. Чунки Фарҳод энди олим ва банкир, Жамшид эса дуконидан ташқари мебел фирмасида бош мұҳандис даражасига етишиб, қўлидан у-бу иш келадиган бўлиб қолди. Шуниси қизиқки, Жамшид бир акасига янгилик кўрсатай деб, дала ҳовлига ишхонадан 340 та катта, аммо енгил блоклар олиб келса, не кўз билан кўрсинки, дала ҳовлида ундан кўпроқ бошқа блоклар чиройли қилиб териб қўйилибди.

У уйга қайтгач акасига бўлган воқеани айтса, Фарҳод.

— Мен сенга «Сюрприз» құлувдим, хонаси келиб қолувди үзимиз чиқарған 480 та блокни бир ҳафтада келтириб олдим — деб мийигіда қулиб қўйди.

Ақа-ука қурилишга шу блокларни ишлатиб дам олиш учун иморат солиши режаси ҳақида ўйлашибди. Шунда Фарҳод, менинг ҳисобим буйича икки хонали уйга менинг блокимдан (Φ)—15 та, сенинг блокингдан (\mathcal{J})—20 дона, уч хонали уйга 30 та (Φ) дан ва 15 та (\mathcal{J}) кетаркан. Ҳуш хоналар сони энг күп бўлиши учун нечта 2 хонали ва 3 хонали уй қуриш мумкин?

Агар 2 ва 3 хонали уйлар сонини x_1 ва x_2 деб белгиласак, қўйидаги ифодаларни ёзиш мумкин.

Масаланинг шартига кўра,

$$N = 2x_1 + 3x_2 \rightarrow \max,$$

$$15x_1 + 30x_2 \leq 480,$$

$$20x_1 + 15x_2 \leq 340.$$

Масалан ечиш учун тенгсизликни тенглама куринишига (7 бўлим) келтирамиз.

$$15x_1 + 30x_2 = 480,$$

$$20x_1 + 15x_2 = 340$$

еки

$$x_1 + 2y = 32,$$

$$4x_1 + 3y = 68.$$

Жавоби: икки хонали уйдан $x_1 = 8$, уч хонали уйдан $x_2 = 12$ қўрилиб, энг яхши ечимга, яъни уйларнинг оптималь сони $N = 52$ га келинар экан. Жамшид ўйлаган вариантида $x_1 = 10$, $x_2 = 9$ эди, у ҳолда хоналар сони 47 та бўлар эди холос.

12. Сирли-махфий хатнинг мазмуни

Қуддус ака 9-май арафасида жуда бошқача бўлиб кетар олилар. Ҳақиқатан, Ватан уруши даври фахрийларимизнинг қалбларига муҳрланган. Уруш даври қанчалик ортда қолма-

сип. унинг аччиқ сабоқлари, ўчмас хотиралар эсдан чиқмасди.

Бу сатрларда тилга олинган ҳикоя шу уруш давридаги бир воқеага бағишиланган. Қуддус аканинг айтишларича, уруши даврида бир асир-офицернинг қўлидан ёқиб юбори-лаётган ҳужжатни тортиб олишган, ундаги қолган ёзув белгиларни ҳеч ким ўқиб беролмаган. Шу куйган ҳужжатни марказга Москвага юборишган ва бир неча кундан сўнг офицер қўлидан ҳужжатни тортиб олган солдатга катта мукофот берилган. Эшишишимча, дердилар уруш қатнашчиси Қуддус ака, ҳужжатдаги рақамлар, белгилар деярли куйиб кетган бўлса ҳам, математик усусларни қўллаш орқали шу ҳужжатдан зарур ахборот олинган.

Шу мавзуга атаб ёзилган «Тилла қўнгиз» номли ҳикояда ҳам ҳарфларниг тақорланиши асосида кодлаштирилган ахборотнинг мазмунини қайта тиклаш кўрсатилган. Қўйила китобда келтирилган ҳикояни келтирамиз.

Сири аниқданиши керак бўлган ҳужжатда қўйидаги ҳарфлар ва имлолар келтирилган:

53##+305//6*;4826)4#(ва ҳ. к. ҳаммаси 194 белги). Маълум бўлишича бу текст инглиз тили асосида тузилган бўлиб, имлоларниг учраши, яъни фойдаланилиши ва қайтарилишини ўрганиши учун қўйидаги жадвални тузишга тўғри келган:

8 рақаминиг учраши 34 марта

; белгисининг учраши 24 марта

белгисининг учраши 21 марта

4 рақаминиг учраши 19 марта

? белгисининг учраши 3 марта

// белгисининг учраши 2 марта

= белгисининг ва Й нинг учраши 1 мартадан ва ҳоказо.

Инглиз ёзувида энг кўп фойдаланиладиган ҳарф е ва а, о... ҳисобланади. Шуниси эътиборга сазоворки, инглиз тилида е ҳарфининг кўп учрашининг сабаби бор. Мисол учун е ҳарфи аксарият, кетма-кет икки мартадан жуфт кўринишида келадиган ҳолларда кўп учрайди; meet ёки fleet, speed ёки seen ва seed, been, agree ва ҳ. к. Ўрганилаётган текстда имло ёки 8 рақами беш мартадан кўпроқ жуфт кўринишида учраганилигини инобатга олинса, бу е ҳарфи деб қабул қилиш мумкин.

Агарда инглиз тилида жуда күп ишлатыладиган сүз the лигини инобатта олинса, имло (4; 8) тексттә 7 мартадан күп учраётганлыги асосида; бу 4-t.; h, 8-е деб белгилаш мүмкін.

Ана шундай ўрганишлар орқали сирли текст мазмунини босқичма-босқич ўрганиш мүмкін.

Шу каби муаммоларни А. К. Дойлнинг «Ўйнаётган одамчалар» ҳикоясида, Ўзбекистон Миллий Университетининг ёзувчиларимиз асарларидағи ҳарфларниң тақорланиши сөнини таңқиқот қилювчи илмий ишларидан ҳам күрса бұла-ди. Университеттә Ойбек асарларыда сүз ва ҳарфлардан фойдаланиш даражаси ўрганилган ва шу асосда илмий холосалар қилинган.

Албаттa бундан ташқари сирли ҳужжатлар мазмунини аниқлаш усууллари күп бұлсада, улар асосан юқоридаги мисол каби изланиш-тадқиқот қилиш асосида олиб борилади. Бундай муаммоларни ўрганиш ва ҳал қилиш учун ЭҲМ га киритилған бир неча хил дастурлар ҳам бор.

13. Бизнесда ким анық ютади?

Тарихдан чет әлларда, аксарият үзимизда ҳам, тош үйини кенг тарқалған эди, бу үйинлар учун маҳсус жой-лар ажратылған. Шуниси қызықки, бу үйинде негадир ким (мисол учун) 1 сүм ташласа, ютқазади дейилади. Ахир бир сүмга баъзан беш сүм, ҳатто 10 сүм ҳам ютишады!

Бу муаммони ўрганиш учун учта тош (кубик) ташлаб ютиш (2-жадвалнинг давоми) әхтимоллигини күрсатади-ған қуйидаги 6-жадвални көлтирамиз.

6-жадвал

Очколар Йигиндиси	Әхтимоллик $P(A)$	Ютуқ миқдори (сүм)
3 ёки 18	$1/26=0,005$	10
4 ёки 17	$3/216=0,014$	5
5 ёки 16	$6/216=0,03$	3
6 ёки 15	$10/216=0,046$	2
7 ёки 14	$15/216=0,070$	1,5
8 ёки 13	$21/216=0,1$	0
9 ёки 12	$25/216=0,1158$	0
10 ёки 11	$27/216=0,12$	0

Күриниб турибдики, ютуқ миқдори ютнш өхтимоллиги очколар йиғиндиси әнг кам бұлғанда катта. Аксинча, очколар йиғиндиси үртача бұлса, ютуқ нолға тенг, еки нолға яқин бұлар экан.

Агарда шу қабул қилинган миқдорлардаги үйиндан кутилаётган ютуқни ўргансак, у ҳолда математик кутиш:

$$MK = 1/216 \cdot 10 + 3/216 \cdot 5 + 6/216 \cdot 3 + 10/2162 + \\ + 15/216 \cdot 1,5 + 10/2;$$

$$16 \cdot 2 + 6/216 \cdot 3 + 3/216 \cdot 5 + 1/216 \cdot 10 = 1/216;$$

$$2 \cdot (1 \cdot 10 + 3 \cdot 5 + 6 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + 15 \cdot 1,5) = 19/24 \text{ сүм} \\ \text{бұлади.}$$

Масалан, үйин 216 марта тақрорланса ва ҳамма мүмкін бұлған очколар (3–18,1 марта; 4–17,3 марта; 5–16,6 марта; 6–15, 10 марта; 7–14,15 марта ва қолғанларида 8, 9, 10, 11, 12, 13 түшсі, бу ҳолда үйин эталон жадвалға биноан 261 сүмдан $2 \cdot 10 + 6 \cdot 5 + 12 \cdot 3 + 20 \cdot 2 + 30 \cdot 1,5 = 171$ сүм тұланади.

Демак, ютуқнинг математик қутилиши $MK = 19/24 = 80$ тийин. Шунинг учун бир сүм тұлаган үйинчи аксарият ютқазади аксинча, үйин әгалари эса ҳар гал камида 20 тийиндан ютади.

Агарда үйин 1 сүм әмас 10 сүм бұлса-чи, бу ҳолда әгаси әнг камида 450 сүмлик ютуққа әга бұлар әди.

14. Қайси күнлари савдо яхши бұлади

Саъдулла үз уйи олдига кичик сут дүкөни очганиға анча бұлған, харидорлар унга яхши ўрганишган, сут фермасидағилар у сутни айтган ҳамжыда үз вақтида идишларға солиб юборишар әди. Қарангки, вақт үтген сари сут даромади нафқат сут сифатига ва ҳажмигагина боғлиқ бұлмай, балки ҳафтаниң қайси куни ва қайси соатида сотилишиға ҳам сезиларлы боғлиқ экан.

Масалан, душанба күнлари ўрта ҳисобда 600–1000 л сут сотилар әкан, шу кунга қанча сутта буюртма берилса әнг катта даромадға әга бўлиш мүмкінлиги Саъдуллани қизиқтириб қолди. Агарда 600 л га буюртма берса, ютуқ катта бўлмайди, сут ололмаган харидорлар ундан айни́ди. Агарда бирмунчя кўпроқ олиб келишса, ортиқчасини

сақтайдиган шароит бұлмагани учун ортиқча харажат бұлади. Қандай қылса, душанба куни ва бошқа күнлари сут талабини әңг яхши қондиради?

Шу фикрлар билан математикага қизиқадиган акаси Фарҳодга мурожаат қилди. Акаси унинг кирим китобини күриб аниқласа:

20 душанбада 600 литр атрофида, шулардан:

3 марта — 600 л сут сотилди,

6 марта — 700 л сут сотилди,

5 марта — 800 л сут сотилди,

4 марта — 900 л сут сотилди,

2 марта — 1000 л (таксинан) сут сотилғанлыги маълум бўлди.

— Бу масалани, математик усуллар ёрдамида аниқ ечиш мумкин, — деди акаси ва қўйидаги жадвални тузди.

7-жадвал

Душанба куни сотилған сут	
жами	Эҳтимоллик
600	3/20=0,15
700	0,3
800	0,25
900	0,2
1000	0,1

Бу жадвалдаги миқдорларнинг математик қутилиши (*МК*) Саъдуллани қизиқтирган миқдор бўлиб, у қўйидагича топилади:

$$MK = 0,15 \cdot 600 + 0,3 \cdot 700 + 0,25 \cdot 800 + 0,2 \cdot 800 + 0,1 \cdot 1000 = 780 \text{ л.}$$

Шу таклиф асосида Саъдулла ҳар душанба куни 780 л атрофида сутга буюртма берар ва ўрта ҳисобда сутнинг ҳаммасини сотар, баъзан уйига ортиқча сут кўтариб ҳам келар эди.

IV. МАТЕМАТИКА ЁРДАМ БЕРМОҚЧИ

15. Тұртта омборчи утасидан арзон?

Бозор иқтисодига үтиш сабабли тажрибавий электротехника заводында күпдан-күп талабномалар туша бошлади. Ахир деярли барча ускуналарни әнді үзимиз чиқаришимизга тұғри келиб қолди. Айниңса, бир сменада юздан күп ходим ишлайдын йиғувчи цехнинг бошлиғи Темирвой аканинг ишлари күпайиб, ҳар бир участкани, ҳар бир ишчиннинг иш жойини ва иш ҳажмини ҳисоблаш күп вақтни ола бошлади.

Олдин яхши әди, штат бүйіча ишчилар олинарды, цех бошлиғи бажарылмаган ишнинг харажат-даромадига болы оғримасди. Эндичи, ҳар бир ишчи, унга кетадын харажат, ундан келалиған даромадларни ҳисобламаса бүлмай қолди.

Муаммолардан бири асбоб-анжом омборчасидаги ишчилар сони әди, 1996 йиллари бу омборда 2 ишчи ишлар, асбоб олишга ёки алмаштиришга келгандар навбатда туралыған бўлиб қолишили. Шунинг учун Темирбой ака омборчи сонини кўпайтириш режасини ўйлаб кўрди, шу асосда навбат ҳам йўқ бўлиб, иш унуми ошиши керак әди.

— Кечирасиз, Темирбой ака, нима шу пайтгача бемалол улдалаётган икки ишчи кам бўлиб қолдими? Ахир яна битта одам олсангиз харажатимизни кўпайтириб юборадику — леди завод бош мұхандиси.

— Айтганингиз тұғрику-я, аммо иш куни ва ҳажминнинг ҳисоб-китоби шуни күрсатаяптика, омборчи 8 соат иш кунидан 7 соат банд бўлади, бунда 2—3, баъзида 5 дақиқа ҳеч ким асбобга келмайди холос, аммо аксарият ҳолда одам кўпайиб, йиғилиб қолишмоқда. Иккита омборчи олиб яна 2400 сүм ойлик берсак, биз чиқарадиган маҳсулот ҳажмини ошириб ишчиларнинг навбатга кетган вақтини тежайимиз.

— Бу фикрларингиз балки асослидир, аммо ҳозир ҳисоб-китоб зарур, ҳар бир үзгариш асосли бўлиши лозим, — деди бош мұхандис.

Темирвой ака икки ҳафта хонасига кириб олиб ҳисоб-китоб қилди ва бош муҳандис олдига чиқиб,

— Биз шу икки ҳафта ичида ҳар хил вақтда 100 марта ишчиларнинг омборга келиш сонини, вақтини (ўртача 10 дақиқа) аниқладалик, — деб қуйидаги жалвални кўрсатди.

8-жадвал

	Лебобга келган ишчилар сони						
10 дақиқа ичида келган ишчилар сони	5—7	8—10	11—13	14—16	17—19	20—22	23—25
Назорат сони	1	6	19	31	25	13	5

Бу деган сўз 10 дақиқа ичида ўрта ҳисобда келган ишчилар сони $I_c = (1 \cdot 6 + 6 \cdot 9 + 19 \cdot 12 + 31 \cdot 15 + 25 \cdot 18 +$

$13 \cdot 21 + 5 \cdot 24) = 15,96 \approx 16$, яъни ҳар бир дақиқада 1,6 ишчи келади. Ҳисобимизча асбоб беришига кетган вақт эса ўрта ҳисобда 1,1 дақиқага тенг экан.

Ҳар дақиқада 1,6 ишчи учун бир иш кунида 1,6 ишчи кунида $1,6 \cdot 60 \cdot 8 = 768$ ишчи омборга келса, у $768 \cdot 1,1 = 845$ дақиқа ёки 14 соат вақтини омборда йўқотди. Агарда хизматни икки омборчи бажарса, 7 соат вақт омборда асбоб олишига кетар экан. Омборда кутиб турган вақтлари тўрт дақиқа бўлиб 768 ишчи учун $4 \cdot 768 = 3072$ дақиқа, яъни 51 соат бир сменада йўқотилар экан. Бу деган сўз завод бир иш кунида 10000 сўмдан кўпроқ маблағ йўқотар экан.

— Агарда омборчи учта бўлсачи? — деди бош муҳандис қизиқиш билан.

— У ҳолда ўртача кутиш вақти 0,31 дақиқа бўлиб, бунда бир сменада $0,31 \cdot 768 = 233$ дақиқа ёки 4 соат йўқотилади. Бунинг учун бир ойда (10000 ўрнига) 1000 сўм йўқотилади, аммо қўшимчча 1200 сўм маош бўлади.

— Нега бўлмаса сиз 4 омборчи ишласин деяпсиз?

— Тўртта омборчилда ҳеч қандай кутиш бўлмайди, аммо 2400 сўм маош ютказамиш бунда 10000 сўм иқтисод қиласмиш.

— Ҳай майли, учта омборчи бұлақолсин.

— Йүқ, тұртта булиши мақсадға мувофиқ чунки биттаси асбобларни тозалаб, созлаб туради, баъзда бир киши у ёқ-бу ёққа чиқиб кетса ҳам билинмайди.

— Ҳай, майли ишонтирдингиз, тұртта бұлса тұрттада, агарда иш етиб, даромад ошса нима ҳам қиласардик, — деди бош мұхандис.

16. Темир йүл станциясими қаерга қурған маъқул?


Каспий деңгизининг қирғогидаги Бекдош портынинг темир йүли йұналишида Уқча деган шаҳарча бұлыб, унда катта завод жойлашынан. Бу завод учун портнинг В-пунктига станция қуриш мүлжалланған эди. Мақсад: В пунктінен заводға тұғри йүл билан юкларни автотранспортда ташып ва вагонларни зудликда бұшатыш эди.

Йүл харажатлари маълум бұлыб, темир йүл орқали ҳар бир тонна километр 3 сүм, автомобиль орқали 5 сүмға тенгдир.

Юқорида келтирілген лойиҳа маҳкамадан үтмади, бұннинг сабаби ҳақида, норозилик билан ҳайъат аъзоси Алиб Анваровичта мурожаат қилишган экан:

— Юқ фақат заводға олиб бориладими ёки заводдан портта ҳамми? — деб сұради у.

— Йүқ, — жавоб берди Ходихұжа ака, заводнинг бош мұхандиси — ҳамма юқ фақат портдан келтирілади.



З-расм.

— У ҳолда *B* да станция қуриш үзини оқламайды, агарда С да құрсанғыз яхши бұлады, — деб лойиҳаны күрсатди Адіб Анварович ва *C* нұқталарни туташтирувчи *AC* чизигини қызиди.

— Аммо бунда автомашина юрадиган йүл узоқлашади-ку, автомашинада юк ташишда қар километр темир йүлга нисбатан $1,5 - 2$ баробар қимматку, деб туриб олди Ходихұ-жа ака.

— Мана қаранг, қайси бири қулай әкан, — деди осо-йишталик билан Адіб Анварович, — агар *CB* масофаны ҳ деб белгиласак, қар бир тонна юқдан биз $3x$ тийин иқти-сад қыламиз, чунки биз юкни портдан *C* станциясынан олиб келяпмиз, *CB* да харажат йүқ. Сүнгра юкни *C* дан заводға олиб борамиз бунда тежам $C = 5 \cdot 60 + 3x - 5(60^2 + 2x)$ га тенг бұлади, чунки $5 \cdot 60$ — автомобилда *BA* йүлидаги харажат, $3x$ — пастда *CB* йүлидаги харажат, $5(60^2 + 2x)$ — автомобилда *AC* йүлидаги харажат.

— Бу ҳолда иқтисод әмас, балки ортиқча харажат ҳам бўлиши мумкин, — деди Ходихұжа ака; мана масалан $x = 120$ км $C = 300 + 360 - 5(60 \cdot 2 + 120 \cdot 2) = -10$ сўм бұлади, бу деган сўз қар бир тонна юк 10 сўмдан қимматга тушмайди-ми? — дебди,

— Йүқ, ўртоқ бош муҳандис, x — кичик бўлган ҳолда иқтисод яққол күриниб турибди, $x = 120$ км функцияси-нинг энг кам қийматидир. Биз шу функциясининг энг маъқул ечимини қидирсак, бу ҳолда унинг x га нисбатан ҳосиласини аниқлаймиз:

$$C(x) = \frac{3 - 5 \cdot 2x}{260^2 + x^2} = \frac{360^2 + x^2 - 5x}{60^2 + x^2}.$$

Агар суратни нолга тенглаштирсак,

$$3 \cdot 60^2 + x^2 - 5x = 0, \text{ яғни } 3 \cdot 60^2 + x^2 = 5x,$$

$$\text{бу ҳолда } 9(60^2 + x^2) = 25x^2, 9 \cdot 60^2 = 16x^2,$$

$$\text{Бу деган сўз } 4x = 3 \cdot 60, \text{ яғни } x = 45 \text{ км.}$$

Мана қаранг-а, агар станцияни портта нисбатан 45 км яқинроқ жойлаштирсанғиз,

$$C(45) = 5 \cdot 60 + 3 \cdot 45 - 5 \cdot 60^2 - 45^2 = 60 \text{ сүм}\text{ бўлали.}$$

Ташылаётган бир суткада портдан заводга ўрта ҳисобда 500 тонна юқ ташылса, бу ҳолда бир йиллик құшимча даромат:

$$C = 500 \cdot 360 \cdot 60 = 10 \text{ млн. 800 минг сүм}$$

та тенг бўлади.

17. «Материаллар қаршилиги»ни топширдингми, уйлансанг бўлади


Қодиржон тенглошлари ичида энг олдин уйлаади, бунга сабаб «Материаллар қаршилиги» фани бўйича имтиҳонни тезкор ва аъло баҳога топширирган эди.

Талабалар, домлалар орасида бир неча нақл, ривоят, тарихлар йилдан-йилга, даврдан-даврга ўтар экан. Қизиғи шуки, ҳар бир олий ўқув юртининг нақдлари бўлиб, техник олийгоҳларда теормехни, яъни назарий механикани топширидингми, қиз билан танишишинг, сопроматни топширидингми, уйланишинг мумкин, деган хазил домлаларга ҳам маълум эди.

Кўйидаги келтирилган мисол ҳақиқатан материаллар қаршилиги, яъни сопроматга оид масала бўлса ҳам, ҳаётда кўп учрайдиган муаммодир. Чунки иморат солмаган оила бўлмаса керак.

Масаланинг мазмуни:

Цилиндр кўринишга эга бўлган дараҳтдан кесиб олинган (радиуси $R = 20$ см ли) ёғочдан кесими тўртбурчакли



4-расм.

түсін арралан керак бўлиб қолди. Эгизинидаги түсіннинг қаршилиги балка кесимининг эни (B) ва баландлигинини (H) квадратига тўғри мутаносиб.

Масаланинг шарти:

Арраланадиган түсіннинг кўндаланг кесимининг қайси ўлчамларида түсіннинг кўтариш қобилияти, яъни қаршилиги энг катта қийматга эга бўлади?

Масаланинг ечими:

Айтайлик түсіннинг қаршилик кўрсатиш қобилияти

$W = K \cdot B \cdot H^2$ бўлсин, бу ерда K — икки томондаги ўлчамларни мослаштирувчи коэффициент.

Юқоридаги шартга биноан доира ичига чизилган тўртбўрчак ўлчамлари қўйидаги боғланишга эга:

$$B^2 + H^2 = (2R)^2. \quad (1)$$

Бу боғланишдан

$$H^2 = (2R)^2 - B^2$$

эквалигини инобатга олсак, бу ҳолда қаршилик

$$H^2 = (4R - B)(4R + B), \quad (2)$$

$$W = K \cdot B \cdot (4R^2 - B^2) = 4K \cdot R^2 B - K \cdot B^3 \quad (3)$$

кўринишга келади.

$$4KBR^2 - KB^3 / (4KR^2 - 3KB^2). \quad (4)$$

Агар бизни W нинг энг катта қиймати қизиқтирса, бу ҳолда қўйидаги ҳосилани оламиз: уни нолга тенглаб

$$4KR^2 - 3KB^2 = 0,$$

соддалаштиrsак

$$4R^2 - 3B^2 = 0,$$

Түсіннинг баландлиги эса

$$B^2 = (4R^2 / 3); B = 2R / \sqrt{3}, \quad (5)$$

$$H^2 = 4R^2 - 4R^2 / 3; H = 2R / \sqrt{2} / 3. \quad (6)$$

Агарда қўйилган мисолнинг сон қийматини $R = 20$ см қўйсак қўйидаги катталиклар

$$B = 2 \cdot 20 / \sqrt{3} = 40 / \sqrt{3} \text{ см},$$

$$H = 2 \cdot 20 / \sqrt{2} / 3 \text{ см}$$

кўтариш қобилияти энг юқори бўлган тўсин ўлчами бўла-ди.

18. Мингбулоқ нефти — туман бойлик бўлсин десак

Республикамизда янги нефть кони — Мингбулоқ топи-лиши бу катта иқтисодий, борингки сиёсий аҳамиятга эга, чунки жумҳуриятимиз шундай, бой ва бадавлат бўлишига қарамасдан кўп хомашёни (темир, ёғоч, буғдой ва бошқа-лар) чет давлатлар қўйган бозор нархларида сотиб олишга мажбурмиз.

Ўзимизда топилган нефть бизнинг бойлигимиз, ундан самарали ва режали фойдаланишимиз зарур. Нефть топилган кунларида ойлаб фонтан бўлиб чиқаётган нефтни сақлаш муаммоси туғилган. Мажбуран катта-катта ҳавзалар қазилди, қанча-қанча харажатлар қилинди, кўп нарсани инобатта олмаганимиз ва қўлламаганимиз учун бир неча миллионлаб зарар ҳам кўрилди. Ерда кавланган ҳавзалардаги нефтнинг бир қисми ер ости атрофларига тарқалиб шимилиб кетиши ҳосилдор срларнинг заҳарланишига ва ишдан чиқишига, ер ости сувларининг ифлосланишига қисман сабаб бўлди.

Аслида нефтни, қўйингки, бошқа шу каби ёқилғи ва химикатларни иқтисодий ва режали сақлаш усууллари бор. Масалалан, бир чуқур ҳавза кавлаб, унинг асоси, ёnlари маълум материал билан қопланса, суюқлик ерга сизиб ўтмайди. Албатта, катта ҳавзалар учун бундай материал анча қиммат тушиши мумкин.

Аммо иқтисодий математика усууллари бундай шароитда ҳам энг тежамли ҳавза ўлчамларини топиш имкони-

ни беради. Масалан, ҳажми ($V=400$ л) бүлган ўра кавшаш зарур бўлсин, дейлик.

Ўранинг қайси ўлчамларида керакли V ҳажмдаги суюқлик — нефтни сақлаш учун ўра деворларига ишлатиладиган материалнинг қиймати энг наст бўлади, деган муаммо қўйилган бўлсин. Бундай масаланинг ечимини топиш учун номаълум ўлчамларни белгилаймиз:

H — ўра чуқурлиги

a — квадрат асосининг ўлчами

Ўрганилаётган юзанинг ўлчами

$$S = 4aH + a^2, \quad (1)$$

бу ерда $4aH$ — ўра деворининг юзаси, a^2 — асос юзаси.

Икки (a ва H) номаълумларнинг сонини камайтириш учун берилган ҳажмдан фойдалансак, яъни

$$V = a^2 \cdot H, \quad (2)$$

бу ҳолда $H = V/a^2$.

Бу деган сўз юза ифодаси қуйидаги кўринишга эгадир:

$$S = (4V/a) + a^2. \quad (3)$$

Энг кичик юзани ҳосила ёрдамида топамиз:

$$S = 4V/a^2 + 2a = 0 \quad (4)$$

бу ердан

$$a = \sqrt[3]{4V / 2} = \sqrt[3]{2V}. \quad (5)$$

Демак, энг оптималь ўра (сифим) ўлчамларини

$$a = \sqrt[3]{2V}, \quad H = \sqrt[3]{V / 4V}$$

кўринишда топса бўлар экан.

Агар ўра ҳажми $V=4000$ л нефть (суюқлик)га мўлжалланган бўлса, бу ҳолда

$$a = \sqrt[3]{2 \cdot 4,000} = 1,33 \quad \sqrt[3]{8,000} = 2,0 \text{ m},$$

$$H = 4,00 / 4,00 = 1,0 \text{ m}$$

бълари.

Биз бу ерда энг солда ўра түгрисидаги мисолни көлтиридик, ваҳоланки ўра деворлари тик бўлмаслиги ҳам мумкин, масала бу билан ўзининг мазмунини йўқотмайди.

Бундай масалалар халқ хұжалиғи учун зарур бўлган бошқа материаллар (цемент, парафин, шифобахш лой ва ҳ.к.) учун ҳам кўп учрайди.

19. Зафар шошаянти...

Зафар поездда Тошкентдан Фарғонага шошилинч масала бўйича кетаяпти, у йўлда газета ўқишдан чарчаса-да, пастдаги пассажирлар билан суҳбатга тушгиси келмасди. Ойнага қараб кетаркан, ўйлади — намунча секин юрмаса, қандай тезликла кетаётган эканмиз? — деб масофани белгилайдиган кўрсаткичдаги километрларни ўқий бошлади. Иккита олдинма-кетин келган кўрсаткичларга ва соатига қараб, 6 км масофани 7,5 минут вақтда ўтган бўлсак, поезднинг тезлиги 48 км/соат эканлигини аниқлади.

Хақиқатан поезднинг шу вақт ичидаги ўртача тезлиги 48 км/соат. Аммо шу вақт ичидаги поезд баландликка ҳам кўтарилгани ва ундан тушган бўлиши, ҳаттоқи тўхташи ҳам мумкинку, у ҳолда ҳақиқий тезликни қандай аниqlаш мумкин?

Албатта, бундай тезликни поезд бир текисда, бир меъёрда юрганида олиш мумкин, аммо афсуски, бундай йўл узоқ давом этмайди. Поезд Фаргона йўлининг ҳар хил қисмида ҳар хил тезликда қатнайди.

Шу масалани ўрганиш ва ечиш учун физиканинг мактабдан маълум бўлган мисолини эслайлик; маълум H ба-ланцукдан бошланғич тезликсиз тушаётган жисмнинг ҳаракат конуни, қуйидаги ифода билан аниқланади:

$$H = ht^2/2, \quad (1)$$

бу ерда g жисмнинг эркин тушиш тезланини, таҳминан $g = 10 \text{ m/s}^2$ га тенг, t — жисмнинг баландликдан тушиш вақти сек.

Агар ҳаракат траекторияси маълум бир функция билан ифодаланса $S = S(t)$, у ҳолда жисм тезлигининг t_1 ва t_2 вақт ичидаги ўртача қиймати қўйидагича аниқланади:

$$(S_2 - S_1)/(t_2 - t_1) \text{ ёки } S/t. \quad (2)$$

Аммо, айтганимиздек вақт ичидаги тезлик ўзгаради ва жуда қисқа вақтдаги тезликни шундай аниқланни мумкин. Бу деган сўз, тезлик босилган йўлнинг босиб ўтишга кетган вақтга нисбатан ҳосиласидир, яъни

$$V(t) = dS/dt = S(t). \quad (3)$$

Эркин тушаётган жисмнинг тезлиги эса $I(t) = S'(t) = gt$.

Бу келтирилган муносабат — ҳосила жуда қўп масалаларни ечишга ёрдам беради, шунинг учун ҳам у мактаб ўқув дастурига киритилган.

Мисол сифатида шу математик усулнинг қўлланилишини кўриб чиқамиз. Бунда бирор бир дифференцияланувчи функцияning экстремал (энг кичик ёки энг катта) қиймати аниқланади.

Биз китоб бошида тўр билан қўйхона ажратиш масаласини кўриб, энг катта юза топишни ўргангандай эдик. Эсласак 36 м тўрдан тўртбурчакли қўйхонанинг иккита томони (эни)ни — x , бўйни эса $2x$ деб қабул қилиб, юзанинг формуласини


$$S = x \cdot (36 - 2 \cdot x) \quad (4)$$

куринишда чиқарган эдик. Бу функцияning солда кўриниши

$$S = 2x^2 + 36x$$

бўлиб, унинг график ифодаси параболадир (5-расм).

$$x = 9.$$



5-расм.

Кўриниб турибдики, экстремал нуқта $x = 9$ да бўлиб, уни бошқача ҳам ҳисоблаш мумкин. Бунинг учун функция A дан X бўйича ҳосила олсак

$$(dS/dx) = (-2x^2 + 36x) = -4x + 36.$$

Ҳосиладан чиққан функцияниг ечимини $-4x + 36 = 0$ деб, номаълум $x = 9$ ва $S = 162 \text{ m}^2$ га тенглигини аниқласа бўлади.

Демак, функцияниг экстремал нуқтасини ҳосила орқали топиш мумкин ва қулайдир, фақат шу функция ҳосила талабига бўйсунадиган бўлса бас.

20. Тешавой беизиндан иқтисод қилмоқчи

Замоннинг зайли билан Тешавоига денгиз флотида хизмат қилишига тўғри келиб қолибди. Бир ой ўтиби, бир йил, қўйингки учинчи йили ҳам ўтай деб қолибди. Шунда у крейсерни анча ўзлаштирган, крейсернинг капитани билан яқин бўлиб, соатлаб сухбатлашадиган бўлиб қолибди.

Тешавоининг математикага, фикрлаш ва ҳисоб-китобга ишқибозлигини билган капитан бир кун унга бир масала қўйибди.

— Бизнинг крейсеримиз, — дебди у, тезлиги 10 км/соат бўлганда 40 сўмлик бензин ёқади. Ёқилғи сарфини кўпайтирилса тезлик ошади. Бундан ташқари, крейсеридан фойдаланишдаги харажатлар (таъмирлаш, маош, озиқ-овқат ва бошқалар) соатига 640 сўм бўлиб, кема тезлигига боғ-

лиқ әмас. Мана сенға масала: крейсернинг қайси тезлинида умумий харажатлар әнг кам бұлади?

Мана шу қүйилған масаладан сұнг Тешавой бир неча күн үйлаб, фикрлаб, қофозга нималарни дір ёзибди ва ниҳоят капитанга хұрсанд бұлып масаланиң ечимини күрсатибди:

— Агар крейсернинг тезлиги 10 км/соат нисбатан x марта күп деб қабул қылсақ, бу ҳолда соатига $40x^3$ сүмлик бензин сарфланади, демек $40x^3 : 10x^3 = 4$ ёки 1 км йүлге $4x^2$ сүмлик ёқилғи кетади.

— Эътибор берсак, — деб тушунтиришда давом этибди Тешавой, — $x = 0,1$ бұлғанида тезлик 1 км/соат, 1 км масоғага 4 тийинлик ёқилғи сарфланади, аммо ҳар километрга 640 сүмлик бошқа харажатлар түғри келади. Шунинг учун кичик тезлик иқтисодий жиҳатдан зиён келтиради.

$x = 5$ ва тезлик 50 км/соат бұлғанида ҳар 1 км га 100 сүмлик ёқилғи сарфланиб, бу ҳам иқтисодий жиҳатдан фойдасизdir. Шунинг учун $x = 0,1$ дан катта ва $x = 5$ дан кичик тезликтерни топиш керакки, умумий харажатлар кам бұлсın.

Бунинг учун тезликни $10 \cdot x$ км/с деб қабул қылсақ, унда ҳар бир км масоғага $640/10 \cdot x$ ёки $64/x$ сүм бошқа харажатлар түғри келади. Умумий йүл босиңшында кетадиган харажат эса

$$C = 4x^2 + 64/x \text{ (сүм)}.$$

Капитанинг қизиқиб үтирганини күриб, Тешавой хұрсанд давом этди.

Агарда шу C — функциясидан x — бүйіча ҳосила олсак,

$$C(x) = 8x + 64/x^2 = (8x^3 - 64)/x^2 = 8(x^3 - 8)/x^2,$$

масаланиң ечими

$$8(x^3 - 8)/x^2 = 0 \text{ ёки } x^3 = 8, \text{ ёки } x = 2$$

бұлади.

Бу деган сүз, әнг маъқул-қулай тезлик 20 км/соат бұлып, бунда ҳам бензиндан, ҳам умумий харажатдан режали фойдаланишында олиб келар экан.

Албатта, баъзи ҳолларда зарур вақтда тезликни 30, 40 км/соатга кўтариш мумкин, аммо бунда харажат катта бўлали.

Бу тушунтириши ва баъзи савол жавобдан сўнг капитан Тешавойни мақтаб, қўлини сиқар, ич-ичидан хурсанд бўлар эди. Чунки қиргоқда тежалган бензинни спиртга алмашини имконига эга бўлар эди.

21. Иморатнинг баландлиги ва бошқа ўлчамлари

— Ҳукуматимиз барака топсени, ҳаммага ер берли, экин ЭК, иморат сол, аҳволингни яхшила деб. Экиннику экамиз-а, аммо иморат қуриш, жуда мушкул бўлиб қолдилада, — деди Фиёсхўжа почча. — Иморатни тиклашга бетон ва гипсит энг асосий материал бўлиб, аммо улар жуда қиммат. Шунинг учун кунчиликниң боши қотиб қолди.

Фиёсхўжа аканинг ташвиши ҳақиқатдан халқ ташвиши, унинг ечимини топиш даркор. У ҳам бўлса харажатни камайтирадиган, фиштни тежаш йўлини қидириш керак. Бундай масаланинг математик ифодаси қуйидагича.

Айтайлик, уйимиз тўғри тўртбурчак бўлиб, бўйи у, эни x ва баландлиги H бўлсин, бу ҳолда иморат ҳажми

$$V = x \cdot y \cdot H, \quad (1)$$

унинг сиртқи сатҳи (фишт сарфи) $2 \cdot y \cdot H + 2 \cdot x \cdot H$ га тенг.

Бор фиштдан шундай иморат солинсинки, бу иморатнинг ички фойдали сатҳи энг катта қийматга эга бўлсин.


$$S = x^*y \max. \quad (2)$$

Масалан: айтайлик, фиштнинг ҳажми V_1 , уйнинг баландлиги H , деворнинг қалинлиги B бўлсин, б-расмда иморатнинг режаси кўрсатилган.

Ҳамма фиштнинг ҳажми

$VF = (2(x + 2 \cdot B) \cdot B + 2 \cdot y \cdot B) \cdot H$ берилган деб фараз қилиб, формуладан номаълум у ни топсак,

$$2 \cdot B \cdot H \cdot x + 4 \cdot B^2 \cdot H + 2 \cdot H \cdot x \cdot B = V, \quad (3)$$



б-расм.

$$y = V - 4B^2 \cdot H - 2B \cdot H \cdot x/2H \cdot B.$$

Бизни қизиқтирадиган сатҳ

$$\begin{aligned} F = x \cdot y &= (VF - 4B^2 \cdot H - 2B \cdot H \cdot x/2B \cdot H) \cdot x = \\ &= V \cdot x/2B \cdot H - 2B \cdot x - x^2 \end{aligned}$$

Бу функцияниң x га нисбатан ҳосиласи

$$\begin{aligned} F(x) &= (VF/(2B \cdot H) - 2B - 2x = 0 \text{ ёки } x = (VF/4B \cdot H) - B, \\ y &= (VF/4B \cdot H) \cdot B, \\ F_{\max} &= ((VF/4B \cdot H) - B) \cdot ((VF/4B \cdot H) - B) = yx. \end{aligned}$$

Демак: (1) формуладан күринадики, тўртбурчаклар ичидаги энг катта сатҳга эга бўладигани квадрат экан:

$$F_{\max} = ((VF/4B \cdot H) - B)^2.$$

Бу деган сўз бор фиштдан энг катта сатҳли иморат солиш зарур бўлса, бу ҳолда уйнинг томонлари квадрат бўлиши шарт ва унинг ўлчамлари

$$x = y = (V/4B \cdot H) - B$$

га тенг бўлади.

Мисол: 20 минг дона фиштдан шундай иморат солинсинки, бу иморатнинг фойдали ички сатҳи энг катта қийматга эга бўлсин. Бор фиштнинг ҳажми $V = 36 \text{ м}^3$, яъни битта фиштнинг ҳажми $V_1 = 0,225 \cdot 0,125 \cdot 0,65 = 0,0018 \text{ м}^3$ га тенг.

Бизда 20 мингга ғишт бор, яъни $V = V_1 \cdot 20\ 000 = 0018 \cdot 20\ 000 = 36 \text{ м}^3$. Бинонинг баландлиги $H = 3,0 \text{ м}$, дёвортининг қалинлиги $B = 0,4 \text{ м}$.

Тўртбурчакли ғишин иморатнинг энг катта сатҳга эга бўладиган бўйи ва эни аниқлансин.

Ечиш: юқорида ҳисоблаб чиқарилган формулалар ёрдамида бинонинг ўлчамларини ҳисоблаймиз.

$$\text{Эни } x = (V/BH) - B = 36/4 \cdot 0,4 \cdot 3 - 0,4 = 7,1 \text{ м},$$

$$\text{Бўйи } y = (V/BH) - B = 36/4 \cdot 3 - 0,4 = 2,6 \text{ м га тенг.}$$

Энди бинонинг энг катта юзасини ҳисоблаймиз.

$$F = x \cdot y = 7,1 \cdot 2,6 = 50,41 \text{ м}^2.$$

Бу ҳолда, яъни бино квадрат шаклида бўлганда энг катта сатҳга эга бўларкан.

Агар бино квадрат эмас, тўғри тўртбурчак шаклида бўлганда қандай бўлади?

Тўғри тўртбурчак бўлганда, яъни бўйи энига нисбатан икки баравар катта яъни $y = 2x$ бўлганда ҳажм учун $V = (2(y + 2B) \cdot B + 2x \cdot B) \cdot H = 2B \cdot H \cdot y + 4 \cdot B^2 \cdot H + 2x \cdot B \cdot H$ ифодага эга бўламиз! Бу формуладан $2x$ ўрнига y ни қўйиб, y ни аниқлаб оламиз.

Бинонинг умумий ҳажми

$$V = 2yB + 4B^2 + y \cdot B \cdot H. \quad (6)$$

(2) формуладан y ни аниқлаймиз:

$$y = (V/3BH) - (4/3) \cdot B \quad (7)$$

бўлади

Энди x ни аниқлаб оламиз:

$$x = y/2(V/6 \cdot B \cdot H) - 4 \cdot B/6 \quad (8)$$

экан. Энди тўртбурчакнинг сатҳини аниқлаймиз:

$$S = x \cdot y = ((V/6B \cdot H) - 4 \cdot B/6) \times ((V/3B \cdot H) - 4 \cdot B/3). \quad (9)$$

Мисол: $V = 36 \text{ м}^3$,

$B = 0,4 \text{ м}$,

$H = 3,0 \text{ м.}$

топиш керак: $x = ?$ $y = ?$ $F = ?$

Ечиш: юқорида түртбұрчак учун аниқланған (2), (3), (4), (5) формулалардан фойдаланиб, түртбұрчак үлчамдарини аниқладаймиз.

$$\begin{aligned}x &= ((V/6B \cdot H) - 4 \cdot B/6) = \\&= ((36/6 \cdot 0,4 \cdot 4) - 4 \cdot 0,4/6) = 4,73,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= ((V/4B \cdot H) - 4 \cdot B/x) = \\&= ((36/3 \cdot 0,4 \cdot 4) - 4 \cdot 0,4/3) = 9,46.\end{aligned}$$

Энди түртбұрчак сатхини аниқладаймиз.

$$F = x \cdot y = 4,73 \cdot 9,46 = 44,75 \text{ м}^2.$$

Бундан күриш мумкинки, квадрат бүлган ҳолда, биз сатхдан 11% ютишимиз мумкин экан.

22. Эңг катта ва эңг арзон

Айниқса ҳозирги вақтда күп нарса, хусусан тунука жуда танқис нарсалардан бири бұлиб қолди. 5—10 тонна тунука олиш учун вагонлаб хұл-мева етказиб беришга түгри келаяпты. Шунинг учун ҳамма жойда уни тежаб ишлатиш мақсадға мувофиқдир. Бунинг учун ҳар бир темирни, тунукани, умуман бошқа камёб нарсаларни математик усуллар ёрдамида тежаб ишлатиш зарур.

Мана ҳәйтдан яна бир мисол: Уста Абдуфаттоқ шогирди Абдувоҳидга оқ тунукадан қутига үхаш идиш тайёрлаш керак, тунукани шундай бичиш керакки, кам чиқиндили катта ҳажмли идиш олинсин, деди.

— Қандай қилиш керак бу идишни? — деб сүради Абдувоҳид.

— Жуда содда, бурчакларини квадрат үлчамиға мос қилиб өзиш ва қирқилған жойни улаш керак. — деб қоғозни буклаб күрсатди ва қопқоқ керак әмас, — деб қүшиб қўйди уста.

Ишлатилган тунука түртбұрчак бўлиб, ўлчамлари 45^* 21 см экан. Абдувоҳид қалам ва қофоз олиб расм чизиб ҳисоб қила бошлади.

Агар — деди у, — қирқиладиган квадратнинг томони но маълум x бўлса, у ҳолда биринчи беришда $x = 3$ см десак, унда қути баландлиги ҳам $x = 3$ см бўлади. Тунуканинг икки томони 3 см дан букилса, унинг томонлари: $45 - 6 - 39$ см, $21 - 6 - 15$ см га teng ва қути сатҳи (асосининг юзаси) $F = 39 \cdot 15 \text{ см}^2$ бўлади ва унинг ҳажми

$V = 39 \cdot 15 \cdot 3 = 1755 \text{ см}^3$ га teng. Агарда $x = 5$ бўлса, у ҳолда $x = 5$ учун, $F = 35 \cdot 11 \cdot 5 = 1925 \text{ см}^3$. Шунингдек, $x = 7$ см бўлган ҳолда $x = 7$, $F = 31 \cdot 7$ ва $V = 31 \cdot 7 \cdot 7 = 1519 \text{ см}^3$ ҳажмга эга бўлади леб, ҳисобни тұхтатди. Қараса, қизиқ аҳвол, қутининг ҳажми x — баландликка боғлиқ бўлиб, $x = 5$ атрофида энг яхни ечимга эга экан (7-расм).

— Уста, деб суюниб келибди у, мана қаранг, мен 5 см га teng квадрат қирқаман, чунки ундаги ҳажм энг катта, деб мағрурланиб қўйди.

Шунда уста,


— Йўқ, Абдувоҳидвой, бундай қилиш керакмас, чунки $x = 5$ см дан ҳам яхни вариант бор — деди.

Масаланинг аниқ ечимини топиш учун математикадан тўғри фойдаланиш керак, яъни тунуканинг бурчакларини x — баландликда қирқсак у ҳолда бизни қизиқтирадиган ҳажм

$$V = (45 - 2 \cdot x) \cdot (21 - 2 \cdot x) \cdot x = 4x^3 - 132x^2 + 945 \cdot x$$

кўринишга эга бўлади, ундан ҳосила олсак,

$$V(x) = 12 \cdot x^3 - 264 \cdot x + 945.$$



7-расм.

Энг катта ҳажмли идишнинг ҳажми бўйича олинган ҳоси-ла нолга тенглигига топилади:

$$12x^2 - 264x + 945 = 0$$

Бу тенгламанинг иккита ечими бор.

$$x_1 = 17,5 \text{ см} \text{ ва } x_2 = 4,5 \text{ см.}$$

Кўриниб турибдик, $x_1 = 17,5$ см ечим берилган масалани қаноатлантира олмайди, шунинг учун $x_2 = 4,5$ см ни ташлаш мақсадга мувофиқдир. Бу ечимда ясаладиган идишнинг энг катта ҳажми

$$V = (45 - 9) \cdot (21 - 9) = 1944 \text{ см}^3$$

булади.

— Мана бу вариант бизни қизиқтиради ва тунукани анча тежашга имкон берали, — леб Абдувоҳиднинг елкасига қоқиб қўйди уста.

23. Салима шамни қаерга қўйсин?

Бир вақтлар шамли оила энг бадавлат оила ҳисобланар, тун киргач шам атрофига тикиш, бичиш, ўқин ва ёзиш имкони бўларди. Ҳозирги вақтда электр чироқ, худди биз билан бирга туғилгандек, уни беминнат хоҳлаган вақтда ёқамиз, учирдимиз. Бирор вақт учиб қолса, қўшнилардан хабар олиб, тегишли жойга, «қапи электр», леб дўқ ҳам урамиз. Электрнинг келиши ўз-ўзидан бўлмаслигини, унинг учун қанчадан-қанча меҳнат, харажат кетаётганини билсакда, аксарият ундан хоҳлаганча ва балки ортиқчароқ ҳам фойдаланамиз.

Аммо бу неъматни ҳам ардоқлаб, ундан тўғри фойдаланилса, зиён қилмайди.

Айтайлик, думалоқ (радиуси $R = 1,2$ м) стол тенасида чироқ осилган бўлса, столнинг ёритилиши энг яхши бўлиши учун чироқни қайси баландликда осиш керак?

Бу масала физика фанига оид бўлиб, ҳақиқатдан ҳам столнинг ёритилиши тушаётган ёруғликнинг тушиш бурчаги синусига тўғри ва чироқ билан ёритилаётган жой орасидаги масофанинг квадратига тескари мутаносибдир.

Агар шу чироқ билан стол орасидаги масофани H билан ифодаласак, бу ҳолда чироқдан столнинг энг чеккасигача бўлган масофа

$$d^2 = R^2 + H^2 \quad (1)$$

синус бурчак эса,

$$\sin \alpha = 1 / \sqrt{R^2 + H^2}$$

ифода бўйича аниқланади. Физикадаги ёритилиш формуласига кўра

$$L = k \frac{\sin \alpha}{d^2} = k \frac{H}{R^2 + H^2} \frac{1}{R^2 + H^2} = k \frac{H}{(R^2 + H^2)3/2}, \quad (2)$$

бу ерда k — ўзгармас қиймат бўлиб, чироқнинг ёритувчалигини кўрсатади.

Маълумки, чироқни пасайтира борсак, чироқ нурлари столни ёритишни кучайтира бошлайди. Агарда чироқни баландроқ кўтара бошласак, масофанинг квадратига мутаносиб равишда ёритилиш камая боради. Хўш, нима қилиш керак? Қандай қилсак, қайси баландликда чироқдан тушаётган ёруғлик мақсадгага мувофиқ бўлади, яъни стол юзаси энг кўп ёритилган бўлади.

Бунинг учун H ни ўзгарувчан деб, юқоридаги ёритилиш формуласининг H га нисбатан ҳосиласини қидирамиз:

$$L'(H) = k \frac{R^2 - 2H^2}{(R^2 + H^2)3/2}, \quad (3)$$

Максимум (минимум) шартига кўра ҳосила нолга тенг бўлиши керак. Бу деган сўз

$$R^2 - 2H^2 = 0. \quad (4)$$

Бундан H ни аниқлаймиз:

$$H_2 = R\sqrt{2}. \quad (5)$$

Демак: $H = 0,7$ $R = 85$ см бўлади.

Үмуман, хулоса шуки, фақат лампочка учун эмас, балки исталған ёритувчи манбани, жумладан шамни ҳам шу масофага күтартсангиз, энг яхши ёритилишни оласиз.

24. Шұхрат күпrik қурмоқчи

Шұхрат билан Хожиакбар устозлари Нодир Жамоловични күргани уйлари жойлашған Аҳмад Дониш күчасига кетишаётган эди. Автобус Себзор даҳаси билан Юнусободни бирлаштириб турувчи янги күпrikдан аста күтарила бошлади. Шунда Хожиакбар қизиқиб сұрады:

— Шұхрат ака, кейинги йилларда шаҳrimизда жуда күп күпrikлар қурилалапты. Шаҳrimiz чиройига чирой қүшиляпты. Бизда ҳам қурса булар экан-ку.

— Албатта бўлади. Чет элда хатто икки, уч қаватли күпrikлар ҳам бор. Уларни қуриб мени ҳам жуда ҳавасим келувди.

— Нега авваллари бундай күпrikлар қурилмаган? Ёки бизларда илм фан ва технологиялар савияси паст бўлганми?

— Йўқ. Бизда илм фан савияси юқори бўлган, ҳозир ҳам шундай. Фақат мустақилликдан олдинги йилларда фан ютуқлари халқ хўжалигига тадбиқ қилинавермаган.

Орқа ўриндиқда ўтириб кетаётган кексароқ аёл беихтиёр суҳбатга қўшилди.

— Ўғлим ҳозирги иқтисодий қийинчилик пайтида қандан қанча пул сарфлаб, шу күпrikларни қуриш шартмиди?

— Холажон, бу каби күпrikларнинг иқтисодиётимизга фойдаси күп. Масалан, — давом этди Шұхрат, — Юнусободгача йўл узунлиги анча қисқарган. Бу эса ёқилғи тежамкорлиги ва вақтдан ютишга олиб келади. Машиналар ҳам бир-бирига халақит бермайди. Ундан ташқари шаҳrimiz чиройли бўлиб, чет эл инвесторларини жалб қилишга ёрдам беради.


Хожиакбар суҳбатга янада қизиқиб кетди:

— Шұхрат ака, менимча қурилиш конструкциясининг оптималь бўлиши ҳам иқтисодий тежамкорликка олиб келса

керак. Бу күпприклар үзи қайси конструкция асосида қурилади?

— Тұғри айтасан Хожиакбар. Конструкция иложи бори-ча кам материал сарф бұладиган ва шу билан бирга күта-риш қобилияты эңг юқори бўлиши керак. Бу күпприклар «Устқурма» конструкцияси асосида қурилади. Бизга Нодир Жамолович бир мисол кўрсатган эдилар. Қоғоз қаламинг бўлса ол бу ёкқа. Ҳозир сенга шу мисол орқали тушунтириб беришга ҳаракат қиласман.

Мана қара. Күпприк вазифасини бажарувчи уч оралиқли симметрик балка учун:



8-расм.

Шу каби статик ноаниқ конструкцияларни лойихалашва ҳисоблашда ҳар бир оралиқдаги балканинг кўндаланг кесимларининг ўлчамини ифодаловчи бирликлар нисбатларини ($EJ = E^* b k^3 / 12$) олдиндан билиш шарт. Шундан келиб чиққан ҳолда кўндаланг кесимларининг бирликлари нисбатларини аниқлаш лозим

$$[\alpha = (EJ_1) / (EJ_2)]. \quad (1)$$

Бунда

$$M_{1\max} = |M_{on}|. \quad (2)$$

Масаланинг ечими эса мана бундай. Уч моментлар тенгламасидан ва $M_{on} = 0,086 q l^2$ (бу қиймат q ва M_{on} лар билан юклантан бир оралиқди балкани ҳисоблашда ҳам аниқ-

линиган)дан оптималь бикрлик муносабати $\alpha = 9,75$ га тенглама аниқланған.

— Ана шундай муносабат балкалар тизимини энг енгил (арzon) булишини таъминлади, — деб гапини тугатди Шухрат.


25. Кўп юришди, кўп ўйлашди, иҳоят кўплаб қуришди

Молиячи Ҳикматилла ва математик Равшан қурилиш соҳасига ўзларининг ҳиссаларини қўшиш мақсадида кичик бир ишбилармонликни йўлга қўйиши. Улар қурилишда кўп ишлатиладиган икки хил турдаги рамаларни ишлаб чиқармоқчи бўлдилар.

Ҳикматилла 1-рамадан 10 дона, иккинчисидан эса 20 дона ишлаб чиқармоқчи. Ҳикматилланинг ўзи математика ва материаллар қаршилиги соҳасидан анча йирокда бўлгани учун математик Равшандан маслаҳат ва ёрдам сўради. Равшан эса бу соҳаларни анча чуқур ва пухта эгаллаган.

Равшан материал ва элементлардан тежаш мақсадида Ҳикматиллага қўйидагича маслаҳат берди: рама элементларига шундай кесимлар танлаш лозимки, бунда барча элементларининг биргаликдаги таннархи минимал қийматга эга бўлиши керак. Шунда биз ишлаб чиқаришда анча ютуқлар қозонамиз ва ишлаб чиқарган маҳсулотларимиз харидорбоб бўлади, — деди. Лекин унификация (бир хиллашибтириш) шарти бўйича тўсин — ригел ва устунлар иккала рамалар учун ҳам бир хил бўлиши лозимлигини Равшан жуда ҳам яхши биларди.

Шунга асосан, улар яна бир мутахассис билан маслаҳатлашиб рама ўқларининг жойлашуви ва эгилётган иккита рамали конструкция учун юкланиш тарҳини қуришди.



9-расм

Равшан масалани унификацияни ҳисобга олмаган ҳолда ечимини бошлади. Бунда иккала рама учун мақсад функцияниң (конструкция харажатини ифодалайдиган функция) күриниши қўйидагича бўлади, деб ҳисоб бошлади:

$$z_1 = M_c^{(1)} + M_p^{(1)} \rightarrow \min; z_2 = 2M_c^{(2)} + M_p^{(2)} \rightarrow \min, \quad (1)$$

бу ерда, M_c , M_p — ригел ва устуннинг чегравий пластик моменти:

Сўнгра P_1 ва P_2 номаълумларга эга бўлган куч усулиниң асосий тизимларини киритди.

Агар иккала рамада соддалаштирилган элементлар ишлатилса, у ҳолда мақсад функцияси қўйидагича бўлади:

$$z = 50M_c + 30M_p \rightarrow \min. \quad (2)$$

Чизиқли дастурлаш масаласининг бу ечими

$$P_1 = 10/3; P_2 = 5/6; M_c = 10/3; M_p = 25/3; z = 416\frac{2}{3} \quad (3)$$

ни беради.

Равшан ҳисоб-китоблар натижасида шундай хulosага келди:

Унификация қилинган элементларда индивидуал лойи-ҳалаштирилган конструкцияларга нисбатан материалларниң харажатлари ҳар доим баланд бўлар экан:

$$(35/3 \times 10 + 10 \times 20 = 316\frac{2}{3} < 416\frac{2}{3}),$$

аммо бирхиллаштирилган конструкциялар тайёрлаш технологияси жиҳатидан афзалроқ бўлиши мумкин, деб хulosaga қилди Равшан.

Шундай қилиб, молиячи Ҳикматилла ва математик Равшан қурилиш соҳасини кенгайтиришга ўзларининг хиссалирини қўшибгина қолмасдан, балки ишлаб чиқаришда кепрак бўладиган харажатларни камайтирадиган бир неча хил математик усуллардан фойдаланиб, уларнинг ҳаётга тадбики ҳозирги вақтда қанчалик зарурлигини англаб этишди.

V. ЧИЗИҚЛИ ДАСТУРЛАШ НИМА?

26. Мебелдан даромад

— Шундай қилиб, келаси ҳафтадан режадан ташқари мебел тайёрлашга киришамиз, — деб эълон қилди мажлисда мебел фирмасининг раҳбари Маъруф ака, — аммо ҳом ашё камроқ, ҳаммаси булиб кенг истеъмол молларига 40 та 1-навли, 19 та 2-навли тахта ажратилган. Мен бош муҳандис Жамшидジョンдан қайси тахтадан қанча керак ва қайси мебел даромадли эканлигини айтиб бериншини илтимос қиласрдим, — деб жойига ўтирги.

— Стол учун 4 та 1-навли ва битта 2-навли, стулга эса битта 1-навли ва битта 2-навли тахта керак. Шуни инобатга олингки, ҳар столдан фирма 80 сўм, стулдан 60 сўм даромад олади.* Ана энди ўзингиз ҳисоблаб кўринг, қайси бири фойдалариқ экан, менга эртага ўз таклифларингизни айтарсиз, — деб цех бошлиғига имо қилди Жамшидジョン.

Шундан сўнг цех бошлиғи Жамшидジョン олдига келиб маслаҳат қилди:

— 10 дан ортиқ стол ясад бўлмайди, чунки 1-навли тахта кам, демак, 800 сўмдан ортиқ даромад олиб бўлмайди. Агарда, — деди сўзида давом этиб цех бошлиғи, — фақат стуллар чиқарилса, 19 тадан ортиқ тайёрлаб бўлмайди, бу ҳолда даромад 1140 сўм бўлар экан. Ҳамма тахтадан самарали фойдаланиб қанча стол, стул чиқарсак натижада энг катта даромад олиш мумкинлигини аниқлаш лозим.

Жамишид олий ўқув юртини аълога тугатган, математикадан кучли ва ўзи чуқур мулоҳазали йигит бўлгани учун бўлса керак,

— Бу муаммони фақат математиканинг чизиқли дастурлаш усуллари ёрдамида ҳал қилиш мумкин, — деб столдаги дафтарга ёза бошлади, — мана масалан, ҳар куни x_1 та стол, x_2 та стул тайёрладик, деб фараз қиласрдик. Бу ҳолда биринчи навли тахтадан $4x_1 + x_2$, иккинчи навлидан эса $x_1 + x_2$

*Хозирги кунда пархлар ўзгарган, албатта, аммо бунинг аҳамияти йўқ.

ишилатиб, $80x_1 + 60x_2$ сүм даромадга эга бўлиш мумкин. Аммо иккита нав тахта чекланганлиги сабабли

$$4x_1 + x_2 \leq 40, \quad (1)$$

$$x_1 + x_2 \leq 19 \quad (2)$$

ва тахта ҳақиқий аниқ бўлганлиги учун

$$x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0 \quad (3)$$


тengsизликларни ҳосил қиласиз.

Агарда шу tengsизликларни қаноатлантирувчи ҳамда даромад (Φ) ни $\Phi = 80x_1 + 60x_2$ максимум, яъни энг катта қийматига келтириш мумкин бўлса, у ҳолда масалани ечган бўламиз, — деб қаламни столга қўйди.

Куриниб турибдики, масаладаги номаълумлар сони иккита бўлгани учун уларнинг геометрик ифодасини қуриш мумкин бўлади. Бунинг учун координата ўқларини « x_1 » ва « x_2 » орқали ифодаласак, 10-расмда кўrsatилган график ҳосил бўлади.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq 19, \\ 4x_1 + x_2 &\leq 40. \end{aligned}$$

Қидирилаётган ечим (1) — (4) tenglamalarни қаноатлантириши учун у шакл ичida ёки унинг чегарасида бўлиши мумкин. Агарда ечим сифатида $A(10, 0)$: 10 стол, O



10-расм.

стул олинса, у ҳолда даромад $\Phi = 10 \cdot 80 = 800$ сүм $E(6,9)$ нүктә олинса, даромад: $\Phi = 6 \cdot 80 + 9 \cdot 60 = 480 + 540 = 1020$ сүм бўлар экан.

$C(0,19)$ нүктада $\Phi_1 = 1140$ сүм ва $B(7,12)$ нүктада даромад $\Phi_2 = 1280$ сүм бўларкан. Расмдан кўриниб турибдики, ечим В нүктадан юқорида булиши мумкин эмас. Шунга кўра еттига стол ва ўн иккита стул тайёрланса, энг катта даромад олиш мумкин экан. Демак, энг мақбул ечим $x = 7$ стол, $y = 12$ стул бўлса, энг даромадли ечимга эта бўлинар экан, — деб тушунтиришни якунлади бош муҳандис.

Қарангки, бу ечим олдингиларига нисбатан анча самарали экан.

27. Алишер аккумулятор тузатади

Жамоа хўжалиги раиси гараж мудирини чақириб,

— Алишержон ҳозирги аҳволни кўриб турибсан, нархнаво қундан-қунга ошиб кетяпти, эҳтиёт қисмлар қиммат, нимадир қилиш керак, — деди.

Алишер худди кўнгилдаги гап бўлганлигини англаб, нимасини айтасиз раис, аккумуляторни йиғишга пластиналар оз қолди. Қопқоғи ундан ҳам кам, ҳайронман энди нима қиласиз.

— Бўлмаса, деди раис, — айтчи, қайси хил аккумулятор йиғинш бизга фойдали: каттасиними ёки кичигиними? Билиб қўй ҳар бир аккумуляторни йиғишда биз кичигидан 100 сүм, каттасидан 150 сүм тежаймиз.

Алишер гаражга бориб эҳтиёт қисмларни санаб кўрди, омборда 17 та қонқоқ, 45 та рухли пластина, мислисидан 21 пластина бор экан. Ўйлаб қараса, кичик аккумуляторга битта, каттасига 5 та рухли, мислидан кичик аккумуляторга 1 та, каттасига эса, 2 та керак экан.

Раиснинг гапини эслаб, агарда 17 та катта аккумуляторни тикласакчи деб ўйлади, аммо рухли пластиналар етмаслигини тушуниб энг кўпи 9 та катта аккумулятор йиғинш мумкинligини аниқлади.

Аммо бу ҳолда $C = 150 \cdot 9 = 1350$ сүм иқтисод қилиши мумкин бўлсада, кичик аккумуляторга зарур нарса қолмас.

лигини сезди. Агарда кичик аккумулятор йиғса, унда 17 тадан ортиқ бўлмайди, тежамкорлик $C = 100 \cdot 17 = 1700$ сўм бўларкан деб, бироз хотиржам бўлди.

Қарасаки, мавжуд қисмлардан уларни тежашнинг ҳар хил варианти бўлиб, қандай қилса тежамкорлик энг катта бўлади? — деб ўйлаб қолди.

Ўтириб олиб бир неча вариантни ҳисоблаб чиқди, аммо қидирилган ечим дарров топила қолмади. Чунки топилган ечим бошқа вариантлардан яхши кўринса-да, бу энг яхши, охирги ечим эканлигига ишончи йўқ эди.

Аммо аккумулятор йиғиш масаласини ҳам чизиқли дастурлаш йўли билан ечиш мумкин бўлиб, унинг математик ифодаси қуийдагичадир:

Фараз қилайлик, x_1 катта, x_2 кичик аккумуляторлар сони. Агарда қопқоқ ва пластиналар сони чекланганлигини иnobatga олсак, у ҳолда қуийдаги тенгсизликларни келтириш мумкин:

- 1) $x_1 + x_2 \leq 17$ қопқоқ,
- 2) $5x_1 + x_2 \leq 45$ руҳли пластина,
- 3) $2x_1 + x_2 \leq 21$ мис пластина,

бундан ташқари, $x_1 > 0$, $x_2 > 0$ эканлиги ва x_1 , x_2 бутун сонлигини унумаслик керак.


Масаладан мақсал юқоридаги (1) ва (2) шартларни баъжарган ҳолда тежамни энг катта қийматга олиб келадиган x_1 ва x_2 миқдорларни топишдир, яъни

$$C = 150 \cdot x_1 + 100 \cdot x_2 - \text{max}.$$

Бу масалани график усулда ечсак (11-расм) AB , BC , CD чизиқлар кесишган AI , BI , C ва D характерли нуқталарга эга бўламиз.

Уларнинг ечимлари:

- $A(9,0)$ бўлгандаги даромад $C_1 = 1\ 350$ сўм;
- $B(8,5)$ бўлгандаги ларомад $C_2 = 1\ 700$ сўм;
- $D(0,17)$ бўлгандаги даромад $C_3 = 1\ 700$ сўм;
- $C(4,13)$ бўлгандаги даромад $C_4 = 1\ 900$ сўм;



$$x_1 + x_2 = 17$$

$$2x_1 + x_2 = 21$$

$$\dots\dots\dots$$

$$5x_1 + x_2 = 45$$

Куриниб турибдики, энг яхши вариант AB , BC , CD чизиқлари кесишган нүқталарда бўлиши ва уларнинг ўрни бўлмиш 1) ва 3), 2) ва 3) тенгсизликларни тенглама деб қабул қилинса ва улар бирга тенгламалар тизими кўринишда ҳисобланса:

1) ва 3) дан $x_1 = 4$ $x_2 = 13$ $C = 1900$ сўм

2) ва 3) дан $x_1 = 8$ $x_2 = 5$ $C = 1700$ сўм тежаш мумкин экан.

Бу билан топилган ечимларнинг энг яхшиси C нүқтагини исбот этган бўламиз.

Бундай ечимни кўрган Алишер аккумляторлардан катта даромад олиш мумкинligини кўриб севиниб кетди, раис эса Алишердан миннатдор бўлди.

28. Лутфулла мәҳмонхона ташкил қилмоқчи

Бозор иқтисоди инсонларни ҳаракатга тушириб қўйди. Кўпчилик ўзининг бор ҳунарини ишга солишга, лозим бўлса ўзгартиришга мажбур бўлди. Нима қиласиз энди, «замон сенга боқмаса, сен замонга боқ» деб, ҳаракат қилмасдан илож қанча.

Шундай хаёл билан Лутфулла анчадан бери ўйлаб юрган фикрини уйдагилари ва яқинлари ҳукмига ҳавола этди; у ҳам бўлса, шаҳардаги бўниаб қолган комсомоллар уйини сотиб олиб, унинг асосида мәҳмонхона ташкил қилиш эди. Иморат шаҳарнинг сўлим жойида, 17 хоналик булиб, уларда бир ўринли ва икки ўринли люкс хоналар ташкил қилиш мумкин эди.

Маслаҳат бонида Фарҳод акаси тургани учунми, ёки Лутфулланинг ўз ниятлари шундай эдими, ҳар ҳолда ҳамма нарса ҳисоб-китобдан, даромадни аниқлашдан бониланди. Чунки комсомол уйи жуда қимматга тушадиганга ўхшарди.

Лутфулла рақамлар келтириб, уларни тушунтира бошлиди. Хоналарни таъмирлаш, жиҳозлаш 50 мингга, бир ўринли хоналар эса 10 мингта тушар экан. Давлат шартига кўра шахсий мәҳмонхоналардаги ўринлар сони 21 дан ортмаслиги керак.

Аммо ака-укалардан мәҳмонхона учун йигилаётган пул 450 минг сўм эди.

— Хўш, — деди Фарҳод, — Лутфулланинг мақсади аниқ, у ҳам бўлса мәҳмонхонадан кўпроқ даромад кела-диган бир ва икки ўринли хоналар сонини аниқлашдир. Бу хоналарнинг ҳар бири келтирадиган даромад ҳам ҳозирча маълум. Масалан 2 ўринли люкс бир кунда 150 сўм, бир ўринлиси эса 100 сўм даромад келтиради. Қандай ечим бизнинг мақсадимизни қаноатлантиради?

Шунда Лутфулла, албатта хоналарнинг кўни дюкс бўлгани маъқул, чунки улардан 1,5 марта кўпроқ даромад олса бўлади, бунинг учун 17 хона бор, аммо бор пул фақат $450 : 50 = 9$ хонага етади, ундаги даромад $\Phi_1 = 150 \cdot 9 = 1350$ сўмдир, деб атрофидагиларга қаради.

Шунда ўтирганлардан Шаҳноза.

— Ака балки бир ўринли хоналардан күпроқ имконият бўлар, масалан унинг учун бир йўла барча 17 хонадан фойдаланилса, пулингиз ҳам ортиб қолади ($450 - 170 = 280$ минг сўм) ва даромад.

$$\Phi_1 = 17 \cdot 100 = 1700 \text{ сўм}$$

бўлади, — деб илжайиб қўйди.

Шунда Фарҳод,

— Кўрлингларми, муаммони ҳисоблаб ечсак, даромад катта бўлиши мумкин, деб ҳисобни бошлади:

— Айтайлик x_1 — икки ўринли ва x_2 — бир ўринли люкс хоналар сони бўлсин, бу ҳолда хоналарнинг йиғинидиси 17 дан ортиқ бўлиши мумкин эмаслиги сабабли

$$x_1 + x_2 \leq 17, \quad (1)$$

демак, ҳаммаси бўлиб 21 ўринли шахсий меҳмонхона бўлиши учун

$$2x_1 + x_2 \leq 21 \quad (2)$$

харажатга йигилган бор пул маълум бўлгани учун

$$50x_1 + 10x_2 \leq 450$$

десак, унда даромад $\Phi = 150x_1 + 100x_2$ бўлади.

Бу масаланинг ечими, — деди Фарҳод, — (1) ва (2) тенгсизликдан тенгламалар олиш йўли билан топилади.

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 17, \\ 2x_1 + x_2 &= 21. \end{aligned}$$

Люкс хоналар сони $x_1 = 4$, бир ўринли хоналар сони $x_2 = 13$ талигини аниқлайдаймиз ва ундан тушадиган даромад $\Phi = 150 \cdot 4 + 100 \cdot 13 = 1900$ сўм эканлигини топамиз.

— Мана Лутфулла, шу тартибдаги хоналарга эга меҳмонхона сенинг мушкулингни осон қилиб, қарзингдан тез озод қиласи ва келгусида энг даромадли меҳмонхоналардан бири бўлиб қолади, — деб укасининг елкасига енгил уриб қўйди Фарҳод.

29. «Машҳура»дан машҳур тикувчилар чиқади

Кумушхон республикаизда энг номдор «Машҳура» фирмасида тикувчилик сирларини ўрганиб чиқиб, болалар кийими тикадиган «Оймомо» ишлаб чиқариш ателье-сида иш бошлаганига кўп бўлгани йўқ.

Ҳар куни эрталаб ишга ошиқади, устози Дилфузга опанинг кўрсатмаларини сидқидилдан бажаришга ҳаракат қиласди. Ўз устида иглашни, тикувчиликка оид журналларни ўқиб ўрганишни яхши кўради.

Бугун дугонаси Замира билан ишдан кейин музқаймоқ емоқчи бўлиб, сув ва музқаймоқ олиб қулай жойга ўтиришдилар. Шу пайт учта аёл ҳам ҳар хил ёшдаги ўғилқизлари билан уларнинг ёнига ўтиришдилар. Болаларнинг қий-чувларига кўниккач, Кумуш бир зум болаларнинг устидаги костюмларига тикилиб қолди, чунки ўзларида тикилаётган болалар кийимини дарров таниб олган эди.

— Ҳа, «Хушрўй», «Мода» костюмларимизга маҳлиё бўлиб қолдингми, ол музқаймоғингни тезроқ егин, эриб кетади, — деб туртиб қўйди Замира.

— Топдинг, эшит, — деб гапира кетди Кумушхон — аниқроги цех йиғилишида Мақсада опанинг «Хушрўй» ва «Мода» болалар костюмлари комиссияда уч ва икки балл олди. Уч баллик баҳода бу ёмон кўрсаткич эмас. Бу костюмларни бир хил рентабелликда ишлаб чиқиш учун икки хил материал ишлатилади, яъни бир дона «Хушрўй» учун 1- ва 2-хил материаллардан икки ва бир бирлик керак.

«Мода» костюми учун эса 1-хилидан бир бирлик ва 2 хилидан эса икки бирлик материал керак. Бир сменада бизга 1-хил материалдан саккиз бирлик ва 2-хил материалдан 6 бирлик сарфлашимиз мумкин. Шундай экан, баллар йифиндиси энг кўп бўлган костюмлар сонини аниқлашимиз керак эди.

Муҳандис ёрдамчиси Равшанжоннинг ҳисоби бўйича, (у икки хил усулда топибди):

— «Хушрўй»дан $3 \cdot (1/3)$ та, «Мода»дан $1 \cdot (1/3)$ та тайёрласак, баллар йифиндиси $12 \cdot (2/3)$ га, агар 4 та «Хушрўй»дан тайёрлаганимизда баллар йифиндиси 12 га тенг бўлар экан. Эсингдами у шундай деган эди.

— Шунда икки нарсага түшүнмадим, нима учун балл билан белгиладик, бу ҳол костюм баҳосини ва бошқа томонларини ҳисобга олмаяптику, иккинчидан эса $3 \cdot (1/3)$, $1 \cdot (1/3)$, $12 \cdot (2/3)$ ва 4 , 4 , 12 сонларини қаердан көлтириб чиқарди?

— Биринчи саволингга жавоб шуки, балл маъноси остида ўша костюм баҳоси, тикиш вақти ва ниҳоят даромад түшүнчеси ётибди, яъни баллнинг юқори булиши сену менга, корхонага фойдадир. Иккинчи саволингга эса жавоб шуки, бир иш билан Равшан аканинг хонасига кирганимда, у киши айнан Мақсада опа айтган нарсаларни ҳисоб қилаётган экан, шунда кўзим беихтиёр (биласанки, мен математикани яхши кўраман)

$$\begin{aligned} y(x) &= 3x_1 + 2x_2 - \max, \\ (x_2 + 2x_1 &\leq 8), \\ (2x_2 + x_1 &\leq 6) \end{aligned} \tag{1}$$

ёзувларига тушиб қолди, — деди Замира.

Бу математик ифодалар нимани англатади, деб сураганимда, у шундай тушунтирган эди:

— Мана қаранг, бизга номаълум нарса бу «Хушрӯй» ва «Мода» костюмларидан қанчадан чиқариш мақсадга мувофиқлигидир. Бунинг учун номаълумларни x_1 — «Хушрӯй» костюми сони, x_2 — «Мода» костюми сони деб белгилаймиз. У ҳолда 1-хил матодан «Хушрӯй» костюмига $2x_1$ метр, «Мода»га $1x_2$ кетаркан, аммо бу материалдан бир кунда 8 м дан кўп бўлмаган миқдорда ишлатиш мумкин, яъни

$$2x_1 + x_2 \leq 8 \text{ м}.$$

Иккинчи хил матодан ҳар бир «Хушрӯйга» $1 \cdot x_1$, «Мода»га $2 \cdot x_2$ ишлатилса, унда бир кунда факат

$$x_1 + 2x_2 \leq 6 \text{ м}$$

ишлатиш мумкин экан. Шу имкониятда энг кўп балл олии режаси қуйидаги мезон орқали ифодаланади: «Хушрӯй»-нинг ҳар биридан 3 балл, «Мода»нинг ҳар биридан 2 балл

олиш мүмкін бұлса, ҳамма (x_1, x_2) костюмлардан олинадиган баллар йигиндисининг мезон сифатида белгиси:

$$\Phi(x) = 3x_1 + 2x_2 - \max(\text{энг күп}).$$

— Демак, математик тенглама ёрдамида ҳисоблаб топилған экан-да, — деб үйланиб қолди Кумуш.

— Ҳа, энг мақбул математик ечим икки тенгламани ечиб топилади, яъни

$$2x_1 + x_2 = 8 \text{ м},$$

$$x_1 + 2x_2 = 6 \text{ м}.$$

Ечсак, $x_1 = 10/3$ м. $x_2 = 4/3$ м., мақсадлы мезони $\Phi(x) = 12,67$. Бу энг юқори баллдир.

Тез, бежирим тикишдан ташқари ҳисоб-китоб билан боелиқ бұлған томонлари ҳам бор экан-да, энди бу томонларини ҳам аста-секин үрганиб оламан, — деб аҳд қилиб қўиди үзича Кумуш. Лекин у бир ишга аҳд қиласа астойдил киришиади, уддасидан чиқади ҳам албатта.

30. Самода унумли парвоз қилиш — ёрдаги тинимсиз изланишлар маҳсулидир

Асроржон ўшлигидан самолётда учишини орзу қиласа. Дадаси ундағы бу қизиқишиңи сезиб, ҳа, самолётни бошқариш учун чуқур билимга эга бўлиш керак, айниқса математика, физика фанларидан, деб қўярди. Ўрта мактабда бир неча йил ўқитувчилик қилган дадаси ҳозир туман марказидаги ишлаб чиқариш кичик корхонасида ишларди. Дадасининг ҳар бир сўзига қатъий амал қиласа-диган Асрорнинг меҳнатлари зое кетмади, кўп ўтмай у Тошкент Давлат Авиация Институти талабаси бўлди. Дунё янгиликларига доимо ташна бўлиб юрувчи дадаси ҳар сафар Асрорни саволга тутар, у бундан баъзан жуда қийналаб ҳам қолар эди. Чунки саволлар оддий бўлиб тувласада, лекин назарий билимсиз жавоб бериш қийин эди. Жавобсиз қолган саволларга дадаси Арслон ака «ҳечқиси йўқ, янаги тал келишингда жавобни айтарсан», деб уни

бу мушкул аҳволдан қутқаради Асрорнинг тиришқоқлигига ишонган ҳолда.

Мана бугун ҳам сешанба куни кечқурун оила аъзолари билан кечки овқатни еб бўлишгач, Арслон ака учувчи талаба ўғли Асроржоннинг «миясини чархлаш» мақсадида яна секин гап бошилади. Буни олдиндан сезиб юрган аяси Мавлуда опанинг «дарсдан чарчаб-ҳориб келгани етмагандай яна саволларингизга нима бор, қўйинг озроқ дам олсин, ахир» дейишига қарамасдан «сенинг нима ишинг бор, хотин, кўп фикр қилишдан, айниқса, фойдали изланишдан ҳеч ким чарчамаган», деб ўғлига «аввал айтганингдек, самолётлар мудофаа, пассажирларни ташиш, юк ташиш мақсадларига қараб бир неча турга булинар экан. Шу юк ташувчи самолётлар ҳам парвоз қиласи тиларми, олдин асосан давлат юклари ташиларди, ҳозирги бозор иқтисодида аҳвол қалай экан?» деб кулимсираб мурожаат қилди.

— Ҳа албатта, парвоз қиласи тиларни, энди аксарият тижоратчилар, ишбилармонларнинг юклари ташиласи, — деб жавоб берди, сўнг:

— Келинг сизнинг саволингизга қўйидаги мисол орқали жавоб берай: Масалан юк кўтариш қобилияти $M = 83$ шартли бирликка тенг бўлган самолётга 4 хил юк ташиш режаси қўйилган, жумладан:

биринчи хил юк, $P_1 = 10$ бу ҳолда, даромад $C_1 = 20$,

иккинчи хил юк, $P_2 = 16$ бу ҳолда, даромад $C_2 = 50$,

учинчи хил юк, $P_3 = 22$ бу ҳолда, даромад $C_3 = 85$,

тўртинчи хил юк, $P_4 = 24$ бу ҳолда, даромад $C_4 = 96$,

Сиз айтгандек масала шарти қўйидагича бўлади; Самолётни шундай юклаш лозимки, ундаги даромаднинг ҳажми энг кўп, яъни максимал бўлсин.

Дада, сиз математика ўқитувчиси бўлганингиз учун қисқароқ тушунтиришга ҳаракат қиласман, бошқалар учун эса албатта бу кўп вақтни олади. Топшириққа мос келувчи математик модел — шундай миқдордаги x_1, x_2, x_3, x_4 юклар самолётга юклансинки, мос ҳолда 1, 2, 3, 4 хил юк учун умумий даромад $\Phi(x) = x_1 C_1 + x_2 C_2 + x_3 C_3 + x_4 C_4 = \max \Phi(x)$ бўлсин. Албатта, бунинг учун самолёт имкониятидан келиб чиқадиган $x_1 P_1 + x_2 P_2 + x_3 P_3 + x_4 P_4 \leq 83$ шарти бажарилиши лозим.

Ана энди жавобини топамиз: бунинг учун $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$ динамика дастурлаш усулини құллаш мүмкін, албатта сизга бошқа йүллари ҳам маълум:

$$\Phi = 1 \cdot 20 + 0 \cdot 50 + 0 \cdot 85 + 3 \cdot 96 = 308 \text{ бирлик.}$$

Демек, бу $x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 3$ га тенглигини билдиради. Сизнинг саволингизга жавоб шуки, самолётдаги юқда даромад максимал бўлиши учун, биринчи хил юқдан 120 бирлик, тўртингичи хил юқдан эса 28 бирлик ортишимиз керак экан.

— Ҳа раҳмат ўғлим, бу сафар аниқ ва тез жавоб бердинг, шундай давом эттиравер деди хурсанд бўлиб дадаси. У ҳар кимни ҳам мақтайвермас эди, шунинг учун бу Асрор учун катта мукофотга тенг эди, иккинчидан эса саволга жавобни кейинги сафарга қолдирмаганидан шод бўлди. Осмондаги самолётнинг овози уни сергак қилди, дадаси эса унга кулимсираб қараб тураг эди.

Эрталаб кечроқ турган Асрор, нонушта қилаётганда дадасининг иш столи устида ёзилган варақларни кўриб ичида «осон қутулолмасам керак, яна бир нарсаларни ўйлаб қўйганга ўхшайдилар дадам, кечагидай лўнда-лўнда жавоб бераманда қўяман» деб қўйди. Шу пайт дадасини бир киши машинада чиқираётганини укаси Аброр югуриб келиб айтди. Шоша-пинча ташқарига чиқаётган Арслон aka Аброрга «мана шу стол устидаги қофоз сенга, майли, мен кетишим керак, келгуси ҳафтада жавобини берарсан», деб уйдан чиқиб кетди. «Ана холос, айтганим бўлди», — деб хаёлидан ўтказди у. Қофозни олиб қуйидаги масалани ўқиди: « A_1, A_2, A_3 шаҳарларидан битта парвозда B_1, B_2, B_3, B_4 , истеъмолчиларга мос ҳолда 40, 60 ва 100 тонна миқдорида юкни самолётда етказиш керак. B_1, B_2, B_3, B_4 , истеъмолчиларга мос ҳолда жами 200, 400, 800 ва 600 т юк етказиш керак.

Масала шарти: Учта шаҳар билан истеъмолчилар (улар ҳам турли жойларда жойлашган) шундай алоқа боғлашлари керакки, уларнинг юкларини ташиш ишига энг кам ёқилғи сарф бўлсин.

Масала ва унинг шарти Асрор ўйлагандек осон эмас эди. Йўлда кетар экан, у гоҳ масаланинг математик модели қан-

дай бўлиши, гоҳ эса дастурий маълумотларига нималарни киритиш кераклиги ҳақида ўйлаб борар эди.

Азиз китобхонлар, сизга ҳам билимингизни синаб кўришга имконият берилди, ҳа айтгандек сизга ёрдам тартиқасида жавобларни ҳам келтирамиз:

$x_{11} = x_{12} = x_{13} = 0$, $x_{12} = x_{24} = x_{32} = 0$, $x_{14} = 400$, $x_{23} = 200$, $x_{31} = 200$, $x_{33} = 500$, $x_{34} = 200$. Шу вариантда самолётнинг юқ билан учадиган масофаси энг кам миқдорда бўлар экан, яъни $y(x^*) = 11200$ т.км.

Йўлда транспорт масаласини ўйлаб кетаётган Асрорга ҳам омад тилаймиз.

31. Сут-қатиқни тезликда эгасига етказсанг, ютуқ сеники

Маълумки, сут-қатиқ бу энг тоза ва энг фойдали нарса. Агарда уни ўз вақтида эскимасидан, бузилмасидан аввал истеъмол қиласанг савобига ким етсин. Хонадонларда, фермаларда, жамоа хўжаликларида, қўйингки Республикализда ҳар куни минглаб літр сут олинади, уни тезликда ўз эгасига — истеъмолчига етказиш катта ва долзарб масаладир. Сутни ўз вақтида, тезликда ва кам харажат етказиш масаласини кўриб чиқайлик.

Масалан тўртта A_1 , A_2 , A_3 , A_4 сут фермаларида 40, 20, 30, 10 тоннадан сут мавжуд бўлиб, уларни талаб қилинган хўжаликларга 30, 40, 30 тоннадан етказиб бериш кепрак. Ундаги шарт: сут маҳсулотини фермалардан хўжаликларга етказиб бериша вақт ёки қилинадиган транспорт харажатлари энг кам бўлсин. Сут ташиш харажатлари 9-жадвалда келтирилган, (сўмларда).

9-жадвал

Жўнатиш пунктлари	Қабул қилиш жойларидағи харажат, сўм/кг			Умумий сут ҳажми, т
	B_1	B_2	B_3	
A_1	3	4	5	40
A_2	7	2	3	20
A_3	6	1	4	30
A_4	5	2	3	10
Сутга бўлган талаб	30	40	30	100

Сутни ташиш учун кетган харажатни, C_{ij} билан, ташилиши керак бўлган сут миқдорини эса x_{ij} билан белгилаймиз. Транспорт масаласини тақсимлаш усули [1,2,8,10] билан ечганда жадвалнинг юқорига чап бурчагига тариф (C_{ij})лар, пастки ўнг бурчагига эса ташилаётган юк миқдорлари (x_{ij}) ёзилади.

Масаланинг математик модели жадвал маълумотлари асосида қўйидагича тузилади:

$$\begin{aligned}x_{11} + x_{12} + x_{13} &= 40, \text{ биринчи фермадаги сут тақсими}, \\x_{21} + x_{22} + x_{23} &= 20, \text{ иккинчи фермадаги сут тақсими}, \\x_{31} + x_{32} + x_{33} &= 30, \text{ учинчи фермадаги сут тақсими}, \\x_{41} + x_{42} + x_{43} &= 20, \text{ тўртинчи фермадаги сут тақсими}, \\x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} &= 30, \text{ қабул қилиш тақсими}, \\x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} &= 40, \\x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} &= 30.\end{aligned}$$

Бу тенгламалар тизимининг ечимини топиш натижасида чизиқли мақсад функцияси

$$\begin{aligned}z = 3x_{11} + 4x_{12} + 5x_{13} + 7x_{21} + 2x_{22} + 3x_{23} + 6x_{31} + x_{32} + \\+ 4x_{33} + 5x_{41} + 2x_{42} + 3 \\x_{43} (\min) \text{ қийматга эга бўлсин.}\end{aligned}$$

Масалани ечишда жадвални «шимолий-шарқ» бурчак усули бўйича юқоридан қути бурчакка қараб юкларни тақсимлаб чиқамиз ва масаланинг бошланғич режасини тузамиз, натижада қўйидаги жадвалга эга бўламиз (10-жадвал).

10-жадвал

Жўнатиш жойлари	Қабул қилиш пунктларидағи харажат ва талаб			Умумий сут ҳажми, т
	B_1	B_2	B_3	
A_1	3 30	4 10	5	40
A_2	7	2 20	3	20
A_3	6	1 10	4 20	30
A_4	5	2	3 10	10
Сутга бўлган талаб	30	40	30	100

Бу жадвалда тақсимланган юкнинг мақбуллик миқдори масаланинг мақсад функцияси орқали түлдирилган катаклар бўйича ҳисоблаб топилади. Шунга асосан жадвал кўрсаткичлари бўйича мақсад функциясининг қиймати

$$z_{\min} = 30 \cdot 3 + 10 \cdot 4 + 20 \cdot 2 + 10 \cdot 1 + 20 \cdot 4 + 10 \cdot 3 = \\ = 90 + 40 + 40 + 10 + 80 + 30 = 290 \text{ сўмни ташкил этади.}$$

Бу режа масаланинг ҳақиқий мақбул ечими эканлигини тақсимлаш усули ёрдамида текшириб кўрамиз. Бунинг учун жадвалнинг пастки (энг охирги) ва ўнг томонига қўшимча график чизиб, уларни ҳал қилувчи қўшилувчилар деб юритамиз (11-жадвал).

11-жадвал

Жўнатиш пунктлари	Қабул қилиш пунктлари			Умумий сут ҳажми	Ҳал қилувчи қўшилувчилар
	B_1	B_2	B_3		
A_1	3 30	4 10	5	40	0
A_2	7	2 20	3	20	+2
A_3	6	1 10	4 20	30	+3
A_4	5	2	3 10	10	+4
Сутга бўлган талаб	30	40	30	100	
Ҳал қилувчи қўшилувчи	-3	-4	-7		

11-жадвалда келтирилган ҳал қилувчи қўшилувчилар ёрдамида түлдирилган катакчалардаги тарифларни нолларга айлантирамиз, бу қуйидагича бажарилади: A_1B_1 түлдирилган катакдаги масофа 3 км бўлганлигидан уни нолга айлантириш учун (пастки қаторга) 3 ни ҳал қилувчи деб олиб, унинг ўнг томонига нолни қўшсак, уларнинг йиғиндиси нолга teng бўлади. A_1B_2 ни нолга тенглаш-

тириш учун унга пастдан (-4) ҳал құлувчини құшамиз ва ҳоказо. Шулар ёрдамида ҳамма түлдирилған катақчалардаги (тарифлар) масофалар нолга айланғунча режани яхшилаб давом эттирилади. Бундай алмаштиришлар услуги 12-жадвалда көлтирилған.

12-жадвал

Жұнатыш жойлари	Қабул қилиш жойлари			Сут қажми
	B_1	B_2	B_3	
A_1	0 30	2	0 10	40
A_2	4	0 20	-2	20
A_3	4	0 20	0 10	30
A_4	4	2	0 10	10
Сутга бұлған талаб	30	40	30	100

Хосил бұлған түғри түртбұрчакнинг мусбат бурчакларидаги юклардан энг кичик миқдордагисини олиб, бу ерда у 10 га теңг, уни үзгартырmasдан манфий катақчалардаги юк миқдорига құямыз, мусбат катақчалардаги юк миқдорларидан олиб таштаймыз, натижада юкларнинг янгича тақсимланиши қуйидаги қүринишида бұлади. (13-жадвал).

Бундай алмаштиришларни масаланинг маъқул ечимиға зәға бұлгунича давом эттирамиз. Келгуси жадвалларни түлдиришда юқорида күриб үтилған қоидаларға амал қилинади. Бу күрсаткичлар бүйіча функция қыймати.

$$z(x)_{\min} = 30 \cdot 3 + 5 \cdot 10 + 2 \cdot 20 + 1 \cdot 20 + 10 \cdot 4 + 3 \cdot 10 = \\ = 90 + 50 + 40 + 20 + 40 + 30 = 270 \text{ минг сүм.}$$

Жүннатиш жойлари	Қабул қилиш жойлари			Сут ҳажми	Ҳал құлувчи қүшилувчи-лар
	B_1	B_2	B_3		
A_1	0 30	2	0 10	40	-2
A_2	4	0 10	-2 10	20	0
A_3	4	0 30	0	30	0
A_4	4	2	0 10	10	-2
Сутта бұлған талаб	30	40	30	100	
Ҳал құлувчи қүшилувчи	+2	0	+2		

Бироқ юқорида тұлдирилған катақчаларда манғий күрсаткичли масофалар бор.

Кейинги жадваллар юқоридаги қоидаларга асосланиб тұлдирилади (14-жадвал).

14-жадвал

Жүннатиш жойлари	Қабул қилиш жойлари			Сут ҳажми
	B_1	B_2	B_3	
A_1	0 30	0	0 10	40
A_2	6	0 10	0 10	20
A_3	6	0 30	2	30
A_4	4	0	0 10	10
Сутта бұлған талаб	30	40	30	100

Қидирилаётган ечим натижаси 14-жадвалда күрсатылған бўлиб мақсад функцияси қиймати.

$$z_{\min} = 3 \cdot 30 + 5 \cdot 10 + 2 \cdot 10 + 3 \cdot 10 + 1 \cdot 30 + 3 \cdot 10 = \\ = 90 + 50 + 20 + 30 + 30 = 250 \text{ минг сүм.}$$

14-жадвалдаги ҳамма түлдирилмаган катақчалардаги ма-софалар мусбат ишорали бўлади. Шунинг учун масала ечимини ниҳоясига етган деб ҳисоблаймиз. Кўриниб ту-рибдик, мақсад функцияси қиймати $\Phi(x)_{\min} = 250$ минг сўмга тенг бўлади. Шу йўл билан фермаларда сут ташувчи корхоналар ташкил этсак, бошланғич режага нисбатан $\Phi(x)_{\min} = 290 - 250 = 40$ минг сўм иқтисод қилишига му-ваффақ бўламиз ва тақсимланган сутлар $x_{11} = 30$ т; $x_{13} = 10$; $x_{22} = 10$ т; $x_{32} = 30$ т; $x_{43} = 10$ т миқдорида жўнатилар экан.

Масаланинг ечими компьютерда жуда тез ва аниқ то-пилади, фақат мақбуллантирувчи ЭҲМ дастури бўлса бас.

32. Фермер пималарни қанча ерга эккани маъқул

Қизиги шундаки, ҳар йили экинларни экиш олдидан катта, мураккаб ва иқтисодий долзарб масалани ечишга тўғри келади.

Ҳар йили бир хил экин экиш ва ундан юқори самара олиб, бойиб кетиш қийин. Албатта бозор талабини, ер техника ва озуқа, ҳамда фермер имкониятларини инобаттга олибгина катта даромад олиш мумкин. Бир қарашда содда, аммо математик ҳисобларга боғлиқ бу иқтисодий масала ҳамма хўжаликда, фермерда, борингки уй, ер эга-сида бир йилда камида бир марта учрайди. Ҳар томонлама тўғри ечилса нур устига аъло нур, аксинча, гардкамига ечил-са ва нима бўлса шуни экса, дехқон қиши билан нон-чой ичиб келгуси йилни пойланига тўғри келади.

Чучварани хом санамаслик учун ердан унумли фойдаланиш керак, бу ўтмишдан қолган нақл. Агарда шу муаммони аниқ усуслар ёрдамида ечилса даромад катта бўлиши муқаррар. Бу муаммо моҳиятини кўрсатиш учун мисол кўрайлик.

Берилган майдонларга экин турларини ҳар бир участкада экин ҳосилдорлиги маълум бўлган ҳолда шундай тақ-симлаш керакки, натижада у ялпи максимум маҳсулотни берсин ёки максимум соф даромад келтирисин. Мисол учун

дон экинлари ёки ҳамма озуқабоп экинлар учун максимум маҳсулотни аниқлаш талаб этилсін.

Масалада функционалнинг максимумини аниқлаш ҳам худди минимумни аниқлаш сингари бажарилади. Фарқи шундаки, режанинг биринчи варианти тузилғандан кейин жадвал катагидаги мавжуд режани мусбат баҳога күчириши йүли билан амалдаги ер участкалари бүйича ҳосилдорлиги берилган. Экинларни шундай жойлаштириши талаб этиладыки, натижада максимум озуқага әга бұлайлик. Озуқабоп экинлар ҳосилдорлиги, экин турлари ва участка ҳажми құйидаги 15-жадвалда берилған.

15-жадвал

Озуқабоп экинлар	Ер майдонидаги ҳосилдорлик, центнер				Жами экин майдони (га)
	1	2	3	4	
А. Маккажұхори	10	40	70	100	1400
Б. Хонаки пұхат	8	12	16	30	1300
В. Күзғи жавдар (озуқа учун)	9	14	24	35	900
Г. Қанд лавлаги (озуқа учун)	10	24	36	50	150
Д. Пориз экинлари	3	5	15	25	250
Ер майдони сатып	700	800	1500	1000	4000

Бу ерда қўйилған масаланинг математик модели келтирилди. Бу қўринишдаги масалаларнинг математик моделлари олдинги бобларда атрофлича кўрсатилиб үтилғанлиги учун бу ерда изоҳ берилмади. Масала жадвал ёрдамида ечилади. 16-жадвалда бош «шимолий-шарқ» усулини қўллаб, ер майдонлари бүйича озуқабоп экинлар экиласиган ер майдонига тақсимланишининг бошланғич режасини тузамиз. 15- жадвалдаги маълумотлардан фойдаланиб, жами экин майдонларини озуқабоп экин майдонлари бүйича юқоридаги усулда тақсимлаймиз ва 16-жадвалга әга бўламиз.

Озуқабоп әкінлар	1	2	3	4	Жами әкін майдони	Хал қилувчи қүшилув- чилар
<i>A</i>	10 700	40 700	70	100	1400	0
<i>B</i>	8	12 100	16 120 0	30	1300	+28
<i>V</i>	9	14	24 300	35 600	900	+20
<i>G</i>	10	24	36	50 150	150	+5
Участкалар саты	700	800	150 0	100	4000	
Хал қилувчи қүшилувчилар	-10	-40	-44	-55		

Биз 16-жадвалдан мақсад функцияси, яғни умумий ҳосил ҳажми (z) нинг максимум қийматини топамиз. Бу ерда

$$\begin{aligned} z = & 700 \cdot 10 + 700 \cdot 40 + 100 \cdot 12 + 1200 \cdot 16 + 300 \cdot 24 + 600 \cdot 35 + \\ & + 150 \cdot 50 + 250 \cdot 25 = 7000 + 2800 + 1200 + 19200 + \\ & + 7200 + 21000 + 7500 + 6250 = 97350 \text{ и.} \end{aligned}$$

Агар жами әкін майдонларини участкалар бүйича шундай тақсимласак $z = 97350$ центнер ҳосил олишга эришар эканмиз.

Мақсад шу олинган ҳосилнинг ҳақиқатдан ҳам максимум, яғни әнг күп ҳосил эканлигини күрсатишидир. Бунинг учун 16-жадвалдан ҳал қилувчи қүшилувчилар танланади. Бунда улар шундай танланиши керакки, натижада тұлдирилған катақчаларда тарифлар нолга айлансын. Буни берилған мисолимиз ёрдамида күриб чиқамиз.

$$z(x) = L_1x_1 + L_2x_2 + L_3x_3 + L_4x_4 \dots \quad (1)$$

A қатор I устунда турған 700 ни нолга айлантириш учун пастки томонға ҳал қилувчи қүшилувчи (-10) ва үнг то-

менига эса 0 ни қүшиш керак, акс ҳолда нол бўлмайди. (17-жадвалда эса 700 турибди).

Қолган қаторлардаги сонлар ҳам шу йўл билан топилади. 16-жадвалининг Б қатори 1 устунидаги 8 сони ўрнига бўш катақча турган сонга ҳал қилувчи қўшилувчилар қўшилиб, $(-10 + 8 + 28 - 26)$ ҳосил қилинади ва ҳоказо. Натижала режанинг янги вариантини ҳосил қиллик (17-жадвал).

Биз бундай тақсимлашда мақбул режага эришмадик, чунки бўш катақчаларда мусбат қийматли сонлар сақланниб қолди. Ҳамма бўш катақчалардаги сонлар манфий бўлгандагина мақбул ечимга эришилади.

Масаланинг мақбул ечимини топиш учун бўш катақчадаги энг катта ҳосилдорликдан бошлаб (қолган катақчалар тўлдирилган ёки баландлик нол бўлиши керак) тўғри бурчак ясаймиз. Биз тўғри бурчакни қайси катақчадан бошланган бўлсак, шу катақчага манфий ишорани, қолганларига эса мусбат, манфий ва ҳоказо ишораларни қўямиз. Манфий катақчалардаги миқдордан айриб ташлаймиз. Натижала тақсимлашнинг янги вариантига эга бўламиз. Бундай варианти масаланинг мақбул ечимига, яъни максимум ҳосилдорликка эга бўлгунга қадар давом эттирамиз.

17-жадвал

Озуқабоп экинлар	1	2	3	4	Жами ҳаридони
A	0 700	0– 700	26	45+ 600	1400
B	26	0+ 100	0– 1200	3	1300
V	19	-6	0 300+	0 600	900
Г	5	-1	-3	0 150	150
Д	23	-5	1	0 250	250
Ер майдони улчами(га)	700	800	1500	1000	4000

17-жадвалда энг катта ҳосилдорлик биринчи қаторнинг тўртинчи устунидаги 45 дир. Биз тўғри бурчакни шу ердан

бонлаймиз. Навбатдаги ҳисоблаш ишларини бажариб 18-жадвалга әга бұламиз.

18-жадвал

Озүқабоп екинлар	1	2	3	4	Жами екин майдони	Хал қилувчи қүшилув- чилар
A	0 700	0 100	26	45 600	1400	0
B	26	0 700	0 600	3	1300	
V	19	-6	0 900	0	900	0
F	5	-1	-3	0 150	150	+45
D	23	-5	1	0 250	250	+45
Ер майдони улчами (га)	700	800	150 0	100 0	4000	
Хал қилувчи қүшилувчилар	0	0	0	-45		

Биз жадвалға ҳал қилувчи қүшилувчиларни құшиб, ма-
саланың мақбул ечимини топишиға киришамиз, яғни
юқорида көлтирилған амалларни яна тақрорлаймиз ва
навбатдаги 19-жадвалға әга бұламиз.

19-жадвал

Озүқабоп екинлар	1	2	3	4	Жами екин майдонлари
A	0 700	0 700	26	0 600	1400
B	26	0 700	0 600	-42	1300
V	19	-6	0 900	-45	900
F	50	34	42	0 150	150
D	68	40	46	0 250	250
Участкалар сатқы	700	800	1500	1000	4000

Бу жадвалда мусбат ҳосил сақланиб қолди, әнді түғри тұртбурчак тузишга түғри келади. 19-жадвалдаги ҳисоблар ишлари ҳам юқоридайдык амалларни бажаришни талаб этгандылықтың учун түғридан-түғри охирги әнді мақбул вариантын 20-жадвални тавсия қилиш ағзал күрілди.

20-жадвал

Озүқабоп әкінлар	1 гектар майдондан олинадиган ҳосил				Жами әкін майдонлари
	1	2	3	4	
A	-48	-22	0 400	0 1000	1400
B	0 500	0 800	-4	-20	1300
C	-3	-2	0 900	-19	900
D	-14	-4	0 150	-16	150
Д	0 200	-2	0 50	-16	250
Участка- ларга қарап талаб қилинадиган микдор	700	800	1500	1000	4000

Бу жадвалдан күриниб турибиди, түлдирилган катақ-чаларнинг ҳеч бирида мусбат ишоралы ҳосилдорлик қолмади, шунинг учун масаланинг ечимини давом эттириш мүмкін эмес. Демак, биз масаланинг мақбул ечимига, яъни максимум ҳосилдорликка эга бўлдик.

Бу ерда:

$$z = 400 \cdot 70 + 1000 \cdot 100 + 8 \cdot 500 + 800 \cdot 12 + 900 \cdot 24 + \\ + 150 \cdot 36 + 200 \cdot 3 + 50 \cdot 15;$$

ёки

$$z = 28000 + 100000 + 4000 + 96000 + 21600 + 5400 + 600 + \\ + 750 = 169950 \text{ ى.}$$

Майдонларга озуқабоп экинларни фақат мақбул режа асосида тақсимлаганимизда, энг юқори ҳосилдорликка эришиш мүмкін.

Мақбул режаны унинг биринчи варианти билан солыштырасқ, жами маҳсулотнинг 72700 ц га ошганини күрамиз.

33. Мол боқанға барака

Энг савобли, энг қийин ва энг керакли иш — бу мол боқиши десак, катта хато қымаган бўлмиз. Шунинг учун бўлса керак, республика мустақил бўлиб бозор иқтисодига утиши билан ҳар бир меҳнаткаш қишлоқ ходими бошқа қишлоқ хўжалик ишлари каби мол боқишига ва гўшт-сутни кўпайтиришга бел боғлашди. Мол боқишининг ўзи бўлмайди, ундан фойда олишини кўпайтириш учун катта меҳнат ва билим керак, шундагина қисқа вақтда катта натижа олиш мүмкін.

Масала. Қорамол фермасида ҳар бир бош мол учун ҳафтагалик тузиладиган озуқа рациони А моддали озуқадан 6 бирлик, В моддали озуқадан 8 бирлик, С моддали озуқадан 12 бирлик қилиб тузиш талаб этилган бўлсин.

Бу озуқа рационнини тузиш учун фермадаги мавжуд бўлган бир неча хил озуқабоп моддалардан фойдаланилади. Мавжуд озуқабоп моддаларнинг ҳар биридан неча бирликдан олиниши 21-жадвалда кўрсатилган:

21-жадвал

Озуқа түрлари	Озуқабоп моддалар			Мавжуд бўлган озуқа бирликлари
	I	II	III	
A	2	1	3	6
B	1	2	1.5	8
C	3	4	2	12

Агар I озуқабоп модданинг 1 кг нинг баҳоси 2 сўм, II озуқабоп модданинг 1 кг нинг баҳоси 3 сўм, ва III озуқабоп модданинг 1 кг нинг баҳоси 2 сўм 50 тийиндан бўлса, моллар учун энг арzon рацион тузилсин.

Берилган шартлар бүйича озуқа турларини x_1, x_2, x_3 лар билан белгилаб, масалага доир тенгсизликлар тизимини заечим функциясини тузамиз:

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 \geq 6 \text{ биринчи озуқа харажати.}$$

$$x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 \geq 8 \text{ иккинчи озуқа харажати,} \quad (1)$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 \geq 12 \text{ учинчи озуқа харажати,}$$

$$\Phi(x)_{\min} = 2x_1 + 3x_2 + 2.5x_3 \text{ жами озуқа нархи,} \quad (2)$$

$$x_1 > 0, x_2 > 0, x_3 > 0; \text{ номаълумлар чегараси.} \quad (3)$$

Лагранж усулига биноан тенгсизликлар тизимига қўшимча номаълумлар киритиб, қўйидаги тенгламалар тизимига эга бўламиз:

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 6,$$

$$x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 - x_5 = 8, \quad (4)$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_6 = 12.$$

Бу тенгламалар тизимига киритилган x_4, x_5, x_6 номаълумларнинг олдидағи коэффицентлар манғий бўлиб, улар фақат тенгсизликларни тенгликка келтириш учун қўйилди. Шунинг учун булар асосий номаълумлар ўрнини боса олмайди.

Шунга кўра юқоридаги тенгламалар тизимига сунъий ўзгарувчилар, яъни y_1, y_2 ва y_3 ларни киритамиз. У ҳолда (4) тенгламалар тизимининг қўриниши қўйидагича бўлади:

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 + y_1 = 6,$$

$$x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 - x_5 + y_2 = 8, \quad (5)$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_6 + y_3 = 12.$$

Ана шу тенгламалар тизимига сунъий ўзгарувчилар киритилгани учун ечим функциясига ҳам (+M) сонини қўшамиз.

Масаланинг шарти бўйича минимум қийматни топиш талаб этилганлиги учун, M ни мусбат ишора билан, акс ҳолда эса манғий ишора билан қўшилади. Масала шартига кўра мақсад функциясининг қўриниши қўйидагича бўлади:

$$\Phi(x)_{\min} = 2x_1 + 3x_2 + 2.5x_3 + M(y_1 + y_2 + y_3) \quad (6)$$

Энди y_1, y_2, y_3 , сунъий ўзгарувчиларни топиш керак.

Бунинг учун (5) тенгламалар тизимини $y_1, y_2, y_3, x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$ ларга нисбатан ечиб, натижада ушбу тенгликларга эга бўламиз:

$$\begin{aligned}y_1 &= 6 - (2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4), \\y_2 &= 8 - C(x_1 + 2x_2 + 1,5x_3 - x_5), \\y_3 &= 12 - (3x_1 + 4x_2 + 2x_3 - x_6), \\y_1 + y_2 + y_3 &= 26 - (6x_1 + 7x_2 + 6,5x_3 - x_4 - x_5 - x_6).\end{aligned}\quad (7)$$

Бу сунъий ўзгарувчиларнинг топилган йиғиндисини (6)га қўйсак, Z_{\min} қўйидагича бўлади:

$$\begin{aligned}z_{\min} &= 2x_1 + 3x_2 + 2,5x_3 + (M(y_1 + y_2 + y_3)) = \\&= 2x_1 + 3x_2 + 2,5x_3 + M[26 - 6(6x_1 + 7x_2 + 6,5x_3 - x_4 - x_5 - x_6)] = \\&= 26M - [6M - 2)x_1 + (7M - 3)x_2 + (6,5M - 2,5)x_3 - Mx_4 - \\&- Mx_5 - Mx_6].\end{aligned}$$

Топилган маълумотлар асосида 22-жадвални тузамиз.

22-жадвал

Асосий номаълумлар	Озод ҳадлар	Асосий бўлмаган номаълумлар					
		$-x_1$	$-x_2$	$-x_3$	$-x_4$	$-x_5$	$-x_6$
y_1	6	2	1	3	-1	0	0
y_2	8	1	2	1,5	0	-1	0
y_3	12	3	4	2	0	0	-1
x^*	$26M$	$6M^{-2}$	$7M^{-3}$	$6,5M$	$-M$	$-M$	$-M$

Масаланинг шарти бўйича минимум қийматни топиш талаб этилганлиги учун 22-жадвалдаги бош устунни топишда Z қаторидаги асосий бўлмаган номаълумлар коэффициентлари орасидан энг каттасини танлаймиз ва у турган устунни бош устун деб оламиз. Мисолда энг катта мусбат сон x нинг коэффициенти $(7M - 3)$ дир.

Бош қаторни топишда эса озод ҳадларни бош устундаги ўзларига мос келган сонларга бўлиб, шулар орасида энг кичигини танлаймиз. Агар масалани ечиш жараённида бир

нече марта бош устун ва қаторни топиш талаб этилса, юқоридаги жараённи шунча марта такрорлаймиз. Ҳар сарфар янги жадвални тұлдиришда биз илгариги усуллардан фойдаланамиз ва бу жадвалларни Жорданнинг модификацияланган ечим усулини құллаб мақбул ечими топилгунча шундай давом эттирамиз. Шу асосда 23-жадвал вужудга келади.

23-жадвал

Асосий номаъумлар	Озод ҳадлар	Асосий бўлмаган номаъумлар					
		$-x_1$	$-y_3$	$-x_3$	$-x_4$	$-x_5$	$-x_6$
y_1	3	$\frac{5}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{5}{2}$	-1	0	$\frac{1}{4}$
y_2	2	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	0	-1	$\frac{1}{2}$
y_2	3	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	0	0	$-\frac{1}{4}$
$x =$	$5m+9$	$\frac{3m+1}{4}$	$-\frac{7}{4}$	$-\frac{7}{4}$	$3m-1$	$-\frac{m-9}{20}$	$\frac{3m+3}{4}$

23-жадвалдан 24-жадвалга ўтишда у қатнашган устунни ташлаб кетиш ҳам мумкин. (y_1, y_2, y_3) ларни сунъий үзгарувчилар деб олган эдик. Булар масала ечимиға таъсир этмайди.

24-жадвал

Асосий номаъумлар	Озод ҳадлар	Асосий бўлмаган номаъумлар				
		$-x_1$	$-y_1$	$-x_4$	x_5	x_6
x_3	$\frac{6}{5}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}1$	$-\frac{2}{5}$	0	$\frac{1}{10}$
y_2	$\frac{7}{5}$	$-\frac{3}{4}$	5	$\frac{1}{5}$	-1	$\frac{9}{20}$
x_2	$\frac{12}{5}$	$\frac{1}{4}2$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{3}{10}$
$x =$	$\frac{7m+51}{5}$	$\frac{3m+3}{4}$	$-\frac{6m+2}{5}$	$\frac{8m+2}{5}$	$-\frac{m-9}{20}$	$-\frac{13}{20}$

24-жадвалда симплекс алмаштиришни құллаб, 25-жадвалга келамиз. Бу жадвални бошқа давом эттириш мумкин эмас, чунки манфий ишоралидир.

Асосий номаълумлар	Озод ҳадлар	Асосий бўлмаган номаълумлар			
		$-x_1$	$-x_4$	x_5	x_6
x_3	$8/9$	$2/3$	$-$	$-$	$2/10$
x_4	$28/9$	$5/3$	$4/9$	$-20/9$	$20/9$
x_5	$10/9$	$-$	$-$	$-$	$2/3$
$\Phi(x)$	$-$	$-1/3$	$-1/9$	$-13/9$	$-M - 13/9$

25-жадвалда изланган мақбул варианти топилди, бу жадвал кўрсаткичлари асосида қўйидагиларга эга бўламиз.

$$x_1 = 0; x_2 = 10/3 = 3,3 \text{ кг}; x_3 = 8/9 = 0,9 \text{ кг}.$$

Номаълумларнинг топилган бу қийматлари шуни кўрсатдики, II моддали озуқадан, 3,3 кг, III моддали озуқадан эса 0,9 кг олиб рацион тузиш лозим. Бу ерда I моддали озуқа талабга жавоб бермаганлиги учун рациондан чиқарилади.

Топилган маълумотлар мақсад ёки ечим функциясининг минимум қийматга эришганлигини кўрсатади. Бу маълумотларнинг тўғрилигини аниқлаш учун номаълумларнинг қийматларини z мақсад функциясига қўйиб кўрамиз.

$$z(x) = 2x_1 + 3x_2 + 2,5x_3 = 2 \cdot 0 + 3 \cdot 10/3 + 2,5 \cdot 8/9 = \\ = 0 + 10 + 20/9 = 90 + 20)/9 = 110/9 = 12 \text{ сўм } 20 \text{ тийин.}$$

Ҳар бир мол учун 12 сўм 20 тийинлик озуқа рационидан фойдаланиш лозим. Демак, масаланинг мақбул ечими $\Phi(X)_{\min} = 12$ сўм 20 тийин.

Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида бу келтирилган кўрсаткичлар йилдан-йилга ўзгариб бормоқда, аммо кўрсаткичлар қандай бўлишидан қатъи назар, у ёки бу кўринишда қўйилган масалаларни ёчиш услуги бўзгармасдан қолаверади.

34. Автотранспортнинг камхаражат режаси

Маълумки транспорт хўжаликнинг қон томиридир, ундан мақсадли ва самарали фойдалансак юк ҳам тезликда

етиб боради, бензин ҳам кам ишлатилади, машинанинг аҳволи ҳам бекорга ёмонлашмайди.

Ҳозирги кунимизда аксарият ҳамма юк машиналари иттифоқдан қолган машиналар, ўзимизда бундай машиналарни катта миқёсда чиқаришга имконият йўқ. Бундан маълум даражада чарчаб қолган, аммо бизга ниҳоятда зарур транспортни авайлаб, ардоқлаб мақсадли фойдаланишимиз керак, деган хулоса чиқади.

Масалан, Андижон шаҳрининг Асака туманида транспорт ҳаракати охирги 3 йилда жуда авжига чиқди. Юкларни тез ва кам харажат қилиб ташиш шаҳар транспорт корхоналари ва юк эгаллари учун катта аҳамият касб этган эди.

Автомобилларни шундай тақсимлаш керакки, натижада юк жўнатувчиларнинг автомашиналарга бўлган талаби қондирилсин. Масаланинг шарти қўйидаги 26-жадвалда берилган.

26-жадвал

Автохужаликлар	Автохўжаликлар билан юк юборувчилар орасидаги масофалар (км)					Мавжуд автомашиналар
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	
A_1	2	4	1	3	5	200
A_2	7	3	9	4	1	600
A_3	10	15	14	8	4	500
A_4	9	13	12	11	7	300
Автомашиналарга бўлган талаб	300	500	400	200	180	1600 1580

Бу ерда автомашиналар сони талаб қилинаётган автомашиналарга нисбатан кўп, шунинг учун биз машиналарга бўлган талабни умумий машиналар сони билан tengлаштирамиз.

Бу масаланинг дастлабки ечими (юкнинг тақсимланиши) 27-жадвалда қўрсатилган.

Автохужа-диклар	Автохужаликтар билан юк юборувчилар орасидаги масофа (км ҳисобида)						Мавжуд автомашиналар
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	P_1	
A_1	2	4	1 200	3	5	0	200
A_2	7	3 420	9	4	1 180	0	600
A_3	10	15 80	14 200	8 200	4	20	500
A_4	9 300	13	12	11	7	0	300
Автомобилга бўлган талаб	300	500	400	200	180	20	1600

Масалага қўйилган шарт: Талаб этилаётган ва мавжуд автомашиналар ёрдамида юкларни шундай ташиш ташкил этилсинки, унга кетган харажатлар: ёнилғи, машина меҳнати энг кам микдорда бўлсин. Бу талабни ифодалайдиган ёки қониқтирадиган мезон қўйидаги боғланишга эгадир:

$$z(x) = P_i L_i,$$

бу ерда P_i — юк бирлиги, L_i — масофа.

Бу масалада умумий харажат ҳажми

$$\begin{aligned} z_{\min} &= 200 \cdot 1 + 420 \cdot 3 + 180 \cdot 1 + 15 \cdot 80 + 200 \cdot 14 + \\ &+ 200 \cdot 8 + 300 \cdot 9 = 9940 \end{aligned}$$

Биз потенциал усул ёрдамида бу қиймат унинг мақбул ечими эканлигини текширамиз.

$(A_2, B_1), (A_4, B_3), (A_4, B_5)$ катакчаларга потенциаллар шарти $V - U \leq C$ бажарилмади. Шунинг учун шу катакчалардаги узун масофа орқали юк тақсимлашни давом эттирамиз; бир неча ҳисоблаш (итерация)дан кейин мақбул ечимга эга бўлган натижа 28-жадвалда келтирилган.

Автохўжалик-лар	Автохўжаликлар юқ юборувчилар орасидаги масофа (км ҳисобида)						Мавжуд автомашина-лар
	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	P_1	
A_1	2	4	$\frac{1}{200}$	3	5	0	200
A_2	7	$\frac{3}{500}$	9	4	$\frac{1}{100}$	0	600
A_3	$\frac{10}{200}$	15	14	$\frac{8}{200}$	$\frac{4}{80}$	0	500
A_4	$\frac{9}{100}$	13	$\frac{12}{200}$		7	0	300
Автомобилга булган талаб	300	500	400	200	180	20	1600

Охирги жадвалга асосан машиналарини шундай тақсимласак, у потенциал усулнинг қонуниятларини қаноатлантиради ва биз мақбул ечимга эга бўламиз:

$$\begin{aligned}\Phi(x)_{\min} &= 200 \cdot 1 + 500 \cdot 3 + 100 \cdot 1 - \\ &- 200 \cdot 10 + 200 \cdot 8 + 80 \cdot 4 + 100 \cdot 9 + 200 \cdot 12 = \\ &= 200 + 1500 + 100 + 2000 + 1600 + 320 + \\ &+ 900 + 2400 = 9020 \text{ т/км.}\end{aligned}$$

Демак, берилган масаланинг шартларига биноан энг кам йўл 9020 т/км ни ташкил этар экан.

35. Танлаб олсанг толмассан, уятга ҳам қолмассан

Харид қилаётган киши буюмнинг сифати, баҳоси ва ташқи қўриниши, агар буюм ишлаб чиқариш дастгоҳи бўлса, зарурият бўлганда эҳтиёт қисмларининг топилиши, таъмирлаш томонларини ҳам ҳисобга олиши керак. Акс ҳолда катта маблағга келтирилган дастгоҳ ўз баҳосини чиқара олмасдан корхонага зарар келтириши мумкин.

Шунинг учун ҳам корхонага асбоб-ускуна олишга одатда Хуршидни юборишга ҳаракат қилишарди. У камгап, вазмин, сермулоҳаза ва билимдон муҳандис. Аммо янги директор ҳали деярли ҳеч кимни яхши билмасди, ҳамма билан танишди-ю фақат, Хуршидни Россияга дастгоҳ олиб келишга кетганлиги учун кўргани йўқ.

Директор икки кун ўтмасдан сафардан дастгоҳлар олиб келганди Хуршид билан танишди. «Бир суҳбатданоқ хуласа чиқариш қийин, қани аввал иш юзасидан сўрайлик-чи» — деди директор ўзича.

— Хўш Хуршиджон, чарчамасдан бориб келдингизми, рўйхатда дастгоҳлар тури йигирмага яқин экан, қандай танлаб олдингиз, уларни? — деди директор муовинига қараб қўйиб.

Хуршид бир оз қизарган ҳолда, секин гап бошлади:

— Янги ишлаб чиқариш дастгоҳининг баҳоси 20 минг сўмдан ошмаслиги керак эди, ундан ташқари у эгаллайдиган майдон 38 m^2 атрофида бўлиши керак.

Корхонамизнинг қўйган асосий талаби эса дастгоҳ, максимал ишлаб чиқарувчанликка эга бўлиши керак эди.

Кейин директор хонасидаги ёзув тахтасига бўр билан ёзиб тушуниришни давом эттириди:

— Биринчи A хил дастгоҳ 5000 сўм бўлиб $8 m^2$ жойини эгаллар, ишлаб чиқарувчанлиги бир суткада 7 минг маҳсулот бирлигига teng экан, иккинчи B хили эса мос ҳолда 2000 сўм $4 m^2$ сатҳни эгаллар ва 30 минг маҳсулот бирлигиги ҳар суткада берар экан.

Биз A ва B хил дастгоҳда шундай x_1 ва x_2 маҳсулот миқдорини топдикки,

$$F = 7x_1 + 3x_2 - \max F(x)$$

бўлиши керак эди, бунинг учун

$$5x_1 + 2x_2 \leq 20; 8x_1 + 4x_2 \leq 38$$

шарт ўринли бўлиши лозим, бу ерда $x_1, x_2 > 0$ бутун сонлардир.

Ҳисоблаб чиққанимда

а) усулда $x(1,7,5)$ $F = 29,5$ минг маҳсулот бир суткада чиқарар экан, аммо дастгоҳ 1,7, яъни яхлитмас сон бўлиши мумкин эмаслиги сабабли б усули танланади.

б) усулда эса $x(2,5)$ га teng бўлиб ишлаб чиқарувчанлик, яъни бир суткада ишлаб чиқсан маҳсулотлар сони 29 минг донани ташкил қиласа экан.

Янги директор бу муаммони ҳал этишда ҳам дастгоҳ баҳоси, ҳам у эгаллайдиган майдони ва энг асосийси иш-

лаб чиқарувчанлыгини аниқлаб корхонага мос келувчи да-
стохдарни адашмай таңлаган Хуршиджондан жуда хурсанд
бұлды.

36. Күчингиз етса фабрика, бұлмаса цех очинг

— Бир маслағат билан келдим сизнинг олдингизга,
Жұрабой ака, агар майли десанғиз фикримни айтсам?

— Марҳамат, Самариддин, сиз билан беш йилга яқин
бірге ишладык, тұғри әнді мен нафақага чиқдым, ёшлар
еса ишимизни давом эттиришіяпты. Кафел плиталар чиқара-
диган корхона очиб олибсан деб әшитдим, ишлар қандай
бұлайпти?

— Мен ҳам айнан шу хусусда, маслағат сұрамоқчи
әдім, Жұрабой ака, заводда топшириқтарни бажариб юра-
вериб, ишни ташкил этиб, күпроқ даромад олиш ҳақида
мулоҳаза құлмаган эканым. Ҳозирги шароитда эса маса-
ланинг шу томонини ҳисобға олиш жуда керак бұлайпти.
Ҳақиқатдан ҳам плиталар чиқарадиган завод ёки корхо-
налар мавжуд бўлиб, қандай қилсак биз ишлаб чиқариш
самарадорлигини оширишимиз мумкин? Қандай қилиб күп
миқдорда шундай товар етказиш йўлларини тушунтириб
берсангиз.

— Яхши, Самариддинжон, ростини айтсам, ишларин-
гиздан оз-моз хабарим бор. Агар адашмасам, корхона бир
хил миқдорда хом ашё зарур бўлган икки хил кафел пли-
талар чиқаради. Шундан бир хилига ранг билан ишлов
берасизлар. Хуллас хом ашё сарғи билан боғлиқ ҳолда ҳар
иккала хил плиталар чиқариш нормаси ва ундан келади-
ган даромад белгиланган. Шундайми?

— Худди шундай Жұравой ака, аммо мени, лўнда
қилиб айтганда, максимал даромад олишимиз учун ҳар
бир плита туридан неча тонна ишлаб чиқишимиз керак-
лиги қизиқтиради.

Манга қолса биринчи кафелдан 4, иккинчисидан 2
тонна чиқарсам деб турибман, деди Самариддин.

— Тушунишимиз осон булиши учун мен буни қуйидагича
қилиб қофозга туширдим, — деди Жұравой ака, — ме-
нининг тузган жадвалим қуйидагича:

Ресурснинг номи	Техник кўрсаткичлар		Жами мавжуд бирликлар
	1-плита (x_1)	2-плита (x_2)	
Машина вақти	2	1	10
Иш вақти	3	3	24
1 тоннадан даромад	2	0	8
	3	2	

Шу жадвал асосида математик тенгламалар тузиб ишласанг, масала анча ойдинлашади. Самараддинжон, Жадвалдаги ҳолга кўра $y(a) = 3x_1 + 2x_2$ – тах бўлиши керак эди. Бунинг учун эса

$$2x_1 + x_2 \leq 10,$$

$$3x_1 + 3x_2 \leq 24$$

шарт бажарилиши керак.

Сенинг вариантингда даромад қўйидагича бўларди, яъни:

$$y(x) = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 12 + 4 = 16$$

— менинг таклифим бўйича қофоз, ручка ва калькуляторда жавобини топчи?

— Жўравой ака, жавоби $x_1 = 2$, $x_2 = 6$, $y = 18$ чиқди.

Демак, биринчи ва йиккинчи хил плиталардан энг кўп 18,0 минг сўм даромад олишинг мумкин экан.

Бу деган сўз, сизнинг вариантингизга кўра 12% кўп даромад олса бўлар экан, деди Самариддин.

Жўрабой ака билан Самариддин олдин фабрика, сўнг кафел чиқазадиган цех очишни мўлжаллашди, чунки кафелга Республикада талаб катта, хом-ашё етарли. Самариддин эса «Курилиш материаллари» кафедрасида ишлаган.

37. Нон тандирда, даромад ошириш йўли мияда пишади

Ўткир ва Ўқтам талабалар шаҳарчасидаги нонвойхонадан ҳар куни нон олишади. Ўқтамга тандир иони ёқади.

Ўткирга эса булка нон. Шунинг учун ҳар сафар кимнинг навбати бўлса, ўшанинг еткизган нони кўпроқ харид қилинарди.

Охирги дам олиш куни улар чой ичиб бўлишгач, нимагадир нон турлари ва улардан келадиган даромадни ҳисобламоқчи бўлиб қолишиди. Нонвойхонадан ишлаб чиқариш керак бўлган маҳсулот турлари, уларни тайёрлаш учун кетган вақтни билгач қўйидагича баҳс бошланди. Ўткир:


— Цехда иккита, дейлик M ва N дастгоҳлар сен ёқтирадиган тандир (A) ва менга хуш келадиган булка (B) нонларни ёпади, шартли равишда уларни A ҳамда B деб белгилаймиз. Маҳсулотларни тайёрлаш вақти ва уларни сотишдан келадиган даромад ҳам ҳар хил.

Нонвойхона техникигининг айтишича, A маҳсулот M дастгоҳдан бир соатда N дастгоҳидан 2 марта кўп чиқади. Шунда даромад 5 минг сўмга тенгдир. Энди N дастгоҳда эса шу вақт ичida M дастгоҳдагидан B маҳсулот 2 марта кўп ишлаб чиқарилиб, даромад 4 минг сўмни ташкил этади. Дастгоҳларнинг ишлаш вақти M ва N учун мос ҳолда 10 ва 8 соатдир. Хуш бу ёғига қандай давом эттирамиз ўртоқ «иқтисодчи», — деб ҳазиллашиди Ўткирга.

Тўғри, Ўткир иқтисод факультети талабаси, лекин у бор-йўғи биринчи курсда, шундай бўлсада математикадан дарс берадиган профессор Лахаевнинг иқтисодий масалаларни ечишда тенгламалар ёки графиклардан фойдаланиш лозим, деган сўзини эслади. Ҳа, нон ейиш осон иш эмаслигини биларди-ю, лекин нон пиширишда ҳам етарлича ҳисоб-китоб қилинмаса, фойласидан зарари ошиб кетар экан, деб қўйди ичida.

Дафтарларини титкилаб, бир жойига келганда юзи ёришиб кетди, ахир шу масалага ўхшаш жойини у топган эди. Хурсанд бўлиб, бирнасда қофозда масала шарти ва талабини қўйидагича ёзди. «Икки хил маҳсулот чиқаришда самарали миқдор ва маҳсулотларни сотишдан келадиган максимал даромадни аниқлаш керак». Ўзича жадвал ва қўйидаги графикни чизди:

Демак



$$y = 5x_1 + 4x_2 \rightarrow y_{\max}(x_1, x_2)$$

бўлиши учун

a) $2x_1 + x_2 = 10$
b) $x_1 + 2x_2 = 8$

тenglama шарти бажарилиши керак

Энди масалани ишлашга киришди, ўткир ҳам бир оз

ёнида турди-ю, зерикдими ёки математикадан узоқлиги учун-ми, ҳар ҳолда бошқа иш билан машғул бўлди. ўткирнинг дафтаридаги узундан-узун ҳисоблар охирида эса ечим қўйидагича топилган эди.

$x_1 = 0$ да а) $x_2 = 10$, $x_1 = 0$ да в) $x_2 = 4$,
 $x_2 = 0$ да а) $x_1 = 5$, $x_2 = 0$ да в) $x_1 = 8$,

Масала шартини қаноатлантирувчи жавоб $C(4,2)$, $y_{\max} = 28$ минг сўм. Нонвойхонада ҳам дастгоҳ имконияти ва маҳсулот тури ҳисобга олиниши керак экан. Биз ҳёттий мисолда юқоридаги кўрсаткичли нонвойхона кўп даромад (28 минг сўм) олиш учун, айнан тандир нондан булка нонга нисбатан 2 баравар кўп ёпилиши керак экан.

Ҳар сафар икки ўртоқ нонвойхона олдидан ўтишаётгандага иссиқда, олов олдидаги турган нонвойлар уларга қўли нон пишириш билан овора-ю, аммо фикрида даромадни ошириш ҳисоб-китобини пишираётгандек туюлади.

38. Абдусаттор қурилишни бошқариш билан машғул

«Инқурилиш» акционерлик жамоасида ишлаб чиқариш мажлиси тугалланмоқда.

— Шундай қилиб, ЭҲМ дан олинган маълумотларга кўра, келгуси йилги ишлаб чиқаришнинг оптималь фойдаси тузатишларсиз қабул қилинмоқда. Қаршиликлар йўқми? — деб, сўради директор Абдусаттор.

— Бундан ҳам яхшироқ режа қидириб күрсак бұлмайдими? — деган овоз чиқди.

— Машинаку ўз йўлига, нима бўлганда ҳам келишиб олиш керак.

— Яхши таклиф! Уни қондиришга ҳаракат қиласиз. Фараз қилайлик, математика ютуқларига асосан қурилишда винерит ва колмогорит деб аталадиган иккита янги қурилиш материаллари пайдо бўлди. Иккала материалнинг сифати бир хил, аммо биттаси комбинатга 5,0 минг сўм фойда, иккинчиси эса 6,0 минг сўм фойда келтиради.

Винерит x_1 миқдорда, колмогорит эса x_2 миқдорда ишлаб чиқарилсин, дейлик. У ҳолда корхонага материалнинг иккала тури ҳам фойда келтирувчи умумий фойда P қуидагича ифодаланади:

$$P = 5x_1 + 6x_2$$

деб ҳисоб-китоб қила бошлади директор.

Режани шундай тузиш керакки, умумий максимал бўлсин. Бу ердан...

— Нима бўпти? — сабрсиз овоз гапни бўлди. — Масала янада тушунарсиз бўлди: агар x_1 ёки x_2 ни чексизга оширасак, у ҳолда чексиз фойда оламиз.

— Тўғри, масалада нимадир етишмаяпти. Буни билиб олиш қийин эмас. Ҳатто агар материалга талаб чексиз бўлса ҳам уларни кўп миқдорда ишлаб чиқариш мумкин бўлмайди, бунга ресурслар етмайди.

Ҳар қандай ишлаб чиқариш бир неча ўилаб турдаги ресурсларни талаб қиласи. Материаллар ишлаб чиқариш учун қандай ресурслар керак? Улар қуйидаги жадвалда келтирилган.

30-жадвал

Ресурслар номи	1 м ³ га сарфланадиган харажат		Режалаштириш давридаги ресурслар миқдори
Цемент т ...	0,3	0,2	1 минг
Пулат, т ...	0,1	0,2	0,6 минг т.
Гравий, м ³	0,3	0,3	1,5 минг м ³
Ишчи кучи, одам	0,1	0,1	кунига 0,6 одам

Энди эса ресурсларни таҳлил қиласиз. Бир кубометр винерит учун 0,3 т цемент сарф бўлади. x_1 кубометр учун x_2 марта кўн сарф бўлади, яъни 0,3 x_2 тонна. Ўз навбатида колмогорит 0,2 x_1 т цемент талаб этади Иккала материалга сарф бўладиган умумий цемент миқдори 1 минг тоннадан ошмаслиги керак, яъни

$$0,3x_1 + 0,2x_2 \leq 1$$

Худди шундай чекланишлар пўлат, гравий ва ишчилар кучи учун ҳам талаб қилинади:

$$\begin{aligned} 0,1x_1 + 0,2x_2 &\leq 0,6; \\ 0,3x_1 + 0,3x_2 &\leq 1,5; \\ 0,1x_1 + 0,1x_2 &\leq 0,6. \end{aligned}$$

Бу ерга яна иккита тенгсизликни қўшиш керак:

$$x_1 \geq 0; x_2 \geq 0,$$

Нима бўлганда ҳам бизнинг мақсадимиз материалларни йўқ қилиш эмас, балки уларни ишлаб чиқаришdir.

Шундай қилиб, ресурсларни чеклашдан максимум фойда P олиб келадиган x_1 ва x_2 ларни топиш талаб қилинмоқда. Мақсад функция ва чекланишлар тўғри чизиқли эканлигини эслатиб ўтамиш, яъни доимий коэффициентлар билан факат бир даражали x_1 ва x_2 номаълумларни ўз ичига олди. Бу математик масала дастурлашнинг чизиқли масаласи деб аталади.

Масаланинг ечими $x_1 = 2$ ва $x_2 = 2$ бўлади, яъни оптиmal режа 2000 m^3 винерит ва 2000 m^3 колмогорит ишлаб чиқиндан иборат. Бу режа $P = 5 \cdot 2 + 6 \cdot 2 = 22$ минг сўм фойда келтиради.

39. Транспорт ташувларини оптиmal режалаштириш

Транспорт ташувларини режалаштириш хусусий ва қурилиши масалаларини ўз ичига олади. Аммо қурилиш транспорт билан шунчалик узвий боғланганки, улар орасида мутаносиблик бўлиб, қурилишда транспорт ҳаракатларининг улуши юқори (40% гача). Бу ҳақда тўлиқроқ тўхта-

лишга тұғри келади. Павел Ивановичнинг иш кунини тас-
вирлаш жараёнида биз транспорт масаласини ечиш дастури
қанчалик унга ёрдам бериши мүмкін эканлигини гапириб
үтдік. Агар үқувчини масаланинг маңында қизиқтирадиган
бұлса, у ҳолда биз винерит ва колмогорит материалларидан
конкрет бетонга үтишимизга тұғри келади. Бетонни учта
бетон заводлари ишлаб чиқаради ва тұртта қурилиш обьект-
ларда ишлатылади.

Берилган барча масалаларни қуйидаги жадвал күри-
нишида көлтирамиз:

31-жадвал

Етказиб берувчилар	Истеъмолчилар				Күввати
№	1	2	3	4	
1	2	3	4	1	100
2	3	3	6	2	150
3	3	2	4	5	180
Талаблар	30	120	200	30	Жами: 430

31-жадвалнинг марказий қисмida, юқори үнг бурчаги-
да тарифлар көлтирилған (яғни ҳар бир заводдан ҳар бир
истеъмолчига етказиб бериладиган бир куб метр бетоннинг
тәнниш бағоси). Масалан, иккінчи заводдан учинчи обьект-
га тәнниш тарифи (маршрут 2—3) 6 сүмни, бириңидан
түртінчига (маршрут 1—4) эса — 1 сүмни ташкил этади.
Бир күнлик қувват йиғиндиси 430 м^3 бетонга бұлған талаб
йиғиндисига теңг.

40. Зиёдиллага зиёбахш зал лозим бўлиб қолди

Ватанимиз мустақиллікка әришгандан сүнг, халқ хұжа-
лигининг түрли соҳаларыда, хусусан қурилиш соҳасыда ҳам
сезиларлы үзгаришлар юзага кела бошлади. Йирик уй-жой
қуриш комбинатлари ўрнига кичик-кичик хусусий фер-
малар пайдо бўлмоқда.

Лойиҳалаштириш институтларида тайёрланадиган ти-
пик лойиҳалар ўрнига индивидуал лойиҳалар асосида қури-
лаётган бинолар пайдо бўла бошлади.


Ҳикоямиз қаҳрамони бўлмиш Зиёдуллахон ўтган йили ҳовлида янги қурилишни бошлаб қўйган эди.

Иморатнинг лойиҳаси расмий буюртма асосида бажарилмаганилиги сабабли катта залнинг устини ёпиш муаммоси пайдо бўлди.

Том ёпилмаси сифатида тайёрланган фермадан фойдаланиш кўзда тутилган. Аммо «ферма элементлари, хусусан, ферма устунларининг баландлиги қанча миқдорда бўлиши лозим?» деган савол пайдо бўлди. Зиёдиллахон бу савол билан ўзининг яқин ўртоғи бўлмиш Тошкент Давлат Авиация институти доценти Усмонов Алишер Саъдуллаевичга мурожаат қилди.

— Бундай масалаларни ечиш учун авваламбор, мақсад функциясини тузмоқ керак — деди Алишер, — буни қуйидагича тушунтириш мумкин, — дея масалани тушунтира кетди, — агарда раскослар, тўсинли ферманинг панеллар узунлиги ва юкланиш схемаси берилган бўлса, — деб ҳисоб бошлиди Алишер, — минимал оғирликка эга ферманинг h_1, h_2, \dots, h_n устунларининг баландлигини топиш масаласи учун мақсад функциясини тузиш талаб қилинади, — деди.

— Ечимни аниқлаш қуйидагича бўлади, — деб ҳисобни давом эттириди Алишер, — ферманинг i -та панелини кўриб чиқамиз i — панелдаги кучланишларнинг статик аниқмаслигини топиш формуласи қуйидагича:



13-расм.

$$N_{ii} = -\frac{M_{i-1}}{h_{i-1} \cos \alpha_i}; \quad N_{2i} = Q_i - N_{ii} \sin \alpha_i; \quad (1)$$

$$N_{3i} = -\frac{N_{2i}}{\sin \beta_i}; \quad N_{4i} = \frac{M_i}{h_i}. \quad (2)$$

Бу ерда, M_i — i нүктадаги оддий түсіннинг эгувчи моменти, оралиғи ферманинг оралиғига тең; Q_i — i панелдеги кесувчи күч.

$$\cos \alpha_i = \frac{l_i - l_{i-1}}{\sqrt{(l_i - l_{i-1})^2 + (h_i - h_{i-1})^2}}; \quad \sin \alpha_i = \frac{h_i - h_{i-1}}{\sqrt{(l_i - l_{i-1})^2 + (h_i - h_{i-1})^2}};$$

$$\sin \beta_i = \frac{h_i}{\sqrt{(l_i - l_{i-1})^2 + h_i^2}}. \quad (3)$$

Бизга маълум бўлган кучлар ва стержен узунлиги бўйича уларнинг конструктив чекловлар, устуворлик ва мустаҳкамликни ҳисобга олган ҳолда талаб қилинган юзаларини топиш мумкин. Шундай қилиб, ҳар бир панелнинг оғирлиги g_i устунлар баландлигининг h_{i-1} , h_i функциясидир. Ферманинг тўлиқ оғирлиги эса қўйидагига тең:

$$z = \sum_{i=1}^3 g_i(h_{i-1}, h_i). \quad (4)$$

Иқтисод математикасини динамик дастурлаш усулидан фойдаланиб бундай масаланинг оптималь ечими топилади. Шундай қилиб, АЛГОЛ дастуридан фойдаланиб, учта панелдан иборат ярим ферманинг минимал оғирлиги 174 кг ни ташкил этиб, узунлиги $l_2 = 7$ м. бўлишини топиш мумкин.

VI. ЯНА БИР НЕЧА ХИЛ МУАММОЛАР

41. Дехқончилик туман бойлик

Бозор иқтисодига ўтиш даврида энг катта ислоҳот қилингенда бўлди, десак муболага бўлмас. Аввал ҳамма нарса колхозда, совхозда бўлиб, меҳнат қилсангиз бир аммалаб кун кўрар эдингиз.

Хөзирчи, хоҳланг ер сотиб олинг, хоҳланг қишлоқ фирмаси ёки фермасини ташкил этинг, хоҳланг ташкил этилаётган жамоа хұжалигига альо бўлинг. Аммо қаерда бўлсангиз ҳам бозор иқтисоди ҳисоб-китобини билганингиз маъкул.

Янги ривож топаётган жамоа хұжалиги бўлса, бу ерда техникадан самарали фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлур эди.

Айтайлик, жамоа хұжалигига қуйидаги тракторлар мавжуд: ДТ-54 дан 36 дона, «Белорусь» 30 дона, ДТ-20 эса 12 дона.

Бундан ташқари, хұжаликда 12000 гектар майдонда иш бажарини талаб этилсин. Бунда унинг 8000 гектарини иккى марта культивация қилиш ва 4000 гектар жойдаги пичани ўриш керак бўлсин. Дарҳақиқат, бир турдаги трактор бирор ишни кам харажат қилиб бажарса, иккинчи турдаги трактор эса кўпроқ харажат қилган ҳолда бажаради. Бундан кўринадики, тракторларни иш турларига қараб тақсимлаш ҳамма ишларга кетган умумий харажатни минимумга келтиришга имкон беради. Бунинг учун тракторларни иш турларига қараб шундай тақсимлаш керакки, ҳар бир трактор билан маълум ишни бажариш учун кетган харажатлар энг кам (минимум) бўлсин. Буни исботлаш учун кичикроқ бир мисол билан танишиб чиқамиз. Тўгри, ДТ-54 билан 6000 га ерда, «Белорусь» билан эса қолган 6000 га ердаги ишни бажарини мумкин бўлсин. Бир гектар ернинг ишини бажаришда (шартли ҳайдаладиган гектар) унинг таннархи қуйидагича (сўм ва тийинлар ҳисобида) бўлсин;

1) культивация ДТ-54 да 4 сўм 50 тийин, «Белорусь» да 4 сўм 10 тийин, ДТ-20 да 5 сўм 40 тийин;

2) пичан ўриш ДТ-54 да 3 сўм 50 тийин, «Белорусь» да 3 сўм 00 тийин, ДТ-20 да 4 сўм 30 тийин;

3) ер ҳайдани ДТ-54 да 2 сўм 70 тийин, «Белорусь» да 2 сўм 80 тийин;

4) қатор ораларига ишлов бериш «Белорусь» да 4 сўм, ДТ-20 да 4 сўм 40 тийин;

5) бороналаш ДТ-54 да 3 сўм 10 тийин, ДТ-20 да 5 сўм 00 тийин.

Албатта, хұжаликда мавжуд тракторларни иш турларига қараб тақсимлашда ишнинг бажарилиш вақти ва бо-

шқа күнгина омилларни ҳисобга олиш шарт. Ҳар доим ба жарилаётган ишларга кетган харажатнинг энг кам бўлинига ва ресурслардан унумли фойдаланишга эринин лозим. Юқорида айтганимиздек, бундай масала чизиқди дастурлашнинг тақсимлаш усули ёрдамида ҳал этилади.

Шундай қилиб, хўжаликда 36 дона ДТ-54, 30 дона «Белорусь» ва 12 дона ДТ-20 мавжуд. Мавжуд тракторлар ёрдамида қуйидаги ҳажмдаги ишлар бажарилади:

1. Культивация (икки марта) — 4400 га.
2. Ер ҳайдаш — 12000 га.
3. Қатор ораларига ишлов бериш — 1000 га.
4. Пичан ўриш — 4600 га.
5. Бороналаш — 3200 га.

Бир гектар юмшоқ ерни ҳайдаш учун тракторларнинг маркасига қараб, уларнинг мавсум нормасини белгилаймиз. Айтайлик, ҳамма иш мавжуд тракторлар ёрдамида бажарилган.

Мавсумий норма (ёзги давр):

ДТ-54 тракторлари учун $400 \text{ га} \cdot 36 = 14400 \text{ га}$,

«Белорусь» тракторлари учун $300 \text{ га} \cdot 30 = 9000 \text{ га}$,

ДТ-20 тракторлари учун $150 \text{ га} \cdot 12 = 1800 \text{ га}$,

Жами — 25200 га.

Ҳозир тракторларнинг мақбул сонини ҳисоблашда барча зарурий маълумотларга этамиз. Тақсимлаш ҳисоби маҳсус жадваллар ёрдамида бажарилади.

Масала шартини жадвалга ёзамиз (32-жадвал).

32-жадвал

Иш турлари	Бир гектар юмшоқ ер - ҳайдашнинг танинхии			Ишнинг умумий ҳажми (юмшоқ ер ҳайдаш)
	ДТ-54	«Беларусь»	ДТ-20	
Культивация	4,50	4,10	5,40	4400
Ер ҳайдаш	7,70	2,80	—	12000
Қатор ораларига ишлов бериш	—	4,00	4,20	1000
Пичан ўриш	3,50	3,00	4,30	4600
Бороналаш	3,40	3,10	5,00	3200
Мавсумда жами (юмшоқ ер ҳайдаш)	14400	9000	1800	25200

Биз жадвалдаги ҳар бир катақчани иккى бұлакка бұламиз, катақчанинг юқори қисміга ишнинг таннархини, пастки қисміга ишнинг ҳажмини ёзамиз.

Бунда ишнинг умумий ҳажми, ишнинг тури ва тракторлар маркасини ҳисобға олиб, масаланинг математик формасини ифода қилиш учун қуйидаги белгиларни киритамиз: x_1 — ДТ-54, x_2 — «Белорусь» ва x_3 — ДТ-20 тракторлари ёрдамида бажарыладиган ишлар ҳажми. Бажарыладиган ишлар қатор ва устунлар бүйича қуйидаги күришишга әга бұлади:

$$\begin{aligned}x_{11} + x_{12} + x_{13} &= 4400, \\x_{21} + x_{22} + x_{23} &= 12000, \\x_{31} + x_{32} + x_{33} &= 1000, \\x_{41} + x_{42} + x_{43} &= 4600, \\x_{51} + x_{52} + x_{53} &= 3200, \\x_{12} + x_{21} + x_{32} + x_{42} + x_{52} &= 9000, \\x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} + x_{51} &= 14400, \\x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} + x_{53} &= 1800.\end{aligned}$$

Бу тенгламалар тизимининг шундай манфий бўлмаган ечимини топиш керакки, натижада

$$\begin{aligned}z = 4,5x_{11} + 4,1x_{12} + 5,4x_{13} + 2,7x_{21} + 2,8x_{22} + x_{23} + x_{31} + 4x_{32} + \\+ 3,5x_{41} + 3x_{42} + 4,3x_{43} + 3,4x_{51} + 3,1x_{52} + 5x_{53}\end{aligned}$$

чизиқли функция ўзининг энг кичик қийматига эришин.

Демак, масалада « x » лар ва z »нинг қийматини топиш керак. Бу масалани чизиқли дастурлашнинг тақсимлаш усули ёрдамида ечганимизда, у юқорида қўйилган талабга жавоб берishi керак.

Бунинг учун биз жадвалда кўрсатилган тракторларнинг маркаларига қараб ишни тақсимлашнинг бошланғич реjasини тузишда «шимолий-шарқ» усулига амал қилган ҳолда 33-жадвални тузамиз.

Иш турлари	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20	Ишнинг ҳажми	Ҳал қилувчи қўшилувчилар
I	4,50 4400	4,10	5,40	4400	0
II	2,700 10000	2,80 2000	x x	12000	+1,8
III	x x	4,00 1000	4,40	1000	+0,6
IV	3,50	3,00 4600	4,30	4600	+1,6
V	3,40	3,10 1400	5,00 1800	3200	+1,5
Жами	14400	9000	1800	25200	
Ҳал қилувчи қўшилув- чилар	4,5	-4,6	-6,5		

Натижада бош диагонал бўйлаб трактор маркасига қараб ҳамма бажариладиган иш ҳажмини тақсимлаб чиқдик ва режанинг биринчи вариантини туздик. Бундан қуидаги заруратлар келиб чиқади:

1. Мавжуд режанинг оптимал эканлигини аниқлаш (исботлаш).

2. Агар режа оптимал бўлмаса, уни яхшилаш лозим. Мақбул режа эса ҳал қилувчи қўшилувчилар ёрдамида текширилади. Бу қўшилувчиларни биз шундай танлаб оламизки, харажатлар нолга тенг бўлиши керак. Бизнинг мисолда устун ва қаторлар бўйича 4—50, 2—70, 2—80, 4—00, 3—00, 3—100, 5—00 ларни қараб чиқиш керак. Демак, шу катачаларда кўрсатилган харажатлар нолга айланиши керак. Шундан кейин янги жадвал тузилади, ҳамма катакларда «нолинчи» бурчак бўйича тракторларнинг турига қараб иш ҳажми тақсимланади.

Кейинчалик эса ҳамма катачалардаги харажатларни устун ва қаторларга қўйилган ҳал қилувчи қўшилувчиларга қўшиб ёки айириб янги жадвалга эга бўламиз. Шунинг учун бу ерда мусбат ва манфий харажатлар ҳосил бўлади:

Иш турлари	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20	Ишнинг ҳажми
I	0 0,5	+	-1,1	4400
II	400 10000	-2000	x x	12000
III	x x	0 1000	-1,5	1000
IV	0,6	0 4600	-0,6	4600
V	0,4	0 1400	0 1800	3200
Жами	14400	9000	1800	25200

Бу жадвалда ҳамма тўлдирилган катақчалар нолга айлантирилди. Энди бизнинг олдимиизда яғи таннархни бошқа ҳамма кўрсаткичлар билан бирлаштириш, яъни мақбул режани топиш ёки уни яхшилаш вазифаси туради.

34-жадвалдан кўрамизки, таннарх I-устуннинг 4- ва 5-қаторларида мусбат: 60 тийин ва 40 тийин. Қолган ҳамма катақларда (тўлдирилганлардан ташқари) таннарх манфий. Тўлдирилган катақларда таннарх нолга teng.

Энди режани яхшилашга киришамиз, бунинг учун учта ёки бир нечта нол харажат қатнашган катақчанинг бир бурчагига ишораси манфий бўлган харажат бўйича ёпиқ контур чизамиз. Бу ерда манфий катақчалар бир нечта бўлса, контурни манфий катақчадаги сонларнинг абсолют қиймат жиҳатидан энг катта бўлган таннархи бўйича тўлдирамиз. А режада берилганлар, яъни нолинчи катақдаги таннархи манфий катақчадаги таннархга ўтказиш ишлари қуйидагича бажарилади. Жадвалдаги бир неча катақчалар бирлаштирилиб, тўртбурчак чизилади. Ундаги танланган катақчалардан биттасининг бурчаги албатта манфий таннархли катақчада ётиши керак, катақчалардаги бошқа баландликлар режа бўйича тўлдирилади. Кейинчалик қатор ёки устундаги манфий таннархли катақчадан тўртбурчакнинг томонлари режадаги рақам бўйича тўртбурчакнинг бир бурчагидан иккинчи бурчагига қараб ҳаракатлантири-

лади. Бу ерда шундай тартиб сақланади: тұлдирилған катақчаларда кам қатнашган тұртбурчакнинг баландлыгидаги юкнинг миқдорини үзгартирмасдан, мусбат катақчалардаги юк миқдоридан олиб ташлаймиз ва манфий катақчалардаги миқдорлар устига құшамиз.

Бунда тұртбурчакдаги катақчаларни тартиб билан белгилаб, биринчи тұлдирилмаган катақчада манфий таннарх, қолған катақчалар эса тұлдирилған бўлиб, унинг таннархи нол бўлиши зарур. Демак, юкни тұртбурчакдаги мусбат катақчада қатнашган энг кам юкни олиш йўли билан тақсимлаймиз. Натижада 35-жадвалга эга бўламиз.

35-жадвал

Иш турлари	Тракторлар маркаси			Ишнинг ҳажми	Ҳал қилувчи қушилувчилар
	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20		
I	0 2400	-0,5 2000	-1,1	4400	0
II	0 2000	0	x	12000	0
III	x x	0 1000	-1,5	1000	-0,5
IV	0,6	0 2800	-0,6 1800	4600	-0,5
V	0,4	0 3200	0	3200	-0,5
Жами	1440 0	9000	1800	25200	
Ҳал қилувчи қушилув- чилар	0	+0,5	+1,1		

Унинг оптималь эканлигини ва учинчи вариантнинг оптимальлигини текшириш учун навбатдаги 36-жадвални тузамиз.

Иш турлари	Тракторлар маркаси			Ишнинг ҳажми
	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20	
I	0 2400	0 2000	-2,2	4400
II	0 12000	0,5	x x	12000
III	x x	0 1000	-3,1	1000
IV	0,1	0 2800	0 1800	4600
V	-0,1	0 3200	-1,6	3200
Жами	14400	9000	1800	25200

Бу жадвалдан кўриниб турибдики, биринчи устун бешинчи қатордаги катакчада, учинчи устунда эса 3 ва 5-қаторда манфий ишорали таннархи сақланган. Демак, режанинг учинчи варианти мақбул эмас. Шунинг учун юқоридагидек алмаштиришларни бажариб, режанинг тўрттинчи вариантини текширамиз ва унинг мақбул эканлигига ишониш учун навбатдаги 37-жадвални тузамиз.

Иш турлари	Тракторлар маркаси			Иш ҳажми	Ҳал қилувчи қўшилувчилар
	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20		
I	0 2400	0 2000	-2,2	4400	-3,1
II	0 12000	0,5	x x	12000	-3,1
III	x x	0 1000	-3,1	1000	0
IV	-0,1	0 3800	0 4600	800 4600	-3,1
V	-0,1	0 3200	-1,6	3200	-3,1
Жами	14400	9000	1800	25200	
Ҳал қилувчи қўшилув- чилар	+3,1	+3,1	+3,2		

Бу жадвалда биринчи устун бешинчи қатор, учинчи устундаги биринчи ва бешинчи қаторларда манфий таниарх сақланади. Шунинг учун бу топилған режа ҳам мақбул ечимга эга эмас. Режанинг мақбул ечимини ҳал қилувчи қўшилувчилар ёрдамида текширамиз.

37-жадвалдан мусбат катакчалардаги энг кам миқдорни олиб, манфий катакчаларга қўшамиз ва мусбат катакчалардан айирамиз. Натижада, тақсимлашнинг навбатдаги вариантига эга бўламиз.

38-жадвал

Иш турлари	Тракторлар маркаси			Ишнинг ҳажми
	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20	
I	0 2400	0 2000	2,2	4400
II	0 1200	0,5	x x	12000
III	x x	3,1	0 1000	1000
IV	0,1	0 3800	0 800	4600
V	-0,1	0 3200	-1,6	3200
Жами	14400	9000	1800	25200

38-жадвалда биринчи устундаги 5-қатор ва учинчи устундаги 5-қаторларда манфий таниарх сақланган. Шунинг учун биз ҳали мақбул ечимга эга бўлганимиз йўқ, буни ҳал қилувчи қўшилувчилар ёрдамида аниқлаймиз ва уни 36-жадвал кўринишида ёзамиз. Мазкур ҳисоблаш ишларини бажариб 39-жадвални тузамиз.

Иш турлари	Тракторлар маркаси			Ишнинг ҳажми	Ҳал қилувчи қўшилувчилар
	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20		
I	0 2400	0 1200	2,2 800	4400	0
II	- 1200	0,5	x x	12000	0
III	x x	3,1	0 1000	1000	-2,2
IV	0,1	0 4600	-0,6	4600	0
V	-0,1	0 3200	-1,6	3200	0
Жами	1440	9000	1800	25200	
Ҳал қилувчи қўшилув- чилар	0	0	+2,2		

40-жадвал

Иш турлари	Тракторлар маркаси			Ишнинг ҳажми
	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20	
I	0 2400	0 2000	0 800	4400
II	0 2000	0,5	x x	12000
III	x x	0,9	0 1000	1000
IV	0,1	0 4600	2,2	4600
V	-0,1	0 3200	0,6	3200
Жами	14400	9000	1800	25200

40-жадвалда мусбат катақчадаги энг кам миқдорни олиб, манфий катақчаларга қўшамиз ва мусбат катақчалардан ай-

ирамиз, натижада тақсимлашнинг навбатдаги вариантига ёришамиз (41-жадвал).

41-жадвал

Иш турлари	Тракторлар маркаси			Ишнинг ҳажми	Ҳал қилувчи қўшилувчилар
	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20		
I	0 2400	0 3600	0 800	4400	0
II	0 1200	0,5	x x	1200 0	-0,1
III	x x	0,9	9 1000	1000	0
IV	0,1	0 4600	2,2	4600	0
V	-0,1 2400	0 800	0,6	3200	0
Жами	14400	9000	1800	2520	
Ҳал қилувчи қўшилув- чилар	-0,1	0	0	0	

41-жадвалда ҳал қилувчи қўшилувчилар ёрдамида ҳисоблаш ишларини бажариб ва ниҳоят қўйилган транспорт масаласининг ЭНГ мақбул варианти бўлган охирги 41-жадвални ҳосил қиласиз.

42-жадвал

Иш турлари	Тракторлар маркаси			Ишнинг ҳажми
	ДТ-54	«Белорусь»	ДТ-20	
I	0,1	0 3600	0 800	4400
II	0 12000	0,4	x x	12000
III	x x	0,9	9 1000	1000
IV	0,2	04600	2,2	4600
V	0 2400	0 800	0,6	3200
Жами	14400	9000	1800	25200

42-жадвалда ҳеч қайси катақчада иш таниархи манғый әмас. Демак, тузилган режанинг охирги варианти мақбул. 39-жадвалдан күриниб турибиди, ишни тракторларнинг маркасига қараб тақсимлаганды АТ-54 трактори 12000 га ни бороналади, АТ-20 эса 1000 га жойни культивация ва 800 га жойни икки марта культивация қиласи, қолган ҳамма ишларни «Белорусь» трактори бажарали. Ишни тракторларнинг турларига қараб шундай мақбул тақсимлаганда қўйидагича харажат талаб қилинган эди:

$$z_{\min} = 3600 \cdot 4,1 + 800 \cdot 5,4 + 12000 \cdot 2,7 + 1000 \cdot 4,4 + \\ + 4600 \cdot 3,0 + 2400 \cdot 3,4 + 800 \cdot 3,1 = 80320 \text{ сўм.}$$

Режанинг биринчи вариантида ишларни бажаришга қўйидагича харажат талаб қилинган эди:

$$z = 4400 \cdot 4,5 + 10000 \cdot 22,7 = 2000 \cdot 2,8 + 1000 \cdot 4,0 + \\ + 4600 \cdot 3,0 + 1400 \cdot 3,1 + 1800 \cdot 5,0 = 83540 \text{ сўм.}$$

Шундай қилиб, режанинг биринчи вариантини мақбули билан солиштирганимизда мақбул вариантда 3220 сўм (4%) иқтисод қилинганини кўрамиз.

42. Катта қурилиш катта билимни талаб қиласи

Қурилиш трести ҳовлиси рўпарасидаги чойхонага қурувчилар доим келишиб овқатланиб, дам олиб кетишарди. Чойхоначи Ашур бобога ҳозирги пайтда таътилда бўлган ўғли Муҳиддин ёрдам бериб турли хил кишиларнинг халқаро воқеалар, ўз ишлари ҳақидаги қизғин баҳсларини завқланиб эшитарди.

Ўзи амалий математика бўйича олий ўқув юртида таълим олгани учунми, ҳар бир нарсани рақамлар билан белгилашга ҳаракат қиласиди. Яқинда эса амалий ёрдам ҳам кўрсатиши мумкинлигини сезди.

Чойхонага келган учта қурувчи йигит узоқ вақт баҳс қилишиди. Шу нарсани тушундики, улар трест энг кўп даромад олиши учун йиллик режани қандай тузиш керак, деган масалани ҳал этишга уринардилар. Муҳиддин масалани математик ифодалашларини илтимос қилди ва ёрдамлашиди.

— Яна бир марта трестимиз фаолияти ҳақида тақрор-лайман; биринчи унинг қурилиш объектлари қўйидагича:

а) *A*, *B* ва *C* серияли темир-бетон элементдан йигилган уйлар;

б) *G* — ғишт уйлар;

в) *D* — мактаб биноси — деди ўрта бўйли тез-тез гапирадиган йигит.

— Бир йил мобайнода элементлар монтажи — 15 та, темир-бетон плиталар монтажи — 16 та, ғиштдан девор ясаш — 14, бетонни тайёрлаш қурилмаси — 5 ҳажмдаги ишларни бажаради, — деб қўшимча қилди семизроқ йигит.

— Тушундим, менинг ишим шу кўрсаткичларни асос қилиб олиб, масалани ҳал этишим керак, — деди сариқ узун йигит ўзини анча билағон кўрсатиб.

Эртасига улар яна тўпланишдилар, аммо «билағон» кўрсаткичларни қўйидаги жадвал кўринишга келтирганини ҳисобга олмагандан ҳеч нарсани ҳал қила олмагани кўриниб турарди.

43-жадвал

Иш турлари	Уйлар серияси				
	А	Б	В	Г	Д
Элементлар монтажи	157	119	970	—	—
Темир-бетон плита монтажи	0 740	0 120	470 —	850 210	900 1900
Ғишт девор териш	—	0	140	0	250
Бетонни тайёрлаш қурилмаси	230	— 300		240	
Бир объектдан келадиган даромад режаси (минг сўм)	5	6	2	4	3

Масалани ҳал этиш чорасини топа олмаган йигитларни бу аҳволдан чиқариш мумкинлигини Муҳиддин уларга айтганда, улар ҳеч ишонишмади. Аммо сариқ йигитнинг олдидан қофоз ва ручкани олиб ёзишга киришганда улар энди умид билан қарашдилар.

— Жадвални қуриб, трест құрсаткичларини билиб, шунан айтиш мүмкінкі, даромад масаласини математик тендерлама тузиб ҳал қилиш мүмкін, — деди Мұхиддин ва ёза бошлади:

$$y(x) = 5x_1 + 6x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 3x_5 \rightarrow \max (y(x)) \quad (1)$$

тenglamani echiш учун

$$\begin{aligned} 1.57x_1 + 1.19x_2 + 9.7x_3 &\leq 1.5, \\ 0.74x_1 + 1.2x_2 + 0.47x_3 + 0.85x_4 + 0.95x_5 &\leq 16, \\ 2.1x_3 + 1.9x_5 &< 24, \\ 0.23x_1 + 0.3x_2 + 0.14x_3 + 0.24x_4 + 0.25x_5 &\leq 5 \end{aligned}$$

шарт бажарилиши керак.

Тайёр tenglamani еча оласизларми? — деб мурожаат қилди Мұхиддин.

— Албатта, — дейинди иккаласи сариқ йигитни назарда тутиб, — буни еча оламиз, лекин эртага ишлаб келамиз.

Эртасига улар масалани $x_1 = 5.685$; $x_2 = 5.167$; $x_3 = x_5 = 0$; $x_4 = 6.668$ даромад $y(x) = 85,734$ минг сүм жавоблари билан ечиб келишдилар. Бу жавоблар эса трестнинг күп даромад олишини таъминловчи құрсаткичлар эди.

Бу учала қурувчи-ұртоқ ҳар сафар чойхонага киргандарыда Мұхиддинга оддий чойхоначи йигиттә әмас, балки үз билимини пухта әгаллаган ёш олимга қарагандек ҳурмат билан муомала қилишарди.

43. Кичкина Маҳмуднинг катта үйлари

Маҳмуджонларниң мағазасында көмекші келиб, уй ҳақида гап очилғанда ҳар сафар нұқул келишиб олғанидек улар бир хил гапни айтишарди ойисига:

— Мана сизларга яхши бўлди, уйларингизни қурган ташкилот ваъда берган бир йил ичидан бинони қуриб топширишди, бизлар эса ҳали ҳам сарсон бўлиб юрибмиз.

Үшандан бери Маҳмуджон кенг ва ёруғ чиройли хоналарга киргандан үзиде қандайдир мамнунлик сезса-да, нега бишқа бирорлар ҳанузгача уй ололмай юргани эсига ту-

шиб, савол туғиларди «ҳамма бир маромда ишласа, нега бир хил қурувчи ташкилотлар ўз вақтида улгуради-ю, бир хиллари эса аксинча?».

Бир кун амакиси Шерзод ака уларникига ўз ўртоғи билан меҳмон бўлиб келганда, бу муаммо яна кўтарилди. Ойиси Шерзод амакисига «бизнинг Маҳмуджонда ҳам уй-жой қурилиши бўйича саволлар тўпланиб қолган, қурувчи бўлиб сиз тушунтириб беролмасангиз биз бу соҳадан анча йироқмиз», деди ва қисқагина қилиб муаммони тушунтириб берди.

Шерзод амакиси Маҳмуджонда пайдо бўлган бу саволга жавобан:

— Ҳозир биз мана бу амакинг билан сенга бирорта мисол ёрдамида тушунтириб беришга ҳаракат қиласдан, — деди.— Албатта ҳар бир қурилиш корхонасида етарлича техника ва ишчи кучи бўлишига қарамасдан, бир хил корхоналар белгиланган муддатда бажарини бўйича ваъда устидан чиқолмайди. Бунга сабаблардан бири техника-манина сарфининг ҳар хил қўйилишидир. Масалан, уй-жой массив қурилишида смета нархи ва қаватлари бир хил бўлган иккита бинони ўз ичига олиши мумкин.

Кран ва бульдозернинг конструкция монтажи учун ва бошқа ишлар учун машина вақти сарфи ҳар хил бўлиш талаби қўйилади, яъни

— А типдаги бино учун экскаватор ва кранга мос ҳолда 5 ва 200 машина сменаси.

— Б типдаги бино учун эса ўшандай техника учун 15 ва 100 машина сменаси кетади.

Экскаватор учун йиллик машина вақти фонди 3,0 минг машина смена, кран учун эса 40,0 минг машина сменасини ташкил этади.

Энди асосий масала, юқоридаги шароитда бир йил ичida қанча турар-жой биносини қуриб тоншириш мумкинлигини аниқлашдир.

— Қолган томонини менга қўйиб бергин, — деди шунча вақтгача сұхбатга аралашмай турган амакисининг ўртоғи ва юқоридагиларга кўра давом этди:

$$y(x) = x_1 + x_2 - \max$$

тенилама тузамиз, бунинг учун эса

$$200x_1 + 100x_2 \leq 40000.$$

$$5x_1 + 15x_2 \leq 3000$$

шарт бажарилиши лозим.

Хисоблаб чиқиб агар $x(120, 160)$, $y(x) = 280$ бўлса, ўша ташкилот техникадан максимал фойдаланиб энг қулайлик билан бинони қуриб топширас экан, — деди меҳмон.

Демак, гап ишни қандай ташкил этиш, техникадан ўринли фойдаланишда экан. Маҳмуджоннинг ҳаёлидан «Агар ҳамма қурувчилар техникадан унумли фойдаланишганда эди, ўшанда келган меҳмонлар, бизлар ҳам ўз вақтида олдик квартирати, барака топкур қурувчилар жудатез ва ортиқча харажатларсиз ишлашди, деб айтишарди» — деган фикр ўтди.

44. Фермер хўжалигидан икки лавҳа

Бириичи лавҳа

Самад ака узоқ йиллар ўз туғилган юртида чорвачилик билан шуғулланиб келди, ем-хашак бригадаси бошлиғи, ферма мудири ва шу каби лавозимларда ишлади. Аммо нафақа ёшига етганда ўз ўрнига қишлоқ хўжалиги институгини тутатиб, қўлида беш йилдан бери ферма зоотехники лавозимида ишлаб келаётган Исожонни таклиф этти-да, ўзи нафақага чиқиб кетди. Нафақада ҳам бекор юрмай оила аъзолари билан келишган ҳолда, чорвачиликка ихтисослашган фермер хўжалигини ташкил этдилар. Асосий жисмоний ишларни фарзандлари бажаарди. Лекин бутун ташкилий хўжалик ишларининг оғирлиги Самад ака зиммасида эди. Самараси ёмон бўлмади: икки йилдан бери мўлжалдагидан анча ошиқ даромад олишди. Узоқ йиллар бу соҳадаги тажрибага эгалиги ўз таъсирини кўрсатди албатта.

Ҳаммаси яхши-ю, ёшлиқдан ўртоғи Арслон аканинг иши юришмагани чатоқ бўляяпти-да. Бутун оила аъзолари билан эртадан кечгача ишлашади-ю, лекин натижаси кўнгилдагидек эмас-да.

Бир куни бўш пайтида Арслон уларникига бориб, аввалига роса ўтган-кетгандан чақчақлашишди, кейин эса Са-

мад акада ва Арслон акада түпланиб турган муаммолар, харжатдаги оқсоклик сабабини топишга ўтиши. Арслон ака ўзининг серғайратлигига ишонади-ми, унча-мунча баҳсла ён бермади.

— Сен кўп ҳовлиқма Шер, — деди Самад ака — сенинг кўп гапларингда асос йўқ, яхшиси кел менга қулоқ сол, менга фермер хўжалигинги ҳақида ахборот бер-чи?

Арслон ака: Менга ажратилган майдондан хашак олиш самарасини ҳисоб-китоб қилолмаяпман. Мана қара, мудир, хўжалигим:

- 200 га ерга ем-хашак экади,
- 1200 одам /кун меҳнат ресурсига эга,
- 200 машина /смена техникага эга.

Шундай бўлса-да иш кўнгилдагидек эмас, нима учун?

— Ана энди ўзингга келаяпсан, жўра, юқоридаги маълумотларга кўра вазифа қўйидагича қўйилади, энг кўп даромад олиш учун ўша майдонга қанча кузги дон, қандлавлаги ва бир йиллик ем экиш керак?

Блокнотидан бир варақ йиртиб, жадвал чизишга киришиди:

44-жадвал

Кўрсаткичлар	Экинлар			Жами ресурслар
	Қишики озуқа	Қандлавлаги	Бир йиллик ўт	
Сарф:				
— майдон (га)	1	1	1	200
—техника (маш/см)	2	25	0,3	1200
—маҳсулотнинг 1 га даги нархи (сўм)	0,5	5	0,1	200
	100	500	75	—

Кейин қўйидаги тартибда ҳисоблаш қолди:

$$y(x) = 100x_1 + 500x_2 + 25x_3 - \max \quad (1)$$

бўлиши учун

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &\leq 200, \\ 2x_1 + 25x_2 + 0,3x_3 &\leq 1200 \end{aligned}$$

шарт бажарилиши керак, деб

$$0,5x_1 + 5x_2 + 0,1x_3 \leq 200$$

шартни ёзди.

Үйланиб-үйланиб бир нималар ёзди-да, деди:

— Агар майдоннинг 36, 74 га сига қанд лавлаги ва 163,26 га қисмiga бир йиллик ўт эксанг, даромадинг энг кўп бўлиб 30 минг 614 сўмни ташкил этар экан.

— Улар анча вақтгача мириқиб гурунглашдилар. Бир-бирларига омад тилаб турғанларида қуёш энди ботаётган эди.

Иккинчи лавҳа.

Шанба куни тонгда туриб оила аъзолари билан хўжалик ишини бажариб ионуштага ўтирганда Самад акани йўқлаб Арслон ака келиб қолди, ўзи ҳар ҳолда хурсанд, чўнтағида дафтар кўриниб турарди. Ҳол-аҳвол сўрашгач савол аломати билан Самад акага қаради.

— Хуш, яна қандай «проблема» полвон, — деб кулимсираб қараб сўради Самад ака.

— Ўтган гал, «проблема»нинг ярмини ҳал қилибмизу, ярми қолибдида, муdir. Тошкентда бизнесчи-фермерлар мактабида ўқийдиган ўслим Тўлқин келиб қолди. Мен сен билан бўлган суҳбатни сўзлаб бердим, энди ўзим бориб молларни озиқлантиришнинг қандай фойдали йўллари борлигини сўраб келаман, дегандим.

— Дала, ўқиш давомида бизлар Тошкент атрофида энг зўр чорвачилик фермерларининг иш тажрибаси билан танишидик. Шулардан биттасида моллар сони ҳам озуқа турлари ва миқдори ҳам бизнинг хўжалигимизга деярли ўхшаб кетар экан. Мен улардан кам харажатли озуқалардан фойдали рацион тузиш режасини ёзib келдим. Улар ҳам бизлардагидек молларни озиқлантириш учун овқатига аралашмали ва шарбатли компонентлар қўшар эканлар.

— Бизда суткалик рацион 260 г протеин ва 2,7 озуқа бирлигидан кам бўлмаслиги, аралашмали озуқа учун 2,5 кг дан, шарбатлиси эса 9 кг дан ошмаслиги керак-ку?

— Дада бу нормани олимларимиз анча вақт ўрганиб аниқлашган, лекин бизнинг мақсадимиз шу озуқа турларидан қанча миқдорда берилиши керак, нархи ҳам баланд бўлмаслиги кераклигини эсимиздан чиқармайлик.

— Масалан, 1 кг аралашмада 0,90 кг озуқа бирлиги ва 200 г протеин булиб нархи 0,08 рус рублига тенг, шарбатлисигда эса 0,27 озуқа бирлиги, 15 г протеин бор булиб, нархи 0,02 рус рублига тенгдир.

Шундай бүлгандың рациони 0,7333 кг аралашмали да 7,5556 кг шарбатли озуқадан түзсак, озуқа нархи 390 тенг, яғни 20,97 тийин га тенг бұлар экан.

— Шу тұғрими, бир қараб берчи, — деб илтимос қилди Арслон ака.

Самад ака Арслон бобо узатған дафтаридаги ёзувларни диққат биләп үқиб чиқиб, бошини тасдиқ аломати билан силкитди.

— Жуда тұғри, ҳатто мен ҳам фойдаланишим керакқа үхшайды, сен эса рационни айнаң шу күрсаткыч бүйіча тузавер. Қара, агар аралашмали озуқадан күпроқ құнсанғ нарх ошибб, миқдори камаяди, шарбатли озуқа күп бүлгандың озуқа миқдори ошибб кетади, бу ҳам ортиқча сарфдир. Бунда шундай тұғри танланғанки, рацион ҳам озуқа миқдори ҳам меңжілде, ҳам нархи паст.

— Тұхта, дүстім ҳисоб-китоб балки тұғрилдір, лекин рус рубли нимаси бизда ахир сүм ишлатилади-ку?

— Бу илғор фермер хұжалиғи нафақат республикамиз, балки құнши давлат фермерлари билан ҳам тажриба алмашар экан, шунинг учун пул ҳисоби рублда көлтирилған.

45. Ерга құвват берсанғ, даромад сеники

Азиз китобхон! Математик моделлаштириш ёрдамида иқтисодий масалаларни ижобий ҳал қилиш ҳақида бир неча үн ҳикоя-мисоллар күрлингиз және сизде мустақил худди шунақа масалаларни ечиш истегі пайдо бүлгандың хойнахой?

Шу туғайлы сизнинг ҳукмингизга бир неча масала ҳавола қыламиз. Бу эса сизнинг ҳар қандай соҳадаги иқтисодий жумбоқтарни ечишда үз ақл күчингизни синааб күришга бир имконияттың, иккінчидан эса ҳикоямизда учрайдиган арзимас даражадаги масалалар учун бирорларнинг ёрдамига мұхтож булаётгандар сонини мүмкін қадар камайтиришдір.

Озуқа	Арпа -I ₁	Нұхат -I ₂	Хашак уни -I ₃	Балик уни -I ₄
Озуқа бирлиги (кг)	1,20	1,25	0,76	0,6
Протеин (г)	60	250	200	530
Кальций (г)	1,2	1,5	13,7	67
Фосфор (г)	3,5	4,0	1,7	32
Коротин (мг)	1,6	2,5	201,76	—
1 кг ем баҳоси (сүм)	3	4	5	7

1-топшириқ. Кунлик семириши үртача 300—400 г бўлиши учун тирик вазни 30—40 килограммли қорамоллар учун энг қулай рацион тузинг. Ҳар бош қорамолга бир суткада 1,6 озуқа бирлиги, 200 г протеин, 1,2 г кальций, 9 г фосфор, 12 мг коротин берилиши ҳисобга олинсин.

2-топшириқ. Фермер ҳўжалигида 200 га майдонга гречиха ва тариқ әкилади, ҳар иккаласининг ҳам рентабеллиги бир хил. Қўшимча 800 ц минерал ўғит олиниб, бунинг ҳисобига 1000 ц гречиха қўшимча олиниши назарда тутилаяпти. Ҳўжалик ихтиёридаги ресурслар қандай тақсимланса, энг кўп даромад олиниши мумкин?

Дастлабки кўрсаткичлар асосида жадвалдаги бўш жойларни тўлдиринг.

46-жадвал

Кўрсаткич	Тариқ	Гречиха
Ерни ҳайдашга (га)		
Кетган сарф		
Ўгит сарфи (ц)		
Даромал		

Бу масалага мос келувчи математик моделлаштириш қўйилдагича:

$$y(x) = 2x_1 + 6x_2 - \text{max} \quad (1)$$

(яъни даромад кўп) бўлиши учун

$$\begin{aligned} 0,07x_1 + 0,05x_2 &\leq 200, \\ 0,1x_1 + 0,4x_2 &\leq 800, \\ x_2 &< 1000; x_1 \geq 0 \end{aligned} \tag{2}$$

шарт бажарилиши лозим.

Масала жавоби $x_1 = 1710$, $x_2 = 1505$ бўлиб, $y(x) = 12870$ сўм бўлиши учун жадвалдаги бўш жойларда қандай рақамлар туриши керак?

Ҳа, кўпинча масала берилиши ва шароитдан келиб чиқиб биз унинг ечимини топамиз. Аммо баъзан тескари аҳвол, яъни масала ечимлари берилган-у лекин биз олдинги босқичларини боғлайдиган катталикларни топишимизга ҳам тўғри келади.

46. Ўйингоҳга энг яқин йўл

Шаҳарнинг чеккасида жойлашган ўйингоҳдаги спорт машгулотига боралиган ака-ука Шароф ва Тўлқинлар баъзида кечикиб, баъзида эртароқ ҳам борар эдилар. Кечикиб боришганда роса хуноб бўлишарди — ахир ҳар гал бир хил вақтда чиқишади-ку, нимага ҳар хил вақтда етиб боришади? Ҳар бир нарсада тиришқоқлик намоён қила оладиган Шарофга бу ҳеч ҳам ёқмас, шунинг учун у кечикмаслик йўлини топишга бел боғлади.

Бир ҳафта давомида ҳар хил маршрутларга юриб соатига қараб бир нарсаларни ёзиб қўярди, спорт саройигача бўлган масофада албатта икки тўхташ жойидан йўл транспортини алмаштириш шарт эканлигини ҳам назарда тутди.

Бир куни укаси Тўлқинга: «Энди мен айтган маршрутдан юрамиз, шунда биз кечикмаймиз», — деб қолди. Мана икки ҳафта ўтди, улар бирор марта кечикканлари йўқ. Ҳатто буни поччаси Шукур акага ҳам Тўлқин қувониб айтди. Шукур ака ҳам қизиқиб: «Қани қандай йўлни топдинглар?» деб сўраб қолди.


Шароф хонасидан қоғозга чизилган кўпбурчакка ўхшаш шаклларни олиб чиқиб кўрсатди.

«Ҳар бир транспорт турига кетган вақтни белгиладик, квадрат ичидаги рақам ўша вақтни кўрсатади. Ҳисоблаб

чиқсак, агар биз A (үй) — B — K — M (спорт саройи) йұналиш бүйіча транспортта чиқсак, әңг кам вақт сарфлар эканмиз», — деди Шароф мамнунлигини яширмай.

14-расмда күрсатылғандек, босқичқа-босқич йүл вақти ҳисобланса, уйдан, яғни бекатдан әңг яқин йүл C дан B гача (чунки бу йүлге 10 минут сарфланади) ва бу шу оралиқдаги бошқа вақт сарфларидан кичигидир.

B нүктадан K гача 25 минут бўлиб, у ҳам шу босқичда әңг кам вақтга тенг, ва ниҳоят K нүктадан M бекатгача 15 минут вақт сарф қилинib, учинчи босқичдаги әңг яқин йўллир). Демак, уйдан ўйингоҳгача әңг қисқа вақт 50 ми-



14-расм.

пүтдән иборат бўлиб, бошқа вариантлардан энг мақбули-
дир.

Шунча ёшга кириб, шаҳар транспортининг ҳамма тур-
ларига чиқиб бундай фикр ҳеч хаёлига келмаган Шукур
ака болаларнинг топқирлигидан жуда хурсанд бўлди. Ма-
ҳаллада одамлар орасида гап баъзан ака-укалар ҳақида
кетганида, албатта Шароғнинг топқирлигини бир гапи-
риб беради.

47. Транзистор корхонаси

Республикамиз бадавлат, ҳалқимиз тўқ ва фаровон
бўлиши учун энг зарур нарсаларни биз ўзимизда чиқари-
шимизга не етсин. Афсуслар бўлсинки, бизларга кўп нар-
салар (автомобил, радио, телемеханика, ҳаттоқи кир ювиш
машинаси ҳам) ташқаридан олиб келинди.

Бу бизнинг тараққиётимизга халақит берар, айниқса
мустақил бўлганимиздан сўнг мутеълиқни сақлаб қолар
эди. Шунинг учун ҳам республикамизда шундай ҳалқ ис-
теъмол молларини ишлаб чиқариш жуда катта иқтисодий
ва ижтимоий аҳамиятга эгадир.

«Ўнғар-бизнес» Гулистонда катта (K) ва кичик ($Ч$) тран-
зисторли приёмниклар чиқаришни режалабди. Ҳисоблаб чи-
қиша, ҳар бир катта приёмник 30 доллар, кичиги эса 20
доллар даромал берар экан. Катта приёмникни йиғишга 15
диод ва 12 триод, кичкинасига эса 2 диод ва 6 триод ишла-
тилар экан.

Тайёр приёмникларни стенда текшириш учун катта-
сига 3 минут, кичкинасига 12 минут вақт сарфланар экан.
Приёмникларга талаб чексиз бўлиб, аммо уларга ишлатила-
диган хомашё чекланганлиги учун бир кунда 300 та диод,
306 триод олиш мумкин бўлиб, текшириш стенди бир кун
давомида 6 соатгача ишлар экан.

«Ўнғар-бизнес» директори ўзи иқтисодчи-математик
бўлгани учун масаланинг қулай ечимини қидириб, қўйи-
даги математик моделини аниқлади.

У аввало, шартларни ифодалади: x — кичик, y — катта
приёмник:

$$\begin{aligned} 2x + 15y &\leq 300, \\ 6x + 12y &\leq 306, \\ 12x + 3y &\leq 360, \\ x > 0, \quad y > 0. \end{aligned} \tag{1}$$

Асосий мақсад даромадни энг катта қийматга етказишига эришишдир.

$$\Phi = 20x + 30y \rightarrow \max$$

Бундай масаланинг ечими $x = 27$, $y = 12$ бўлиб, демак мос равишда шунча приёмник чиқарилса, «Ўнгар-бизнес»-нинг даромади ҳар куни 900 долларни ташкил қиласа.

48. Самолётдан самарали фойдаланиш

Бу масала янги очилган Тошкент Давлат Авиация институтига Ўзбекистон ҳаво йўллари томонидан берилиб, энг самарали ечим сўралган эди. Масала ҳар бир вилоятдаги самолётларда юқ (пассажир) ташиш маршрутини ташкил қилишига тааллуқлидир.

Масаладан мақсад ҳар хил самолётларни вилоятлараро тақсимлаб юқ ташишда ҳаво йўлларидаги мақбул йўналишларни аниқлашдан иборатдир.

Айтайлик, Республикада (Регионда) n та ҳар хил ишлаб турган самолёт бор ва буларни m та ҳаво йўлларига тақсимлаш зарур. Бир ойда ташиладиган юклар a_{ij} (i -самолёт хили, j -ҳаво йўли) бўлиб ундаги харажат b_{ij} сўмдир. Ҳар бир ҳаво йўли бўйича шундай x_{ij} самолёт хили ва сони топилсинки, a_{ij} юкларни ўз вақтида, энг кам харажат асосида етказилсин. Умуман самолёт хили ва сони N_j маълум деб белгилансин.

Масаланинг математик модели, умумий харажат миқдори, яъни мезон

$$C = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n b_{ij} x_{ij} \rightarrow \min \tag{1}$$

ифодага кўра аниқланади.

Юк ташиш шароитидан келиб чиқадиган чегара шарттарини аниқласак бұлади, яғни ҳамма йүлларда ва самолёттарда ташиладиган юклар йиғинди

$$a_{1j}x_{1j} + a_{2j}x_{2j} + \dots + a_{nj}x_{nj} > a_j \quad (j = 1, m),$$

$$x_{i1} + x_{i2} + \dots + x_{in} = N_i,$$

$$x_{ij} > 0,$$

Мисол. Масалан уч хил самолёттарни түртта ұаво йүлиға бириктириш зарур бұлсın. Қуйидаги жадвалда самолёт сонлари, хиллари, ойлик ташийдиган юклар ұажми ва унга тегишли хизмат харажатлари берилған.

47-жадвал

Самолёт хили	Самолёт сони	Хар бир самолёттинг қуйидаги йұналишлар бүйича							
		Ойлик ташиладиган юки				Хизмат харажати			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	50	15	10	20	50	15	20	25	40
2	20	30	25	10	17	70	28	15	45
3	30	25	50	30	45	40	70	40	65

Талаб қилинадыки, шу түртта йұналиш бүйича юк ташишни шундай ташкил қилинсінки, у кам харажатлы бұлсın ва ұаво йұналиши бүйича мос равища 300, 200, 1000 ва 500 миқдорда юк етказилсін.

Йұналишлар бүйича самолёттар сонини x_{ij} деб белгілаймиз.

У ҳолда масаланинг модели:

$$C(x) = 15x_{11} + 20x_{12} + 25x_{13} + 40x_{14} + 70x_{21} + 28x_{22} + \\ + 15x_{23} + 45x_{24} + 40x_{31} + 70x_{32} + 40x_{33} + 65x_{34} - \min \quad (1)$$

Юк ташишни ташкил қилишдаги чегаралар:

$$\begin{aligned}
 & 15x_{11} + 30x_{21} + 25x_{31} \geq 300, \\
 & 10x_{12} + 25x_{22} + 50x_{32} \geq 200, \\
 & 20x_{13} + 10x_{23} + 30x_{33} \geq 1000, \\
 & 50x_{14} + 17x_{24} + 45x_{34} \geq 500, \\
 & x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 50, \\
 & x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 20, \\
 & x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 30.
 \end{aligned} \tag{2}$$

Ана шу күринишига эга бўлган масаланинг мумкин бўлган ечими жуда кўп, ичидан энг мақбулини топиш учун тааллуқли усул қилирамиз. Китобнинг охирги бобида масаланинг хили ва унга тааллуқли усуллар келтирилган.

Биз кўраётган мисол чизиқди математик дастурлаш масаласи бўлиб, чизиқди дастур усулларидан бўлган симплекс усулидан фойдаланамиз.

Масаланинг ечими қўйидагичадир.

Номаълум x_i лар миқдори:

$$\begin{aligned}
 & x_{10} = x_{21} = x_{22} = x_{24} = x_{31} = x_{32} = x_{34} = 0 \\
 & x_{11} = 20, x_{12} = 20, x_{14} = 10, x_{23} = 20, x_{33} = 30
 \end{aligned} \tag{3}$$

Шу юкларни етказиб боришдаги энг кам харажат

$$C(x) = 2600 \text{ млн. сўм}$$

бўлиб энг мақбул — кам харажат эканлигини инобатга олиш керак. Агарда бошқа вариантлар топилса улар биз топган вариантга нисбатан 3—20 % гача қиммат бўлиши турган гап.

49. Самолёт конструкцияси енгил ва арzon бўлсин десак

Бир гурӯҳ Тошкент Давлат Авиация институтининг II—III курс талабалари иқтидорли ёшлар учрашувида бир нечта долзарб масалалар, хусусан самолётнинг асосий хусусиятлари, унинг массаси, қаноти ва фюзеляжи ўлчамлари, шасси курсаткичлари устида музокара юритишаар эди. Бунда «Амалий механика» ҳамда «Самолётлар конструкциялари ва уларни лойиҳалаш» кафедрасинин ёш олимлари ҳам иштирок этдилар.

— Менинг билишимча, самолёт фюзеляжининг массасини аниқлаш лойиҳалашда катта аҳамиятга эга, бу эса унинг конструкцияси, ўлчамлари, материал турларига кўпроқ боғлиқ — дейди, Алиакбаров Дилмурод.

-- Биз юк кўтариш самолётларининг фюзеляж масасини аниқлашга доир ҳисоблаш алгоритми ва компьютер дастурини яратгандик,— уни тўлдириди Алишер. — Ана шунда самолёт қанотларининг узунлиги, уларнинг кўндаланг кесимларининг ўлчамлари, айниқса, самолётнинг энг асосий юк кўтарувчи конструкцияси -- фюзеляжининг кесими анча муаммоларга bogлиқлиги маълум бўлди.

Биз олдин тўртбурчак қуринишга эга бўлган рама контурларининг оптималь ечимларини тадқиқ қилдик — давом эттириди ўз фикрини Алишер, — бу дегани фюзеляж кўндаланг кесим ўлчамлари, бикрликлари қандай бўлиши кераклигини тадқиқ қилмоқчи эдик. Мана эътибор бер, Дилмурод, энг содда мисолларда туташган рама — контурларда бикрликлар муносабатининг оптималь ечимини топишга уриниб кўрайлик.

Рама элементлари бикрликлари нисбатларини инобатга олган ҳолда рама устунидаги иол нуқта момент эпюралари вазиятларини таҳдил қилиш самолёт конструкцияларида учрайдиган содда каркаслардаги монтаж чоклари ўрнини аниқлашга ёрдам беради.

Материаллар қаршилигининг куч усули ёрдамида шу масалани ечамиш. Бўйлама куч таъсирида, масалани фагатгина бир қия симметрик номаълум x_1 (асосий система, бирлик ва юк таъсиридан ҳосил бўлган момент эпюралари 15-расмнинг a , b , c ларида келтирилган)ни аниқлашга келтирамиз:


$$\delta_{11}x_1 + \Delta_{1p} = 0, \quad (1)$$

Бу ерда,

$$EJ_1 = \frac{L^3}{12}(1 + 7\alpha); \quad EJ_1\Delta_{1p} = -\frac{PL^3a}{3}; \quad \alpha = \frac{J_1}{J_2}, \quad (2)$$

Бу ердан


$$x_1 = \frac{4P\alpha}{1+7\alpha}. \quad (3)$$



15-расм.

Устундаги нол нүкта момент эпюралари вазияти (15-расм) (2) ифода билан характерланади ва унинг графиги 16-расмда келтирилган.

$$Y = \frac{l(1+3\alpha)}{1+7\alpha}. \quad (4)$$



16-расм.

Графикдан шуни аниқлаш мүмкінки, $\alpha > 2$ бұлған қолда M әпюрадаги нол нүкта құзғалмайды.

Шуниси қизиқки, P , \square , Γ күренишдеги рамаларининг оптималь бикрлик муносабатларининг аналитик ифодалари домламизнинг китобларида [9] аниқлаб қойилған. Үнда аниқланған оптималь муносабат, масалан P күренишдеги рама учун қойидагичадир:

$$\xi_{\text{optimal}} = \frac{2l}{3H}, \quad (5)$$

бу ерда $\xi = E/I$, бикрликлар муносабати, l — ригел узунлигі, H — устун баландлиги.

Ушбу муносабат орқали, конструкция нархини (оғирлигини) деярли 9—12% енгиллаштириш мүмкінлиги аниқланған эди.

Умұман авиацияда ва бошқа механик тизимларни лойиҳалашда уларнинг оптималь ўлчамларини аниқлаш фақат катта фойда, юқори самара беради. Бу ҳақиқат халқаро стандарт сифатида чет әл олим мутахассисларининг доимий изланув йұналиши бўлиб қолған, — деб ўз фикрини тутатди Алишер Усмонов.

50. Семизбай аканинг озиш режаси

Жуда ҳам озгим келаяптику, лекин овқат сыйишни ҳам жуда хоҳлаяпман. Бундан ташқари, чиройли бўлиш орзу сидан оила ҳам зарап кўрмаслиги керак. Тажрибали дўстим фақат иккита янги маҳсулот, яъни творохека ва вродекрабдан иборат рационал овқатланишга ўтишни маслаҳат берди. Тўғри, уларни ақлни ишлатиб сыйиш керак: бундай кундузги овқатланиш 14 бирлик (единиц жира)дан кўп бўлмаган ёғ бериши керак, лекин 200 калориядан ҳам кам бўлмаслиги керак.

Айтганча, творохеканинг 1 килограммининг баҳоси — 1500 сўм, вродекраба эса 2500 сўм.

Энди фақат диета шартини бузмасдан, шу билан бирга кам пул ишлатиш учун бу иккита ажойиб маҳсулотдан қанча пропорция олиш кераклигини ўйлаш керак. Зудлик билан қарор қабул қилиш керак.

Математик дастурлашга мурожаат қиласиз. Аввалом бор, масалани маший тилдан математик тилга ўгирасиз. Изланаётган x_1 ни — творохеканинг кундузги нормаси, x_2 — вродекрабники деб белгилаймиз. Бу ҳолда диета шарти қўйидагича математик чегара кўринишга эга бўлади: ёғ бўйича

$$14x_1 + 4x_2 \leq 14, \quad (1)$$

калория бўйича

$$150x_1 + 200x_2 \geq 200. \quad (2)$$

Айтиб ўтиш керакки, x ларнинг бирортаси ҳам манфий бўла олмайди.

$$x_1 \geq 0 \quad (3)$$

Тежамкорликнинг шартларини қўйидагича ёзамиз, яъни мақсадли функция қўйидаги кўринишга эга бўлади:

$$C = 1500x_1 + 2500x_2 \rightarrow \text{иложи борича камроқ}. \quad (4)$$

Берилган (2) ифодадан келиб чиқувчи рухсат этилган шартга нисбатан: $(150x_1 + 200x_2 = 200)$ қўйидагини тонализмиз:

$$x_2 = 1 - 0,75x_1.$$

Энди x_1 га исталган қиймат бериб, x_2 га мос келувчи қийматлари орқали — у (1) ифодасини аниқлаймиз.

Энди, рухсат этилган ҳудуд ичидаги қайсилир бир нуқтани олмайлик, бари-бир диета шарти сақланиб қолади: ёғ ва калория миқдори нормада бўлади.

Масалан, x_2 ўқила ётувчи $x_1 = 2$ ординатаси билан рухсат этилган режа ҳудудидаги нуқтани оламиз, бунда $x_1 = 0$. Ган, кунига фақат 2 кг дан вродекраба билан озиқланишга тўгрисида кетаяпти. Бундай шартда диетанинг бажарилишини текширамиз. (1) ва (2) формулалар ёрдамида қўйидагилар топилади: ёғ бўйича $14 \cdot 0 + 4 \cdot 2 = 8$ ёғ бирлиги, ш.к. 14 дан кам.

Бизнинг кундузги истеъмол қиласиган маҳсулотимиз қанча туришини ҳисоблаш қийин эмас. Формуладан фойдаланамиз

$$C = 1500 \cdot 0 + 2500 \cdot 2 = 5000 \text{ сўм.} \quad (5)$$

Бу кўпми ёки камми? Диета шартини сақлаб қолган ҳолла, харажатни ҳам камайтириш мумкин эмасми?

$1500 \cdot 0 + 2500 \cdot 2 = 5000$ сўм олинган диета қийматини мос келувчи график чизифида куриб чиқамиз.

Агар биз бу ифодадаги озод ҳад катталигини алмаштирасак, у ҳолда қиймат чизиги ўз-ўзига параллел юқорига ёки настга силжийди. Масалан, диета режаси сифатида *B* нуқтани — юқори худуддаги баландликни олсак ($y_x = 3,5$ ординатали), у ҳолда $1500 \cdot 0 + 2500 \cdot 3,5 = 8750$ сўмни оламиз. Аниқ айтиш мумкинки, диета қимматлашди.

Биз эса мақсад сари йўлни кўрамиз: оптимал режа бу ерда, математик дастурлашнинг бошқа бир масаласига ўхшаб, четки нуқта худудига тўғри келиши керак, аниқроғи бирданига энг кам қийматли чизиқقا тегишли. В баландлик бундай нуқтага киради.

Унинг координаталари — бизга керакли x_1 ва x_2 оптимал режа ифодаларини, *AB* ва *BV* томонларини ҳосил қилувчи: $14x_1 + 4x_2 = 14$; $x_1 + 200x_2 = 200$ чизиқ тенгламаларини счиш орқали топиш мумкин.

Содда ўзгаришилардан сўнг $x_1 = 10/11 \approx 0,9$ кг; $x_2 = 7/22 \approx 0,32$ кг ларни олиш мумкин.

Бу эса творохека ва вродекрабанинг кундузги нормасидир. Биз диета нормасининг энг кам қийматини олишга эришдик. Графикда *B* нуқта орқали ўтувчи бу қиймат чизиги:

$$1500 \cdot 0,9 + 2500 \cdot 0,32 = 2160 \text{ сўм.}$$

Энг қиммат диетага нисбатан бизнинг режа харажатларимизни 4 баробар камайтиришга ёрдам берди. Ҳозиргина биз ечган масала фақатгина инсон диетасин учунгина тааллуқли эмас. Шунга ўхшаш масалалар халқ хўжалигига ҳам кенг қўлланилади.

VII. КҮП МЕЪЗОНЛИ МУАММОЛАР

51. Мен ва рафиқам

Бу ҳикояни «Рафиқам ва мен» деб атасам аникроқ бўлар эди, чунки ҳаммасини бошлашга, шу китобчани ёзишга ҳам сабабчи рафиқам Дилдораҳоннинг саволи сабаб бўлган.

Кунлардан бир кун у киши менга:

— Агар шу меҳнатларингизни иш билармонликка, ҳаётга татбиқ қилганингизда балким аввало ўзингизга қолаверса, шогирдларингизга ва кўпчиликка фойдаси кўпроқ тегарди. Ҳозирги кунда меҳнатингиз самарадор булиши учун илмий ишлар натижасидан кенг фойдаланиш мумкин эмасми? — деб суради Дилдораҳон.

— Мен ҳам шуни ўйлаб юрибман, авваллари ўз соҳамдаги илмий мақола ва натижаларим кўпчиликни қизиқтирарди, бутун иттифоқдаги шу соҳа олимларига юборар эдим. Энди эса ўзимизда камдан кам мутахассис ўқииди. Шунинг учун билганингизни соддароқ, кўпчиликка тушунарли ва фойдали бўладиган кўринишда татбиқ этиш йўлини ўйлаб юрибман.

— Ўйлаганку яхши, аммо нафини ўзингиз кўрганингизга нима етсин, сизнинг формула ва сопроматингиз кўпчиликка керак бўлармикан?

— Менимча жуда керак бўлади, мана масалан мен фойдаланган ва яратган оптималлаштириш усуллари ҳаёт масалаларини ечишга жуда керак бўлади,— деб усул мазмuni ва моҳиятини тушунтириб кетдим.

Масаланинг мазмuni бу кўп мезонли оптималлаштиришга тегишли муаммодир. Қандай масалани олманг, уни кенгроқ ва тўлароқ ҳал қилиш зарур бўлса кўп мезонли масала бўлиб чиқади, масалан:

1. Мебель (ёки бошқа нарса) харид қилмоқчисиз, сизга қолса чиройли, чидамли, замонавий, чет элники, ёғочдан ясалган, кўп имкониятли, енгил, умрбоқий, кам жой эгаллайдиган ва ниҳоят жуда қиммат бўлмагани маъқул.

2. Бозорга бордингиз, сизга қолса баҳорда: гилос, тут, қуулупнай, картошка, помидор, пиёз, кўкат ва бошқа нарсаларни, кам харажат, унча оғир бўлмаган, уйингиз

яқинида бўлган, харажатини максимум қоплайдиган, янги сифатли, соғлом маҳсулотлар олмоқчисиз.

3. Дам олгани кетмоқчисиз, сиз бормоқчи бўлган жой сизга қолса энг чиройли табиатли, энг жаҳонга номи чиққан, сизнинг соғлиғингизга жуда мос, сизга мос меёрга харажатли ва соғлиқ учун энг фойдали бўлса ва ҳ.к.

Аммо афсуски, орзу бошқа, имконият-шароит бошқа. Ҳамма вақт ҳам мезони энг яхши шароитга етишишга эришиб бўлмайди. Шунинг учун ҳам «сих ҳам куймасин, кабоб ҳам», яъни имкони борича ҳамма мезон яхши қийматига яқинлашсин, дейилади. Шу ҳам инобатга сазоворки, бир мезон иккинчи мезонга тенг кучга эга бўлмайди. Масалан мебелнинг нархини белгилайдиган мезон уни енгил, кам жой эгаллайдиган бўлиши каби мезонлардан устунроқ. Мана шунга ўхшашиб шартларни ечиш «Кўп мезонли оптималлаштириш масалалари»га киради. Бундай масалаларни ечишга бағишланган ишлар юзлаб бўлиб айниқса, чет элда бу соҳа жуда яхши ривожланган.

Шу ва шу каби усуулларни яратишда Ўзбекистон олимлари ҳам анча ишлар қилишган.

Биз бу ерда энг осон, энг тез ечиладиган, шу китоб муаллифи яратган усуулни келтирамиз. Усуулнинг номи «Тезкор кўп мезон усули». [9]

Айтайлик, масаланинг сифати-мазмунини ифодалайдиган $i=1,2,\dots,n$, C — мезон бор, номаълум ўзгарувчилар ҳам x_1, x_2, \dots, x_n та. Маълумки ҳар бир мезон C алоҳида қараганда ўзининг мақбул (\max, \min) ечимига эга ва уларни топиш усууллари юқоридаги бобларда келтирилган. Бу мақбул ечимларнинг $C^*(x^*)$ — биринчи мезони энг яхши (\max ёки \min) қиймати x^* — оптимал миқдорига мос келади.

Бизга, демак, масаланинг ҳар бир мезонининг энг яхши миқдорлари аниқ:

$$C_1^*(x_1^*), C_2^*(x_2^*), \dots, C_n^*(x_n^*). \quad (1)$$

Аммо $x_1^* \sim x_2^* \sim \dots \sim x_n^*$, яъни ҳар бир мақбул ечим ҳар хил x_i га тўғри келади. Чунки бир мезоннинг энг яхши қиймати бошқа мезоннинг яхши қийматига деярли тўғри келмайди. Чунки мебель бир вақтнинг ўзида ҳам арzon, ҳам пишиқ, ҳам умрбокий ва енгил бўла олмайди.

Ана шунинг учун умумлаштирувчи мезон-кўрсаткич $F(x)$, яъни

$$F = [C_1(x_1), C_2(x_2), \dots, C_n(x_n)] \quad (2)$$

яхши бўлиши мақсадга мувофиқ.

Умумлаштирилган мезоннинг энг яхши қийматини аниқлаш катта ва мураккаб муаммодир. Бу масалани ечиш бўйича юзлаб олимлар минглаб илмий ишлар чоп этишган. Таклиф қилинган усуллар ҳар хил мураккаблик ва имкониятларга эга.

Биз VIII бўлимда маълум усуллардан энг соддаси, энг тез ва аниқ натижа берадиган усул — «Тезкор кўп мезон усули»ни кўрсатганимиз.

Мен ўзим қурилиш конструкциялари бўйича мутахассис бўлганим учун жуда содда, аммо кўп мезон талабига мос иморатда, кўприкларда ишлатиладиган темир фермани бошқаларга, қолаверса хотинимга ҳам тушунтириш учун мисол сифатида қабул қилиб олдим.

Темир ферма элементларининг кўндаланг кесимларини номаълум — x деб қабул қилиб икки мезон : $G=yA_f$ — конструкция массаси, $T=k/aq$ — конструкцияни тайёрлашга зарур меҳнат сарфи орқали баҳолаш мумкин.

Айтайлик, металл ферма иложи борича арzon ва енгил бўлиши талаб этилсин. У ҳолда бундай фермани яратиш катта меҳнат талаб этали, яъни бир мезондан ютсак, иккинчисидан ютказамиз.

Бизга юқоридаги боблардан маълум бўлган бир мезонли усуллар ёрдамида қўйидагилар аниқланган:

Биринчи мезон бўйича энг енгил, металл харажати кам ечим:

$$1. G_{\min} = 26,04 \text{ kN}, T = 36,450 \text{ соат}$$

бўлса, иккинчи мезон бўйича эса энг кам меҳнат сарфи ечимида

$$2. G = 56,5 \text{ kN}; T_{\min} = 17,9 \text{ соат}, бўлади.$$

Ана шу икки мезоннинг устуворликларини инобатга олсак ($a_1=0,8$ $a_2=0,2$) ҳамда VIII бобдаги (MZO) форму-

ласидан фойдаланиб күп мезонли масалани ечсак, энг мақбул ечим аниқланади ва у қийидаги қийматта эга булади:

$$G(\text{opt})=30 \text{ kN}, \quad T(\text{opt})=22,60 \text{ соат}.$$

Күриниб турибдики, бу қийматлар қидирилаётган күп мезонли масала ечимининг энг мақбулини илмий асосда ишниңдайди.

Усулни ўта мурраккаб масалаларга ҳам қўллаш мумкин, натижаси аниқ ва белгиланган *a*-устуворликка боғлиқдир.

Мана Дилдорахон, шундай усуллар ҳам борки, эр-хотин орасидаги муаммоларни ҳам илмий асосда кам харажат ва ютуқ асосида ечиб беради, леб турмуш ўртогимга бир оз далда бергандек бўлдим.

52. Ким бўлсам экан?

Ҳар бир инсоннинг ҳаёти давомида бир неча марта тандов имкониятлари бўлади. Биринчиси аксарият «Ким бўлсам экан?» деган саволдан бошланади. Чунки, шу тандовгача инсоннинг ҳаёти асосан ҳаёт тақозоси асосида боради.

Мактабда битказувчи 11 синфнинг раҳбари Людмила Петровна анчадан бери битирувчиларга ким бўлиш тўғрисида ўз маслаҳатларини берарди, аммо оқибатда битирувчилар бошиқа соҳаларга кетганлигини эшишиб ўйланиб юради. Нима қиласа, маслаҳати ҳаётий, йигит-қизларга фойдали, ота-онаси хоҳлаганча бўлади. Шу фикрини ўз Қўлида ўқиган, катта ҳаёт тажрибасига эга, медицина фанлари номзоди Лазизжонга айтди:

— Илтимос укам, мана сен ўз тажрибангдан, ҳаёт тадаббларидан келиб чиқадиган маслаҳатларингни бу йилги мактаб битирувчиларига айтиб берсанг. Битирувчиларнинг кўичилиги ҳали ким бўлишини ҳам аниқ ҳал қилишганича йўқ,— деди.

— Мен нима ҳам дердим, ўзим шифокор бўлсам, аммо мен ўзим қандай касб танлаганимни айтиб беришим мумкин. Мен касб танлашимда дадамларнинг ҳамкаслари буюк

Эстониялик олимпиада Эмма Модестовна Иеги катта роль ўйнаган. Унинг сўзи билди айтганда математикада деярли ҳамма муаммоларни ечишга қодир усуулар бор экан. Касб танлашда математикадаги «қора қути» усулиниң менга ёрдами теккан эди. Лозим топсангиз мен шуни сизнинг ўкувчиларингизга гапириб бераман, чунки менда шу олимпиада нинг материали сақланган.

Кунлардан бир куни Лазизжон ўзи тамом қилган мактабга келди, Людмила Петровна билан синфига киришди. Болалар билан танишгач, ў Эмма Модестовна билан бўлган сұхбатларни гапириб берди.

Илтимос, ҳаммангиз ўз касбингизни аниқлаш-танлаш учун икки варакдан қофоз олинглар ва қўйидаги жавдални чизинглар, деб доскага қўйидаги жадвални чизди (48-жадвал).

48-жадвал

Мутахассислик ташлаш жадвали

№	Таклиф мезони	ТошМИ	Иқтисод университети	Тижорат иши	Коллеж (техникум)
Ижобий мезонлар					
1	Олий маълумотли булиш				
2	Истиқболлилиги				
3	Мутахассисликнинг даромадлилиги				
4	Кириш имконияти				
5	Эзгу ният				
6	Истетъод				
7	Ота-она хоҳиши				
8	Ўйга яқинлиги				
9	Касбнинг оиласвийлиги				
10	Таъсирлилик				
11	Обрулилиги				
12	Озодалиги				

№	Таклиф мезони	ТошМИ	Иқтисод университети	Тижорат иши	Колледж (техникум)
Салбий күрсаткичлар					
1	Гардкамлик				
2	Отир меҳнатлилиги				
3	Сөзлиқ кетиши				
4	Мутахассисликнинг иоаниқдиги				

Жадвал устунларида сизларнинг талаб мақсадларининг мезонлар сифатида ёзилади, масалан, ижобий күрсаткичлардан мана энг асосийлари 12 та бўлди, салбий күрсаткичили мезонлар тўртта. Энди сизлар ҳар бирингиз тела қаторга қаерга бориб ўқиш ёки ишлашини мўлжалляпсиз, шуладан энг асосийларини ёзамиш. Мана олдинги партадаги Шодивой фикри асосида мен доскага шуларни ёзалипман.

48-жадвални уч баллик баҳода тўлдирамиз, хоҳланг ўзингиз, хоҳланг оила аъзолари ёки ёру-дўстларингиз билан тўлдиринг. Асосий талаб шошилмасликда, балким бамаслаҳат, аммо асосан ўзингизнинг фикрларингизни асос қилиб тўлдирасиз.

Шуни эътиборга олингки, 1- ва 2-гуруҳ рақамлар ижобий баҳолар сифатида, 3-гуруҳ салбий, яъни манғий сифатида инобатга олинади.

Мана доскада мен Шодивойнинг ёзган рақамларини келтираман (49-жадвал) ва улар асосида мезонлар йигиндисини коэффициентларга қараб аниқлайман. Бунда 3-гуруҳ салбий мезонларнинг ифодалари манғий ишорада кўшилади.

1. Медицина институти варианти бўйича

$$T_1 = 8 \cdot 1,2 + 7 \cdot 1,1 - 1 \cdot 1,0 = 16,3.$$

	Таклиф мезони	ТошМИ	ТДИУ	Тижор.	Коллеж.
1	2	3	4	5	6

I—гурұх үсіш ривожланиш имконияти $K = 1,2$

C_1	Истиқболлилиги	1	2	1	0
C_2	Катта хоҳиш	2	2	0	1
C_3	Мутахассисликнинг даромадлилиги	0	1	2	0
C_4	Истеъоддинг мавжудлиги	1	1	1	2
C_5	Ота-она хоҳиши	2	2	0	0
C_6	Тайёргарчилик	1	1	1	1
C_7	Жамиятда обрулилиги	1	2	2	0
	Жами	8	11	7	4

II—гурұх ривожланиш имконияти $K = 1,1$

C_8	Олий маълумотли булиш	2	2	0	0
C_9	Кириш имконияти	0	0	2	2
C_{10}	Үйга яқинлиги	1	2	0	0
C_{11}	Касбнинг оиласындылығы	2	2	0	0
C_{12}	Обрулилиги	0	2	1	0
C_{13}	Озодалиғи	2	1	0	0
	Жами	7	9	5	4

III—гурұх манфий хусусиятлиги $K = 1,0$

C_1	Гардкамлик	0	1	2	1
C_2	Оғир меңнатилиги	1	1	2	1
C_3	Софлик кетиши	0	1	2	1
C_4	Ноаниқлиги	0	0	2	1
	Жами	1	3	3	4

2. Иқтисод университети варианти

$$T_2 = 11 \cdot 1,2 + 9 \cdot 1,1 - 3 \cdot 1,0 = 20,1.$$

3. Тижорат ишига бориш варианти

$$T_3 = 7 \cdot 1,2 + 51,1 - 8 \cdot 1 = 5,9.$$

4. Махсус мутахассислик олиш ўқув юртига кириш варианти

$$T_4 = 4 \cdot 1,2 + 4 \cdot 1,1 - 4 = 4,8 + 4,4 - 4 = 5,2$$

Уч балл: 2.1.0

Күриниб турибиди, 2-вариант асосида Шодивой учун иқтисод университетига кириш мақсадға мувофиқ күринади.

Масалани янада аниқроқ ечиш зарур бұлса, мезонлар орасидаги муносабаттарни аниқтаймиз.

Тушунтириш осон булиши учун мезонлар сонини бир оз қысқартыриб ёзамиз, масалан:

C_1 – Истиқболлилык

C_2 – Даромадлилык

C_3 – Қобилият

C_4 – Ота-она фикри

C_5 – Тайёрлик

Назарияда бор алгоритм асосида қыйидаги амалларни бажарамиз.

1. Күрсатилған мезонларнинг энг асосийларини олдин күрсатыб, улар орасидаги қыйидаги ифодаларни аниқтаймиз,

$$C_1 > C_3 > C_5 > C_2 \sim C_4 \quad (1)$$

Бу ерда ~ тенгроқ дегани, $>$ яхшироқ дегани.

2. Улар орасидаги муносабаттарни рақам орқали белгилаймиз, масалан,

$$\begin{matrix} C_1 & > & C_3 & > & C_5 & > & C_2 & \sim & C_4 \\ 5 & & 3 & & 2 & & 1 & & 1 \end{matrix} \quad (2)$$

3. Мезонлар йиғиндиси бүйича таққослаймиз:

$$\begin{array}{c|c|c} \text{аввал } C_1 \{[C_3 C_5 C_2 C_4] & | C_3 \{[C_5 C_2 C_4]\} & | C_5 \{[C_2 C_4] \\ \text{сүнг } C_1 \{[C_3 C_5 C_2] & | C_3 \{[C_5 C_2] & | C_5 \{[C_1 C_4] \\ \text{сүнг } C_1 \{[C_3 C_5] & | C_3 \{[C_5 C_2] & | \end{array} \quad (3)$$

Күриниб турибдики, солиширишда CC_3C_5 дан, яъни қўйилган 5 рақам ўрнига 4 қўйсак, муносабат бажарилади.

Мезонлар муносабатини коэффициентлар орқали топамиз:

$$\begin{aligned} a_1 &= 4/(4+3+2+1+1) = 0,36, \quad a_3 = 3/(4+3+2+1+1) = 0,27, \\ a_5 &= 2/(4+3+2+1+1) = 0,18, \\ a_2 &= 1/(4+3+2+1+1) = 0,08. \end{aligned}$$

Ана энди юқорида ечилган масалани иккинчи усул орқали аниқроқ ҳисоблаймиз, бу ерда мезонлар қўйида-
гича аниқданади:

$$\begin{array}{ccccc} 1 & 3 & 5 & 2 & 4 \\ K_1 & = 1 \cdot 0,36 + 1 \cdot 0,27 + 1 \cdot 0,18 + (0+2) \cdot 0,09 = 0,99 \\ K_2 & = 2 \cdot 0,36 + 1 \cdot 0,27 + 1 \cdot 0,18 + (1+2) \cdot 0,09 = 1,46 \\ K_3 & = 1 \cdot 0,36 + 1 \cdot 0,27 + 1 \cdot 0,18 + (2+0) \cdot 0,09 = 0,99 \\ K_4 & = 0 + 2 \cdot 0,27 + 1 \cdot 0,18 + 0 = 0,72. \end{array}$$

Кўриниб турибдики, биринчи вариантдаги натижа ис-
ботланди, Шодивойнинг тўлдирган жадвалига асосан унга
энг яхши танлов Иқтисод университетига бориш экан.

Аммо иккинчи ўринга биринчи вариантда ТошМИ
бўлган бўлса, иккинчи вариант ҳисобида тижорат ҳам
шунча кўрсаткич олди, бунга сабаб иккинчи вариант ҳисо-
бида учинчи гурӯҳ салбий кўрсаткичлар инобатга олин-
ганилигидир.

Юқоридаги мисол алгоритми бошқа кўп мезонли тан-
лов масалаларида ҳам қўлланилиши мумкин.

53. Сих ҳам, кабоб ҳам кўймасин десанг

Шуниси қизиқки, I—IV бобларда ўриб ўтилган опти-
мал масалалар бир мезонга эга, аммо шу мезон ёнида

иккинчи, учинчи ва бошқа мезонлар ҳам бўлиб, уларни аксарият ҳолларда инобатга олиш зарурдир. Баъзида биринчи мезон сифатида энг асосийини, қолганларини зарурлигини инобатга олиб иккинчи, учинчи ва ҳ. к. мезонлар деб қабул қилинади. Аксарият иккинчи, учинчи ва бошқа мезонлар оптималлаштириш масаласига чегара сифатида киритилади. Аммо бу ёндошиш зарур ечимни беролмайди.

Масалани тўлиқ, кўп мезонли сифатида ечиш учун юқорида кўрсатилган «Тезкор кўп мезон усули» ёрдамидан фойдаланиб иккита мезонли содда масалани кўриб чиқамиз.

I-масала. Бир ёш тадбиркор маҳсулот (темир тўр, картон қутилар, хонтахта, сандиқ ва ҳ.к.) чиқариш ниятида кичик бир дастгоҳ тайёрламоқчи бўлибди. Дастгоҳдан олинидиган маҳсулот бир нечта талаб мезонларига мос келиши керак, айтайлик, нархи — C_1 , унинг оғирлиги — C_2 , унга кетган меҳнат — C_3 ва харажат — C_4 бўлсин. Тадбиркорнинг мақсади — шундай маҳсулот чиқарсинки, унинг юқорида келтирган мезонлари энг кам қийматга эга бўлсин. Юқорида ва кейинги бобда келтирилган ифода мезонлар сони нечта бўлса ҳам ечим топишга ёрдам бера олади. Биз бу ерда масаланинг ечимиини таҳдил қилиш осон бўлиши учун фақат иккита мезон — C_1 ва C_2 ни қабул қиласиз.

Масаланинг математик модели қуйидаги мулоҳазадан келиб чиқади: x — номаълум, маҳсулот сони, мезонлар кўриниши қуйидагича бўлсин:

$$C_1(x) = 5x^2 - 2x + 3 \text{ min} \quad (1)$$

$$C_2(x) = 2x^3 - 6x + 7 \text{ min} \quad (2)$$

Масаланинг ечимидан мақсад иккала мезоннинг энг кичик қийматларини ифодаловчи функционални топиш:

$$\Phi(x) = a_1 C_1(x) + a_2 C_2(x) \text{ min бўлсин,}$$

$$\text{Бу ерда } x \leq 6 \text{ ва } x \geq 0 \text{ бўлсин.} \quad (3)$$

Масала ечими бир нечта вариантлардан иборат бўлиб, мезонлар орасидаги α — афзаллик коэффициентларига

боғлиқдир. Масалан, афзаллик коэффициентлари муносабати $\alpha_1/\alpha_2=3/1$ сифатида қаралса, $x^*=0,38$ қиймат “олтін нүкта” бўлиб, мезонлар қиймати

$$C_1(x^*) = 2,952; \quad C_2(x) = 4,83.$$

Агарда, $\alpha_1/\alpha_2=0,54/0,46$ бўлса, у ҳолда оптималь ечим $x^* = 0,66$ бўлиб, мезонлар эса қуидагига тенг бўлади:

$$C_1(x^*) = 3,88; \quad C_2(x^*) = 3,61.$$

Агарда $\alpha_1/\alpha_2=1/1$ бўлса, у ҳолда оптималь ечим $x^* = 0,59$ бўлиб, мезонлар эса:

$$C_1(x^*) = 3,58; \quad C_2(x^*) = 3,87.$$

булиб, кабобни ҳам, сихни ҳам куйдирмайди.

VIII. ОПТИМАЛЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ

54. Оптималлаштиришда иқтисодий-математик модел

Тадқиқот фаолиятининг турли хил соҳаларида математиканинг кенг имкониятлари қўлланилиши янги воситаляр ва усуллар билан унинг ҳалқ хўжалигига бўлган аҳамиятини кенгайтирмоқда. Асосий ўринни амалий математика эгаллаб, уни қўллаш учун фақат математик билимларни билиш кифоя эмас, яъни масалалар ва жараёнлар математик тилда келтирилиши лозим.

Математик усулларни қўллашнинг асосий мақсади масалани тўғри қўйиш босқичи, унинг математик ифодаси ва оптималь ечимни аниқлашдан иборат.

Математик муносабатлар орқали келтирилган масала, жараён ёки ҳодиса *математик моделлаштириш* дейилади. Турли масалаларнинг математик моделлари физик, механик кимёвий ва бошқа турли фанларни тушунтиришда ва айниқса, ҳалқ хўжалигини режалаштиришда учрайди. Ташкилотнинг фаолиятини ва ҳалқ хўжалик тармоқларининг иқтисодий жараёнини моделлаштириш де-

Гана да хұжаликнинг математик — иқтисодий моделинни нратиши тушунилади.

Оптималлаштиришнинг математик — иқтисодий модели иккى хил бұлады: бир мезонли ва күп мезонли.

Ұзгарувчиларға функционал боғлиқ шакллантирилған масаланиң мақсади $\phi(x)$ нинг мақсад функцияси деб қабул қилинган. Функция эса номаълум x аргументларға боғлиқ бўлиб, уларга нисбатан алгебраник кўринишга эга чегаралар тизими мавжуд, масалан $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n \leq c$ ва $x_i \geq 0$.

Оптималлаштириш моделида бир неча ечимларнинг ичидан минимал (максимал) аҳамиятга эга бўлган мақсад функциясини топиш талаб қилинади.

Математик масалалардан фарқли ўлароқ, иқтисодий масалалар хұжаликларнинг конкрет имкониятларини ва реал ҳолатни белгилайди. Булар асосан ресурсларга, вақтга ва шу кабиларга қўйиладиган иқтисодий, физик, ижтимоий, техник ва бошқа талаблардир.

Қўйилган чекланишларни инобатга олиб энг мақбул ечим $\min(\max) \Phi(x)$ ни танлаш жараёнларни тадқиқ қилиш назарияси — оптимал дастурлашнинг асосий масаласидир.

Оптималлаштириш алгоритми

Инсон, гурух, оила, ташкилот ходимлари борки ҳар бири хоҳ алоҳида, хоҳ бирга яшаща ва меҳнатда энг мақбул, камхарж, кўп фойдали ва самарадор фаолиятга интилади. Аммо ҳаёт қонунлари, турмуш шароитлари ва имкониятлар бу интилишга маълум чегара қўяди.

Масалан, бозорга борилганда энг арzon, энг сифатли, энг витаминаларга бой мева ва сабзавотларни олишга ҳаракат қиласиз, аммо имконият бунга маълум даражада чек қўяди. Ёки корхонада юқори даромад, сифат ва самарадорликка эришишида бор хомашёни, техника ва машиналар имкониятини, электр, сув, иссиқлик ва ниҳоят ишчи кучи чегарасиз эмаслигини инобатга олиш зарур бўлади.

Бундай мисол ва масалаларни биз юқорида кўрсатиб ўтдик, шу каби масалаларни ечиш учун математик усуллардан фойдаланиш зарурлигини ҳам кўрсатдик. Умуман олганда оптималлаштириш масалалари, уларнинг назарияси,

ешиш усуллари анча мураккаб бўлиб, уларга бир неча юзлаб, минглаб адабиётлар, машина усуллари яратилган. Биз бу ерда оптималлаштириш масалаларини ечишга иложи борича соддароқ ёндашишни кўрсатганмиз. Оптимал ечими қилираётган масалаларни тегишли математик усул ёрдамида аниқлаш учун масалани математик кўринишга, боғланиш ёки ифодаларга, яъни математик моделга келтириш зарур. Албатта, математик модел қанчалик масала моҳиятини тўлиқ ифодалай олса, шунча аниқ ва тўғри ечимга эга бўлиш мумкин.

Масалани математик модел кўринишида ифодалаш анча масъулиятни, билимни ва қунтни талаб этади. Математик модел қўйидаги амаллар асосида ташкил қилинади:

Масаланинг моҳиятини, шарт-шароитларини, унга қўйилаётган талаб ва мақсадларни ўрганиш ҳамда оптималлаштириш foясига мослаштириш зарур бўлади. Қандай мезон ва ўзгарувчи-номаълумлар орқали масала моҳиятини ифодалаш мумкинлиги аниқланади.


55. Оптималлаштириш масаласининг математик модели

Халқ хўжалиги оптималлаштириш масалаларининг қўйилиши ва ечими асосан математик усулларнинг уч босқичида амалга оширилади (17-расм).

- масаланинг қўйилиши;
- масаланинг ечими;
- масаланинг ечимини қабул қилиш.

Масаланинг қўйилиш босқичи қўйидагилардан ташкил топади:

а) самарадорлик мезонини танлаш — M ;



17-расм.

- б) ечимларнинг чегаравий соҳасини аниқлаши — *II*;
- в) масалани шакллантириш — *III*.

Масаланинг самарадорлик мезонини танлаш

Математик моделни яратишдан аввал оптимальлик мезонини аниқлаш лозим (сифат ёки иқтисод кўрсаткичи, мақсад функцияси), бунда сон ечимнинг оптималлаштириш мезонини аниқлайди. Мақсад функциясини танлаш масъулиятли босқичлардан бири бўлиб, хўжалик иқтисодий фаолиятини реал баҳолаш ва масаланинг ечимини қатъий белгилашдан иборатдир. Мезонни нотўғри танлани, танлаш натижалари ноаниқ ва ҳатто нотўғри натижаларга олиб келади.

Самарадорлик мезонини танлаш жараёнида қўйидаги талабларга жавоб бериш лозим:

- оптималлаштириш мезонига сонлар ифодасини қўйиш лозим ва уни математик кўринишида келтириш лозим;

- оптималлаштириш мезони мустақил номаълум ўзгарувчилар орқали ифодаланиши керак;

- оптималлаштириш мезони умумий ҳолда битта катталик кўрсаткичи орқали ифодаланиши лозим;

- агар масала бир нечта бўлиши мумкин бўлган мезонлардан иборат бўлса, у ҳолда асосий кўрсаткичини танлаш лозим. Агар бундай бўлиши мумкин бўлмаса, у ҳолда кўп мақсадли-векторли оптималлаштириш масаласини ечиш лозим;

- танлаш жараёнида фақат биргина ташкилотнинг қизиқишини эмас, балки бутун халқ хўжалигини ҳисобга олиш лозим.

Самарадорлик мезонлари қўйидагилар булиши мумкин:

- маҳсулотни ишлаб чиқариш ва реализация ҳисобига келган фойда;

- аниқ бир ҳисобга келиб тушган даромад;

- ишлаб чиқариш рентабеллиги;

- меҳнат самарадорлиги;


- моддий харажатлар;

- меҳнат харажатлари;

- капитал құйилмалар;
- капитал құйилмаларнинг үзини оқлаш муддати; транспорт, ишлаб чиқариш харажатлари ва б.к.

56. Масаланинг математик моделини анықлаш

Масаланинг асосий мақсади унинг мазмунини ифодалайдын мезони ва масалага құйиладын шарт-шароитларни (18-расм), номағымлар ва уларнинг чегара шартларини анықлаш булиб, бу масалани математик моделлаштиришга киради.



18-расм.

Математик моделлаштириш. Масала мөхиятини ифодаловчи мақсад да имкониятларнинг математик ифодасини яратыш **математик моделлаштириш** демекдир. Үрганила-ётган масалада иқтисодий мезон, харажат $C(x)$, меңнат сарфи $M(x)$, ютуқ $P(x)$, фойда $\Phi(x)$ ёки даромадлар каби күрсаткичлар **масала мезони**, унинг эстремал (max, min) қийматини анықлаш унинг **мақсади** деб юртилади ва у қуйидагича белгиланади:

$C(x) = \min$, — иқтисод,

$D(x) = \max$, — даромад.

Аммо экстремал қийматга эришиш қийин, чунки реал ҳаёт, имконият ва шароит чегараланган бүлгани учун ма-салага қўйилган чегара шартлари тенглик ва тенгсизлик каби кўринишда киритилади, масалан:

$$\left| \begin{array}{l} \sum a_i x + b_1 \geq C_1, \\ \sum a_i x + b_2 \geq C_2, \\ x \geq O \end{array} \right| x \in \Omega \quad (1)$$

бу ерда a, b, c — берилган коэффициентлар, x — номаъ-лум, аниқланиши шарт бўлган ўзгарувчи.

Бу чегара шартлари масаланинг мавжуд доирасини, соҳасини (тўпламини) билдиради. Шунинг учун мақсад функциясининг аниқ ечилиши қўйидагича бўлади:

$$\begin{aligned} C(x) &= \min, D(x) = \max, -\text{даромад}, \\ \sum a_i x + b_i &> \sum c_i \quad x \in \Omega \end{aligned} \quad (2)$$

Бу деган сўз $C(x), D(x)$ нинг энг кичик ёки энг катта қийматини x чегара ичидаги топилсан, деб тушунилади. Шундай математик моделларга келтирилиши мумкин бўлган масалалар *математик дастурлаш масаласи* деб юри-тилади.

Ечиш усулини танлаш. Масаланинг хилига, мураккаблигига қараб ечиш усули белгиланади. Масала қўйида-ги (19-расм) хилларга бўлиниши мумкин:

Масала хилига қараб шунга мос усувлар танланади.
Масалан:

1-хил масалага — чизиқли математик дастурлаш усули (симплекс, Жордан ва ҳ.к.)

2-хил масалага — ночизиқли математик даструли (Нью-тон, кесиш усувлари ва ҳ.к.)

3-хил масалага — яхлит математик дастурлаш усувлари,

ОПТИМАЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ



19-расм

4-хил масалага — түр ёки динамик усуллар

5-хил масалага — қиди्रувчи, эҳтимолий мақбуллаштириш усуллари,

6-хил масалага — ўйнсимон қидирувчи усуллар,

7-хил масалага — хусусий, эврикаий усуллар.

Масалани ечиш. Масала хилига қараб ва танланган усулдан фойдаланиб натижа олиш мумкин. Шуни айтиш зарурки, бир кўринишда содда туюлган оптималлаштириш масалаларининг номаълумлар сони 1, 2, 3 ва 4 бўлганида уларнинг ҳисобини қўлда график ёки ҳисоблаш орқали ечиш мумкин, ундан кўп бўлса электрон ҳисоблаш машинасида (ЭҲМ) ҳисобланади. Ҳар бир ҳисоблаш машинасида юқорида қайд қилинган усуллар бор, улардан кенг фойдаланилса бўлади. Бунинг учун киритилувчи қийматахборотни билиб машинага киритилса бас. Машинада энг мақбул ечимни қисқа вақтда (аксарият 10 минутдан кам вақтда) олса бўлади. Шунга эътибор бериш лозимки, чегара шартларини ўзгартириб мақбул ечимни у ёки бу кўринишда ўзгартириш мумкин.

Ечим қабул қилиш. Баъзида масаланинг ечими математик шартларни қаноатлантириса-да, аммо масала моҳиятига мос келмаслиги мумкин. Бу ҳолда масала моделига аниқлик киритиш лозим бўлади. Масалан маҳсулот чиқазинш ёки мақбул миқдорда техника ёки инсонни жалб қилишдаги ечимни аниқлаш жараённида ечим $x=13,7$ каби касрли сон чиқиши ёки $x=-7,2$ каби манфий ечим чиқиши мумкин. Маълумки, маҳсулот, мисол учун консерва, техника ва одамлар сони фақат яхлит сонлар орқали, мусбат қийматга эга бўлади. Касрли ечим ёки манфий ечим ҳолатларига тушмаслик учун масала ечими чуқур таҳлил қилинади, лозим бўлса масала моделига ($x \geq 0$) аниқлик киритилади.

Юқоридаги изоҳни тушунтириш мақсадида бир рус эртагидан мисол келтирамиз. Масалани ўрганиши: қишлоқда яшовчи кампир керак нарсаларни сотиб олиш мақсадида қишлоқ марказидаги бозорга отланди. Сотиб олиш учун пул топиш ниятида уйидаги ўрдак, фоз ва товуқ сотишни мўлжаллади, шунда қанча ўрдак, фоз ва товуқ сотишни ўйлаб қолди. Асли мақсад бир марказга борганда кўп нарса олиб келиш эди, демак кўп пул керак. Афсуски кампир кўтариши мумкин бўлган қушларнинг умумий оғирлиги P чегараланган. Кўп пуллик бўлиш учун қайси қушлардан кўпроқ олиш керак.

Масала моҳиятини моделлаштириш.

Қизифи шундаки фоз энг қиммат, ундан катта пул ишлаш мумкин, аммо бошқаларига нисбатан оғир. Хўш нима қилиш керак? Фоз, ўрдак ва товуқ сонларини шундай аниқлаш керакки, кампир уларни кўтариб бориб бозорда энг катта пулга сотиш имконига эга бўлсин.

Математик моделлаштириш. Аввало масалани математик ифода орқали белгилаймиз. Сотиш орқали келадиган пул қушларнинг ҳар бирини сотиш баҳоси C_1 — фоз, C_2 — ўрдак, C_3 — товуқ учун бўлса ва мос равишда x_1 — фоз, x_2 — ўрдак, x_3 — товуқ сотилса, бунда умумий даромад энг кўп бўлиши ифодаси:

$$C = C_1x_1 + C_2x_2 + C_3x_3 \rightarrow \max. \quad (3)$$

Айттанимиздек, қушларнинг умумий оғирлиги P ни уларнинг ҳар бирининг ўртача оғирлиги — P_i орқали топиш мумкин, яъни

$$P_1x_1 + P_2x_2 + P_3x_3, \quad P = \sum P_i x_i. \quad (4)$$

Демак, уларнинг оғирлиги P га тенг ёки кичик бўлиши керак.

Масала математик моделининг умумий кўриниши

$$C = \sum_{i=1}^3 C_i x_i \rightarrow \max x \in \Omega, \quad (5)$$

$$\sum_{i=1}^3 P_i x_i < P \quad (6)$$

Ечиш усули. Ўрганилаётган масала детерминик (чунки x -ҳақиқий сон), чизиқли математик дастурли масаладир (x -даражаси бирга тенг бўлгани учун). Бу мисолни қўлда ҳам, машинада ҳам ечса бўлади.

Экстремал ечимли масалаларни ечиш усули.

Бу хил масала математиканинг экстремал функциялар масалаларига кириб, уларнинг ечими классик йўллар билан топилади.

Бунинг учун энг содда мақбуллаштириш усулини кўриб чиқайлик. Бу ҳам бўлса, мезоннинг математик ифодаси баъзи бир талабларга мос бўлса, у ҳолда уларни ечиш ҳосила орқали осон топилади.

Агарда мезон $y(x)$ узлуксиз функция бўлиб, дифференциаллаш хусусиятига эга бўлса бу мезоннинг экстремал (\max, \min) ечими бор. Бунинг учун шу функциядан ўзгарувчилар бўйича ҳосилалар олиб уни

$$\frac{dy}{dx} = 0, \quad (7)$$

нолга tengлаш асосида экстремал ечим x^* топилади. Агарда мезон функциянинг иккинчи ҳосиласи $\frac{dy}{dx} > 0$ бўлса, унда

мезон $y_{\max}(x^*)$ экстремал ечим максимум қийматини, $\frac{dy}{dx} < 0$ бўлса, унда мезон $y_{\min}(x^*)$, минимум қийматин беради.

Мисол. Масала мезони қуидаги кўринишга эга

$$y = x^2 + (x - 1)^2$$

бўлган масаладаги номаълум x нинг чегараси $x > 0$ деб беришган, у ҳолда биринчи ҳосила

$$\frac{dy}{dx} = 2x + 2(x - 1) = 0,$$

бу сурʼан $X = \frac{1}{2}$ натижага келинади. Иккинчи ҳосила

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 2 + 2 = 4 > 0. \quad (8)$$

Демак, ҳосила ёрдамида топилган $x = 1/2$ қиймат $y(x)$ функцияниңг энг кичик миқдорини аниқлайди.

Биз юқорида айтганимиздек, оптимальлаштириш масаласининг аксарият чегара шарти математик модел орқали ифодаланади. Бундай ҳолларда ҳосила олиш усулини қўллаш қуидагича олиб борилиши керак. Тушуниш осон бўлиши учун мисол келтирамиз.

Масаланинг математик модели:

$$y(x) = x_1x_2 + x_2x_3 \min, \quad (9)$$

чегара шартлари

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 - 2 &= 0, \\ x_2 + x_3 - 2 &= 0. \end{aligned}$$

кўринишга эга. Бу ҳолда Лагранж усулини қўллаб чегара шартларини функцияга қўшиб ёзамиш, у ҳолда

$$y(x) = x_1x_2 + x_2x_3 + \lambda_1(x_1 + x_2 - 2) + \lambda_2(x_2 + x_3 - 2)$$

Ҳар бир номаълум x_i бўйича ҳосила олиб нолга тенлаштирасак:

$$\begin{array}{ll} x_1 + 11 = 0, & x_2 + 12 = 0 \\ x_1 + x_3 + 11 + 12 = 0 & x_1 + x_2 - 2 = 0 \\ & x_2 + x_3 - 2 = 0 \end{array}$$

тенгликларни оламиз.

Агарда шу тенгламалардан $11=-x_1$, $12=-x_2$ бўлишини ҳисобга олсак,

$$\begin{aligned}x_1 + x_2 - 2x_3 &= 0, \\x_1 + x_2 - 2 &= 0, \\x_2 + x_3 - 2 &= 0;\end{aligned}$$

бу тенгламалар ечими $x_1 = x_2 = x_3 = 1$ бўлади, функцияниң энг кичик миқдори $y_{\min}(x) = 2$ эканлигини кўрамиз, чунки $d^2y/dx^2 > 0$.

57. Оптималлаштиришниң математик усуллари

Ўқув қўлланманинг мақсадига математик иборалар назарияси ва оптималлаштириш усулларини батафсил келтириш кирмайди, чунки бу мавзуга оид оптималлаштириш усуллари ва моделларининг моҳияти ҳақида ёзилган китоблар, дарсликлар ва бошқа кўп мақолалар [1—9] бор.

Халқ хўжалигининг бошқарув таркибига мўлжалланган қўлланмани эътиборга олган ҳолда, мана шу қисмда мундарижа ва қатор математик усулларнинг оптималлаштириш режаси келтирилган. Ўқувчи тавсия этилаётган адабиётдан фойдаланиш мобайнида режалаштиришнинг ва бошқарувнинг иқтисодий масаласини ечиш учун назарияниң чукурлаштирилган билими ва математика усуллари тўғрисида ахборот олини мумкин.

Оптимал режалаштириш, лойиҳалаштириш ва бошқарув масалаларини ечиш босқичларида ҳар хил математик усуллар, услублар ва ёндашувлардан фойдаланилади. Масалан, математик дастурлаш усулига ҳисоблаш характеристи бўйича динамик дастурлаш, функциявий жиҳатдан эса оптималлаштиришнинг динамик масаласи киритилган бўлиши мумкин.

Аниқ бир масалани ечиш учун тегишли усулни таилаш ва қўллан жараёнида бошқарувчи ишлаб чиқариш жараёнидаги оптималлаштириш масалаларини ечиш жараёнида бажариладиган усул тўғрисида тўлиқ ахборотга ва ўша ҳисоблаш моҳияти ҳақида тўлиқ билимга эга бўлмаслиги мумкин. Шунинг учун оптималлаштириш усуллари кири-

түлгән машхур «Қора қути» атамасыга асосланамыз. «Қора қути» имкониятларынан мурожаат қилиш учун упин көркемли усул коди ва маълумотларни киритиш шакини билиш зарур.

Умуман олганда, «Қора қути» — бу ЭХМ нинг математик таъминотчисидир. ЭХМ нинг математик таъминлаш рўйхатига стандарт дастурлаш (мисол учун: ҳар хил функцияларни ҳисоблаш, тенгламалар системасини ечиш ва ҳакозо)дан ташқари оптималлаштириши масалаларини ечиш учун дастурлар (мисол учун: симплекс усули, транспорт масаласи ва бошқалар) мавжуд.

58. Чизиқли математик дастурлаш усули

Чизиқли математик дастурлаш усули масала (мақсад функцияси, тенглик ва тенгсизликлар) чизиқли, яъни X нинг даражаси 1 га тенг бўлса қўлланилади ва улар бир неча хилдир. Булардан энг содда ва кеңг қўлланиладигани *Симплекс усулидир*.

Симплекс усулининг моҳияти ва алгоритмини тушуниш осон бўлсин учун уни мисол асосида тушунтирилади. Мисолга қўйилган талаб: чизиқли функциянинг аргументлари x_1, x_2 ларнинг шундай қиймати топилсинки, функция энг катта (кичик) бўлсин. Агарда биз x ларнинг ҳар бирининг мумкин бўлган ечимларини ўргана бошласак, қидирилаётган ечимни тоини жуда ҳам мураккабланиб кетади. Тез ҳисоблайдиган машина ҳам қийналиб, кўп вақт кетказади. Шунинг учун мақсадли усуллардан фойдаланилади.

Мисол. Қўйидаги функциянинг энг катта миқдори топилсин:

$$y(x) = 3x_1 + 2x_2 \quad \max y(x). \quad (1)$$

Шу билан бирга қўйидаги чегара, яъни чегаравий шарт инобатга олинсин:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 6, \\ x_1 + 2x_2 &\leq 8, \quad x > 0. \end{aligned}$$

Симплекс усул машина боп усул бўлиб масалани счишда қўйидаги алгоритмга эга:

Биринчи қадам. Симплекс усулиниң хусусияти бу тенгизликларни тенглама кўринишига келтиришdir. Масалан юқоридаги тенгизликлар қўйидаги кўринишда ёзилади:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + U_1 &= 6, \\ x_1 + 2x_2 + U_2 &= 8, \\ U_1 &> 0. \end{aligned}$$

Иккинчи қадам. Номаълумларни топишни соддалаштириш мақсадида номаълумларга бошланғич миқдор берилади, масалан $x_1 = 0$, $x_2 = 0$. У ҳолда

$$U_1 = 6, \quad U_2 = 8.$$

Учинчи қадам. Киритилган номаълум U_i лар ҳақиқий номаълумлар ёки базис номаълумлар орқали ифодаланади:

$$\begin{aligned} U_1 &= 6 - 2x_1 - x_2, \\ U_2 &= 8 - x_1 - 2x_2. \end{aligned}$$

Тўртинчи қадам. Ҳар бир базис номаълумнинг функцияга таъсирчанлигини максималлаштириш учун x_1 нинг энг катта қиймати $x_1 = 3$; у ҳолда

$$\Phi(x_1 = 3, x_2 = 0) = 9, \quad x_2 = Y, \quad \text{у ҳолда } \Phi(x_1 = 0, x_2 = 4) = 8$$

Демак, ҳозирги қадамда энг яхши ечим

$$x_1 = 3; \quad x_2 = 0, \quad U_1 = 0, \quad U_2 = 5, \quad \Phi(x) = 9.$$

Энди, учинчи қадамни қайтарамиз ва U_1 ни базис деб қабул қиласиз, у ҳолда

$$\begin{aligned} x_1 &= 3 - (1/2)x_2 - U_1 \\ x_2 &= 8 - (3 - (1/2)x_2 - (1/2)U_1) - 2x_2 = 5 - (3/2)x_2 + (1/2)U_1, \\ \Phi &= 3(3 - (1/2)x_2 - (1/2)U_1) + 2X_2 = 9 + (1/2)x_2 - (3/2)S_1. \end{aligned}$$

Бешинчи қадам. Тўртинчи қадамни қайтарамиз, яъни бошқа нуқтага ўтамиш, у ҳолда $x_1 < (10/3)$, чунки $x_2 > (10/3)$ бўлганда $U_1 = 0$ бўлади. Ечим топилди.

59. График усул

Агарда ечилаётган чизиқли дастурлашга доир масала үч ва ундан кам номаълум (x_1, x_2, x_3) лардан иборат бўлса, бундай масалани график усулда осон ечиш мумкин.

График усулни биз юқоридаги баъзи мисолларни (18-расм) ечишда қўллаган эдик. Куйида биз унинг моҳиятини таҳдил қиласиз.


Масалан, чизиқли дастурлаш масаласи қуйидаги математик моделга эга бўлсин.

$$\begin{aligned} z &= G_1 x_1 + G_2 x_2 - \max(\min), \\ a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &\leq B_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &\leq B_2. \end{aligned} \quad (3)$$

У ҳолда тенгсизликларнинг тенгламалари бўйича графикаларини аниқлаймиз. Бунда, тенгсизлик ифодасини чегара чизиқлари орқали белгилаймиз. Шунда Ω -юза масаланинг ечимиға доир юза бўлиб, бу юзани мумкин бўлган ечимлар юзаси деб юритилади (20-расм).

Биз мақсад мезонини, яъни z функцияниң энг эстримал ечимини қидираётган бўлсак, унинг қиймати аксарият шу юзанинг чегарасида бўлади ва унинг қиймати қуйидаги иккита тенглама

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 &= B_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 &= B_2 \end{aligned} \quad (4)$$



20-расм.


ни сиб топилади. Бу тенгламалардан x_1, x_2 номаълумларнини миқдорини аниқтаймиз. Мана шу $F(x_1^*, x_2^*)$ нүкта масала ечи-мидир. Бу деган сүз x_1^*, x_2^* миқдорда функция $z(x_1^*, x_2^*)$ экст-ремал ечимга әгадир.

График усулдан фойдаланиб масалани ечиш учун берилган тенгсизликтарни тенгликлар сифатига келтирилиб ҳар бир тенгламанинг график ифодаси қурилади. Бунинг эң осон күриниши ҳар бир тенгламада аввал $x_1=0$ деб, x_2 миқдор аниқланади ва x үқига қўйилади. Сўнг $x_2=0$ деб қабул қилиб x_1 миқдори аниқланади ва тегишли x үқига қўйилади.

Бу топилган нүкталар орқали чизик ўтказилиб тенглик-нинг, тенгсизликнинг график ифодаси деб қабул қилинади.

Умумий ўринишида тенгсизлик тенгламалар бир нечта булиши мумкин, бу ҳолда расмда кўрсатилгандек 1, 2, 3, 4, 5 тенгсизлик ва тенгламалар ўз графикига эга булиши керак (21-расм).

Бундай ҳолларда мантиқан таҳлил қилиш асосида масалани соддалаштиришида фойдаланиладиган тенгламалар сонини аниқлаш лозим. Агарда мезон функция z нинг тах-



21-расм.

Қиймати топилса x_1 ва x_2 ларнинг катта қийматларини аниқлайдиган тенгламалар, аксинча ζ_{\min} га деса x_1 ва x_2 лар нинг кичик миқдорларини белгилайдиган тенгламаларни танлаш керак. Ноаниқроқ бўлса, ҳар бир F_1, F_2, \dots, F_s нуқтадарни топиш керак бўлади, бунинг учун z_1, z_2, \dots, z_s ни ҳам ҳисоблаш ва уларни таққослаб, энг яхши ечим қабул қилиниши мумкин. Усул тушунарли бўлини учун талабанинг ошхонада овқатланишига доир мисолни жадвал бўйича кўриб чиқамиз.

50-жадва 1


Таом		
Биринчи хил	Иккинчи хил	
Нархи $C_1=30$ сўм	Нархи $C_2=20$ сўм	Норма
Тўйимли моддалар миқдори		
$B_1 \dots 2$	$B_1 \dots 1$	4
$B_2 \dots 0$	$B_2 \dots 3$	6
$B_3 \dots 1$	$B_3 \dots 3$	9
$B_4 \dots 3$	$B_4 \dots 2$	6

Маълумки, ёш йигит ўз соғлигини ва иш қобилиятини сақлаб юриши учун бир суткада камида 4 бирликда B_1 , 6 бирликда B_2 , 9 бирликда B_3 ва 6 бирликда B_4 озуқа моддалари бўлган таом истеъмол қилиши керак.

Ошхонада талаба кўнглига тўғри келадиган 2 хил таом бор ва уларнинг нархи C_1 ва C_2 озуқалар миқдори жадвалда кўрсатилган.

Масаланинг шарти — талабанинг истеъмол қиласидан овқатида энг зарур моддалар кераклигича бўлса-ю, аммо нархи ҳам энг арzon бўлса. Бу масаланинг математик модели, юқоридаги жадвалда берилган рақамларга кўра (22-расем):

Графикнинг кўринишига қараганда 3 та яхши ечим бор экан, шуларнинг ҳар бири қуйидаги нархли овқатни белгилайди:



Нүқта $B(3,2)$, $C = 130$ сүм,
 $A(1,2)$, $C = C_2 = 70$ сүм.

Күриниб турибдики, энг яхши ечим A нүктада бўлиб чиқди.

60. Бутун сонли (дискрет) дастурлаш

Иқтисодиётни режалаштириш, машина ва биноларни лойиҳалаштириш, ишлаб чиқаришни бошқариш ва ташкия қилишдаги кўплаб масалалар асосан дискрет элементлар тўпламидан энг яхши қийматлар билан солиширилади.

Амалиётда ўзгарувчи дискретлик талабига эга бўлган тақвим режалаштиришни, жадвал назариясини, оптималь лойиҳалаштиришини жойлаштиришдаги масалалар кўп учрайди.

Объектнинг бўлинмаслиги масалан, станоклар, транспортлар сони ва бошқа ўзгарувчининг бутун сон бўлиши шарти ҳисобланади.

Бутун сонли дастурлаш усуллари ёрдамида бутун сонли оптималлаштириш масалаларини ечиш математик дастурлашнинг қийин вазифаларидан биридир. Дискрет, бутун сонли ва комбинаторлик дастурлашнинг шундай

усуллари мавжудки, улар иқтисодиётнинг шундай спектифик масалаларини ечишга ёрдам беради.

Бутун сонли дастурлашда бутун сонли чизиқди тенгламалар қўйидагича кўринишда бўлади:

$$\Phi(x) = \sum C_i X_i \rightarrow \min(\max) \Phi(x^*). \quad (1)$$

Бунда қўйидаги шартлар бажарилади:

$$\sum a_{ij} x_j \leq b_i, \quad x_j \leq 0, \quad x \in X, \quad x - \text{бутун}. \quad (2)$$

Бу ерда $\in X$ бунда x ларнинг ҳар бири дискрет қиймат қабул қилиши мумкин деб ҳисобланади.

Р. Томари, Дж. Данцига ва бошқалар томонидан ишлаб чиқилган усуллар маълум мураккабликдаги дискрет дастурлаш масалаларини ечиш имконини беради.

Бу ерда чизиқди дастурлаш билимлари асосида Дж. Данциганинг бутун сонли дастурлаштиришнинг содда алгоритми келтирилган. Бунда ўзгарувчининг бутун сон бўлишлиги шарти инобатга олинмайди ва оддий чизиқди масала сифатида мавжуд усуллар ёрдамида ечилади. Биринчи қадамдан сўнг бутун сон бўлмаган қиймат олинса, унда масалага қўйилган бошланғич чизиқди чеклашларга қўшимча янги чизиқди тенгламалар киритилади. У қўйидаги тахминлардан келиб чиққан ҳолда шаклланади: олинган бутун сон бўлмаган қиймат янги қўшимча тенгламани қаноатлантирумаслиги керак ва ҳар қандай бутун сон эса қаноатлантириши керак. Сўнг бу жараён янги масала учун яна қайтарилади ва бутун сонлик бўйича яна текширилади. Ҳар сафар янги чизиқди дискретлик чеклашларини киритиш жараёни Q бутун сонлилик шартини қаноатлантирувчи оптимал режа олинмагунча қайтарилаверади.

Дискрет дастурлаш масалаларини бу усулда ечиш амалиёти шуни кўрсатдики, охирги қадамларга бориб қўшимча чеклашлар киритиш жараёни ҳам якунланади.

Бутун сонли дастурлаш масаласининг ечилишини кўриб чиқамиз.

Майдони 38 кв.м. бўлган янги ишлаб чиқарини участкасига икки типдаги янги жиҳозлар олиш учун 20000 сўм

ажратилди. А типдаги жиҳоз $C_1=5000$ сүм туради, $\Gamma_1=8$ кв.м. жойни эгаллайди ва ҳар сменада $\Pi_1=7000$ дона маҳсулот ишлаб чиқаради. В типдаги маҳсулот эса мос равишида $C_2=2000$ сүм, $\Gamma_2=4$ кв.м., ва $\Pi_2=3000$ дона.

Ҳар бир жиҳознинг шундай оптимал сонини топиш керакки, майдондан фойдаланиш самарадорлиги энг юқори (максимум) бўлсин.

Масаланинг математик модели қуидаги кўринишга эга:

Функцияни максимизациялаш

$$\Phi(x) = \sum_{i=1}^2 \Pi_i = 7x_1 + 3x_2. \quad (3)$$

Бунда

$$\begin{aligned} 5x_1 + 2x_2 &\leq 20, \\ 8x_1 + 4x_2 &\leq 38, \end{aligned}$$

бутун x_i .

Масала биринчи навбатда бутун сонлилик шартисиз ечилади. Қўшимча ўзгарувчи кўринишида x_3 ва x_4 тенгсизлик қуидагича бўлади:

$$\begin{aligned} 5x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 20, \\ 8x_1 + 4x_2 + x_4 &\leq 38. \end{aligned}$$

Симплекс усулини қўллаш қуидаги дастлабки оптимал режани беради:

$$\Phi(x) = \sum \Pi = 29.5 \text{ минг дона.}$$

$$x_1 + 1 = 1; \quad x_2 = 7,5; \quad x_3 = 1; \quad x_4 = 0,25.$$

Бутун сонлилик шартини қаноатлантириш учун қўшимча тенглама киритилади:

$$7,5 = x_2 + 0,25 x_4$$

ёки

$$x_2 = 7,5 - 0,25 x_4.$$

Бу тенглама масаланинг бутун сонли ечимиға ҳам тўғри келади, чунки киритилаётган x_2 ва x_4 — бутун сон бўлса, унда охирги тенгламанинг ўнг қисмидаги ифода бутун бўлади, яъни $0,25x_4 = 0,5; 1,5, 2,5, \dots$

Энди янги чеклашларни ҳисобга олсак,

$$\begin{aligned}5x_1 + 2x_2 + x_3 &\leq 20, \\8x_1 + 4x_2 + x_4 &\leq 38, \\0.25x_4 &= 0.5.\end{aligned}$$

Симплекс усулида ечишини давом эттириб, янги оптималь режани оламиз:

$$x_1 = 2; x_2 = 5; x_4 = 2.$$

Шундай қилиб, $\Phi(x) = \sum P = 29,0$ минг дона самарадорликка эга бўлган оптималь бутун сонли ечимни топдик.

61. Чизиқли бўлмаган дастурлаш усуллари

Режалаштириши ва лойиҳалаштиришида масала ҳар доим ҳам чизиқли бўлавермайди. Чизиқли дастурланида мақсал функцияси ва қўйилган чекланлар албатта чизиқли бўлиши шарт. Масалаларда ҳам агар мақсал функция ва ҳатто-ки, чеклашлар ҳам чизиқсиз бўлса, уларни ечишда чизиқли бўлмаган математик дастурлаш усуллари қўлланилади. Бундай усуллардан фойдаланиш халқ хўжалиги иқтисодиётидаги масалалар қўламини кенгайтиради. Мақсад функцияси — фойданинг максимумини таъминлайди. У капитал харажатлари, таннархнинг минимумлиги, ўзга-рувчан харажатлар сифатида эса ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ҳажми бўлиши мумкин. Баъзида бундай масалаларни ечишда чизиқли дастурлаш усулларини ҳам қўллаш мумкин. Лекин баъзи бир масалаларда фойда, капитал харажатлар таннарх маҳсулот бирлиги олинганда ўзгармас ва ишлаб чиқариш қисмига bogliq bўlmайди, деб фараз қилишига тўғри келади.

Ҳақиқатдан ҳам, маҳсулот бирлигига тўғри келадиган харажатлар ишлаб чиқаришнинг турли ҳажмида турлича бўлади. Қоидага кўра, маҳсулот ҳажмини ошириш унинг таннархнинг пасайишнiga олиб келади. Режалаштириши масалаларида бундай омилларнинг ҳисобга олиниши мақсад функциясининг чизиқли бўлмаслигига олиб келади.

Шуни қайд қилиб ўтиш керакки, чизиқли дастурлашда универсал ва самарадор усуллар мавжуд бўлса, чизиқли бўлмаган дастурлашда бундай усуллар мавжуд эмас. Чизиқли бўлмаган дастурлашда мавжуд усулларини мақсал функция ва масала чеклашиларининг маълум бир шаронтида ёки тахминларида ишлатиш мумкин.

Шунинг учун чизиқли бўлмаган дастурлаш усули билан ечиладиган баъзи масалаларни кўриб чиқамиз.

Нуқталар тўплами қавариқ дейилади, қачонки AB кесма шу тўпламга тегишли бўлса, масалан, шар, куб қавариқ бўлган сферик ҳажмлар шу тўпламга киради. Шу билан бирга функция қавариқ ва ботиқ бўлиши мумкин. *Ботиқ функция* деб, шундай чизиқقا айтиладики, унинг икки нуқтасини бирлаштируви ихтиёрий кесма графиги эгри чизиқдан пастда жойлашади.

Масалани ечиш учун фунциянинг характеристини ва муҳитини билиш катта аҳамиятга эга. Агар локал оптимумларининг мавжудлиги масала ечимини қийинлаштираса, масаланинг охирги ечимини топишда локал оптимумлардан бирортасини танлаш зарурати туғилади, қавариқни қаноатлантирувчи ечимлар тўплами ва чизиқли чеклашлар қавариқ кўпбурчак ҳосил қилди.

Чизиқли бўлмаган оптималлаштириш масалаларини ечиша қавариқ дастурлаш усули, градиент усули, квадратик дастурлаш ва бошқа усуллар мавжуд. Бир неча усуллар борки, булар чизиқли бўлмаган масалани линеризация қилишда қўлланилади ва бу масалаларни итерациянинг ҳар бир босқичидаги чизиқсизлик тенглаштирилиб, худди чизиқли дастурлани масалалари каби ечилади.

Баъзан, масаланинг келтирилган ечими усулида Q эгри фунциянинг бўлак-чизиқли функция билан апроксимацияси қўлланилади. Чизиқли бўлмаган математик дастурлашнинг энг самарадор усулларидан бири сифатида градиент усулининг мазмунини кўрамиз.

Қуйида умумий кўриниши чизиқли бўлмаган масаланинг математик моделини келтирамиз.

Мисол: Максималлаштириш (минималлаштириш)

$$z = f(x_1, x_2, \dots, x_n). \quad (1)$$

Бунда,

$$\varphi = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq b, \quad x_i \geq 0. \quad (2)$$

Энг түгри ечимни топишда ўрганилаётган түпламдан ихтиёрий A пункт оламиз ва унинг учун $z(x_i)$ ни ҳисоблаймиз. Агар A пунктда бирор бошқа пунктга ўтилса ёки шу масофага ихтиёрий томонга ўтса, унда z функция Dz ҳар хил қийматга ўзгаради. A punktдан тезроқ экстремумга эришиш учун максимум (минимум) томонга z катта ўзгариши бўйича ҳаракатланиши лозим.

Градиент усули ҳар бир ўзгарувчи бўйича $z(x)$ ишлаб чиқилган функциясини қўллашнинг йўлларини қидиришга асосланди. Шуни кўзда тутиш лозимки, ишлаб чиқилган функция эгри чизикқа боғлиқ.

Мисол: Максимумни топиш.

Бунда,

$$z = x_1^2 + 4x_2. \quad (3)$$

Чеклашлар тизимини ўзгартирамиз.

Қидиувни A (2,1) нуқтадан бошлаймиз, яъни у $z=8$, бўлган ечимлар тўпламига тегишли. Ҳар бир ўзгарувчи бўйича ҳосила функцияни аниқлаймиз.

$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = 2x_1; \quad \frac{\partial z}{\partial x_2} = 4. \quad (4)$$

A нуқта учун ҳосила:

$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = 4; \quad \frac{\partial z}{\partial x_2} = 4. \quad (5)$$

Бунда с (4.4).

A нуқталарнинг параллел градиент йўналиши бўйича қадамни ташлаймиз. У қўйидагича кўринишда булиши мумкин:

$$x_1 = 2 + 4t,$$

$$x_2 = 1 - 4t.$$

түннің қиймати (ихтиёрий)ни бериб, қуйидагини ола миз:

$$x_1 = 2,2; \quad x_2 = 1,2.$$

Текшириб күрамиз, $B(2,2; 1,2)$ нүктә керакли мұхитда ётибдими?

$$y = 36 - 4 \cdot 2,2^2 - 9/1,2^2 = 3,68 > 0$$

агар етмаётган бўлса, унда t га бошқа қиймат бериш за-
пур.

B нүктада функционал $z = 9,64$ га тенг.

$A(z=8)$ нүктадан $B(z=9,64)$ нүктага қўчишда функционаллги ошади, яъни бу йўналишни қўллаш мумкин.

B нүкта учун градиентнинг координаталари қуйидагига тенг:

$$\frac{\partial z}{\partial x_1} = 2 \cdot 2,2 = 4,4; \quad \frac{\partial z}{\partial x_2} = 4 \quad (6)$$

бу градиентга параллел тўғри чизиқ тенгламаси:

$$\begin{aligned} x_1 &= 2,2 + 4,4t, \\ x_2 &= 1,2 + 4t. \end{aligned}$$

$t = 0,5$ қийматини сақдаган ҳолда

$$x_1 = 2,42, \quad x_2 = 1,4.$$

$C(2,42; 1,4)$ рухсат этилган ечим ҳудудида аниқланмайди.

$$y = -5,04 < 0.$$

$t = 0,01$ қийматини ўзгартирамиз, у ҳолда рухсат этилган ечим ҳудудида аниқланади:

$$x_1 = 2,244, \quad x_2 = 1,244, \quad z = 10,0,$$

Градиентни аниқлаш бўйича цикл ва тўғри чизиқ z максимал қиймат ҳосил бўлгунча давом этади. z_{\max} га эришиш учун қуйидаги шарт бажарилиши керак:

$$\frac{\partial z}{\partial x_i} = 0. \quad (7)$$

62. Динамик дастурлаш

Кетма-кетлика эга бўлган барча халқ хўжалиги масалалари, яъни вақт ўтиши билан масала шарти ўзгарадиган масалалар динамик масалалар сирасидандир. Бундай масалаларни ечиш учун барча ривожланиш жараёнларининг оптималлигини бутунлай таъминлаб берувчи динамик дастурлаш усуллардан фойдаланилади.

Мисол тариқасида истиқболли режалаштириш масаласини кўриб чиқамиз: 2 та ҳар хил вазифага эга тармоқ бор. Уларни ривожлантириш учун бошлангич даврда k_1 воситалар берилган. Агар биринчи тармоқقا йил давомда x_1 сўм харажат қилинса $F(x_1)$ даромадга эга бўлиш мумкин.

Иккинчи тармоқ эса $\varphi(k_1 - x_1)$ йиллик даромад келтирувчи $x - 1$ воситалар қолади.

Уларнинг йифиндиси қуйидаги даромадни беради:

$$z = f(x_1) + \varphi(k_1 - x_1). \quad (1)$$

Биринчи йил охирига келиб бошлангич воситалар ўзгарили ва k_2 га айланади. k_2 нинг қиймати бошлангич k_1 қийматга боғлиқдир:

$$k_2 = \varphi(k_1 x_1). \quad (2)$$

Кейинги йил бошланишидан олдин воситалар янгидан тақсимлаб чиқилади. Биринчи тармоқقا x_2 сўм йўналтирилса, иккинчи тармоқقا $(k_2 - x_2)$ сўм йўналтирилади. Мос ҳолда умумий даромад қуйидагига teng бўлади:

$$z_2 = f(x_2) + \varphi(k_2 - x_2). \quad (3)$$

Кейинги йил учун воситалар йифиндиси аниқланади:

$$k_3 = \varphi(k_2 x_2). \quad (4)$$

Шунга асосан жараён n хўжалик йили учун, x_n ва $k_n - x_n$ молиявий тармоқлар ҳажмига эга бўламиз ва даромади:

$$z_n = f(x_n) + \varphi(k_n - x_n). \quad (5)$$

Шундай қилиб, бошланғыч ресурслар k_i ва $f\varphi$ φ күришиндеги функцияларга эга бўлиб, воситалар тақсимотини шундай режалаштира оладики, натижада умумий даромадда n йил давомида максимал ҳолатга келади:

$$Z = \sum^n Z \rightarrow \max, \quad (6)$$

агар $0 \leq x_i \leq k_i$ ва бошқалар бўлса, бунда,

$$z = f(x_1) + \varphi(k_1 - x_1) + f(x_2) + \varphi(k_2 - x_2) + \dots + f(x_n) + \varphi(k_n - x_n) \quad (7)$$

Бундай масалаларни ечиш динамик масалаларни ечишнинг предметини ташкил этади. Динамик дастурлаш ғояси шундан иборатки, бунда битта масалани кўпгина қатор кетма-кет ечиладиган ўзгарувчан масалалар билан алмаштирилади.

Кўйида оддий бир мисол келтирамиз:

A шаҳридан (46 «Ўйингоҳга энг яқин йўл», 14-расмга қаранг) *F* шаҳрига 4 та (*B, C, D, E*) оралиқ станцияларидан ўтиш керак. Ҳар пунктдан кейингисига учта йўл (ҳар хил транспортда) ҳар хил ҳаракат давомийлиги ва бир транспортдан бошқасига ўтириш учун кетган вақт билан олиб боради.

Пунктга энг тез олиб борувчи маршрутни аниқлаш талаб этилади. Бу масала учун вариант сони $3^5=243$ га teng.

Динамик дастурлаш услубини қўллаш бу варианtlар сонини қисқартиришга олиб келади. Мисол учун, бу масалага атиги 15 та вариант мавжуд. Бундан ташқари, динамик дастурлашга доир масалалар китобнинг «Ўйингоҳга энг яқин йўл» ҳикоясида келтирилган.

Динамик дастурлаш орқали қўйидаги масалаларни ечиш мумкин:

- капитал қўйилмаларни тақсимлаш;
- тақвимий режалаштириш масаласи;
- ишлаб чиқариш ва созлаш масаласи;
- ишлаб чиқариш варианtlарини танлаш;
- емирилган ускуналарни алмаштиришнинг оптималь режимини ўрнатиш;
- транспорт тармоғи пунктлари орасидан энг қисқа йўлни аниқлаш масалалари ва б.

63. Эҳтимоллик нимадир?

Математик эҳтимоллик — бу маълум воқеанинг содир бўлиш эҳтимоллигининг сонли ифодасидир. «Катта математик энциклопедия» ибораси билан айтганда «Эҳтимоллик деб содир бўлган воқеалар сонининг содир бўлиши мумкин бўлган воқеалар сонига нисбатига айтилади».

Масалан, агарда қутидаги 100 лампочканинг 7 таси йигирма беш ваттли, қолган 93 таси олтмиш ваттли бўлса, у ҳолда қутида аралаш тахланган лампочкалар ичидан йигирма беш ваттлигини чиқариб олиш эҳтимоллиги $7/100=0.07$ га, яъни 7% га тенгdir.

Яна бир мисол: мактабнинг биринчи синф дафтарларида алифбо бўйича 100 ўкувчи рўйхати келтирилган бўлиб, шулардан тенг ярми ўғил ва иккинчи ярми қиз болалар бўлсин. Бу рўйхатдан ихтиёрий 10 фамилия кўчириб олинган дейлик, булар ичida фақат ўғил болалар бўлиш эҳтимоллиги

$$5 \cdot 10/100 = 0,5, \text{ яъни } 50\%$$

ёки танлаб олинган 10 тадан ҳаммаси ўғил (қиз) бўлиш эҳтимоллиги

$$1/210 = 1/1024 = 0,001, \text{ яъни } 0,1\%.$$

Алабатта, синф дафтарида аввал ўғил болалар, сўнг қизлар бўлса бошқа эҳтимоллик чиқади.

Эҳтимоллик назарияси асосида жуда кўп масалаларни ечиш ва истиқболини аниқлаш мумкин.

Масалан: Сирдарё ва Жizzах вилоятларини боғловчи телефон алоқа сими катта дўл-ёмғирда узилиб кетди. Сим «Юлдуз» ва «Оқ олтин» жамоа хўжаликлари устидан ўтган бўлиб узунлиги 12,5 км эди.

Марказдан 2,5 км масофада молхона, яна 6 км нарида товуқхона ва хонадонлар бор.

Масала: сим тортилган узунликнинг қайси қисмини бориб ўрганиш зарур, нимадан бошласа алоқа тез ўрнатилади?

Бунинг учун учта вариант бор:

1. Молхона атрофига бориш, у ердаги эҳтимоллик $P = 2,5/12,5 = 0,2$ ёки 20%

2. Товуқхона атрофига бориш, унда эҳтимоллик $P = 6,0/12,5 = 0,48$ ёки 48%

3. Қолган қисмига бориш, ундаги эҳтимоллик $P = 12,5 - (6 + 2,5)/12,5 = 0,32$, ёки 32%

Албатта симнинг энг узун, аксарият узилиши кўпроқ эҳтимолликка эга қисмига бориш керак, бу ҳам бўлса товуқхона атрофидир, чунки унинг эҳтимоллиги 48% дир.

64. Кўп мезонли масалаларни ечиш усули

Кўп мезонли масалаларга бағишлиланган илмий ишларда бир неча хил усуллар таклиф қиласди, улар маълум мураккабликларга эга [9].

Биз қўйида энг осон, энг тез ечиладиган усулни келтирамиз. Усулнинг номи «Тезкор кўп мезон усулидир».

Ихтиёрий обьектни (бино, иншоот, аппарат, машиналар) лойиҳалаш кўп мезонли оптималлаштириш масалаларига (КОМ) киради. Шу обьект бўйича энг оптималь ечими топишда (VII бобга қ.) ҳар бир мезонга самарали қийматни бера оладиган параметрларни аниқлаш лозим бўлади. Масаланинг бундай категорияси оптималлаштиришнинг векторли масаласи деб аталади ва «Операцияларни тадқиқ қилиш» фанининг тамойили асосида ечилади.

Кўп мезонли масаланинг математик модели умуман қўйидаги кўринишга эга бўлади:

$$x = \Phi^{-1} [optC(x)], x \in \Omega_v \quad (1)$$

бу ерда $C(x)$ – кўп мезонли вектор, яъни $\Phi(C) = \{C_1(x)C_2(x)\dots C_s(x)\}$, $\Phi(C)$ – кўп мезонли функция, x – бошқарувчи, номаълум параметр, Ω – рухсат этилган майдон, яъни чеклов шартлари.

Амалиётдаги кўпмезонли оптималлаштириш масаласини ечишга доир муаммоларнинг туғилиши маълум мураккабликларни келтириб чиқаради. Кўп мезонли масалаларнинг ечими топишдаги ёндашувлар қўйидагилар бўлиши мумкин:

КОМнинг долзарб мезонлари $f(x)$ ни бир функция $\Phi(C)$ га келтириш йўли билан:

$$\Phi(C(x)) = \sum a_i C(x),$$

Мезонларнинг характерли нуқталари бўйича уларни апроқсимация қилиш йўли билан $\Phi(x) = F(C_1(x), C_2(x) \dots C_s(x))$. Бу ерда a – функцияниң пропорционаллик коэффициенти, хусусан биз кўраётган масалада a – аҳамиятлиликлар коэффициенти.


Биринчи ёндашув скаляр-бир мезонли масалага мос тушиб, фанда старли даражада ўрганилган ва бу масала мавжуд усуллар ёрдамида миқдорларни киритиш асосида ечилиши мумкин. Бу ёндошишини ҳамма мезонларнинг ўлчамлари бир хил бўлиб, ўзаро амаллар бажарилиши мумкин бўлган шароитдагина бажариш мумкин.

Иккинчи ёндашув – оптималлаштиришининг векторли масаласини ечиш маълум қийинчиликларга эга. Бу масалада мезонлар турли ўлчамларга, аҳамиятга, бояланишларга эга бўлишлари мумкин ва уларни биринчи ёндашув асосида ҳисоблаб бўлмайди. Бу ёндашувда ҳар бир мезоннинг локал оптимал ечимидан фойдаланилади. Бу ечимлар асосида апроқсимацияловчи кўп мезонли масаланинг умумий функцияси қурилади ва шу функцияниң майдонида оптимал ечим аниқланади.


Кўп мезонли оптимал масалалар ҳам 23-расмда кўрсатилган кетма-кетликда ечилади.

Бундай масаланинг самарали ечимлар юзасини графикда кўриш ва унинг таҳлилини кўрсатиш учун аввал оддий икки мезонли векторли оптималлаштириш масаласини кўриб ўтамиз. Айтайлик, қидирилаётган КОМ ечими ҳар бир мезоннинг алоҳида оптимал ечими бўлган $A(x^*)$, $B(x^*)$ нуқталар орасида ётади. Бошқа самарали нуқталар аҳамиятлилик коэффициентлари ёрдамида топилади. 23-расмда иккита $C_1(x)$ ва $C_2(x)$ функцияларнинг рельефи келтирилган ва уларнинг минимал қийматлари $A(1,5; 1,5)$ да $I_1(x^*)$, $B(2,0; 1,5)$ да $I_2(x^*)$ ларда аниқланади.

Иккала функция эквивалент ($a_1=a_2$) бўлганда КОМнинг оптимал ечими $A \cup B$ келишув эгри чизигида ётади, яъни оптимал ечим $I_3(1,667; 1,5)$ нуқталарда аниқланади.



23-расм.



24-расм.

қисқартириш асосида күйидаги 0,66—2,66 оралиқда ётади. Бұ шунан англатадыки, агар биринчи муаммони ечсек, унда қидирилаётган ечимни самарали ечимлар орасидан топсак бұлади.

Келтирілған мисолларда ҳар бир оптимальлаштириш мезонининг экстремал қиймати жойлашған нүкталар асосида апроксимациялаш методи билан самарали Паретто юзасини анықташ әрдамида күп мезонли оптималь масаланинг ечими $A(X)$ ни топиш мүмкінligини күрдік. Бу тоғыннан математик ифодасини күрса-тиш учун қуйидаги таҳлилни келтирамиз.

Агар бир неча мезонли қолни күриб үтадиган бұлсак, шуны күрсатын мүмкінкі, локал минимал қийматлар келишув ечимлар майдонининг че-гаравий нүкталари ҳисобланади.

Түрт мезонли масала-да қидирилаётган ечим A_1, A_2, A_3, A_4 нүкталар (24-расм) ичіда бұлади, агар шу майдонни янада қис-қартирилса, ечим B_1, B_2, B_3, B_4 нүкталардан таш-қарига чиқмайды. Бу майдон ечим қидирилаётган Паретто юзаси Ω_n ҳисобланади.

Күриниб турибиди, самарали ечимлар майдо-нини секин аста қисқартириш ва шу асосда керак-ти ечимни тезда топиш мүмкін. Күрилаётган ми-солда қидирилаётган ечим аввал 0,2—3,0 оралиқда бұлған бұлса, кейинчалик

Кўп мезонли оптималлаштириш масаласини ечиш учун x ўзгарувчининг C , векторга таъсир қилиш даражасини ҳисобга олган ечимни аниқлашда апроксимация усулини [9] кўриб чиқамиз. Бу усул жуда сермашаққат ва аҳамиятли босқич ҳисобланган Парето юзасини қуришга ёрдам беради.

Қидирилаётган ечим берилган мезонлар ичидаги самарали Парето ечими ҳисобланади ва келишув ечимлар соҳасидан топилиши мумкин.

Паретто юзасини $\Phi(x^*)$ мезонларнинг локал оптимал ечимлари асосида қуриб, бу юзачадан кўп мезонли масаланинг оптимал ечимини қўйидаги шарт [9] асосида аниқлаш мумкин:

$$\nabla C(x^*)(x - x^*) = 0 \quad (2)$$

Бу деган сўз, кўп мезонли масаланинг ҳақиқий функциясидан $\Phi(C)$ дан биз апроксимациялаб қурган функция $\Phi(x)$ фарқининг 0 га тенглигини ифодалайди, яъни

$$\Phi(C) - \Phi(x) = \nabla C(x^*)(x - x^*) = 0 \quad (3)$$

Апроксимация юзасидаги қидирилаётган оптимал ечимни белгиловчи $A(x^*)$ нуқта координаталари (1) тенгликлар системасини биргаликда ечиш орқали топилади:

$$x^* = \frac{\Delta C_{12}x_1 + \sum_{i=2}^{s-1} (\Delta C_{hi-1} + \Delta C_{hi+1})x_i + \Delta C_{hs}x_h}{\Delta C_{12} + \sum_{i=2}^{s-1} (\Delta C_{hi-1} + \Delta C_{hi+1}) + \Delta C_{hs}}. \quad (4)$$

бу ерда

$$\nabla C_{12} = C_1(x^*) - C_2(x), \quad \nabla C_{21} = C_{12}(x) - C_{21}(x^*). \quad (5)$$

Келтирилган формула КОМнинг талабларини ҳисобга олади ва уни жуда қийин масалаларни ечишда ҳам қўллаш мумкин.

Агар мезонлар ўзаро таққослаб бўлмайдиган, турли масштабга ва ўлчамга эга бўлсалар у ҳолда мезонларга аҳамият коэффициентлари киритилиб, кўп мезонли масаланинг самарали ечими қўйидагича аниқланади:

$$x^* = \frac{\lambda_1 \alpha_1 \Delta C_{12} x_1 + \sum_{i=2}^{s-1} \lambda_i \alpha_i (\Delta C_{i|i-1} + \Delta C_{i|i+1}) x_i^* + \lambda_s \alpha_s \Delta C_{s|s-1} x_s^*}{\lambda_1 \alpha_1 \Delta C_{12} + \sum_{i=2}^{s-1} \lambda_i \alpha_i (\Delta C_{i|i-1} + \Delta C_{i|i+1}) + \lambda_s \alpha_s \Delta C_{s|s-1}}. \quad (6)$$

бу ерда λ – ички аҳамият коэффициенти.

Агар КОМ иккита ҳал қилувчи мезон орқали ифодаланиши мумкин бўлса, у ҳолда

$$x^* = \frac{\lambda_1 \alpha_1 \Delta C_{12} x_1 + \lambda_2 \alpha_2 \Delta C_{21} x_2}{\lambda_1 \alpha_1 \Delta C_{12} + \lambda_2 \alpha_2 \Delta C_{21}}. \quad (7)$$

Лойиҳалаш амалиётида таклиф қилинаётган (7) формула «Тезкор кўп мезон усули» асосини ташкил қиласди ва натижалари қулайлиги, ҳамда жуда соддалигини кўрсатади. Бу эса ихтиёрий мураккабликдаги ва тартибдаги кўп мезонли масалаларнинг характерли кўрсаткичлари бўйича қидирилаётган оптимал ечимни аниқлаш имконини беради.


Мисол. Назорат учун [2] усул ёрдамида ечилган бир масалани кўриб чиқамиз. Қуйидаги параметрларга эга бўлган шарнирли стерженли оддий система берилган: $R_p=200$ мн/м², $R_c=150$ мн/м², (F)=0.707 см² l_1 , l_2 , $l_3=1.0$ м (25-расм)

$$P_1 = \begin{bmatrix} 0,0 \\ -100,0 \end{bmatrix} \text{ мн} \quad P_2 = \begin{bmatrix} 50,0 \\ -70,0 \end{bmatrix}.$$

Мезонлар сифатида $G = \gamma \sum_{i=1}^3 F_i L_i$ – системанинг оғирлиги, $T = K \frac{gq}{\alpha} \sqrt{3q}$ – ишлаб чиқаришга кетадиган меҳнат сарфи (q – ўлчамлар рақами) қабул қилинган.

Ҳар бир мезон бўйича оптимал ечим: Оғирлиги энг кичик бўлган ечимда $G_{min}=4,52 \cdot 10^{-2}$ мн, бу ерда меҳнат сарфи $T_{min}=0,283$ одам.соат ва бошқарув параметрлар миқдори $F(G)_{min}=\{1,0; 4,09; 0,707\}$ га тенг.

Меҳнат сарфи энг кичик бўлган ечимда $T_{min}=0,185$ одам. соат; оғирлик эса $G=5,85 \cdot 10^{-2}$ мн, бошқарув параметрлар миқдори $F(T)_{min}=\{2,65; 2,65; 2,65\}$ га тенгдир.



25-расм.

Ушбу күпмезонли масаланинг ечими (4) формулага асосан қыйидаги күрнишга келади:

$$q = 3 \text{ бүлганды } F \cdot (GT) = \{1,7; 3,47; 1,63\}$$

$$q = 2 \text{ бүлганды } F \cdot (GT) = \{2,65; 3,47; 2,65\}$$

$$q = 1 \text{ бүлганды } F \cdot (GT) = \{2,65; 2,65; 2,65\}$$

Күрниб туриблики, бу қийматларнинг мақбул нүктеси илмий асосда аниқланади. Үсулни ўта мураккаб масалаларга ҳам қўллаш мумкин, натижаси аниқ ва белгиланган α – устуворликга боғлиқдир.

Математик мақбуллаш үсулларининг хиллари кўп. Улардан асосан ЭҲМ ёрдамида фойдаланиш мумкин, чунки но маълумлар сони қанча кўп бўлса, мураккаблик шунча ортади. Юқорида кўрсатилган энг содда үсуллардан ташқари бир неча бошқа хил үсуллар ҳам мавжуд. Булар жумласига «Тасолифий қидириув» «Динамик дастурлаш» үсуллари, «Эвристик үсуллар», «Ўйинисимон үсуллар» ва ҳ.к.лар киради. Бу үсулларни ўрганиш учун маҳсус билимлар керак бўлади.

Бу үсуллар ёрдамида жуда кўп ва ҳар хил мураккабликдаги масалаларнинг энг мақбул ечимларини топиш мумкин.

65. Оптималлаштириш (ПОРТ) компьютер дастури

Оптимал ечимни қидириш, топиш, ечимлар ичида энг зарурини танлаш катта ҳисоблашларни ва вақтни талаб этади. Шунинг учун бундай масалаларни фақат ҳисоблаш техникаси ёрдамида бажариш мумкин. Қуйида энг уни-

версал оптималлаштириш компьютер технологиясига доир дастурга доир йүрикнома келтирилган.

Аввало оптималлаштириш зарур бўлган масаланинг математик модели яратилади.

Бизга оптималлаштириш мезони функция қўринишида берилган бўлсин:

$$C(x) = C_{11}x_{(1)} + C_{12}x_{(2)} + \dots + C_{1m}x_{(m)} \rightarrow \min(\max) \quad (a)$$

Масаланинг шарти бўйича юқоридаги функциянинг ушбу

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_{(1)} + a_{12}x_{(2)} + \dots + a_{1m}x_{(m)} \leq b_{(1)} \\ a_{21}x_{(1)} + a_{22}x_{(2)} + \dots + a_{2m}x_{(m)} \leq b_{(2)} \\ \dots \\ a_{n1}x_{(1)} + a_{n2}x_{(2)} + \dots + a_{nm}x_{(m)} \leq b_{(n)} \end{array} \right\} \quad (b)$$

чегаравий шартларини қаноатлантирувчи ечими топилсан.

Бу ерда $C(x)$ — оптималлаштириш мезони, x — номаълум ўлчам, a , b лар чегара шартларидағи озод ҳадлар.

Бу масалани аналитик усул билан ечиш мумкин. Шахсий ЭҲМда ҳам шу каби масалаларни ечиш мумкинми? Агар мумкин бўлса, қанақа усувлар билан ечган маъқул? Мана шу каби саволларга жавоб топиш учун шахсий ЭҲМда тузилган ПОРТ оптимал қидирудувчи дастурига мурожаат қиласиз. ПОРТ оптимал қидирудувчи дастури юқоридаги (a) масаланинг (b) чегаравий шартларини қаноатлантирувчи ечимини тасодифий қидирудув усули орқали излайди.

Ушбу масалани ечишдан мақсад берилган масаланинг аналитик ечими билан ЭҲМда ечишган ечимини солиширишдан иборатдир, яъни ПОРТ оптимал қидирудувчи дастурининг фойдали ва шу билан бирга хатоликлар дарајасини аниқлашдан иборат.

ПОРТ қидирудувчи дастури ҳам тасодифий излаш усули асосида ишлайди.

ПОРТ қидирудувчи дастурида масалани қўйидагича қўймиз:

А) Мезон функцияни оптималлик шартлари асосида текшириши:

Б) Чегаравий шарттарни қуриш (ресурсдаги чегаралар ва бошқалар).

Шахсий ЭХМда масаланинг ечилиш босқичини кўрайлик.

Масала математик моделига асосан икки қисмга бўлиниади:

1. Мақсад функциясининг умумий кўриниши юқоридаги (а) кўринишда бўлади.

2. Чегаравий шартлар эса (б) кўринишда бўлади.

ПОРТ қидирувчи дастури қуйидаги шартлар асосида оптималлаштириш жараёнини бажаради:

а) номаълумларнинг **сонини киритинг**.

Бунда номаълумлар сони киритилади.

б) чегаралар сонини киритинг.

Бу ерда берилган тенгсизликлар сони киритилади.

в) ϵ — **аниқликни билдирувчи жуда кичик сониниг қийматини киритинг**.

ϵ қийматининг 0,1 дан оптималлаш жараёни тугагунга қадар давом эттириш мумкин. Бунда $\epsilon > 0,000001$ шартни назарда тутиш зарур бўлади.

г) **DELTAнинг қадамини киритинг**.

DELTA — номаълумнинг ўзгариш қадамини, баъзизда 0,5 деб қабул қилиш тавсия қилинади. Кейинги ҳар бир қадамда ЭХМ мана ину қадамнинг мақбул қийматини аниқлаштириб боради.

д) **Бошланғич векторни киритинг**.

Бу ерда x_1, x_2, \dots, x_n — бошланғич векторлар, яъни номаълум миқдорларнинг тахминий қийматлари, жуда бўлмаганда 1-лар бериш мумкин. Улар аниқликка, чегарага ва бошқа шартларга кўра батамом ўзгариши мумкин.

е) Оптималлаштиришининг типини: максимум ёки минимумини танланг.

Юқоридагилар компьютерга киритилгандан сўнг «Берилганларни киритинг» тугмачаси босилгач, (а), (б)ларнинг умумий кўриниши ҳосил бўлади. Сўнгра коэффициентлар киритилади. Қидирув жараёни бажарилгандан ва

натижа олингандан сүнг ЭХМ оптималлаш жараёни туга-
ланғы ҳақида хабар беради.

Дастур Deiphis4 программалаштириш тилида тузилған
булиб, ҳар томонлама мұккаммал ишланған. Дағтурдан барча
хоҳловчилар, қизиқувчилар фойдаланишлари мүмкін.

НОРГ дастуридан олинған натижаларин қуйндаги жад-
валларда күрайлик. Жадвалларда усгуулар қуйидаги гар-
тибда тузилған:

1. Тартиб рақами.
2. Мақсал функциясининг умумий күриниши.
3. Чегаралар системасининг берилиши.
4. Ечимлар:
 - аналитик ечим.
5. Бошланғыч хлар.
6. Фойдали қадамлар сони.
7. Фойдасыз қадамлар сони.
8. Оптималлаш %.и.

СҮНГИ СҮЗ

Шундай қилиб, хурматли үқувчи, тадбиркор ва иқтисодчи, бу китобда сизга иқтисодий математик усуллар мөхиятини мисол ва масалалар асосда тушунтиришига уриниб күрдик.

Аҳамият берсанғыз күпинча математик изоҳдар билан сизни қиёнамасликка ҳаракат килдик. Аммо билингки, бу фан анча мураккаб бўлиб, математик ифода ва формулалар орқалигина ишлайди. Бу фан техник ва иқтисодий олий үқув юртларида III–IV курсларда ўргатилади.

Китобни ёзаётгандиа муаллиф юздан ортиқ ҳикоя, масала ва мисолларнинг мазмунини режалаб, улар зоссида китобчани тайёрлашда ийғилган материалларни 2–3 қисмга бўлишини лозим топди.

Биринчи қисмда [1] келтирилган мисоллар оптималь масалаларнинг ёнг соддалари ҳисобланади. Бундай масалаларни аксарият умумлаштириб математик дастурлаш масалалари деб юритилади.

Ҳаётда, ҳалқ ҳужалигига чизиқди бўлмаган ва бошқа ҳар хил мураккабликдаги (яхлит соили, ҳҳимоли, динамик, өвристик, ўйин ва бошқа) масалалар ҳам кўп учрайди. Уларнинг жозибадорлиги, зарур ва фойдалилиги юқоридагилардан қолишмайди.

Шу билан бирга юқоридаги ўрганилган бир мезонли масалалар билан бир қаторда аксарият кўп мезонли масалаларни ечишга тўри келади. Масалан, костюм олиш, автомобиль танлаш, касб ахтариш, мустаҳкам ва арzon иморат қуриш каби жуда кўп масалалар бир йўла бир неча мезонни яхшилашни талаб килади. Костюм факат арzon ёки чиройли ёки пишиқ ёки замонавий бўлиши кам-ку. Бизга қолса, ҳам арzon (жуда арzon бўлмасада), ҳам чиройли, пишиқ ва замонавий бўлишини хоҳлаймиз.

Албатта, шу каби аббитуриент ёки ёшларнинг касб танлаши ҳам бир неча мезон орқали ифодаланади. Айниқса касб танлаш жуда қизиқ ҳамда математик тез, тұла ва аниқ ечилиши мумкин бўлган масаладир. Бундай масалани ечишда ҳамма талаб шарт-шароитни хусусан, ота-онанинг фикрини, касбнинг ифтихорини инобатга олиш зарур.

Ана шундай чизиқти бўлмаган ва кўп мезонли масалаларга багишланган материалларни бир оз ёритган бўлсак ҳам келгусида жуда қизиқ ва ҳаётий мисолларни II ва III қисмларда нашр этиш ниятимиз бор.

Эслатиб ўтамиш, математик моделлар, баъзи ҳикоялар бошқа манбалардан олингандиа бўлиб, кенг оммага яқинлаштириши учун қайта ишланган.

Шуннай айтиши лозимки, математик-иқтисод усуллари халқ хұжалигидегі жуда кatta ва мураккаб мұаммаларини ечишга имкон беради. Қызыл республикамызда бундай усуллар қурилишда, қишлоқ, хужалығида, тиббиетда, саноатда, құйнингки, деярли ҳамма соқаларда кең қулланилиб келиніпти ва миллионлаб сүмлик иқтисодий самаралар бераяпты.

Миңг ағсусларки, бундай усуллар ёрдамида ечилмаشتган масалалар ундаи бир неча марта күп булиб, миллиардлаб сүм маблағлар бе-фойда харажат қилингенди. Агарда ҳар бир мутахассис, ҳар бир тад-биркор, ҳар бир шахс шу усулларин амалда құллай билса, республика-миз иқтисодиеті қисқа вақт ичида әнг бадавлат, тежамкор ва самарали булиши хеч гап әмас.

Математик-иқтисод усуллари ҳозыр деярли ҳар бир ЭХМга кири-тилгап үзүннөң мөхиятини, яйни математик услубини сиз билап биз билишимиз шарт эмас. Масалан, хоҳтаган ҳисоблаш марказига, мута-хассиста борсак, у тезда ишонарлы оптимал ечимни чиқарып беради.

Муаллиф ҳар бир тадбирни күрастганингизда бу масалалинг энг яхши, оптимал ечими боралганин улутмаслигингизни, бу оптимал ечими топини мураккаб эмаслигини эслатиб ўтади.

Агарда ушбу китобча ўқувчига маъқул тушган бўлса, биз мақбул ечимлар борлиги ва уларни топиш мумкинлигини тушунтира олган бўлсак, ва ҳаётда (ўқишида, уйда, ишда, ва ҳ.к.) шундай усуулларни қулаш мумкинлигини ишонтира олган бўлсак беҳад маминуни бўламиз ва бошлаган ҳайрли ишни яна давом эттирамиз.

АДАБИЁТ

1. Абчук В. А., 7:1 в нашу пользу. М. Радио и связь 1982, –176 с.
2. Грешилев А. А., Как принято наилучшее решение в реальных условиях, М. Радио и связь 1981—320 с.
3. Мостеллер Ф., Пятьдесят занимательных вероятностных задач с решениями. М. Наука, 1985.
- 4 Туйчиев Н. Д., Модели оптимизации производственных планов, проектов и программ. Тошкент, ИПК РР, 1982.
5. Халмайзэр А. Я., Математика гарантирует выгриш, М. 1991, 240
6. Садовский Л. Е и др. Математика и спорт М. «Наука» 1983 г.
7. Розен В. В. Цель — оптимальное решение М. «Радио и связь» 1982 г.
8. Грошев В. П. Занимательная экономика М. Просвещение 1989 г.
9. Туйчиев Н. Д. Оптимальное проектирование железобетонных рам. Ташкент, «Фан», 1989 г.
10. Шодиев Т., Қўчкоров А., Мизрапов У. Ишлаб чиқаришни режалаштиришда математик усуллар. Т.: Узбекистон, 1995.
11. Туйчиев Н. Ж. Минг бир бизнес, Тошкент, Молия 2001 й., 140 в.
12. Туйчиев Н. Д. Вероятностная оптимизация и оценка надежности сложных стержневых конструкций. Ташкент, «Фан», 1993.
13. Избранные задачи по строительной механике и теории упругости. Учеб. пособие для ВУЗов. Под общей редакцией Н. П. Абовского М., Стройиздат, 1978.
14. В мире строительной кибернетики. Воропаев В. И., Рейтман М. И.. М., Стройиздат, 1975.

МУНДАРИЖА

I. Умумий маълумот	3
1. Кириш	3
2. Ютуқ нимада?	6
3. Алдовсиз ютуқ	8
4. Қишлоқ хўжалиги маҳсулотини консервалашдан даромад	11
5. Аҳмад юқ етказишини ривожлантироқчи	13
II. Тўплам	16
6. Мантиқсиз буйруқ	16
7. Одам Аго ва Момо Ҳавонинг қўйлари	17
III. Эҳтимоллик	18
8. Олчи ёки пукка?	18
9. Муҳлиса қайси қаватда яшайди?	20
10. Математик Комилжон учрашувга ишоилияпти	22
11. Дала ҳовлида қурилиш – «Сюриз»	24
12. Сирли-махфий хатнинг мазмуни	25
13. Бизнесда ким аниқ ютади?	27
14. Қайси кунлари савдо яхши бўлади	28
IV. Математика ёрдам бермоқчи	30
15. Тўртта омборчи учтасидан арzon?	30
16. Темир йўл станциясини қаерга қурган маъқул?	32
17. «Материаллар қаршилиги»ни топширдингми, уйлансанг бўлади	34
18. Мингбулоқ нефти – туман бойлик бўлсин десак	36
19. Зафар шошаяпти	38
20. Тешавой бензиндан иқтисод қўлмоқчи	40
21. Иморатнинг баландлиги ва бошқа ўлчамлари	42
22. Энг катта ва энг арzon	45

23. Салима шамни қаерга қўйсин?	47
24. Шуҳрат кўпприк қурмоқчи	49
25. Кўп юришди, кўн ўилашди, ниҳоят кўплаб қуришди	51
V. Чизиқли дастурлаш нима?	53
26. Мебелдан даромад	53
27. Алишер аккумулятор тузатади	55
28. Лутфулла мәҳмонхона ташкил қилмоқчи	58
29. «Машҳура»дан машҳур тикувчилар чиқади	60
30. Самода узумли парвоз қилиш — ердаги тинимсиз изланишлар маҳсулидир	62
31. Сут-қатиқни тезликда эгасига етказсанг, ютуқ сеники	65
32. Фермер нималарни қанча срга эккани маъқул	70
33. Мол боққанга барака	76
34. Автотранспортнинг камхаражат режаси	80
35. Танлаб олсанг толмассан, уятга ҳам қолмассан	83
36. Кучингиз етса фабрика, бўлмаса цех очинг	85
37. Нои тандирда, даромад ошириш йўли мияда пишади	86
38. Абдусаттор қурилишни бошқариш билан машғул	88
39. Транспорт ташувларини оптимал режалаштириш	90
40. Зиёдиллага зиёбахш зал лозим булиб қолди	91
VI. Яна бир неча хил муаммолар	93
41. Деҳқончилик туман бойлик	93
42. Катта қурилиш катта билимни талаб қиласди	104
43. Кичкина Маҳмуднинг катта ўйлари	106
44. Фермер хўжалигидан икки лавҳа	108
45. Ерга қувват берсанг, даромад сеники	111
46. Ўйингоҳга энг яқин йўл	113
47. Транзистор корхонаси	115
48. Самолётдан самараали фойдаланиш	116
49. Самолёт конструкцияси сингил ва арzon бўлсии десак	118
50. Семизбой аканинг озиш режаси	121
VII. Кўн меъзонли муаммолар	124
51. Мен ва рафиқам	124
52. Ким бўлсам экан?	127
53. Сих ҳам, кабоб ҳам куймасин десанг	132

VIII. Оптималлаштириш усуллари	134
54. Оптималлаштиришда иқтисодий-математик модел	134
55. Оптималлаштириш масаласининг математик модели	136
56. Масаланинг математик моделини аниқлаш	138
57. Оптималлаштиришининг математик усуллари	144
58. Чизиқли математик дастурлаш усули	145
59. График усул	147
60. Бутун сонли (дискрет) дастурлаш	150
61. Чизиқли булмаган дастурлаш усуллари	153
62. Динамик дастурлаш	157
63. Эҳтимоллик нимадир?	159
64. Кўп мезонли масалаларни очиш усули	160
65. Оптималлаштириш (ПОРТ) компьютер дастури	165
Сўнгги сўз	169
Адабиёт	171

Нодир Жамолович Тўйчиев

**БИЗНЕСДА ИҚТИСОДИЙ
МАТЕМАТИКА УСУЛЛАРИ**

*Олий ўқув юртлари талабалари
учун ўқув қўлланма*

«Ўзбекистон» НМИУ — 2004.
700129, Тошкент, Навоий кўчаси, 30.

Бадиий муҳаррир *Ҳ. Мехмонов*

Техник муҳаррир *У. Ким*

Мусаҳҳих *Ш. Мақсудова*

Компьютерда тайёрловчи *Л. Абкеримова*

Босишига руҳсат этилди 18.11.04. Бичими 84×108 / _у. Шартли б.т. 9,24.
Нашр т. 7,80. Нусхаси 1000. Нашр № 132-03. Буюртма № **K-0006**
Баҳоси шартнома асосида

Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлигининг «Ўзбекистон»
НМИУда босилди. Тошкент, 700129, Навоий кўчаси, 30.

65.9(2)

Т 60

Тўйчиев Н.Ж.

Бизнесда иқтисодий математика усуллари/Олий ўқув юртлари талабалари учун қўллаима. Т.: «Ўзбекистон» нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2004,—176 б.

ББК 65.9(2)-07

- **Мухлиса қайси қаватда яшайди?**
- **Математик Комилжон учрашувга шошиляпти**
- **Бизнесда ким аниқ ютади?**
- **Қайси кунлари савдо яхши бўлади?**
- **Тўртта омборчи учтасидан арzon**
- **Темир йўл станциясини қаерга курган маъқул?**
- **Лутфулла меҳмонхона ташкил қилмоқчи**
- **“Машхура“дан машхур тикувчилар чиқади**
- **Автотранспортнинг камҳаражат режаси**